



5  
P  
as

# HORTUS BOISSIERIANUS

---

## ÉNUMÉRATION DES PLANTES

CULTIVÉES EN 1885

à Valleyres (Vaud) et à la Pierrière (Chambésy près Genève)

PAR

EUGÈNE AUTRAN

Conservateur de l'Herbier Boissier à Chambésy

ET

THÉOPHILE DURAND

Conservateur au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles.

PRÉFACE DE M. F. CRÉPIN

Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles.

---

*Avec un portrait d'Edmond Boissier, et deux planches.*

---

GENÈVE ET BALE

GEORG & Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE & FILS

49, rue Hautefeuille.


BERLIN

R. FRIEDLENDER & SOHN


44, Carlstrasse.

1896

---



**HORTUS BOISSIERIANUS**





LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN.



R. Piquet del Esc.

Journal of the American Statistical Association  
1990, Vol. 85, No. 413

... clear iris

# HORTUS BOISSIERIANUS

---

## ÉNUMÉRATION DES PLANTES

CULTIVÉES EN 1885

à Valleyres (Vaud) et à la Pierrière (Chambésy près Genève)

PAR

EUGÈNE AUTRAN

Conservateur de l'Herbier Boissier à Chambésy

ET

THÉOPHILE DURAND

Conservateur au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles.

PRÉFACE DE M. F. CRÉPIN

Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles.

---

*Avec un portrait d'Edmond Boissier, et deux planches.*

---

GENÈVE ET BALE

GEORG & Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE & FILS

49, rue Hautefeuille.

BERLIN

R. FRIEDLÄNDER & SOHN

44, Carlstrasse.

1896

4171  
B66  
166  
166  
166

---

LAUSANNE. — IMP. GEORGES BRIDEL & C<sup>IE</sup>

---



## PRÉFACE

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN.

Boissier, l'illustre auteur du *Flora Orientalis*, avait réuni dans sa belle campagne de Valleyres, au pied du Jura, une admirable collection de plantes vivaces dont la réputation était devenue universelle.

Ses voyages en Orient, en Italie, en Espagne et ses nombreuses excursions dans les Alpes lui avaient permis de recueillir lui-même un grand nombre des espèces de cette collection, dans laquelle les plantes alpines comptaient pour une large part.

Grâce à des installations ingénieuses, résultat d'une expérience de tous les jours, Boissier était parvenu à cultiver d'une façon presque miraculeuse les plus difficiles des habitantes des hautes altitudes.

Les visiteurs des jardins de Valleyres restaient toujours émerveillés en face des rocailles, des murs, des remparts et des multiples carrés qui regorgeaient d'une foule d'espèces alpines originaires non seulement des Alpes d'Europe, mais encore des montagnes de l'Asie et de l'Amérique.

Possesseur d'une grande fortune, Boissier, depuis 1852, n'avait reculé devant aucune dépense pour enrichir ses collections des espèces qu'il n'avait pu recueillir lui-même.

M. Christ a, dans le *Supplementum Floræ Orientalis*, décrit avec enthousiasme les cultures de Valleyres, dont il évaluait les espèces et variétés à environ 3500. Ce chiffre est d'autant plus remarquable qu'il ne comprend pas de vulgarités.

En composant ses collections, Boissier, tout en satisfaisant sa passion pour les plantes rares ou intéressantes, avait eu en vue de pouvoir étudier sur le vif des caractères que, pendant ses voyages, il n'avait pas toujours le temps ou l'occasion d'examiner avec le soin désirable. Il trouvait ainsi à Valleyres, à côté de ses herbiers, de précieux matériaux vivants propres à perfectionner les descriptions de ses ouvrages.

Pendant l'hiver, Boissier quittait son domaine de Valleyres pour séjourner à sa campagne du Rivage, aux bords du Léman. Là, il avait créé un vaste *arboretum*, dans lequel il avait introduit un très grand nombre d'arbres exotiques, principalement des conifères. Aujourd'hui, cet arboretum est devenu splendide par la beauté et la rareté de ses essences. Nous avons eu l'occasion d'admirer ce parc lors de la session extraordinaire de la Société botanique de France tenue en Suisse en 1894.

Lors de cette même session, nous avons visité les serres de la campagne la Pierrière, propriété de Madame Barbey. Les plantes cultivées au Rivage ont été transférées à la Pierrière, après la mort de Boissier. Ce dernier y avait réuni une foule d'espèces tropicales et subtropicales.

On verra, dans le tableau statistique faisant suite à cet avant-propos, le nombre de familles, de genres, d'espèces et de variétés composant les collections réunies de Valleyres et du Rivage. Le nombre des espèces et variétés dépasse 5000.

Les genres à espèces alpines et subalpines sont richement représentés. Citons, par exemple, *Ranunculus* (27 espèces); *Arabis*, (20); *Draba*, (13); *Dianthus*, (26); *Silene*, (31); *Arenaria*, (23); *Potentilla*, (44); *Saxifraga*, (107); *Sempervivum*, (30); *Campanula*, (42); *Primula*, (56); *Androsace*, (15); *Gentiana*, (25); *Crocus*, (41), etc.

Il est d'autres plantes dont les genres, par suite d'un choix fait par Boissier, sont également riches en types spécifiques. Tels sont les suivants: *Cotyledon*, (43 espèces); *Mamillaria*, (77); *Echinocereus*, (48); *Cereus*, (70); *Opuntia*, (36); *Mesembryanthemum*, (67); *Masdevallia*, (69); *Dendrobium*, (57); *Cœlogyne*, (21); *Odontoglossum*, (47); *Oncidium*, (58); *Aerides*, (20); *Cypripedium*, (47); *Selenipedium*, (7); *Iris*, (76); *Agave*, (21); *Gasteria*, (15); *Aloe*, (24); *Allium*, (60); *Lilium*, (30); *Fritillaria*, (35); *Tulipa*, (31); *Calochortus*, (15).

A la mort de Boissier survenue en 1885, son beau-fils, M. William Barbey, botaniste lui-même, devint possesseur de ces précieuses collections. Celles-ci sont conservées avec un soin religieux par le nouveau propriétaire, qui n'a pas cessé, depuis lors, de les enrichir.

Pour permettre au monde botanique et aux amateurs d'apprécier l'œuvre à laquelle Boissier avait consacré tant de recherches et de soins, M. William Barbey a eu l'heureuse idée de faire rédiger sous le titre d'HORTUS BOISSIERIANUS, le catalogue des espèces cultivées en 1885, l'année de la mort de Boissier.

La littérature botanique ancienne compte un assez grand nombre d'ouvrages désignés sous le nom d'*Hortus*, qui sont des catalogues de plantes cultivées dans des jardins botaniques ou dans des jardins de riches particuliers. Les uns sont de simples listes de plantes sans descriptions, les autres

renferment des diagnoses. Beaucoup de ces catalogues n'ont plus que le seul intérêt de nous renseigner sur la date de l'introduction de certaines espèces dans les cultures; mais il en est d'autres qui ont conservé une réelle valeur et qui sont encore consultés de nos jours. Parmi ces derniers, on peut citer l'*Hortus Cliffortianus* de Linné (1737), l'*Hortus Kewensis* d'Aiton (1789), l'*Hortus Britannicus*, de Loudon (1830), etc.

Bien que l'HORTUS BOISSIERIANUS soit dépourvu de descriptions, nous sommes persuadé que le temps lui conservera sa valeur à cause des soins qui ont présidé à sa rédaction.

Etablir la dénomination correcte de plus de 5000 espèces, avec leurs synonymes, leur distribution géographique et l'indication de bonnes planches pour chacune d'elles était un travail considérable et qui a exigé des recherches sans nombre et souvent difficiles. MM. Eug. Autran et Th. Durand voulant produire une œuvre sérieuse, ne se sont pas contentés de copier servilement des ouvrages généraux qui, trop souvent, sont défectueux sous le rapport des indications bibliographiques, des dates de publication, du choix des noms spécifiques à admettre; ils ont, pour chaque espèce, revu les textes originaux. Ce recours aux sources les a conduits à faire d'assez nombreuses rectifications de synonymie et à rétablir la priorité de noms spécifiques délaissés contrairement aux lois qui régissent la nomenclature.

L'HORTUS BOISSIERIANUS, par l'exactitude de ses dénominations spécifiques, est un ouvrage qui sera fructueusement consulté et qui doit occuper une place distinguée à côté des meilleurs traités généraux, species ou monographies.

Il importe de marquer ici que l'impression de ce catalogue



a été commencée en 1891 et que sa dernière feuille vient de sortir de presse.

Nous félicitons bien sincèrement MM. Autran et Durand de cette belle et bonne publication, que la riche bibliothèque du musée Boissier-Barbey et celle de M. C. de Candolle leur ont permis de mener à bonne fin.

Mais nous ne devons pas, d'autre part, oublier M. William Barbey dans nos félicitations. Par la publication de l'HORTUS BOISSIERIANUS, le digne continuateur de Boissier nous a donné une nouvelle preuve de l'intérêt qu'il ne cesse de porter à la science.

Rappelons ici que notre confrère de Valleyres a doté la botanique d'un établissement de premier ordre, le musée Boissier-Barbey, dans lequel sont installés d'une façon admirable l'herbier Boissier et une très riche bibliothèque. L'herbier est chaque année augmenté par d'importants achats de plantes et par des récoltes faites en pays lointains par des voyageurs envoyés aux frais de M. Barbey. D'autre part, la bibliothèque s'accroît de tous les ouvrages nouveaux de botanique descriptive.

Le musée botanique de Chambésy, aux portes de Genève, est devenu promptement un centre d'études de premier ordre.

FRANÇOIS CRÉPIN.

Bruxelles, le 25 juin 1896.

---



# TABLEAU STATISTIQUE

DES

## COLLECTIONS DE PLANTES VIVANTES

*cultivées dans les jardins de Valleyres, du Rivage et de la Pierrière en 1885.*

Dans ce tableau les trois colonnes présentent pour chaque famille le nombre des genres, des espèces et des variétés remarquables.

### DICOTYLÉES

Renonculacées. . .	19	157	20	Hippocratéacées .	1	2	—
Calycanthacées . .	2	3	—	Acéracées. . . .	1	16	8
Magnoliacées . . .	5	12	—	Anacardiées. . .	1	1	—
Anonacées . . . .	1	1	—	Légumineuses. . .	33	98	2
Berbéridées. . . .	11	30	1	Rosacées . . . .	26	160	9
Nymphaeacées . . .	3	6	1	Saxifragées . . .	16	138	16
Sarracéniacées. . .	1	1	—	Crassulacées. . .	17	141	8
Papavéracées . . .	7	14	1	Hamamélidées . .	4	4	—
Fumariacées . . . .	4	18	1	Myrtacées . . . .	5	8	—
Crucifères . . . .	26	100	8	Mélastomacées. .	9	15	1
Résédacées . . . .	1	1	—	Onagrariées. . . .	4	12	2
Cistinéas . . . . .	2	9	—	Passiflorées . . .	1	3	—
Violariées . . . . .	2	28	6	Cucurbitacées . .	1	1	—
Bixinées . . . . .	1	2	—	Bégoniacées. . . .	1	25	—
Polygalées . . . .	2	3	—	Cactées. . . . .	10	250	16
Caryophyllées . . .	9	98	6	Ficoïdées. . . . .	1	67	1
Portulacées . . . .	4	7	—	Ombellifères . . .	18	31	—
Tamariscinées. . .	1	1	—	Araliacées . . . .	3	9	2
Hypéricinées . . .	1	13	1	Cornacées. . . . .	4	8	—
Ternstroëmiacées	2	2	1	Caprifoliacées . .	6	25	1
Malvacées. . . . .	6	9	—	Rubiées . . . . .	10	24	—
Sterculiacées . . .	1	1	—	Valérianiées . . .	2	10	—
Tiliacées . . . . .	2	6	2	Dipsacées. . . . .	1	7	—
Linées . . . . .	2	2	1	Composées . . . .	46	142	9
Géraniacées. . . .	7	81	3	Lobéliacées . . . .	3	3	—
Rutacées . . . . .	5	5	—	Campanulacées . .	8	56	7
Ochnacées . . . .	1	1	—	Vacciniées . . . .	3	3	—
Méliacées . . . . .	2	2	—	Ericacées. . . . .	15	20	—
Ilicinées . . . . .	1	2	—	Dipsacées. . . . .	1	1	—
Rhamnées . . . . .	2	2	—	Plombaginées . . .	4	22	1
Sapindacées. . . .	2	2	—	Primulacées . . .	11	83	12

Myrsinées . . .	1	1	—	Plantaginées . .	1	2	—
Ebénacées . . .	1	3	—	Nyctaginées . . .	1	2	—
Styracées . . .	1	1	—	Amarantacées . .	1	1	—
Oléacées . . . .	6	17	—	Phytolacacées . .	1	1	1
Salvadoracées . .	1	1	—	Polygonées . . .	4	8	—
Apocynacées . .	7	9	—	Népenthacées . .	1	11	—
Asclépiadées . .	9	24	—	Aristolochiées . .	2	13	—
Loganiacées . . .	3	4	—	Piperacées . . .	2	17	2
Gentianées . . .	6	31	—	Laurinées . . . .	1	1	—
Polémoniacées . .	3	11	—	Protéacées . . .	3	3	—
Hydrophyllacées	3	5	—	Thyméléacées . .	3	11	—
Boraginées . . .	10	19	—	Elæagnées . . . .	2	4	—
Convolvulacées .	3	6	—	Euphorbiacées . .	6	36	—
Solanées . . . .	10	14	—	Urticées . . . .	7	13	3
Scrophularinées .	24	66	—	Platanées . . . .	1	2	—
Gesnériacées . .	18	52	—	Juglandées . . . .	3	3	—
Bignoniacées . . .	3	9	—	Myricées . . . .	1	1	—
Acanthacées . . .	13	26	—	Cupulifères . . .	3	6	—
Myoporinées . . .	1	1	—	Salicinées . . . .	2	13	—
Sélaginées . . . .	1	1	—	Empétrées . . . .	1	1	—
Globulariées . . .	1	1	—				
Labiées . . . . .	20	52	—	<i>Totaux</i>	582	2524	162

## MONOCOTYLÉES

Hydrocharidées .	1	1	—	Commélinacées .	6	7	1
Orchidées . . . .	122	772	62	Joncées . . . . .	2	7	1
Zingibéracées . .	8	14	2	Palmiers . . . . .	9	15	—
Musacées . . . . .	2	3	—	Pandanées . . . .	1	1	—
Broméliacées . . .	18	102	3	Aroïdées . . . . .	26	52	5
Iridées . . . . .	16	139	12	Alismacées . . . .	3	3	1
Amaryllidées . . .	32	100	14	Naïadées . . . . .	1	2	1
Taccacées . . . .	1	1	—	Cypéracées . . . .	5	26	—
Dioscoréacées . .	3	4	—	Craminées . . . .	18	33	1
Liliacées . . . . .	91	462	38	<i>Totaux</i>	365	1748	141

## GYMNOSPERMES

Gnétacées . . . . .	1	1	—
Conifères . . . . .	25	76	25
<i>Totaux</i>	26	77	25

## CRYPTOGAMES VASCULAIRES

Fougères. . . . .	41	302	27
Sélaginellacées . . . . .	1	36	4
Lycopodiacées . . . . .	1	5	—
Rhizocarpées . . . . .	2	3	—
<i>Totaux</i>	45	346	31

## TABLEAU RÉCAPITULATIF

	Genres.	Espèces.	Variétés.
Dicotylées. . . . .	582	2524	162
Monocotylées . . . . .	365	1748	141
Gymnospermes . . . . .	26	77	25
Cryptogames vasculaires. . . . .	45	346	31
<i>Totaux</i>	1018	4695	359

Comme points de comparaison nous rappellerons, qu'en 1858, dans l'*Hortus Donatensis*<sup>1</sup>, J. E. Planchon mentionnait 2000 espèces, dont 600 Orchidées.


En 1895, M. le sénateur L. van den Bossche a publié un fort intéressant *Hortus Thenensis*<sup>2</sup> donnant l'énumération de toutes les plantes cultivées dans ses jardins à Tirlemont (Belgique); nous y trouvons le résumé suivant :

	Genres.	Espèces.
Dicotylées . . . . .	854	2233
Monocotylées . . . . .	153	300
Gymnospermes . . . . .	41	131
Cryptogames vasculaires . . . . .	17	29
<i>Totaux</i>	1065	2753


Ces chiffres accusent une légère supériorité quant au nombre des genres, mais pour les espèces, sauf en ce qui regarde les Gymnospermes, les collections Boissier l'emportent de beaucoup.

<sup>1</sup> J. E. Planchon, *Hortus Donatensis*. — Catalogue des plantes cultivées dans les serres de S. E. le prince A. de Demidoff, à San Donato, près Florence. — Paris 1854-1858. 1 vol. in-4° de 258 pages.

<sup>2</sup> L. van den Bossche, *Hortus Thenensis*. — Index des espèces botaniques cultivées dans le jardin de M. L. van den Bossche, à Tirlemont. — 1895. 1 vol. gr. in-8° de 231 pages.








*Le mur de Valleyres.*






*Saxifraga Kotschy* Boissier, 1856.

Cultivé dans le mur de Valleyres, 2 avril 1896.




# HORTUS BOISSIERIANUS





*Herbier Boissier.  
4 janvier 1883.*





## I. RENONCULACÉES

- 1. CLEMATIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 696 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1. — Plus de 200 esp. décrites, réduites à 66 par M. O. Kuntze<sup>1</sup>. — Rég. temp. et trop. du monde entier.
- C. alpina** Miller, *Garden. Diction.* éd. 8 (1768) n. 9. ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 241 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 76. ATRAGENE — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 542. — Sibérie, Mandchourie, Chine bor., Amér. bor., Laponie, Pyrénées, Alpes, Carpathes.  $\mathfrak{H}$
- C. angustifolia** Jacquin, *Enum. Stirp. Vindob.* (1762) 310 ; *Fl. Austr. Icon.* t. 104 ; *Bot. Cab.* t. 918 (forma). — Daourie, Mongolie, Mandchourie, Chine bor.  $\mathfrak{H}$
- C. crispa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 543 ; *Bot. Mag.* t. 1892 ; *Bot. Reg.* XXXII, t. 60 ; Lavallée, *Clémat.* t. 14. — États-Unis mérid.-or.  $\mathfrak{H}$
- C. dioica** Linné, *Amœn. Acad.* V (1760) 398 ; Sloane, *Hist. Jamaic.* I t. 128 ; Martius, *Fl. Brasil.* XIII I (1841) t. 33, fig. 2. — Mexique mér., Ind. occ., Amér. centr., Colombie, Brésil.  $\mathfrak{H}$
- — subsp. **Catesbyana** O. KUNTZE in *Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg.* (1885) 103. C. CATESBYANA Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 736. — Alabama, Georgie, Caroline, Floride, Cuba, Portorico.  $\mathfrak{H}$
- C. Douglasii** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1838) 1, t. 1. — Mont. Rocheuses.  $\mathfrak{H}$
- C. florida** Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 240 ; *Bot. Mag.* t. 834 ; *Bot. Reg.* XXIV t. 25 ; Lavallée, *Clémat.* (1884) t. 5 et 6. — Japon, Chine (Ningpo, Fokien).  $\mathfrak{H}$
- C. florida**  $\times$  **integrifolia** JACKMAN et MOORE ex O. Kuntze in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg.* (1885) 186. — Cultivé dans les jardins.

<sup>1</sup> O. Kuntze, Monographie der Gattung Clematis in Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg XXVI (1885) p. 83-202.

- Clematis Flammula** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 544 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 62 et 63 ; Hayne, *Darstell. und Beschreib. Arzneigew.* XII t. 31. — Rég. méditerran. de l'Eur. et de l'Afrique ; Russie mér., Asie Min., Syrie, Caucase, Perse.  $\mathfrak{H}$
- C. Fremontii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* X (1875) 339. **C. ochroleuca** Loddiges (non Aiton) *Bot. Cab.* t. 661. — Kansas.  $\mathfrak{H}$
- C. graveolens** Lindley in *Lond. Journ. Hort. Soc.* I (1819) 307 cum icone. — Turkest., Afghan., Himal. temp. occ.  $\mathfrak{H}$
- C. heracleæfolia** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 138. **C. Hookeri** Decaisne in *Nouv. Archiv. Mus. sér. 2, IV*, 204, t. 9. **C. tubulosa** var. **Hookeri** J. D. Hooker in *Bot. Mag.* t. 6801. — Chine bor., Japon.  $\mathfrak{H}$
- — subsp. **Davidiana** O. Kuntze in *Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* (1885) 183. **C. Davidiana** Decaisne, *Révis. Clémat. tubul.* (1881) t. 10. **C. tubulosa** J. D. Hooker in *Bot. Mag.* (1846) t. 4269. — Chine bor.  $\mathfrak{H}$
- — subsp. **stans** O. Kuntze, *loc. cit.* (1885) 183 **C. stans** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Natur.* (1843) n. 302 ; *Bot. Mag.* t. 6810 ; Decaisne, *Révis. Clémat. tubul.* t. 12, var. — Japon.  $\mathfrak{H}$
- C. integrifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 544 ; *Bot. Mag.* t. 65 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 362. — Portugal, Eur. centr. et or., Grèce, Cauc., Asie Min., Sibérie occ., monts Altaï, Songarie.  $\mathfrak{Z}$
- C. lanuginosa** Lindley in Paxton, *Fl. Gard.* III (1854) 107, t. 94 ; *Fl. des Serres* VIII t. 811. — Chine.  $\mathfrak{H}$
- C. ochroleuca** Aiton, *Hort. Kew.* II (1789) 260 ; Trattinick, *Archiv. für d. Bot.* t. 269. — Amér. bor. (bassin de l'Atlantique).  $\mathfrak{Z}$
- C. Orientalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 543 ; Kerner, *Hort. Sempervir.* t. 691. — Eur. (bassin de la mer Caspienne), Ile Tinos ; Afrique (rég. médit. except.), Asie (Japon et rég. bor. exceptés).  $\mathfrak{H}$
- C. Pitcheri** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 10 ; Lavallée, *Clémat.* t. 15. — Arkansas.
- C. recta** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 544 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 291 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 61. **C. jubata** Bischoff. — Eur. centr., mér. et mér.-or., Sibérie, Mandchourie, Japon.  $\mathfrak{Z}$
- C. reticulata** Walter, *Fl. Carol.* (1788) 156 ; Watson, *Dendrol. Brit.* I t. 72. — De la Floride à la Louisiane, Texas, Mexique.  $\mathfrak{Z}$
- — var. **Sargenti** O. Kuntze in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* (1885) 133. **C. Sargenti** Lavallée, *Clémat.* t. 18. — États-Unis (Saint-Louis).  $\mathfrak{H}$
- C. Viorna** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 543 ; Jacquin, *Eclog. Pl.* t. 32 ; Lavallée, *Clémat.* t. 17. — Amér. bor. (part. or.), Mexique.  $\mathfrak{H}$
- — var. **coccinea** A. Gray, *Pl. Wright.* II (1852) 7. **C. coccinea** Engelm. ex Asa Gray, *loc. cit.* ; *Bot. Mag.* t. 6594 ; Lavallée, *Clémat.* t. 19. **C. texensis** Buckley. — Texas.  $\mathfrak{H}$

**Clematis Virginiana** Linné, *Amœn. Acad.* IV (1759) 275 ; Watson, *Den-drol. Brit.* t. 74. — Amér. bor. jusqu'au Nouv. Mexique. Ț

**C. Viticella** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 543 ; *Bot. Mag.* t. 563 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 516. **C. ASCOTIENSIS** Standish. — Eur. mér. et mérid.-or., Asie Min., Cauc., Perse, Amér. bor. temp. et subtrop. Ț

2. **THALICTRUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 697 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3. — Environ 70 esp.<sup>1</sup>. — Eur., Asie, Afrique, Amér. bor. et mér.

**T. alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 545 ; *Bot. Mag.* t. 2237. — Rég. alp. et arct. de tout l'hémisph. bor. Ț

**T. anemonoides** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 322 ; *Bot. Mag.* t. 366 ; *Fl. des Serres* (1856) t. 1158. — Du Canada à la Floride et à l'ouest, jusqu'au Mississipi. Ț

**T. aquilegifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 547 ; *Bot. Mag.* t. 1818. — Mont. de l'Eur. et de l'Asie temp. Ț

**T. Baicalense** Turczaninow, *Catal. Pl. Reg. Baical.* (1842) n. 5 ; *Fl. Baical.-Dahur.* I (1842) 28. — Du lac Baikal à la Chine bor. et à l'Amour. Ț

**T. dioicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 545 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 8. — Amér. bor. du 32° au 72° de lat. bor. Ț

**T. Fendleri** Engelm. in **A. Gray**, *Pl. Fendler.* (1849) n. 5. — Amér. bor.; hautes vallées des Cordillères. Ț

**T. foetidum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I. (1753) 545 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 10. — Rég. subalp. de l'Eur. et de l'Asie. Ț

**T. isopyroides** C.-A. Meyer in LEDEBOUR, *Fl. Altaïca* II (1830) 346. — Arménie, Syrie, Perse, Afghan., Beloutchist., Altaï, Songarie. Ț

**T. macrocarpum** Grenier in *Mém. Acad. Besanç.* (1838) 117 t. I. — Pyrén. (vers. bor.). Ț

**T. orientale** Boissier in *Ann. Sc. Natur.* sér. 2 XVI (1841) 349. — Morée, Taygète, Taurus, Liban, Bulghar, Daghestan. Ț

**T. petaloideum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 770 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 9. — Asie centr. et or., jusqu'en Corée. Ț

**T. rubellum** Siebold et Zuccarini in *Abhandl. Baier. Acad. Wiss.* IV 2 (1845) 177. **T. AQUILEGIFOLIUM** Linné var. **ATROPURPUREUM** Miquel, *Prol. Fl. Jap.* (1865) 1<sup>a</sup>. — Japon. Ț

<sup>1</sup> Lecoyer, Monographie du genre *Thalictrum* in *Bull. Soc. Roy. Bot. de Belg.*, t. XXIV (1885) p. 78-324.

**Thalictrum tuberosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 545 ; Miller, *Fig. Pl. Gard. Dict.* (1760) 177, t. 265. — France mérid.-occ., Espagne bor. et or. ☞

3. **ANEMONE** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 694 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4. — Environ 85 esp. bien distinctes. — Rég. extratrop. des deux hémisphères ; ailleurs le genre est à peine représenté.

**A. Albana** Steven in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* III (1812) 264 ; Ledebour, *Icon. Fl. Ross.* t. 409. — Caucase, Perse, Tibet, Sibérie centr. et occ. ☞

**A. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 539 ; *Bot. Mag.* t. 2007 ; Reichenbach *Icon. Fl. Germ.* IV t. 51. — Espagne, France, Eur. centr., Caucase, Amér. bor. : rég. arct. occ. et mont. Rocheuses. ☞

— — var. **sulfurea** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 18. **A. SULFUREA** LINNÉ, *Mant. Pl.* I (1767) 78 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 51. — Alpes, Caucase. ☞

**A. angulosa** Lamarck, *Encycl. Bot.* I (1783) 169 ; *Bot. Mag.* t. 5518. **HEPATICA**. — De Candolle, *Regn. Veget. Syst. Nat.* I (1818) 217 ; *Fl. des Serres* XXII t. 2306. — Transylv., Moldavie. ☞

**A. Apennina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 541 ; *Engl. Bot.* t. 1060 ; Curtis *Fl. Londin.* VI t. 35. — Ital., Dalm., Herzég., Monténégro, Grèce ; ailleurs naturalisé. ☞

**A. Baldensis** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 78 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 103 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 50. — Pyrén., Alpes, Monténégro. ☞

**A. biflora** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 201. — Perse, Turkest., Afghan., Belouchist., Cachemire. ☞

**A. blanda** Schott et Kotschy in *Österr. Bot. Wochenbl.* (1854) 129. — Grèce, Thessal., Macéd., Asie Min., Syrie, Perse bor. ☞

**A. coronaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 539 ; *Bot. Mag.* t. 841 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca*, t. 514. — Rég. méditerr. : Eur., Asie, Afr. ; bassin de l'Euphrate supér. ☞

**A. decapetala** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 79 ; **A. TRILOBATA** Jussieu in *Ann. Mus. Paris* III 247 t. 21, fig. 3. — Brésil, Pérou, Chili. ☞

**A. fulgens** J. Gay in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 18. **A. PAVONINA** Lamarck var. **FULGENS** De Candolle, *loc. cit.* — France mér., Ligurie, Grèce, Constantinople. ☞

**A. Halleri** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) n. 170 t. 80 fig. 2 ; *Bot. Cab.* t. 940. **PULSATILLA**. — Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 664. — Dauph., Piém., Lombardie, Eur. centr., Tauride. ☞

**Anemone Hepatica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 338; *Bot. Mag.* t. 10; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 513. — Eur., Asie et Amér. bor. ☞

**A. multifida** Poiret, *Encycl. Bot.* (suppl.) I (1810) 364; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 16. — Rég. extratrop. de l'Amér. bor. et de l'Amér. austr., entre 35° et 55° lat. ☞

— — var. **Hudsoniana** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 24. A. HUDSONIANA Richardson in *Botan. Append. to Franckl. Journ.* (1823) 22. — Amér. bor. ☞

**A. narcissiflora** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 342; *Bot. Mag.* t. 1120; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 48. — Rég. alpestre de la France et de l'Eur. centr. et or., Sibérie, Cachemire, Chine (Chihli), Canada, Amér. bor.-occ. ☞

**A. nemorosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 341; *Fl. Dan.* IV t. 549; *Engl. Bot.* t. 555. — Toute l'Eur.; Amér. bor. : du Canada à la Virginie et aux mont. Rocheuses. ☞

**A. palmata** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 333; *Bot. Reg.* III t. 200; *Bot. Cab.* t. 175. — Portugal, Espagne, France mér., Sardaigne, Sicile, Maroc, Algérie. ☞

— — var. **albida** Sims in *Bot. Mag.* (1819) t. 2079. — Avec le type.

**A. Pennsylvanica** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 247; Torrey, *Fl. State New-York* I (1843) 19 t. 4; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I 8, t. 3, fig. B. A. ACONITIFOLIA Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 320. — De l'Amér. arct. et du Canada, à la Pensylv., au Michigan et à l'Ohio. ☞

**A. polyanthos** Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 194. — Himalaya (du Cachemire au Sikkim), Yunnan. ☞

**A. pratensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 339; *Fl. Dan.* IV t. 611; *Bot. Cab.* t. 900. PULSATILLA — Miller, *Gard. Dict.* éd. 8 (1768) n. 2. — Eur. bor. et centr. : du Danemark à la Russie mérid. et la Thrace. ☞

**A. Pulsatilla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 339; Dietrich, *Fl. Boruss.* VII, t. 478; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 54. — Eur. (Irlande, Écosse, Turquie et Grèce exceptées), Sibérie. ☞

**A. rivularis** Hamilton in De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818); *Bot. Reg.* XXVIII t. 8. A. WIGHTIANA Wallich ex Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 936. — Ceylan., Ind. temp. ☞

**A. stellata** Lamarck, *Encycl. Bot.* I (1783) 166; *Bot. Mag.* t. 123; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 50. — Eur. méditerran., Crète, Tauride. ☞

**A. sylvestris** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 340; *Bot. Mag.* t. 54; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 50. — Suède mér., Eur. centr., de la France à la Transylv., et mér.-or., Caucase, Sibérie. ☞

**A. trifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 340; Sturm, *Deutsch. Fl.* IV t. 14; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 48. — Autriche, Italie bor., Espagne bor., Transylv. ☞

**Anemone vernalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 538; *Fl. Dan.* t. 29; Dietrich, *Fl. Boruss.* VII t. 479. PULSATILLA — Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 3. — Scand., Eur. centr., Ital. bor., Russie méd. et mér. ʒ

4. **ADONIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 698; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6. — Une vingtaine d'espèces décrites, mais 5 ou 6 seulement bien distinctes. — Eur. et Asie tempérées.

**A. pyrenaica** De Candolle, in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* V (1815) 635; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 21. — Pyrénées. ʒ

**A. vernalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 547; *Bot. Mag.* t. 134; Dietrich, *Fl. Boruss.* V t. 292. — Iles Oeland et Gothland, Espagne, France, Eur. centr., Russie méd. et mér., Sibérie, Chine, (Chihli, Shingking, Corée). ʒ

5. **TRAUTVETTERIA** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* I (1835) 22; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 9. — Genre monotype.

**T. palmata** Fischer et Meyer, *loc. cit.* CIMICIFUGA — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 316; *Bot. Mag.* t. 1630; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* III t. 500. — De la Caroline au Tennessee; Japon.

6. **RANUNCULUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 699; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 10. — Genre répandu dans le monde entier; environ 200 espèces.

**R. alpestris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 553; Jacquin, *Fl. austr. Icon.* II t. 110; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 5. — Pyrénées, Jura, Alpes, Carpathes. ʒ

**R. amplexicaulis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 549; *Bot. Mag.* t. 266; *Bot. Cab.* t. 1593. — Pyrén., Alpes. ʒ

**R. anemonæfolius** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 282. — Capadoce, Arménie, Somchétie. ʒ

**R. anemonoides** Zahlbruckner in *Flora* VI 1 (1823) 220; Reichenbach, *Pl. Crit.* VIII t. 779; Sturm, *Deutsch. Fl.* XII t. 46. — Alpes centr., Styrie, Transylv., ʒ

**R. blepharicarpos** Boissier, *Elench. Pl. Hisp.* (1838) n. 1; *Voy. Bot. Esp.* 8 t. 1. — Espagne, Portugal. ʒ

**Ranunculus brevifolius** Tenore, *Prodr. Fl. Napol.* I (1811) 68 et IV (1830) 345 t. 149 fig. 2 ; Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 25. — Italie mér., Montén., Pélopon., Crète, Thessalie, Arménie. ♀

**R. Cadmiceus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, I (1842) 65. — Carie. ♀

— — var. **cyprius** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 32. — Chypre.

**R. carpetanus** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Nov. Hisp.* in *Biblioth. Univ. Genève* XXXVIII (1842) 195 n. 1. — Espagne (Aragon, Castille, Estram.) ♀

**R. crenatus** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* I (1802) 9 t. 10 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 5. — Eur. centr.-or. et mér.-or. ♀

— — subsp. **Magellensis** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 10. **R. MAGELLENSIS** Tenore, *Viag. in Abruz.* (1830) 71. — Apennins, Serbie.

**R. cuneatus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VIII (1849) 2. — Cilicie, Arménie, Liban. ♀

**R. Cymbalaria** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 392 ; *Fl. Dan.* XII t. 2293. — Amér. bor. et centr., Sibérie, Inde or., Chine. ♀

**R. flabellatus** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) 438 t. 114. **R. CHEROPHYLLOIDES** Jordan, *Observ. Pl. Nouv. ou Crit. Fr.* fasc. VI (1847) 5. — Eur. : Rég. Médit. du Portugal à la Grèce ; Asie Min., Syrie, Cyrénaïque, Afrique bor. ♀

**R. Gouani** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 1322 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 16. — Pyrén., Alpes, Apennins. ♀

— — subsp. **Croaticus** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 11. **R. CROATICUS** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* VII (1857) 182. — Carpathes ♀

**R. gramineus** Linné, *Sp. Pl.* éd. I (1753) 549 ; *Bot. Mag.* t. 164 ; *Engl. Bot.* t. 2306. — Eur. mér. (partie centr. et occ.). ♀

**R. hybridus** Biriá, *Hist. Nat. et Médic. des Renonc.* (1811) 38. **R. THORA** Jacquin (non Linné), *Fl. Austr. Icon.* (1778) t. 442. — Autriche, Lomb., Transylv. ♀

**R. Illyricus** Linné, *Sp. Pl.* éd. I (1753) 552 ; *Bot. Cab.* t. 1620 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 8. — Eur. centr. et or. ♀

**R. millefoliatus** Vahl, *Symb. Bot.* II (1791) 63 t. 37 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca*, t. 521 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 9. — Eur. (rég. médit.-or. de l'Italie à la Roumélie), Bithynie, Algérie, Tunisie. ♀

**R. Monspeliacus** Linné, *Sp. Pl.* éd. I (1753) 553 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III, t. 8 ; De Candolle, *Icon. Pl. Rar.* t. 50. **R. MONSPESSULANUS** Jordan, *Diagn.* I 64. — Espagne, France mér., Italie méd., Corse, Sicile, Dobroudja. ♀

— — subsp. **saxatilis** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 8. **R. SAXATILIS** Balbis, *Miscell. Bot.* I (1804) 27. — France or. ♀

- Ranunculus montanus** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 1321 ; *Bot. Mag.* t. 3022 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 16. — Pyrénées, Jura, Eur. centr. et mér.-or. Ț
- R. parnassifolius** Linné, *Sp. Pl.* ed. (1762) 774 ; *Bot. Mag.* t. 386 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 4. — Pyrénées, Dauphiné, Suisse mér., Italie bor., Carinthie. Ț
- R. Peloponnesiacus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, I (1842) 63. **R. GRACILIS** Bory et Chaubard (non Schleicher) *Fl. Pélop.* (1838) 53. — Italie, Grèce, Céphalonie, Crète. Ț
- R. platanifolius** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 79 ; *Fl. Dan.* t. 111. **R. ACONITIFOLIUS** Linné var. **PLATANIFOLIUS** Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 7. — Eur. bor.-occ., centr. et centr.-or., Italie. Ț
- R. rutæfolius** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 552 ; Jacquin, *Collect. Bot.* t. 6 et 7 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 67. — Pyrénées, Dauphiné, Suisse, Italie bor., Autriche, Croatie, Hongrie, Transylv. Ț
- R. Sibthorpii** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2 I (1853) 7. **R. NIVALIS** Smith (non Linné), *Prodr. Fl. Gr.* I (1806) 382. — Bithynie, Troade. Ț
- R. Sprunnerianus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 I (1842) 64. — Macéd., Thessalie, Grèce, Archipel, Crète. Syrie. Ț
- R. Thora** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 550 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V III t. 9. **R. SCUTATUS** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* II (1805) 205 t. 187. — Pyrénées, Jura, Italie, Eur. centr. et mér.-or. Ț
- R. Trautvelleri** Hoppe in *Bot. Zeit.* II (1819) 731 t. 2 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 5. — Carinthie, Carniole, Tyrol, Suisse. Ț
- 7. CALTHA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 703 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 13. — Environ 9 esp. — Europe, Asie, Amérique, Australie, Nouv.-Zélande.
- C. biflora** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 310. — Amér. bor.-occ. Ț
- Obs. M. E. Regel, *Fl. Ost.-Sibir.* I p. 52 ne voit dans cette plante qu'une var. *minima* du *C. palustris* Linné.
- C. leptosepala** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 310 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I 22 t. 10. — Amér. bor.-occ. et mont. Rocheuses, au sud jusqu'au 40°, Ț
- C. natans** Pallas, *Reise Provinz d. Russisch. Reich.* III (1776) 248 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* IV 192 t. 82. — Du Canada, au sud jusqu'au 60° de lat., Sibérie or. Ț



**Caltha palustris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 538 ; *Engl. Bot.* t. 506 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 101. — Eur., Asie occ., Sibér., Amér. bor. 2

8. **HYDRASTIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 704 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 16. — 2 espèces. — Amér. bor., Japon.

**H. Canadensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 784 ; *Bot. Mag.* t. 3019 et 3232 ; Baillon, *Hist. des Pl.* I 51 fig. 88. — Canada, États-Unis, à l'ouest jusqu'à l'Ohio et au Kentucky. 2

9. **TROLLIUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 700 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 17. — Environ 10 esp. — Europe, Asie, Amérique bor.

**T. acaulis** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) miscell. 56 et (1843) t. 32. — Himalaya occ. 2

**T. Altaicus** C.-A. Meyer, *Verzeichn. Pfl. Reise Caucas.* (1831) 290. T. CAUCASICUS Ledebour, *Icon. Fl. Alt.* t. 345. — Sibérie altaïq., Daourie. 2

**T. Asiaticus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 557 ; *Bot. Mag.* t. 225 ; De Lauenay, *Herb. de l'Amat.* t. 88. — Russie or. et arct., Sibérie, Daourie, Chine (Chihli, Kiangsu). 2

**T. Dschungaricus** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VII (1880) 383. — Sibérie. 2

**T. Europaeus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 556 ; *Fl. Dan.* t. 133 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* VI t. 406. — Eur. bor. et méd., mont. de l'Espagne et de l'Italie centr., Caucase. 2

**T. Ledebourii** Reichenbach, *Pl. Crit.* (1825) t. 272 fig. 435. T. DAOURICUS Turczaninow, *Catal. Baikal.* (1843) n. 55. — Sibérie baïcal. 2

**T. patulus** Salisbury in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1803) 303 ; Delessert, *Icon. Select. Pl.* I t. 44 ; Smith, *Icon. adhuc Ined.* t. 37. — Georgie, Asie Min., Perse bor., Kamtchatka ? 2

10. **HELLEBORUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 702 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 18. — 17 esp. décrites, réduites à 7 par M. J. Baker<sup>1</sup>. — Eur., Asie occ. et centr.

**H. Abschasicus** Al. Braun, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) app. p. 24 ; Boissier, *Fl. Or.* I 63 ; C. Koch in *Allgem. Gartenzeit.* (1858) t. 1. H. CAUCAS-

<sup>1</sup> J.-S. Baker, *Species of Helleborus in Garden. Chron. new ser.* VII (1877) I 432 et 464.

**SICUS** C. Koch var. **ABSHASICUS** Regel in *Gartenflora* (1866) t. 496. — Caucase. 2

**Helleborus Caucasicus** C. Koch in AL. BRAUN, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) app. 24. **H. VIRIDIS** Marschall-Bieberstein (non Linné), *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 30. — Georgie. 2

**H. foetidus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 558 ; *Engl. Bot.* t. 60 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 103. — Eur. occ., centr. et mér.-occ. 2

**H. guttatus** AL. BRAUN, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) app. 23 ; K. Koch in *Allgem. Gartenzeit.* (1853) t. 2. **H. CAUCASICUS** K. Koch var. **GUTTATUS** Regel, *Gartenflora* (1863) t. 400. — Caucase. 2

**H. niger** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 558 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 201 ; *Bot. Mag.* t. 8. — Eur. méd. et mér., Grèce cont. 2

**H. odoratus** Waldstein et Kitaibel ex WILLDENOW, *Enum. Hort. Berol.* I (1809) 592 ; *Bot. Reg.* t. 1643 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1643. — Autriche mér., Hongrie, Esclavonie, Transylvanie, Croatie, Serbie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro. 2

**H. viridis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 558 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 106 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 103. **H. PALLIDUS** Host, *Fl. Austr.* II (1831) 90. **H. OCCIDENTALIS** Reuter, *Cat. Graines Jard. Genève* (1868) 4. — Toute l'Europe, sauf la Scandinavie, l'Écosse, la Grèce et la Russie. 2

— — subsp. **multifidus** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 17. **H. MULTIFIDUS** Visiani in *Flora, Ergänz.* XII 1 (1829) 13. — Dalmatie, Herzégovine, Monténégro, Bosnie, Istrie, Croatie, Transylvanie. 2

41. **ERANTHIS** Salisbury in Trans. Linn. Soc. VIII (1803) 303 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 19. — 2 espèces. — Europe, Asie, mont.

**E. Cilicica** Schott et Kotschy in *Österr. Bot. Wochenbl.* (1854) 113. — Cilicie. 2

42. **COPTIS** Salisbury in Trans. Linn. Soc. VIII (1803) 305 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 20. — 6 espèces. — Rég. temp. de l'hémisphère bor.

**C. brachypetala** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Natur.* (1843) n. 328 ; *Icon. Jap. Phonzo Zoufou* VII fol. 4, recto et verso. — Japon. 2

**C. occidentalis** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 28 ; *Fl. Dan.* IX

t. 1519; *Phonzo Zoufon*, VII fol. 3. *CHRYSOPTIS* — Nuttall in *Journ. Acad. Philad.* VII (1834) p. 9 t. 1. — Japon; mont. Rocheuses, d'après Torrey et Gray, *loc. cit.*, mais non mentionné dans ces montagnes par M. Coulter. 2

**Coptis trifolia** Salisbury in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1803) p. 305; *Fl. Dan.* IX t. 1915; *Bot. Cab.* t. 173. *HELLEBORUS* — Linné, *Amæn. Acad.* II (1751) 356 t. 4 fig. 18. — Du Groënland et du Labrador au Maryland et à l'Iowa vers l'ouest; Eur. et Asie bor. 2

13. **ISOPYRUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 701; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 21. — Sept espèces. — Zone temp. de l'hémisphère bor.

**I. biternatum** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 660; Gray et Sprague, *Gen. Amer. Bor.* I p. 26 t. 2; Baillon, *Hist. des. Pl.* I fig. 36. *ENEMION* — Rafinesque in *Journ. de Phys.* II (1820) p. 70. — États-Unis. 2

14. **AQUILEGIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 684; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 23. — Environ 50 esp. décrites, mais d'après M. Baker, il n'y en a que 27 bien distinctes<sup>1</sup> et 6 ou 8 seulement d'après Bentham et Hooker. — Eur., Asie, Amér. bor. et centr.

**A. alpina** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) p. 553, *Bot. Cab.* t. 657; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 48. — Eur. centr., du Dauphiné à la Transylv. 2

— — var. **grandiflora** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veg.* I (1824) p. 50. *A. GRANDIFLORA* Patrin ex De Candolle, *loc. cit.* Avec le type. 2

**A. aurea** Janka, *Plant. Turcic. Breviar.* (1872) n. 2; Boissier, *Fl. Or.* (suppl. 1888) 17. — Macédoine. 2

**A. brevistyla** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) p. 24. — Amér. arct. et mont. Rocheuses jusqu'au Colorado. 2

**A. Buergeriana** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Natur.* (1843) n. 333. *A. ATROPURPUREA* Miquel (non Willdenow), *Prolus. Fl. Japon.* (1866) 196. — Japon. 2

<sup>1</sup> J.-G. Baker, A Synopsis of all the known forms of *Aquilegia*, *Gardener's Chronicle*, new ser. X (1878) pp. 19, 76, 111 et 203.

- Aquilegia chrysantha** A. Gray in *Garden. Chron.* (1873) p. 1335 et 1501 fig. 304; *Gartenflora* (1884) p. 84, cum icone. A. LEPTOCERAS var. HAYLOGENSIS Hort. ex *Gartenflora* loc. cit. A. LEPTOCERAS Nuttall var. CHRYSANTHA J.-D. Hooker in *Bot. Mag.* t. 6073. — De l'Arizona au Nouv.-Mexique. ♀
- A. coerulea** James in *Bot. Long's Exped.* II (1823) 15. A. LEPTOCERAS Nuttall, *Bot. Mag.* t. 4407 et 5477. — Utah, Colorado, Californie. ♀
- A. Einseleana** F. Schultz in *Flora* (1848) 153. A. BAUHNI Schott in *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien* (1853) 128. A. VISCOSA Reichenbach (non Gouan), *Icon. Fl. Germ.* IV (1839) t. 116. — Suisse, Salzbourg, Tyrol, Carinthie, Carniole. ♀
- — subsp. **Bertolonii** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 19. A. BERTOLONII Schott, loc. cit. 127. A. PYRENAICA Bertoloni (non De Candolle) *Fl. Ital.* IV (1842) 431; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 117. — Dauph., Italie bor. ♀
- — subsp. **thalictrifolia** NYMAN, loc. cit. (1878) 19. A. THALICTRIFOLIA Schott, loc. cit. (1853); *Gartenflora*, t. 961. — Tyrol, Ital. bor., Carint., Serbie. ♀
- A. flavescens** S. Watson in WATSON et EATON, *Bot. of the Fortieth Parall.* (1871) 10. A. CANADENSIS Linné var. AUREA Rœzl in *Gartenflora* (1872) 558 t. 734. — Utah, Orégon. ♀
- A. glandulosa** Fischer in LINK, *Enum. Pl. Hort. Berolin.* II (1822) 84; Maund, *The Botan.* V t. 219; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* 2<sup>d</sup> ser. t. 55. — Hongrie, Transylv., Bukovine, Sibérie centr., Japon. ♀
- A. Kitaibelii** Schott in *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien* (1853) 127. A. VISCOSA Waldstein et Kitaibel (non Gouan), *Descr. et Icon. Pl. Hung.* t. 169. — Croat., Dalm., Herzég., Cévennes, Pyrénées. ♀
- A. lactiflora** Karelin et Kirilow in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* XV (1841) 374. — Sibérie centr.-mér. ♀
- A. Olympica** Boissier in *Ann. Sc. Nat.* (1841) 360. A. VULGARIS Linné var. CAUCASICA Ledebour, *Fl. Ross.* I (1842) 56. — Caucase, Arménie, Perse bor. ♀
- A. Ottonis** Orphanides in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2 I (1853) 11. A. MAGELLENSIS Porta et Rigo exsicc. ex Boissier, *Fl. Or.* (suppl. 1888) 16. — Grèce, Ital. mér. ♀
- A. Pyrenaica** De Candolle in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* VI (1815) 640; *Floral Magaz.* (1867) t. 322. — Pyrénées. ♀
- A. viridiflora** Pallas in *Act. Hort. Petrop.* (1779) 260 t. 11. A. ATROPURPUREA Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 577; *Bot. Reg.* XI t. 922. — Sibérie altaïq., Daourie, Chine (Chihli, Kansuh). ♀
- A. viscosa** Gouan, *Fl. Monspel.* (1765) 267; *Illustr. et Observ. Bot.*, t. 19. — France mér., Algérie, Maroc. ♀

**Aquilegia vulgaris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 533 ; *Fl. Dan.* IV t. 695 ; *Engl. Bot.* V t. 297 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 114. — Eur., Asie bor. et temp. Ț

— — var. **oxysepala** REGEL, *Tent. Fl. Ussur.* (1861) 9. A. OXYPETALA Trautvetter et Meyer, *Fl. Ochot.* (1856) p. 10. (in *Middendorff's Reise*). — Chine. Ț

15. **ANEMONOPSIS** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Natur.* I (1843) 73, t. 1 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 24. — Genre monotype.

**A. macrophylla** Siebold et Zuccarini, *loc. cit.* (1843) n. 352, t. 1 ; *Abhandl. Mathem. Phys. Cl. d. K. Bair. Akad.* IV t. 1. A. JAPONICA Siebold et Zuccarini. — Japon. Ț

16. **DELPHINIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 681 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 25. — Environ 40 esp. — Zone tempérée de l'hémisphère bor.

**D. Brunonianum** Royle, *Illustr. Bot. Himal.* (1839) 51 t. 56 ; *Bot. Mag.* t. 5461 ; Morren, *Belg. Hort.* (1865) t. 4. — Tibet occ., Afghan. Ț

**D. Californicum** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 31. — Californie Ț

**D. cardinale** Hooker in *Bot. Mag.* (1855) t. 4887 ; Torrey, *Bot. of Mexic. Bound.* t. 2. — Californie Ț

**D. elatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 749 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 145 ; *Archiv. Mus. Hist. Nat.* IV t. 4. — Pyrénées, Dauph., Italie bor., Europe centr., Russie. Ț

— — subsp. **montanum** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) p. 20. D. MONTANUM De Candolle in Lamarck et De Candolle, *Fl. Fr.* VI (1815) p. 641 ; *Bot. Reg.* XXIII t. 1936 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 73. — Avec le type.

**D. fissum** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* I (1802) p. 83 t. 81 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IV t. 70. — Dauph., Italie centr., Eur. centr.-or. Ț

**D. grandiflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 531 ; *Bot. Mag.* t. 1686 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* t. 78. — Chine, Sibérie, Daourie. Ț

**D. Mackaianum** Regel, *Tent. Fl. Ussur.* (1861) 9 ; *Gartenflora* (1861) 374, t. 344. — Sibérie or. Ț

**D. nudicaule** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) p. 33 et 661. — Californie. Ț

**Delphinium Requieri** De Candolle in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* VI (1815) 642; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 63. D. PICTUM Willdenow; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 123. — France mér., Corse, Sardaigne. (2)

**D. Scopulorum** A. Gray, *Pl. Wright.* II (1852) 9. — Californie. ♀

**D. simplex** Douglas in HOOKER, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 25. — De la Californie au territ. de Washington et à l'Idaho. ♀

**D. tricorne** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 314; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 59; *Bot. Cab.* t. 306. — États-Unis, partie or. jusqu'à l'Arkansas. ♀

17. **ACONITUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 682; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 26. — Une vingtaine d'espèces croissant surtout dans les régions montagneuses de l'hémisphère boréal.

**A. Cammarum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 751; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 424; Hoffmann, *Deutsch. Fl.* (1791) t. 8. — Autriche mér., Suisse, Italie bor. ♀

— — subsp. **Stoerkianum** Nyman, *Consp. Fl. Eur.* (1878) p. 19. A. STOEKIANUM Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* (1819) p. 49 t. 71. — Autriche, Allem., Suède mér.-occ. ♀

**A. Fischeri** Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* (1820) t. 22. A. NASUTUM Fischer in Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 126; A. COLUMBIANUM Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 31. — Alaska, Kamtchat., Sibérie, mont. Rocheuses, Sierra-Nevada. ♀

**A. Kuznezoffii** Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* (1820) t. 24. — Kamtchat., Sibér. or. et transbaïc. — Chine (Chihli, Corée). ♀

**A. Napellus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 532; Reichenbach, *Monog. Gen. Aconit.* t. 1-4; *Icon. Fl. Germ.* IV t. 92. — Eur. (Turquie exceptée), Asie et Amér. arct. et tempér. ♀

— — var. **Tauricum** Seringe, *Mus. Helv.* I (1823) 153. A. TAURICUM Wulfen in Jacquin, *Collect. Bot.* II (1788) p. 112; Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* t. 63. — Tauride. ♀

**A. rotundifolium** Karelín et Kirilow, *Enum. Pl. Song.* (1842) n. 46. — Afghan., Cachemire, Songarie. ♀

**A. uncinatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) p. 750; *Bot. Mag.* t. 1119; Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* t. 35, 36. — Himal. tempér. or.; États-Unis (de New-York à la Pensylv. et à la Georgie). ♀

**A. volubile** Pallas in WILLDENOW, *Sp. Pl.* II (1800) 1237; Jacquin, *Fragm. Bot.* t. 123; Reichenbach, *Monog. Gen. Aconiti* t. 25. — Sibérie altaïq. ♀

18. **CIMICIFUGA** Linné, *Amœn. Acad.* VIII (1774) 193; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 28. — Huit espèces. — Eur. bor., Asie temp., Amér. bor.

**C. Dahurica** Maximowicz, *Primit. Fl. Amur.* (1859) 25. ACTINOSPORA—Turczaninow, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1835) 21. — Daourie, Mongolie, Chine (Chihli). ♀

19. **PÆONIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 445; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 30. — Formes décrites nombreuses, pouvant se ramener à 4 ou 5 espèces. — Eur. et Asie temp., Amér. bor.-occ.

**P. Broteri** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Hisp.* in *Biblioth. Univ.* XXXVIII (1842) p. 196 n° 2. **P. OFFICINALIS** Brotero, *Fl. Lusit.* II 299 (1804) non Linné. — Espagne, Portugal. ♀

**P. Brownii** Douglas in Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 27; *Bot. Reg.* XIV t. 30. — Orégon. ♀

**P. coriacea** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* n. 6 (1838); *Voy. Bot. Espagne*, 14, t. 3. — Espagne mér., Maroc. ♀

**P. Emodi** Wallich, *Catal.* (1831) n. 4727; *Bot. Mag.* t. 5719. — Himal. temp. occ. ♀

**P. microcarpa** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 3. — Espagne. ♀

**P. Wittmanniana** Steven in *Ann. Sc. Natur.* sér. 3 XII (1849) 374; *Bot. Reg.* XXXII t. 9. — Cartalinie, Perse bor. ♀

## II. CALYCANTHACÉES

1. **CALYCANTHUS** Linné *Gen. Pl.* (1737) n. 639 ex parte : T. Durand, *Ind. Gen.* n. 49. — Deux esp. — Amér. bor.

**C. floridus** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 718; *Bot. Mag.* t. 503; Duhamel, *Tr. des Arbres et Arbust.* éd. II, I, t. 47; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 138. — Caroline. ♂

**C. occidentalis** Hooker et Arnott, *Bot. of Beechey's Voy.* (1841) 300 t. 84; *Bot. Mag.* t. 4808; *Fl. des Serres* XI t. 1113. **C. MACROPHYLLUS** Hartweg ex Lindley in *Garden. Chron.* (1852) 613 cum icon. — Californie. ♂

2. CHIMONANTHUS Lindley in Bot. Reg. V (1819) n. 404, in observ. ; T. Durand, Ind. Gen. n. 50. — Genre monotype.

**C. fragrans** Lindley, *loc. cit.* (1819) et VI t. 451. CALYCANTHUS PRÆCOX Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 718 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* I t. 49. — Japon ? Chine.  $\mathfrak{H}$

### III. MAGNOLIACÉES

1. DRIMYS Forster, Char. Gen. Pl. (1776) 83 t. 42 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 54. — De 8 à 10 esp. — Amér. austr., Mexiq., Austral., N.-Zél., N.-Caléd., Bornéo.

**D. aromatica** F. Mueller, *Pl. of Victoria* I (1860) 20. TASMANNIA — R. BROWN in De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* I (1818) 443 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* I t. 84. — Victoria, Tasmanie, N.-Galles du Sud.  $\mathfrak{H}$

2. ILLICIUM Linné, Gen. Pl. (1737) n. 611 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 56. — Huit esp. de l'Asie trop. et or. et de l'Amér. bor.

**I. anisatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 664 ; Berg et Schmidt, *Officin. Gewächse* IV t. 30 f. fig. M.-R. I. RELIGIOSUM Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 5 t. 1 ; *Bot. Mag.* t. 3965 ; Berg et Schmidt, *loc. cit.* fig. A.-C. — Chine, Japon.  $\mathfrak{H}$

3. MAGNOLIA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 690 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 58. — Environ 15 esp. — Amér. bor., Asie subtrop. et or.

**M. acuminata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 536 ; Michaux, *Hist. Arb. Forest. Amér.* III t. 3 ; *Bot. Mag.* t. 2427 ; *Bot. Cab.* t. 418. — États-Unis mérid.  $\mathfrak{H}$

**M. Campbellii** Hooker f. et Thomson, *Fl. Ind.* (1835) 77 ; Hooker f., *Illustr. Himal. Pl.* t. 4 et 5 ; *Fl. des Serres* XII t. 1882-83. — Himal. or. (Sikkim, Bhotan).  $\mathfrak{H}$



- Magnolia conspicua** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806) t. 38. M. YULAN Desfontaines, *Hist. d. Arbr. et Arbriss.* II (1809) 2; *Bot. Mag.* t. 1621; *Bot. Cabin.* t. 1187. — Chine, Japon.  $\mathfrak{h}$
- M. cordata** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 328; *Bot. Mag.* t. 325; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 250. — De la Caroline à la Georgie.  $\mathfrak{h}$
- M. Fraseri** Walter, *Fl. Carol.* (1788) 139. M. AURICULATA Lamarck, *Encycl. Bot.* III (1789) 673; *Bot. Mag.* t. 1206; Andrews, *Bot. Reposit.* t. 573. — Des monts Alleghany à la Georgie.  $\mathfrak{h}$
- M. grandiflora** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 755; *Bot. Mag.* t. 1952; Andrews, *Bot. Reposit.* VIII t. 518. — De la Caroline à la Floride et à l'ouest au Mississippi.  $\mathfrak{h}$
- M. obovata** Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 336; Kerner, *Hort. Sempervir.* t. 67; Guimpel, Otto et Hayne, *Abbild. Fremd. Holzarten* t. 52. — Chine, (Japon, indig. ?).  $\mathfrak{h}$
- M. stellata** Maximowicz, *Mélang. Biolog.* VIII (1872) 509. BUERGERIA — Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Nat.* I (1843) 186 t. II A. — Japon.  $\mathfrak{h}$
4. LIRIODENDRON Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 689; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 61. — Genre monotype.
- L. tulipifera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 535; *Bot. Mag.* t. 275; Duhamel, *Traité d. Arbr. et Arbust.* III t. 18. — Du Canada à la Louisiane et à la Floride.  $\mathfrak{h}$
5. SCHIZANDRA Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 218; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 62. — 6 esp. — Amér. bor., Asie trop. et or.
- S. Chinensis** Baillon, *Hist. des Pl.* I (1867) 148. KADSURA — Turczaninow in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* VII (1837) 149. MAXIMOWICZIA — Ruprecht in *Bull. Acad. St.-Petersb.* XV (1857) 142 cum. ic. — Japon, Chine.  $\mathfrak{h}$

## IV. ANONACÉES

1. UVARIA Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 692; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 67. — 44 esp. — Asie et Australie trop., Afrique trop. et austr.
- U. purpurea** Blume, *Bijdr. Fl. Ned. Ind.* (1825) 11; *Fl. Jav. (Anon.)* 13 t. 1 et 13 A. U. GRANDIFLORA Roxburgh, *Fl. Ind.* II (1824) 665. UNONA — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1818) 90. — De Pegu et de Penang aux îles Philippines.  $\mathfrak{h}$

## V. BERBERIDÉES

1. **AKEBIA** Decaisne in Archiv. Mus. Paris I (1839) 195 t. 13 A et B ; T. Durand, Ind. Gen. n. 188. — 4 esp. — Chine, Japon.
- A. quinata** Decaisne in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, XII (1839) 106 ; *Bot. Mag.* t. 4864 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* I t. 77 ; *Fl. des Serres* X t. 1000. RAJANIA — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 148. — Japon, Chine. 4
2. **BERBERIDOPSIS** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1862) t. 3343 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 189. — Genre monotype.
- B. corallina** Hooker f., *loc. cit.* ; *Belg. Hort.* (1863) 161 t. XI f. 4 — Chili. 5
3. **BERBERIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 442 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 190. — Plus de 100 esp. décrites ; 60 seulement bien distinctes. — Eur., Asie, Amér. bor. et austr.
- B. crataegina** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 9. B. **HETEROPODA** Schrenk in Fisch. et Mey. *Enum Pl. Nov. a cl. Schrenk lect.* I (1841) 102, II (1842) 64. — Asie Min., Perse bor., Turkestan, Songarie, Mongolie, Himalaya. 5
- B. dealbata** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1750. — Mexique. 5
- B. densiflora** Boissier et Buhse, *Aufz. Reise Transkauk. und Pers.* (1860) 9 t. III. B. **INTEGRIRIMA** Bunge, *Reliq. Lehmann.* (1851) 13 t. 1. — Arménie, Perse, Turkestan, Beloutchistan. 4
- B. dulcis** Sweet in *Brit. Fl. Gard.* ser. 2, II (1831) t. 100 ; Maund, *The Botanist* I t. 42 ; Paxton, *Magaz. of Bot.* X t. 171. — Magellan. 5
- B. ilicifolia** Förster in *Comment. Soc. Goett.* IX (1787) 28 ; *Bot. Mag.* t. 4308 ; *Fl. des Serres* III t. 291 ; Hooker f., *Fl. Antarct.* II t. 86. — Terre de Feu. 5
- B. Nepalensis** Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 120. MAHONIA — De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 21 ; Delessert, *Icon. Select. Pl.* II t. 4 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III t. 278. — Himalaya temp., Nilgherries, Mergui, Japon, Chine. 5
- B. Sibirica** Pallas, *Fl. Ross.* II (1788) 42 t. 67 ; *Bot. Reg.* VI t. 487. — Sibérie altaïq. et baïcal., Daourie. 5
- B. vulgaris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 330 ; *Fl. Dan.* VI t. 604 ; *Engl. Bot.* I t. 19. — Eur., Asie tempérée (Amér. bor., indig. ?). 5

4. **BONGARDIA** C.-A. Meyer, Verzeichn. Pfl. Reize Caucas. (1831) 174 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 191. — Genre monotype.
- B. Rauwolfii** C.-A. Meyer, *loc. cit.* ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* IV t. 396. **LEONTICE CHRYSOGONUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 312. — Eur. mér.-or. (Grèce), Asie occ. ☞
5. **LEONTICE** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 423 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 192. — 8 esp. — Eur. mér., Asie centr.
- L. Alberti** Regel in *Gartenflora* XXX (1884) 223 et 293 t. 1057 fig. 2. — Turkestan occ. ☞
- L. Altaica** Pallas in *Act. Acad. Sc. Petrop.* II (1779) 255 t. 8 fig. 1, 2, 3 ; *Bot. Mag.* t. 3245 ; *Gartenflora* (1861) t. 334. — Russie mér., Tauride, Songarie, Sibérie altaïque. ☞
- L. Darwasica** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1883) 692 t. XIV fig. 4, p. à t. — Boukhara. ☞
- L. Eversmanni** Bunge in *Mém. Sav. Étrang. Acad. St-Petersb.* VII (1851) 190. — Asie centr. ☞
- L. leontopetalum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 312 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 254. — Macédoine, Thessalie, Grèce, Archipel, Asie Min., Mésopot., Arménie, Syrie, Palestine. ☞
- L. vesicaria** Pallas in *Act. Acad. Sc. Petrop.* II (1779) 257 t. 9 fig. 4 ; Goebel, *Reise Stepp. d. Südl. Russlands* II (1838) t. 1. — Turkestan, Songarie. ☞
- L. vesiculosa** Regel in *Gartenflora* XXIX (1880) 5. — Turkest. bor.-or. — Obs. Probablement **L. VESICARIA** Pallas.
6. **VANCOUVERIA** C. Morren et Decaisne in *Annal. Sc. Nat. sér. 2*, II (1834) 351 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 195. — Deux esp. de l'Amérique bor.
- V. hexandra** C. Morren et Decaisne, *loc. cit.* **EPIMEDIUM** — Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 31 t. 13. — Du Fort Vancouver à la Caroline. ☞
7. **EPIMEDIUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 81 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 196. — Une quinzaine d'esp. décrites, originaires de l'Eur., de l'Asie temp. et de l'Algérie.
- E. Ikariso** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1868) app. 89. Probablement hybride des **E. ALPINUM** et **MACRANTHUM**. — Japon. ☞

**Epimedium Musschianum** C. Morren et Decaisne in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, II (1834) 333 ; *Bot. Mag.* t. 3745. — Japon. ㊦

**E. Perralderianum** Cosson in *Bull. Soc. Bot. Fr.* IX (1867) 167 ; *Bot. Mag.* t. 6509. — Algérie (Kabylie or.). ㊦

**E. pinnatum** Fischer in De CANDOLLE, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 29 ; *Bot. Mag.* t. 4456 ; *Annal. de Gand* (1846) t. 61. — Talysch, Caucase occ., Perse bor. ㊦

— — var. **Colchicum** BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 102. **E. COLCHICUM** Hort. — Caucase occ., Pontus Lazicus.

**E. rubrum** C. Morren in *Belg. Hort.* (1854) 33 t. 6 fig. 1-5 ; *Gartenflora* (1862) t. 373 ; *Bot. Mag.* t. 5671. **E. ALPINUM** L. var. **RUBRUM** Hort. — Hybride des **E. ALPINUM** et **MACRANTHUM** ? — Japon. ㊦

**E. versicolor** Hort. ex C. MORREN in *Annal. de Gand* V (1849) 92 t. 243 ; *Belg. Hort.* (1854) t. 6 fig. 7, var. — Hybride des **E. ALPINUM** et **MACRANTHUM** ? — Japon. ㊦

**E. violaceum** C. Morren et Decaisne in *Ann. Sc. Natur.* sér. 2, II (1834) 354 t. 12 ; *Bot. Mag.* t. 3751 ; *Bot. Reg.* XXVI t. 43. — Japon. ㊦

8. **ACERANTHUS** Decaisne in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, II (1834) 349 t. 14 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 197. — 2 esp. du Japon.

**A. diphyllus** C. Morren et Decaisne, *loc. cit.* ; *Bot. Mag.* t. 3448. **EPIMEDIUM** — Loddiges in *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1858. — Japon. ㊦

9. **JEFFERSONIA** Barton in *Amer. Phil. Soc. Trans.* III (1793) 334 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 199. — 2 esp. de l'Amérique bor. et de la Mandchourie.

**J. diphylla** Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 418 ; *Bot. Mag.* t. 1513 ; *Bot. Cab.* t. 1036. **PODOPHYLLUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753). — États-Unis (de New-York aux mont. des États du Sud). ㊦

10. **PODOPHYLLUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 426 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 201. — 2 esp. de l'Amérique bor. et de l'Himalaya.

**P. Emodi** Wallich, *Catal.* (1829) n. 814. **P. HEXANDRUM** Decaisne in Jacquemont *Voy. Ind. (Bot.)* II t. 9. — Himalaya (du Sikkim au Kashmir).

11. **ACHLYS** De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 35 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 201. — 2 esp. de l'Amérique bor.  
occ. et de l'Asie or.

**A. triphylla** De Candolle, *loc. cit.* ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* t. 12. **LEONTICE**  
— Smith in Rees, *Cyclop.* XX (1819). — Amér. bor.-occ. (Fort Vancouver). ♀

## VI. NYMPHÆACÉES

1. **BRASENIA** Schreber, *Gen. Pl.* I (1782) 372 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* 203. — Genre monotype.

**B. peltata** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 389 ; A. Gray et Sprague, *Gen.*  
*Fl. Amer. Bor. illustr.* t. 39. **HYDROPELTIS PURPUREA** Michaux, *Fl. Bor.-*  
*Amer.* I (1803) 329 t. 29 ; *Bot. Mag.* t. 1147. — Amér. bor., Cuba, Australie  
or., Asie trop. et or., Afrique trop. occ.

2. **NUPHAR** Smith, *Prodr. Fl. Græc.* I (1806) 361 ; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 204. — 3 ou 4 esp. de l'hémisphère bo-  
réal extratropical.

**N. advenum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, III (1811) 293 ; Reichenbach, *Fl. Exot.*  
t. 12. **NYMPHÆA** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 311 ; *Bot. Mag.* t. 684.  
— Du Canada à la Georgie et à l'Arkansas ; à l'ouest à l'Oregon. ♀

**N. polysepalum** Engelmänn in *Trans. Acad. St-Louis* II (1865) 282. —  
Mont. Rocheuses (bassin du fleuve Columbia). ♀

**N. pumilum** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 61 ; Reichenbach,  
*Pl. Crit.* II t. 119 ; *Icon. Fl. Germ.* VII t. 65. **NYMPHÆA** — Hoffmann, *Fl.*  
*Germ.* (1800) 241. — Eur. bor. (Écosse, Suède, Norvège) et centr. ♀

3. **NYMPHÆA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 421 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 205. — Environ 25 esp., se retrouvant dans  
presque toutes les régions du globe.

**N. odorata** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 227 ; *Bot. Mag.* t. 819 ;  
Andrews, *Bot. Reposit.* V t. 297. — Amér. bor.-or. (jusqu'aux mont. Ro-  
cheuses). ♀

— — var. **minor** Sims in *Bot. Mag.* (1814) t. 1652. **N. MINOR** De Candolle,  
*Regn. Veg. Syst.* II (1821) 58.

**N. tuberosa** Payne, *Catal. Pl. Oneida* (1865) 132. **N. ALBA** Nuttall, *Gen. of*  
*North.-Amer. Pl.* II (1818) 43. — New-York, Ontario. ♀

## VII. SARRACENIACÉES

1. DARLINGTONIA Torrey in Smithson. Contrib. VI (1853) 4 t. 12 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 211. — Genre monotype de la Californie.

**D. Californica** Torrey, *loc. cit.* ; *Fl. des Serres* XIV 125 t. 1440 et 1441 ; *Bot. Mag.* t. 5420. — Californie. ♀

## VIII. PAPAVERACÉES

1. ROMNEYA Harvey in Hooker, Lond. Journ. of Bot. IV (1845) 74 t. 3 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 215. — Genre monotype de la Californie.

**R. Coulteri** Harvey, *loc. cit.* ; *Gard. Chron.* (1875) 1, 280 cum icone. — Californie. ☉

2. PAPAVER Linné, Gen. Pl. (1737) n. 423 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 216. — Genre plus ou moins répandu dans le monde entier et comptant environ 26 esp. bien distinctes.

**P. alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 507 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 83 ; *Gartenflora* (1861) t. 323. — Dauphiné, Eur. centr. ♀

**P. caucasicum** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 15 ; *Bot. Mag.* t. 1675. — Cappadoce, Arménie, Caucase, Perse bor. ②

**P. croceum** Ledebour, *Fl. Alt.* II (1830) 271 ; *Icon. Fl. Ross.* t. 141 ; *Bot. Mag.* t. 3035. — Sibérie, Daourie. ♀

— Obs. Quelques auteurs regardent le *P. croceum* comme une variété du *P. nudicaule* Linné.

**P. Heldreichii** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 108. — Lycie, Tauride, Lycáonie. ♀

**P. libanoticum** Boissier in *Ann. Sc. Natur.* sér. 2, XIII (1841) 373. — Syrie. ②

**P. nudicaule** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 507 ; *Engl. Bot.* t. 2684 ; *Bot. Mag.* t. 2344. — Eur., Asie, Amér. (zone arct.), Himalaya bor.-occ., Afghanistan. ♀

— Obs. N'est vraisemblablement qu'une sous-espèce du *P. alpinum* Linné.

**Papaver spicatum** Boissier et Balansa in Boissier *Diagn. Fl. Or.* sér. 2, V (1856) 14. — Lycie, Carie. ♀

**P. strictum** Boissier et Balansa *loc. cit.* sér. 2, VI (1859) 8. — Phrygie. ♀

3. **ARGEMONE** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 422 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 219. — Environ 7 esp. d'origine américaine, dont une abondamment naturalisée dans les régions chaudes du monde entier.

**A. platyceras** Link in Link et Otto, *Icon. Pl. Hort. Berol.* I (1829) t. 43. — Kansas, Nebraska. ♀

4. **MECONOPSIS** Viguier, *Hist. Nat. des Pavots* (1814) 20 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 220. — 9 esp. de l'Eur. occ., de l'Asie centr. et de l'Amér. bor. occ.

**M. Nepalensis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 121 ; Hook., *Ill. Himal. Pl.* t. 9 ; Hook. f., *Fl. Brit. Ind.* I 118. — Himalaya temp., Népal, Sikkim.

5. **STYLOPHORUM** Nuttall, *Gen. North-Amer. Pl.* II (1818) 7 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 222. — 4 ou 5 esp. de l'Amér. bor., de l'Himalaya, de la Mandchourie et du Japon.

**S. diphylum** Nuttall, *loc. cit.* ; *Bot. Mag.* t. 4867. **CHELIDONIUM** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 309. **STYL. OHIOENSE** Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 570. — Amér. bor. ♀

6. **SANGUINARIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 425 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 224. — Genre monotype de l'Amér. bor.

**S. Canadensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 505 ; *Bot. Mag.* t. 162 ; *Bot. Cab.* t. 1840. — Du Canada à la Floride et au Mississipi. ♀

7. **BOCCONIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 88 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 225. — 3 esp. de l'Amér. trop., de la Chine et du Japon.

**Bocconia cordata** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 844 ; *Bot. Mag.* t. 1905. — Chine, Japon. ♀

— — var. **japonica** Regel in *Gartenflora* XIV (1865) t. 480. **B. JAPONICA** Hort.

## IX. FUMARIACÉES

1. **DICENTRA** Borkhausen ex Bernhardi in Linnæa VIII (1833) 468 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 234. (*Diclytra* et *Dielytra* De Candolle.) — 13 esp. de l'Asie occ. et centr. et de l'Amér. bor.
- D. Canadensis** S. Watson, *Bibliog. Index to N.-Amer. Bot.* (1878) 45. DICLYTRA — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 126 ; *Bot. Mag.* t. 3031 ; A. Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. illustr.* I t. 50. CORYDALIS — Goldie in *Edinb. Philos. Journ.* VI (1822) 330. — Du Canada à New-York et au Kentucky. ♀
- D. cucullaria** S. Watson, *loc. cit.* (1878) 45. DICLYTRA — De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 108 ; *Fl. des Serres* VIII t. 920 ; *Illustr. Hort.* VI t. 215. FUMARIA — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 699 ; *Bot. Mag.* t. 1127. — Amér. bor.-occ. (du Canada au Kentucky). ♀
- D. eximia** S. Watson, *loc. cit.* (1878) 46. DICLYTRA — De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 109 ; Maund, *The Bot. Garden* t. 340. FUMARIA — Ker in *Bot. Reg.* (1815) t. 50. ♀
- D. formosa** S. Watson, *loc. cit.* (1878) 46. DICLYTRA — De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* I (1818) 109. FUMARIA — Andrews, *Bot. Reposit.* VI (1804) t. 393 ; *Bot. Mag.* t. 1335. — Virginie, Caroline. ♀
2. **ADLUMIA** Rafinesque ex De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 111 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 235. — Genre monotype.
- A. cirrhosa** Rafinesque in DESVAUX, *Journ. de Bot.* II (1809) 169 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 189 ; A. Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. illustr.* t. 51. — De la Nouvelle-Angleterre à la Caroline et au Kansas. ②
3. **CORYDALIS** De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 113 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 236. — Environ 100 esp. de l'Eur., de l'Asie, de l'Afrique extratrop. et de l'Amér. bor.
- C. Bidwelliæ** S. Watson, *Bot. of Calif.* II (1880) 429. — Californie. ♀



**Corydalis bracteata Persoon**, *Syn. Pl.* II (1807) 269 ; *Bot. Mag.* t. 3242 ; *Bot. Reg.* t. 1644. FUMARIA — Stephan in Willdenow *Sp. Pl.* III (1803) 838. — Sibérie altaïque. ♀

**C. fabacea Persoon**, *Syn. Pl.* II (1807) 269 ; *Fl. Dan.* VIII t. 1394 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 7. FUMARIA — Retzius, *Fl. Scand. Prodr.* ed. 2 (1795) n. 859. — Scandinavie méd. et mér., Hollande, Belgique, France, Eur. centr., Russie centr. ♀

**C. Kolpakowskiana Regel** in *Acta Hort. Petrop.* V (1877) 633 ; *Gartenflora* XXVII (1878) 261 t. 928 ; *Bot. Mag.* t. 6925. — Turkestan. ♀

**C. Ledebouriana Karelin et Kirilow**, *Enum. Pl. Alt.* in *Bul. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 377 ; Ledebour, *Icon. Pl. Fl. Ross.* I 745 ; *Gartenflora* XXVIII t. 981. — Sibérie. ♀

**C. nobilis Persoon**, *Syn. Pl.* II (1807) 269 ; *Bot. Mag.* t. 1953 ; *Bot. Reg.* V t. 395. FUMARIA — Jacquin, *Hort. Vindob.* (1772) t. 156. — Sibérie altaïque. ♀

**C. persica Chamisso et Schlechtendal** in *Linnaea* I (1826) 567. Boissier, *Fl. Or.* I, 127. — Perse bor. ♀

**C. pumila Host**, *Fl. Austr.* II (1831) 304 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 7 ; *Fl. Dan.* t. 3224. — Scandinavie, Allemagne bor., Eur. centr.-or. ♀

— — subsp. **decipiens** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 26 ; C. DECIPiens Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta bot.* (1854) 42. — Transylv.

**C. Scouleri Hooker**, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 36 t. 14. — Orégon. ♀

**C. Semenowi Regel et Herder** in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* (1864) 407 t. VIII fig. 6-10 ; *Gartenflora* XXX (1881) 313 cum xylog. — Turkestan. ♀

**C. Sewerzowi Regel** in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* (1870) 252 ; *Gartenflora* XXXI (1882) 97 t. 1077. — Turkest. occ. ♀

4. **SARCOCAPNOS** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 129 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 237. — 4 esp. de l'Eur. austr. et occ. et de l'Afrique bor.-occ.

**S. crassifolia** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 130. FUMARIA — Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) 126 t. 173. — Maroc, Espagne mér. ♀

**S. speciosa Boissier**, *Diagn. Pl. Or. sér. 1, I* (1842) 14. S. CRASSIFOLIA Boissier (non De Candolle), *Voy. Bot. Esp.* (1839-1845) 18. — Espagne. ♀

## X. CRUCIFÈRES

1. **MATTHIOLA** R. Brown, in Aiton Hort. Kew. ed. 2, IV (1812) 110; T. Durand, Ind. Gen. n. 239. — Environ 36 esp. de la rég. méditerranéenne et de l'Asie occ.

**M. montana** Boissier in *Ann. Sc. Natur.* sér. 2, XVII (1842) 47. — Asie Min. Ț

2. **CHEIRANTHUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 537; T. Durand, Ind. Gen. n. 243. — Une douzaine d'esp. de l'Eur., de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amér. bor.

**C. Corinthius** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, I (1853) 18. — Grèce. Ț

**C. Menziesii** Benthams et Hooker, *Gen. Pl.* I (1862) 68. **HESPERIS** — Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 60; Hooker et Arnott, *Bot. Beechey's Voy.* 322 t. 75. — Californie. Ț

3. **ARABIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 544; T. Durand, Ind. Gen. n. 247. — Environ 150 esp. décrites, dont 80 environ bien distinctes, originaires des rég. arctiques et tempérées.

**A. Allionii** De Candolle in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Franç.* IV (1805) 676; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 41. **TURRITIS STRICTA** Allioni, *Auct. ad Fl. Pedem.* (1789) 18. — Piémont, Dauphiné. Ț

**A. androsacea** Fenzl, *Pugill. Pl. Nov. Syr. et Taur.* (1842) 13; Boissier, *Fl. Or.* I, 173. — Pamphylie, Cilicie. Ț

**A. bellidifolia** Jacquin, *Observ. Bot. Pars* I (1764) 22 t. 12; *Fl. Austr.* *Icon.* III t. 280; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 38. — Pyrénées, Alpes, Carpathes. Ț

**A. blepharophylla** Hooker et Arnott, *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 321; *Bot. Mag.* t. 6087. — Californie. Ț

**A. Boryi** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-1845) 26 t. 5<sup>a</sup>. **SISYMBRIUM** — Nyman, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 44. — Portugal, Espagne. Ț

**A. bryoides** Boissier in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, XVII (1842) 55. **A. DRABEFORMIS** Grisebach (non Boissier), *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 248. — Grèce, Thessalie, Macédoine. Ț

**Arabis Carduchorum** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 173. *DRABA GIGAS* Sturm. ex Boissier, *loc. cit.* — Arménie. 2

**A. Cebennensis** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 234 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* II t. 26. — Cévennes. ②

**A. ciliata** R. Brown in Aiton *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 107 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 40. — Angl. occ., Irlande. ②

**A. cœrulea** Wulfen in Jacquin, *Collect. Bot.* II (1788) 56 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 37. *TURRITIS* — Allioni, *Fl. Pedem.* (1785) t. 40 fig. 2. — Alpes, Italie bor., Transylv. 2

**A. drabæformis** Boissier in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, XVII (1842) 55. *DRABA HIRTA* Sibthorp et Smith (non Linné), *Prodr. Fl. Gr.* II (1813) 5. *D. SAXICOLA* C. Koch in *Linnaea* XIX (1847) p. 53. — Bithynie. 2

**A. Holboellii** Hornemann, *Fl. Dan.* XI (1825) t. 1879. — Amér. bor. 2

**A. Ovirensis** Wulffen in Jacquin, *Collect. Bot.* I (1786) 196 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 125 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 35. — Carinthie. 2

**A. procurrens** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* II (1805) 154 t. 144 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 37. — Banat, Serbie, Bosnie, Thrace. 2

**A. purpurea** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII (1830) t. 643 ; Boissier, *Fl. Or.* I, 176. — Chypre. 2

**A. rosea** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 215 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* II t. 23 ; *Bot. Mag.* t. 3246. — Italie mér. ②

**A. Scopoliana** Boissier in *Ann. Sc. Natur.* sér. 2, XVII (1842) 56 ; *DRABA CILIATA* Scopoli, *Fl. Carn.* II (1772) t. 33 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 14. — Carniole, Croatie, Istrie, Dalmatie, Bosnie, Transylv. 2

**A. Soyeri** Reuter et Huet in REUTER, *Cal. Graines Jard. Genève.* (1852) 4. *A. BELLIDIFOLIA* Linné var. *SOYERIANA* Grenier et Godron, *Fl. Fr.* I (1848) 105. — Pyrénées. 2

**A. stricta** Hudson, *Fl. Angl.* (1762) 292 ; *Engl. Bot.* IX t. 614 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 39. — Angleterre, Pyrénées, Dauphiné, Suisse, Transylv., Labrador. 2

**A. Vochinensis** Sprengel, *Pl. minus cognit. Pugill.* I (1813) 46 n. 81. Sturm, *Deutsch. Fl.* VII t. 28 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 35. — Carniole, Tyrol, Carinthie, Styrie. 2

4. **MACROPODIUM** R. Brown in Aiton *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 108 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 249. — Genre monotype.

**M. nivale** R. Brown, *loc. cit.* *ARABIS* — Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 893. — Sibérie ural. et altaïque 2

5. **CARDAMINE** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 541 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 253. — Environ 75 esp. des rég. temp. alpines, et arctiques.
- C. angulata** Hooker, *Kew Gard. Miscell.* I (1849) 343 t. 69. — De l'Orégon et de la Californie au Mexique austr. ʒ
- C. carnosa** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* II (1805) 137 t. 129 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 29. **C. SERBICA** Panic (1877). — Croatie, Dalmatie, Thessalie. ʒ
- C. diphylla** A. Wood, *Amer. Bot. and Flor.* (1871) 37. **DENTARIA** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 30 ; *Bot. Mag.* t. 1465. — Amérique bor. ʒ
- C. glauca** Sprengel, in litt. (1819) sec. DE CANDOLLE, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 266 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* II t. 31. — Italie mér., Sicile, Herzég., Bosnie. ʒ
- C. laciniata** Wood, *Amer. Bot. and Flor.* (1871) 38. **DENTARIA** — Muehlenberg in Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 479 ; Barton, *Veget. Materia med.* II t. 72. — Du Canada à la Georgie et au Mississipi. ʒ
- C. macrophylla** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 484 ; Ledebour *Icon. Fl. Ross.* t. 146 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* III t. 62. — Sibérie, Japon, Himalaya. ʒ
- C. maxima** Wood, *Amer. Bot. and Flor.* (1871) 38. **DENTARIA** — Nuttall, *Gen. N.-Amer. Pl.* II (1818) 66 ; Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. illustr.* I t. 56. — New-Jersey, Pensylv. ʒ
- C. pentaphyllos** R. Brown in AITON *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 101. **DENTARIA DIGITATA** Lamarck, *Encycl. Bot.* II (1786) 268 ; *Bot. Cab.* t. 757 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* II t. 72. — Pyrénées, France, Eur. centr., Italie bor. ʒ
- — subsp. **intermedia** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 33 (sub **DENTARIA**). **DENTARIA** — Schott, *Flora* (1855) 125 t. 4. — Tyrol mér.
- C. trifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 654 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 27 ; *Bot. Mag.* t. 452. — Jura, Eur. centr., Italie bor. ʒ
- C. uliginosa** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 438. **C. OLYMPICA** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, VIII (1849) 19. — Russie mér., Sibérie altaïque, Asie Min., Perse. ʒ
6. **FARSETIA** Desvaux in Journ. de Bot. III (1813) 173 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 267. — Environ 20 esp. de l'Eur. austr., de l'Afrique bor. et trop. or., de l'Orient et de l'Inde.
- F. triquetra** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 290 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 23. — Dalmatie, Croatie. ʒ

7. **AUBRIETIA** Adanson, *Fam. des Pl.* II (1763) 420 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 271. — 7 esp. de l'Italie, de la Grèce, de l'Asie occ. et de la Perse.

**A. Columnæ** Gussone, *Pl. Rar. Reg. Samn. et Aprut.* (1826) 266 t. 46 f. 3. — Italie (les Abruzzes). ♀

**A. deltoidea** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 294 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 628 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 235. **ALYSSUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 408. — Grèce, Crète, Asie Min. ♀

**A. erubescens** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 268. — Macédoine, Dalmatie. ♀

— — subsp. **croatica**, NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 50. **A. CROATICA** Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta Botan.* (1854) 36. — Dalmatie, Croatie.

**A. parviflora** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. I, VI (1845) 14. — Mésopotamie, Perse. ♀

8. **VESICARIA** Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* (1823) t. 559 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 272. — Environ 32 esp. de l'Eur. austr. et de la chaîne des Andes.

**V. Græca** Reuter, *Cat. Graines Jard. Genève.* (1858) 3 ; Boissier, *Fl. Or.* I 262. **ALYSSUM UTRICULATUM** Sibthorp et Smith (non L.), *Fl. Græca* VII (1830) t. 627. — Eur. austro-or., Bithynie. ♀

**V. purpurea** Gray, *Pl. Wright.* II (1853) 14. — Amérique bor. ♀

**V. utriculata** Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* (1823) t. 559 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II. t. 22. — Dauphiné, Bourgogne, Allemagne occ., Suisse mér., Italie, Croatie, Banat. ♀

9. **ALYSSUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 533 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 274. — Une centaine d'esp. de l'Europe, de l'Afrique bor. et de l'Orient.

**A. leucadeum** Gussone, *Pl. Rar. Reg. Samn. et Aprut.* (1826) 268 t. 47. — Italie mér. ♀

**A. longicaule** Boissier in *Bibl. Univ. Genève*, nouv. sér. XIII (1838) 9. **PHILOTRICHUM** — Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1838) 13 ; *Voy. Bot. Esp.* t. II fig. 47. — Espagne. ♂

**A. Nebrodense** Tineo, *Pl. Sicul. Pugill.* (1817) 12 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 20. — Sicile, Sard., Dalmat., Espagne centr., France mér. ♀

**Alyssum Podolicum** Besser, *Cat. Krem.* (1816) 8; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* 2 t. 36; *Bot. Cab.* t. 1720. SCHIVERECKIA — Andrzejowski et Besser in De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 300. — Russie mér., Galicie, Sibér., Anatolie. ʒ

**A. Pyrenaicum** Lapeyrouse, *Abrég. Hist. Pl. Pyr.* (1813) 371 et Suppl. 91. — Pyrénées. ʒ

**A. rupestre** Tenore, *Fl. Napol.* (1811-1815) 72 t. 60. — Naples. ʒ

**A. saxatile** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 650; *Bot. Mag.* t. 159; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 21. — Eur. centr. et austro-or. ʒ

**A. spinosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 650; Jordan, *Obs. Pl. Rar. ou Crit. Fr.* I t. 1. — France mér., Espagne, Algérie. ʒ

**A. Wulfenianum** Bernhardt in Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* suppl. (1813) 44; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 5 et *Icon. Fl. Germ.* II t. 19. — Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol, Italie bor., Transylv., Macéd., Albanie, Montén. ʒ

10. **DRABA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 535; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 277. — Environ 80 esp. bien distinctes, répandues dans les rég. temp. et froides de l'hémisphère bor. et dans l'Amér. austro-occ.

**D. aizoides** Linné, *Syst. Veget.* ed. XIV (1784) 372; *Bot. Mag.* t. 170; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 15. — Angleterre, Belgique, Eur. centr., mér. et or. ʒ

— var. **montana** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3 (1867) 54. D. **ELONGATA** Host, *Fl. Austr.* II (1831) 237; Sturm, *Deutsch. Fl.* XIV t. 60; Visiani, *Fl. Dalm.* t. 32. — Eur. centr.

**D. Aizoon** Wahlenberg, *Fl. Carpat.* (1814) 193; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 15. — Hongrie, Transylv., Dalmatie. ʒ

— subsp. **Haynaldi** Nyman, *Consp. Fl. Europ.* (1878) 52. D. **HAYNALDI** Stur in *Öestr. Bot. Zeit.* XI (1861) 186 tab. 2. — Transylv.

**D. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 642; *Fl. Dan.* I t. 56; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 15. — Côtes de l'Océan Glacial. ʒ

**D. arabisans** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 28; Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. Illustr.* I t. 68. Amér. bor.-or. ②

— Obs. M. Watson considère cette plante comme une variété du D. **INCANA** L.

**D. Carinthiaca** Hoppe in *Bot. Zeit.* VI<sup>2</sup> (1823) 437. D. **JOHANNIS** Host, *Fl. Austr.* II (1831) 240; Sturm, *Deutsch. Fl.* XIV t. 60, XV t. 65. — Pyrénées, hautes mont. de l'Eur. occ., centr. et or. ʒ

**D. Dedeana** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* Suppl. (1845) 718 — Espagne bor. ʒ

**Draba Hispanica** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1838) 13 ; *Voy. Bot. Esp.* 48 t. 13. — Espagne mér. et mér.-or. ☞

**D. longirostra** Schott, Nyman et Kostchy, *Anal. Botan.* (1854) p. 35. — Dalmatie. ☞

— — subsp. **armata** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 52. D. ARMATA Schott, Nyman et Kotschy, *loc. cit.* (1854) 35. — Croatie, Transylv.

**D. Olympica** Sibthorp in DE CANDOLLE, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 336 ; Boissier, *Fl. Or.* I 295. — Bithynie, Phrygie. ☞

— — var. **bruniæfolia** BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 295. D. BRUNIEFOLIA Steven in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* III (1812) 268 ; *Gartenflora* (1873) t. 780. — Caucase, Arménie russe, Perse bor. ☞

— — var. **heterocoma** BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 295. D. HETEROCOMA Fenzl, *Ill. et Descr. Pl. Syr et Taur.* (1843) 55 t. XVI<sup>a</sup>. — Asie Min., Syrie. ☞

**D. Pyrenaica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 642 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 8 ; *Bot. Mag.* t. 713. PETROCALLIS — R. Brown in Ait. *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 93. — Pyrénées, Alpes, Carpathes. ☞

**D. repens** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 93. — Russie arct., Sibérie, monts Ourals, Caucase. ☞

**D. Sauteri** Hoppe, in *Bot. Zeit.* VI (1823) II 425 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 385 et *Icon. Fl. Germ.* II t. 15. — Alpes de Styrie, de Salzbourg et du Tyrol. ☞

**D. stellata** Jacquin, *Hort. Vindob.* (1770) 113 t. 4 fig. 3 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* II t. 46 ; *Bot. Cab.* t. 32. — Autriche, Styrie, Transylv. ☞

11. **MALCOLMIA** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 121 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 286. — Environ 25 esp. de l'Eur., de l'Afr. bor. et de l'Asie occ. et centr.

**M. flexuosa** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII (1830) t. 634 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* XII t. 59. M. INCRASSATA De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II 441. — Grèce, Macédoine, Thrace, Archipel, Crète, Chypre, Smyrne. ☉

12. **SISYMBRIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 547 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 290. — Environ 90 esp. originaires des rég. temp. et de l'Afr. tropicale.

**S. tanacetifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 659 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 81 et *Pl. Crit.* X t. 999. HUGUENINIA — Reichenbach, *Fl. Excurs.* (1830) 691. — Pyrénées, Dauphiné, Piémont, Suisse mér. ☞

13. **ERYSIMUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 548 ; T. Durand  
Ind. Gen. n. 295. — Environ 80 esp. de la rég. temp. de  
l'hémisphère bor.

**E. linifolium** Spach, *Hist. Nat. Veget.* VI (1838) 409. **CHEIRANTHUS** — Per-  
soon, *Syn. Pl.* II (1807) 201. — Espagne, Portugal. ♀

14. **STANLEYA** Nuttall, *Gen. N.-Amer. Pl.* II (1818), 71 ; T. Du-  
rand, Ind. Gen. n. 300. — 3 ou 6 esp. des États-Unis mér.-  
occ.

**S. pinnatifida** Nuttall, *loc. cit.* ; A. Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor.*  
*illustr.* I t. 65. — Bassin inf. du Missouri. ♀

15. **BRAYA** Sternberg et Hoppe in Regensb. Denkschr. I (1815)  
pars I, 95 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 340. — 15 esp. des  
rég. mont. et arct. du monde entier.

**B. alpina** Sternberg et Hoppe, *loc. cit.* ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 121 ; Delessert,  
*Icon. Sel. Pl.* t. 22 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 56. — Carinthie, Ty-  
rol, Norvège arct., mont. Rocheuses. ♀

16. **BRASSICA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 542 ; T. Durand, Ind.  
Gen. n. 317. — Plus de 150 esp. énumérées, dont 85 bien dis-  
tinctes de l'Eur., de l'Asie et de l'Afr., et largement natura-  
lisées ailleurs.

**B. cretica** Lamarck, *Encycl. Méthod. Bot.* I (1783) 747 ; Sibthorp et Smith,  
*Fl. Græca* t. 645. — Grèce, Archipel, Crète, Macédoine, Lycie. ♂

**B. humilis** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 598. **S. REPANDUM**  
Willdenow, var.  $\beta$ . DE CANDOLLE, *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 62. — France  
mér. ♀

17. **VELLA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 797 ; T. Durand, Ind.  
Gen. n. 325. — 3 esp. d'Espagne.

**V. spinosa** Boissier, in *Biblioth. Univ. Genève*, nouv. sér. XII (1838) 407 ;  
*Voy. Bot. Esp.* 41 t. 10. — Espagne mér. ♀



18. **LEPIDIUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 527 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 336. — Environ 80 esp. des rég. temp. et chaudes du monde entier.

**L. stylatum** Lagasca et Rodríguez, *Anal. Cienc. Natur.* V (1802) 276 ; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* t. 5 ; Webb, *Olia Hisp.* t. 42. — Espagne. 2

19. **ÆTHIONEMA** R. Brown in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, IV (1812) 80 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 344. — Une quarantaine d'esp. de l'Eur. mér., de l'Asie Min. et de la Perse.

**Æ. cordatum** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 350. **THLASPI** — Desfontaines in *Ann. Mus. Paris* XI (1808) 382 t. 39. — Asie Min., Syrie. 3

**Æ. coridifolium** De Candolle, *Regn. Veget. Syst.* II (1821) 561 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* t. 76 ; *Gartenflora* (1884) t. 1150. **IBERIS JUCUNDA** Schott et Kotschy, ex Boissier, *Fl. Or.* I 347. — Liban, Cilicie, Cataonie. 2

**Æ. Creticum** Boissier et Heldreich in Boissier, *Fl. Or. Suppl.* (1888) 61. — Crète, Asie Min. 2

**Æ. diastrophis** Bunge, *Cat. Sem. Hort. Dorpat.* (1844) 7 ; Boissier, *Fl. Or.* I 347. — Arménie. 3

**Æ. grandiflorum** Boissier et Hohenacker in Boissier, *Diagn. Pl. Or. sér. 1,* VIII (1849) 42 ; *Gartenflora* XXVIII t. 1102. — Perse. 3

**Æ. lacerum** Boissier et Balansa in Boissier *Diagn. Fl. Or. sér. 2,* V (1844) 45. — Cilicie. 2

20. **EUNOMIA** De Candolle, in Mém. Mus. Par. VII (1821) 244 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 343. — 2 esp. de l'Asie Min.

**E. iberidea** Boissier in *Ann. Sc. Nat. sér. 2,* XVII (1842) 491. **ÆTHIONEMA** — Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 351 ; **EUNOMIA MONTBRETH** Jaubert et Spach, *Ill. Pl. Or.* I (1842) t. 51. — Bithynie. 2

**E. rotundifolia** C.-A. Meyer, *Verzeichn. Pfl. Reise Caucas.* (1831) 194. **ÆTHIONEMA** — Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 344. — Caucase occ. 2

21. **BISCUTELLA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 531 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 355. — Une vingtaine d'esp. décrites, dont 5 seulement bien distinctes, originaires de l'Eur., de l'Orient et de l'Afr. bor., du Mexique et de la Californie.

**B. lævigata** Linné, *Mant. Pl.* II (1774) 225 ; De Candolle, *Icon. Pl. Gall.* t. 38 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 616 et *Icon. Fl. Germ.* II t. 8. — Eur. occ., centr. et mér. 2

22. **THLASPI** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 530 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 359. — 30 esp. environ, originaires des rég. temp. alpines et froides du monde entier.

**T. cepeæfolium** Koch in RÖHLING, *Deutschl. Fl.* ed. III, IV (1833) 534 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 6. **IBERIS** — Wulfen in Jacquin, *Misc. Austr.* II (1781) 28 t. 1. — Valais, Tyrol, Carinthie, Carniole, Piémont. ♀

**T. Græcum** Jordan, *Obs. Pl. Rar. ou Crit. Fr.* III (1845) 30. **T. MONTANUM** Bory et Chaubard (non L.), *Fl. Pélop.* (1838) 41 n. 1015. — Grèce mont. ♀

**T. montanum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 647 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 237 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 5. — Eur. occ., centr. et mér., Portugal, Espagne.

**T. Nevadense** Boissier et Reuter in BOISSIER, *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 11. — Espagne (Sierra Nevada et Sierra de Guadarrama). ♀

**T. rotundifolium** Gaudin, *Fl. Helv.* IV (1829) 218 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 6. **IBERIS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 649 ; Scopoli, *Fl. Carn.* II t. 37. — Alpes, Dauphiné, Suisse, Autriche, Allemagne, Italie, Croatie, Transylv. ♀

**T. violascens** Schott et Kotschy, ex BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 328. — Cilicie, Syrie bor. ②

23. **IBERIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 529 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 361. — Une vingtaine d'esp. de l'Eur. et de l'Asie Min.

**I. Garrexiana** Allioni, *Fl. Pedem.* III (1785) t. 40 fig. 3 et 54 fig. 2 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 7 ; Jordan, *Obs. Pl. Rar. ou Crit. Fr.* VI t. 1. — Eur. austr. ♂

**I. Gibraltarica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 649 ; *Bot. Mag.* t. 124. — Gibraltar. ♂

**I. Granatensis** Boissier et Reuter, *Pug. Pl. novar.* (1852) 11. **I. NANA** Boissier (non All.), *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 54. — Espagne. ♂

**I. Pruiti** Tineo, *Pl. Rar. Sicil. Pugill.* I (1817) 11. — Sicile, Espagne mér. ♀

**I. saxatilis** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1759) 321 ; *Bot. Mag.* t. 1642 ; Gouan, *Fl. Monsp.* t. 3 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 557. — Espagne, France mér., Jura, Italie, Sicile, Tauride. ♂

— — var. **corifolia** Sims in *Bot. Mag.* (1814) t. 1642 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 180. **I. CORIFOLIA** « Sweet » ex Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. 2, I (1840) 800. — France mér.

**I. semperflorens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 648 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 8. — Sicile, Naples. ♂

**Iberis sempervirens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 648 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 620 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 8. — Italie, Grèce, Thessalie, Crète, Asie Min.  $\frac{1}{2}$

24. **PELTARIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 806 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 369. — 3 esp. de l'Eur. mér. et de l'Asie occ.

**P. isatoides** Barbey in *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* XXI (1885) 219. — Ile Carpathos.  $\frac{1}{2}$

25. **ISATIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 549 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 375. — 65 esp. décrites, dont 30 bien distinctes, originaires de l'Eur., de l'Asie occ., bor. et centr. et de l'Afr. bor.

**I. alpina** Villars, *Prosp. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 72 ; *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 308 ; Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) t. 86 fig. 2 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* II t. 4. — Dauphiné, Italie bor.-occ., méd. et mér.  $\frac{1}{2}$

**I. armena** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 670 ; Jaubert et Spach, *Ill. Pl. Or.* t. 225. **SAMERARIA ARMENA** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 373. — Arménie, Perse, Turkestan.  $\odot$

**I. Athoa** Bcissier, *Fl. Or. Suppl.* (1888) 64. — Mont Athos.  $\frac{1}{2}$

26. **ANCHONIUM** De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 578 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 414. — 3 esp. de la Syrie, de la Perse et de l'Asie Min.

**A. elychrysifolium** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 240. **STERIGMA** — De Candolle, *Regn. Veg. Syst.* II (1821) 581 ; Delessert, *Icon. Sel. Pl.* II t. 84. — Asie Min., Perse.  $\frac{1}{2}$

## XI. RÉSÉDACÉES

1. **RESEDA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 447 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 458. — Une trentaine d'esp. de l'Eur., de l'Afr. bor. et de l'Orient.

**R. complicata** Bory, *Fl. Sierra Nevada* in *Ann. Gén. Sc. Phys. Bruxelles* III (1820) n. 122 ; Webb, *Otia Hisp.* t. 14 ; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* t. 22. — Espagne.  $\frac{1}{2}$

## XII. CISTINÉES

1. **CISTUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 441 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 461. — Environ 50 esp. énumérées, dont la moitié bien distinctes. Eur., Afr. bor. et Asie médit.
- C. Canariensis** Jacquin in *Miscell. Austr.* II (1781) 339 et *Icon. Pl. Rar.* I (1781-1786) t. 97. — Iles Canaries.  $\frac{1}{2}$
- C. laurifolius** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 523 ; Sweet, *Cistineæ* t. 52 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 37. — Espagne, Portugal, France mér., Lombardie, Asie Min. (de la Bithynie à la Cilicie).  $\frac{1}{2}$
- C. Monspeliensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 524 ; Sweet, *Cistineæ* t. 27 ; Sibthorp et Smith *Fl. Græca* t. 493. — Eur. mér., Crète.  $\frac{1}{2}$
- C. vaginatus** Aiton, *Hort. Kew.* III (1789) 304 ; Sweet, *Cistineæ* t. 9 ; *Bot. Mag.* t. 5241 ; *Bot. Reg.* III t. 225. RHODOCISTUS BERTHELOTIANUS Spach. — Ile de Ténériffe.  $\frac{1}{2}$
2. **HELIANTHEMUM** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 75 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 462. — Environ 160 esp. décrites, dont 25 seulement bien distinctes, disséminées dans le monde entier.
- H. Apenninum** De Candolle, in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* V (1805) 824 ; Sweet, *Cistineæ* t. 62 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 33. CISTUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 529. — Eur. occ. et mér., Suisse mér., Grèce.  $\frac{1}{4}$
- H. leptophyllum** Dunal in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 279 ; Sweet, *Cistineæ* t. 20 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* t. 150. — Espagne mér. (Grenade).  $\frac{1}{2}$
- H. lunulatum** De Candolle in Lamarck et De Candolle, *Fl. Fr.* V (1805) 816 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 26. CISTUS — Allioni, *Auct. ad Fl. Pedem.* (1789) 30 t. 2 fig. 3. — Alpes du Piémont.  $\frac{1}{2}$
- H. Occidentale** Willkomm (sub **Halimo**), *Icon. Pl. Hisp.* II (1856) 59 t. 103 et 104 ; CISTUS — Amo, *Fl. Penins. Iber.* VI (1873) 352. — Espagne, Portugal.  $\frac{1}{2}$
- H. Oelandicum** De Candolle, *Fl. Fr.* V (1805) 817 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I (1823) 1 et 89 t. I fig. 1. CISTUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 526. — Eur., Asie Min., Caucase.  $\frac{1}{4}$

## XIII. VIOLARIÉES

1. VIOLA Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 679 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 469. — Environ 250 esp. énumérées, dont 150 seulement bien distinctes, disséminées dans le monde entier.

**V. Ætolica** Boissier et Heldreich in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, VI (1839) 24. V. ÆTOLICA Boissier et Heldreich, *Fl. Or.* I 464. — Grèce. ☉ ♀

**V. Beckwithii** Torrey et Gray, *Pacif. Railr. Rep.* II (1855) 119 t. 1 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I, 58. — Californie.

**V. biflora** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 936 ; *Bot. Mag.* t. 2089 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 1. — Pyrénées, Dauphiné, Eur. centr., Sibérie, Amér. bor. ♀

**V. blanda** Willdenow, *Hort. Berolin.* (1816) t. 24 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 51 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 138. — États-Unis.

— — var. **renifolia** S. WATSON in A. GRAY, *Man. Bot. North. Unit. States* ed. 6 (1890) 80. V. RENIFOLIA A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* (1810) 288. — Du Maine au Massachussets.

**V. calcarata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 935 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 269 et *Icon. Fl. Germ.* III t. 18. V. NEBRODENSIS Presl. — Eur. centr. et mér. (du Dauphiné au Monténégro). ♀

— — var. **flava** KOCH, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3 (1857) 76. V. ZOYZII Wulfen in Jacquin, *Coll. Bot.* IV (1790) 297 t. 11. — Carniole, Bosnie.

**V. Canadensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 936 ; Reichenbach, *Pl. crit.* I t. 54 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 62. — Amér. bor. ♀

**V. canina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 935 ; *Engl. Bot.* t. 620 ; *Fl. Dan.* t. 1453. — Eur., Sibérie, Caucase. ♀

— — var. **Muehlenbergii** A. GRAY, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* (1890) 81. V. MUEHLENBERGH TORREY et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I (1838) 256 ; *Fl. Dan.* Suppl. t. 2710. — Du Labrador à la N.-Orléans et aux mont. Rocheuses. ♀

**V. cornuta** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1325 ; *Bot. Mag.* t. 791 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 20. — Pyrénées. ♀

**V. delphinantha** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, I (1842) 7 ; Boissier, *Fl. Or.* I 453. — Macédoine, Thessalie. ♀

**V. delphinifolia** Nuttall, in Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I (1838) 136. — États-Unis. ♀

- Viola dissecta** Ledebour, *Fl. Altaica* I (1829) 255 et *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 233. V. MULTIFIDA Willdenow. — Sibérie, Daourie. 2
- V. glabella** Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I (1838) 142 — Oregon. 2
- V. Macedonica** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, I (1853) 56; *Fl. Or.* I 465. — Macédoine. ☉ 2
- V. mirabilis** × **sylvatica** W.-O. Focke, *Die Pflanzen-Mischlinge* (1891) 63. — Allemagne.
- V. montana** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 935; *Bot. Mag.* t. 1595; Reichenbach, *Pl. Crit.* I 98. — Eur. temp., Sibérie. 2
- — var. **stricta** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 299. V. STRICTA Hornemann, *Fl. Dan.* XI (1825) t. 1812. — Eur. bor. et centr., Serbie. 2
- V. Nuttallii** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 174; Hooker. *Fl. Bor.-Amer.* I t. 26. V. PRÆMORSA Douglas ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1829) t. 1254. — États-Unis. 2
- V. Orphanidis** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 464. — Macédoine. 2
- V. palmata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 933; *Bot. Mag.* t. 535; Reichenbach *Pl. Crit.* I t. 41 et 42. — États-Unis. 2
- — var. **cucullata** A. GRAY, *Man. Bot. North. Unit. States* ed. 6 (1890) 79. V. CUCULLATA Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 288; *Bot. Mag.* t. 1795; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* sér. 2 t. 298. — De l'Amér. arct. à la Floride. 2
- V. pedata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 933; *Bot. Mag.* t. 89; *Bot. Cab.* t. 536. — De l'Amér. angl. à la Floride et à l'Illinois. 2
- V. pedunculata** Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I (1838) 141; *Bot. Mag.* t. 5004. — Californie. 2
- V. pinnata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 934; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 1 et *Pl. Crit.* I t. 41. — Dalmatie, Italie bor., Sicile, Tyrol, Carinthie. 2
- V. primulaefolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 934; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 45. — Du Massachussets à la Floride et au Kentucky. 2
- V. pubescens** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 290; *Bot. Cab.* t. 1249; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 53. — Du Canada à la Georgie et au Missouri. 2
- V. rostrata** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 174; Reichenbach, *Icon. bot. exot.* t. 131. — Du Canada à la Virginie et au Kentucky. 2
- V. rotundifolia** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 150; Reichenbach, *Icon. bot. exot.* t. 124. — Labrador, États-Unis. 2
- V. sagittata** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 287; Reichenbach, *Pl. crit.* I t. 42; *Bot. Cab.* t. 1471. — Du Canada à la Floride et à l'Arkansas. 2
- — var. **emarginata** TORREY et GRAY, *Fl. of N.-Amer.* I (1838) 138. V. DENTATA Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 172; *Bot. Cab.* t. 1485. Avec le type.

**Viola uliginosa** Schrader in *Neues Journ. f. d. Bot.* IV (1810) 80 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 52 et *Icon. Fl. Germ.* III t. 2. — Scandinavie mér., Eur. centr.-or., Russie méd., Bosnie. ʒ

2. **HYMENANTHERA** R. Brown in Tuckey, *Exped. Congo* (1818) 442 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 481. — 4 esp. de l'Australie et de la N.-Zélande.

**H. crassifolia** Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* I (1853) 17 t. 7 ; *Garden. Chron.* (1875) 237 cum icon. — N.-Zélande. ʒ

#### XIV. BIXINÉES

1. **AZARA** Ruiz et Pavon, *Flor. Peruv. et Chil. Prodr.* (1794) 79 t. 36 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 510. — 12 esp., originaires du Chili et du Mexique.

**A. Gilliesii** Hooker et Arnott in Hooker *Bot. Mag.* (1860) t. 5178 ; *Bot. Misc.* III (1833) 144 ; Gay, *Fl. Chil.* I 193. — Chili. ʒ

**A. microphylla** Hooker, *Fl. Antarct.* II (1847) 243 ; *Garden. Chron.* (1874) I 81, cum icon. — Chili. ʒ

#### XV. POLYGALÉES

1. **POLYGALA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 567 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 542. — Plus de 200 esp. dispersées dans le monde entier.

**P. Chamæbuxus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 704 ; *Bot. Mag.* t. 316 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 233. — Eur. centr. (du Dauph. à la Transylv.), Italie. ʒ

**P. Senega** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 704 ; *Bot. Mag.* t. 1051 ; *Bot. Cab.* t. 1380. — De l'Amér. arct. à la Caroline et au Kentucky. ʒ

2. **MONNINA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Syst. Veget.* I (1798) 169 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 554. — Une cinquantaine d'esp. originaires du Mexique et de l'Amér. austr.

**M. obtusifolia** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. Sp. Pl.* V (1821) 441 ; *Bot. Mag.* t. 3122. — N.-Grenade.  $\frac{1}{2}$

## XVI. CARYOPHYLLÉES

1. **DIANTHUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. 2 (1742) n. 29 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 569. — Plus de 225 esp., dispersées en Eur., en Asie, en Afr. et dans l'Amér. bor.-occ.

**D. alpinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 412 ; *Bot. Mag.* t. 1205 ; *Bot. Cab.* t. 67. — Alpes, Autriche, Styrie, Tyrol.  $\frac{1}{2}$

**D. arenarius** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 412 ; De Candolle, *Icon. Pl. Gall. rar.* t. 31 ; *Bot. Mag.* t. 2038. — Suède mér., Fionie, Russie méd., Prusse, Pologne, Dalmatie.  $\frac{1}{2}$

**D. arenarius**  $\times$  **cæsius** W.-O. Focke, *Die Pflanzen-Mischlinge* (1891) 3. — Allemagne.

**D. attenuatus** Smith in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 301 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 3 et 4. — Pyrénées franç. or., Catalogne.  $\frac{1}{2}$

— — subsp. **benearnensis** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 105. **D. BENEARNENSIS** Loret in *Bull. Soc. Bot. Fr.* I (1858) 227. — Pyrénées franç.

**D. Banaticus** Heuffel ex GRISEBACH et SCHENK, *It. Hung.* in Wigmann, *Archiv.* XVIII, 1 (1852) 301 ; *Gartenflora* V t. 153. — Banat.

— Obs. M. Nyman en fait une sous-espèce du **D. GIGANTEUS** d'Urville.

**D. barbatus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 409 ; *Bot. Mag.* t. 207 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 248. **D. LATIFOLIUS** Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* (1809) 466. — Eur. mér. et mér.-or.  $\frac{1}{2}$

**D. brachyanthus** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 85 t. 24 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* II t. 5. — Espagne centr.  $\frac{1}{2}$

**D. cæsius** Smith in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 302 ; *Engl. Bot.* I t. 62 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* III t. 265. **D. VIRGINEUS** Linné var.  $\beta$ . Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 590. — Eur. occ. et centr., Lombardie.  $\frac{1}{2}$

**D. Caryophyllus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 410 ; *Bot. Mag.* t. 2744 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 268. **D. corsicus** Fischer. — France occ., Italie, Dalmatie, Sardaigne, Angleterre, introd.



- Dianthus cinnabarinus** Sprunner in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, VI (1845) 92. — Grèce mont. ½
- D. cruentus** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 186. — Monténégro, Herzégovine, Serbie, Macédoine, Grèce. ½
- D. fureatus** Balbis in *Act. Acad. Taurin.* VII (1801) 12 t. 2; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 265. — Piémont. ½
- D. giganteus** d'Urville, *Enum. Pl. Archip.* in *Mém. Soc. Lin. Paris* I (1822) 301; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 288. — Bulgarie, Banat, Transylvanie, Valachie, Serbie. ½
- D. glacialis** Hænke in JACQUIN, *Collect. Bot.* II (1788) 84; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 261; Sturm, *Deutsch. Fl.* VII t. 28. — Alpes suisses et autrich., Lombardie. ½
- — subsp. **gelidus** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 102. D. **GELIDUS** Schott, Nyman et Kotschy, *Anal. botan.* (1854) 54. — Transylvanie.
- D. leucophæus** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V (1825) 3 t. 405. — Bithynie. ½
- D. Liburnicus** Bartling et Wendland, *Beiträge zur Botanik* II (1825) 52. — France mér., Italie, Eur. centr.-or. ½
- — subsp. **Knappii** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 103. D. **KNAPPII** Ascherson et Kanitz. — Hongrie, Herzégovine, Monténégro. ½
- D. Lusitanus** Brotero, *Fl. Lusit.* II (1804) 177; *Phytog. Lusit.* t. 70; Willkomm, *Icon. Fl. Hisp.* I t. 2. — Espagne, Portugal.
- D. Monspeulanus** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1759) 313; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 258. D. **MARSICUS** Tenore in Huet, *Ecsicc. Neap.* (1856) n. 277. — Eur. mér. et centr.-or. ½
- D. neglectus** Loiseleur, *Not. Pl. ajout. Fl. de Fr.* (1810) 65; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 261; *Gartenflora* (1874) t. 815. D. **TENER** Balbis in *Act. Acad. Taur.* VII 13 t. 3. — France mér. et mér.-or., Italie bor., Tyrol, Transylvanie. ½
- D. polymorphus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 324; Reichenbach, *Pl. Crit.* VI t. 534 et *Icon. Fl. Germ.* VI t. 251. — Russie méd. et mér., Banat, Serbie, Hongrie. ½
- D. pungens** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 240; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 6. — Espagne, France mér. ½
- D. rupicola** Bivona, *Sicul. Pl. Cent.* I (1805) 31 t. I. D. **BISIGNIANI** Tenore, *Cat. Hort. Bot. Bisign.* (1809) 18; *Fl. Napolit.* t. 39. — Naples, Sicile. ½
- D. Seguieri** Chaix ex VILLARS, *Hist. Pl. Dauph.* I (1786) 332, II (1789) 594; Reichenbach, *Pl. Crit.* VI t. 543 et *Icon. Fl. Germ.* VI t. 253. — Mont. de la France, de l'Eur. centr. et de la Russie, Thrace, Sibérie. ½
- — var. **montanus** BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 504. D. **CAUCASICUS** Sims, *Bot. Mag.* (1804) t. 795. — Caucase.
- Obs. Ledebour rapporte aussi comme variétés à cette espèce : 1<sup>o</sup> D. **FISCHERI**

Sprengel, *Cat. Sem. Hort. Hal.* (1810); Reichenbach, *Pl. Crit.* VI t. 545;  
2° D. *VERSICOLOR* Fischer in Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 420;  
Reichenbach, *Hort. Bot.* t. 48.

**Dianthus spinosus** Desfontaines in *Ann. Mus. Paris* I (1802) 198 t. 16 fig. 1.  
— Perse. ♪

**D. squarrosus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 331; *Cent.*  
*Pl. Ross. mer.* I t. 33. — Russie mér. ♥

**D. xylorrhizus** Boissier et Heldreich in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or. sér. 1*, VIII  
(1849) 67. — Crète. ♪

2. **TUNICA** Scopoli, *Fl. Carniol.* I (1772) 298; T. Durand, *Ind.*  
*Gen. n.* 570. — Une douzaine d'esp. de l'Eur. et de l'Asie  
occ.

**T. Illyrica** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 520; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.*  
VI t. 246 sub FIEDLERIA; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 386 sub GYPSO-  
PHILA. SAPONARIA — Linné, *Mant. Plant.* I (1767) 70. — Italie mér., Sicile,  
Dalmatie, Grèce, Thessalie, Macédoine. ②

3. **ACANTHOPHYLLUM** C.-A. Meyer, *Verzeich. Pfl. Reise Cauc.*  
(1831) 210; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 371. — Environ 17 esp.  
de l'Asie occ. et centr.

**A. mucronatum** C.-A. Meyer, *loc. cit.*; *Annal. d. Wien. Mus.* I t. 5 et 6.  
— Arménie russe. ♪

4. **GYPSOPHILA** Linné, *Gen. Pl. ed. 6* (1764) n. 563; T. Du-  
rand, *Ind. Gen. n.* 573. — Une soixantaine d'esp. de l'Eur.  
et de l'Asie extratrop., Australie et N.-Zélande, indig.

**G. cerastoides** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 213. ACOSMIA RUPESTRIS  
Bentham in *Wall. Cat.*; Jacquemont *Voy. dans l'Inde*, 26 t. 28. TIMÆOSIA  
RUPESTRIS Klotzsch in *Bot. Reise Prinz Waldem.* 138 t. 33. — Himalaya  
temp., de Cachemire à Sikkim.

**G. fastigiata** Linné, *Amæn. acad.* III (1756) 23; Dietrich, *Fl. Boruss.* X  
t. 584; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 241. — Suède mér., Eur. centr.,  
Russie mér. ♥

**G. repens** Linné, *Amæn. acad.* III (1756) 23; *Bot. Mag.* t. 1448; Reichen-  
bach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 240. — Pyrénées, monts d'Auvergne, Jura, Alpes,  
Apennins, Carpathes. ♥

**Gypsophila Transsylvanica** Sprengel, *Syst. Veget.* IV 1 (1827) 179 ;  
BANFFIA PETRÆA Baumg., Enum. Stūrp. Magn. Transylv. Princip. I (1816)  
385 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* (1826) t. 400. — Transylvanie. 2

5. **SAPONARIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 365 ; T. Durand, Ind.  
Gen. n. 574. — Environ 35 esp. de l'Eur. et de l'Asie extra-  
trop.

**S. bellidifolia** Smith, *Spicileg. Bot.* I (1791) 5 ; *Gartenflora* (1874) t. 815 ;  
Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 244 sub SMEGMATHAMNIO Fenzl. —  
France et Italie mér., Dalmatie, Albanie, Serbie, Thessalie, Grèce. 2

**S. cæspitosa** De Candolle, *Rapp. Voy. bot. Dept. du Sud-Est* II (1810) 28 ;  
Willkomm, *Icon. Fl. Hisp.* I t. 22. — Pyrénées. 2

**S. lutea** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 585 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 23 ;  
Rœmer, *Fl. Eur.* I t. 8. — Dauphiné, Suisse mér., Piémont, Lombardie. 2

**S. pubinervis** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 4, VIII (1849) 74. **S. PUMILIO**  
Boissier (non Fenzl), *loc. cit.* sér. 4, I (1842) 18. — Asie Min., Syrie. 2

6. **SILENE** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 372 ; T. Durand, Ind.  
Gen. n. 575. — Près de 500 esp. décrites dans ce genre,  
mais 250 seulement paraissent bien distinctes ; elles sont  
originaires de l'Eur., de l'Asie, de l'Afr. extratrop. et aussi  
de l'Amér. bor.

**S. acaulis** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 603 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 79 ;  
*Bot. Mag.* t. 1081. CUCUBALUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 415. — Eur.  
bor. et mont., Amér. bor., arct. et mont. 2

**S. alpestris** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I (1773) 60 t. 96 ; Reichenbach, *Icon.*  
*Fl. Germ.* VI t. 277b. — Savoie, Autriche, Styrie, Carinthie, Transylvanie,  
Carniole, Tyrol. 2

**S. auriculata** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 301 ; *Fl.*  
*Græcæ* V t. 425. — Grèce (rég. alp. et subalp.). 2

**S. Borderi** Jordan in ROHRBACH, *Monog. d. Gatt. Silene* (1868) 137. —  
Pyrénées franç. 2

**S. Boryi** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1838) 19 n. 28 ; *Voy. Bot. Esp.* 93 t. 25 A.  
— Portugal, Aragon.

**S. cæsia** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 417 ; *Fl. Græca* V  
t. 417. — Grèce mont., Chios. 2

**S. ciliata** Pourret in *Act. Acad. Toul.* III (1783) 328 ; Willkomm, *Icon. Pl.*  
*Hisp.* I t. 42 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 654. — Pyrénées,  
Auvergne. 2

- Silene ciliata** Pourret, subsp. **geniculata** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 92. *S. GENICULATA* Pourret in *Act. Acad. Toul.* III (1783) 328 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 42. *S. ARVATICA* Lagasca, *Var. cienc.* (1805) 212. — Espagne bor. et centr. ʒ
- S. commutata** Gussone, *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 499. *S. FABARIA* Bertoloni (non Sibthorp et Smith), *Fl. Ital.* IV (1839) 627. — Eur. mér., Asie Min., Chypre, Arménie. ʒ
- S. cordifolia** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 82 t. 23 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 286. — Piémont. ʒ
- S. crassicaulis** Willkomm et Costa in Willkomm, *Pug. Pl. Rar. Penins. Pyr.* (1859) 91 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 666. — Catalogne. ʒ
- S. Elisabethæ** Jan, *Catal. Rerum Natur.* (1832) 3 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 271 ; *Pl. Crit.* X t. 901 ; *Gartenflora* (1880) t. 1009. — Lombardie, Tyrol. ʒ
- S. fruticosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 417 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 428 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 122. — Sicile, Pélopon., Chypre. ʒ, ʒ
- S. gigantea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 418 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 432. — Grèce, Archipel, Macédoine, Crète, Arménie, Syrie.
- S. Græfferi** Gussone, *Pl. Rar. Reg. Samn. et Aprut.* (1826) t. 34 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IX t. 880. — Italie centr., Sicile, Thessalie. ʒ
- S. graminea** Visiani, *Fl. Dalm.* II (1847) t. 34 ; Reichenbach, *Icon. Pl. Germ.* VI t. 286. — Croatie, Dalmatie, Herzégovine, Monténégro, Bosnie. ʒ
- S. Legionensis** Lagasca, *Gen. et Sp. Plant.* (1816) 14 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 41. — Espagne. ʒ
- S. Lemmoni** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* X (1875) 342. — Amér. bor.
- S. multicaulis** Gussone, *Pl. Rar. Reg. Samn. et Aprut.* (1826) 72 t. 35. *S. INAPERTA* Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V t. 420. — Italie méd. et mér., Corse, Dalmatie, Herzégovine, Macédoine, Thessalie, Grèce. ʒ
- S. Nicæensis** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 81 t. 44 fig. 2 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V t. 424 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 278. — Eur. mér. (partie occ.), Afr. bor., Péloponèse, Chypre ☉ ou ② (Boissier).
- S. odontopetala** Fenzl, *Pugill. Pl. Nov. Syr. et Taur.* (1842) n. 28. — Asie Min., Lazistan, Arménie, Liban. ʒ
- var. **latifolia** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 626. *S. PHYSOCALYX* Ledebour, *Fl. Ross.* I (1842) 321.
- S. Olympica** Boissier, *Diagn. Pl. Or. sér. 1*, I (1842) 24 ; Boissier *Fl. Or.* I 609. — Bithynie, Cappadoce, Cilicie. ʒ
- S. paradoxa** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1673 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* III t. 84 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 296. — Eur. bor. et centr., France mér., Italie, Grèce, Macédoine, Caucase, Sibérie. ʒ

**Silene Pumilio** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* (append.) V (1778) t. 2 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 377 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 270. CUCUBALUS — Linné, *Mant. Plant.* I (1767) 71. — Lombardie, Tyrol, Carniole, Carinthie, Styrie, Transylvanie.

**S. radicosa** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.*, sér. 1, VI (1845) 24 ; Boissier, *Fl. Or.* I 645. — Grèce, Thessalie. ♀

**S. Requienii** Otth, ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 381 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 44. — Corse. ♀

**S. Saxifraga** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 421 ; Waldstein et Kitaibel, *Icon. et Descr. Pl. Rar. Hung.* t. 163 ; *Bot. Cab.* t. 454 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 285. — Mont. de l'Eur. centr. et mér. ♀

**S. Schafta** S.-G. Gmelin, ex Hohenacker in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* XII (1837) 328 ; Fischer et Meyer, *Sert. Petrop.* t. 2 ; *Bot. Reg.* XXXII t. 20 ; *Gartenflora* (1858) t. 241. — Russie mérid. ♀

**S. serrulata** Boissier in Bourgeau, *Pl. exsicc.* (1860) n. 56 ; *Fl. Or.* I (1867) 643. — Lycie. ♀

**S. Tatarica** Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 497 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* V t. 291 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 292. — Laponie, Prusse or., Pologne, Transylvanie, Russie méd. et mér., Turkestan. ♀

**S. Vallesia** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 603 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 23 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 286. — Dauphiné, Suisse mér., Piémont, Dalmatie. ♀

7. **LYCHNIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 381 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 577. — 40 esp. de la rég. extratrop. de l'hémisphère bor.

**L. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 436 ; *Bot. Mag.* t. 394 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 307. — Eur. bor., Pyrénées, Alpes, Labrador. ♀

**L. Chalcedonica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 436 ; *Bot. Mag.* t. 257 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 305. — Russie méd.-or. et mér., Asie Min. ♀

**L. Flos-Jovis** Lamarck, *Dict. Encycl. Bot.* III (1789) 644 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 305. AGROSTEMMA — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 436. — Dauphiné, Suisse mér., Italie bor. ♀

**L. nivalis** Kitaibel in J.-A. Schultes, *Öesterreichs. Fl.* (1814) 698. POLYSCHEMON — Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta bot.* (1854) 55. — Hongrie, Transylvanie. ♀

**L. pyrenaica** Bergeret, *Fl. Bass.-Pyr.* II (1803) 264 ; *Bot. Mag.* t. 3264. PETROCOPTIS — A. Braun in *Flora* XXVI (1843) 370. — Pyrénées franç.-occ. ♀

**Lychnis Viscaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 436 ; Willkomm, *Icon. Pl. Hisp.* I t. 19 et 20 ; *Engl. Bot.* XI t. 788 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* VI t. 411 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 307. — Eur. (rég. arct. et mér. except.). ☞

8. **CERASTIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 376 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 580. — 115 esp. décrites, dont 50 bien distinctes se rencontrant presque partout.

**C. nutans** Rafinesque, *Préc. des Découv.* (1814) 36 ; Grenier, *Monogr. Cerast.* t. 5 ; A. Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. illust.* II t. 114. **C. LONGEPEDUNCULATUM** Muehlenberg *Cat. Pl. Amer. Sept.* (1818) 47 — De la baie d'Hudson à la Louisiane et à l'Orégon. ☉

**C. viscosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 437 ; *Engl. Bot.* t. 711 ; *Fl. Dan.* t. 1211. — Partout.

— — var. **barbatum** Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 723. **C. villosum** Steven, *Verzeichn. Taur. Pl.* (1857) 89. — Caucase. ☉

9. **ARENARIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 374 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 589. — Environ 160 esp. répandues dans le monde entier.

**A. aretioides** Portenschlag (inéd. 1818) ex **A. Kerner**, *Sched. Fl. Austr.-Hung.* II (1882) 85. — Suisse, Autriche, Transylvanie. ☞

**A. Armeriastrum** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1838) n. 35 ; *Voy. Bot. Esp.* t. 30. — Espagne. ☞

**A. Balearica** Linné, *Syst. Nat.* ed. XII, app. III (1768) 230 ; L'Héritier, *Stirp. Nov.* t. 15. — Iles Baléares, Corse, Sardaigne. ☞

**A. caricifolia** Boissier in TCHIHATCHEFF, *Asie Min.* III (Botan.) I (1860) 235. — Arménie mér. ☞

**A. dianthifolia** Boissier, (sub **ALSINE**) in *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, III (1849) 99. — Lycie, Cappadoce. ☞

**A. glauca** Heuffel, (sub **MÖHRINGIA**) in *Bot. Zeit.* (1858) 586. — Tyrol.

**A. gracilis** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* III (1812) 305 t. 276 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 218. — Croatie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie. ☞

**A. Grignensis** Thomas in *Suppl. Catal.* (1842). **A. GRIGNENSIS** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I (1848) 254, in adnot. — Suisse. ☞

**A. gypsophiloides** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 71. — Arménie, Cappadoce, Perse. ☞

**A. Huteri** **A. Kerner** in *Öst. Bot. Zeitschr.* XXII (1872) 368. — Vénétie. ☞

- Arenaria juniperina** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 72 ; Smith, *Icon. Pl. ined.* t. 35 ; Bory et Chaubard, *Fl. Pélop.* t. 15. — Péloponèse, Asie Min., Syrie, Palestine. 2
- A. lanceolata** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 114 t. 26 fig. 5. ALSINE — Mertens et Koch, in RÖHLING *Deutschl. Fl.* ed. III (1831) 275. — Provence, Dauphiné, Piémont, Autriche (du Tyrol à la Carniole). 2
- A. laricifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 424. ALSINE — Grenier in *Mém. Soc. Doubs* (1849) 33 t. I fig. 1 — Espagne, Pyrénées, France mér., Dauphiné, Italie bor., Eur. centr. 2
- A. Ledebouriana** Fenzl in RUESSEGER, *Abbild. seltn. Pfl. aus Syr.* II (1843) 931. — Asie Min., Assyrie. 2
- A. liniflora** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 24 ; Jacquin, *Collect. Bot.* II t. 3. ALSINE BAUHINORUM J. Gay ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 212 (sub WIERZBICKIA). — France mér., Eur. centr., Italie cont. 2
- A. macrophylla** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 102 t. 37. — Asie or., Amér. occ. 2
- A. montana** Linné, *Amœn. Acad.* IV (1759) 272 ; *Bot. Mag.* t. 1118 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 213. — Portugal, Espagne, France occ. et mér., Italie sup. 2
- A. peploides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 423 ; *Engl. Bot.* t. 189. HONCKENYA — Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* II (1788) 181 ; *Fl. Dan.* IV t. 624 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 213. — Eur., Sibérie arct., Amér. bor. (du 40° à l'océan Glacial). 2
- A. pinifolia** Fenzl (sub ALSINE) in *Verbreit. d. Fam. d. Alsin.* (1833) 46 ; Boissier, *Fl. Or.* I 671. — Tauride, Arménie, Caucase. 2
- A. purpurascens** Ramond in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* IV (1805) 785 ; De Candolle, *Icon. Pl. Gall. rar.* t. 45. — Pyrénées, Sierra Nevada. 2
- A. Rosani** Tenore, *Fl. Napol. Prodr.* (1811) XXVII ; *Fl. Napolit.* (Atlas) t. 228 fig. 2. — Italie, Sicile, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie. 2
- A. Villarsii** Balbis, *Misc. Bot.* (1804) 21. ALSINE — Mertens et Koch ; Allioni, *Fl. Pedem.* t. 64 fig. 2 (sub A. AUSTRIACA) ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 210 (sub NEUMAYERA). — Espagne, Provence, Dauphiné, Suisse, Piémont, Lombardie, Carinthie. 2
- A. Wulfenii** Steudel, *Nomencl. Bot.* (1840) 128. A. VILLOSA Wulfen (non Ledebour) in Jacquin, *Coll. Bot.* IV (1790) 319. MÖHRINGIA — Fenzl, *Verbreit. d. Fam. d. Alsin.* (1833) 46. — Carniole. 2

## XVII. PORTULACÉES

1. PORTULACA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 343 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 605. — Une vingtaine d'esp. croissant partout dans les régions chaudes.  
**P. Caffra** Thunberg, *Fl. Capens.* (1825) 399. TALINUM CAFFRUM Ecklon et Zeyher ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 385. — Afrique austr. ♀
2. ANACAMPSEROS Linné, Gen. Pl. (1737) n. 428 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 611. — Une dizaine d'esp. de l'Afr. austr.  
**A. arachnoidea** Sims in *Bot. Mag.* (1811) t. 1368 ; PORTULACA — Haworth, *Miscell. Naturalia* (1803) 142. — Afrique austr. ♂  
**A. Telephiastrum** De Candolle, *Cat. Hort. Monspel.* (1813) 77. PORTULACA ANACAMPSEROS Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 445. TALINUM — Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 862 ; Redouté, *Pl. Grasses* t. 3. — Afrique austr. ♂
3. CLAYTONIA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 849 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 615. — Une vingtaine d'esp. de l'Asie et de l'Amér bor. et de la N.-Zélande.  
**C. Caroliniana** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 160 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 208 ; Salisbury, *Parad. Lond.* t. 71 sub C. SPATHULÆFOLIA. — Du Canada à la Caroline et aux mont. Rocheuses. ♀  
**C. Sibirica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 204 ; *Bot. Mag.* t. 2243 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 16. — Sibérie, Amér. bor.  
**C. Virginica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 204 ; *Bot. Mag.* t. 941 ; *Bot. Cab.* t. 643. — Du Canada à la Floride, la Louisiane et l'Arkansas.
4. LEWISIA Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 368 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 622. — 2 esp. de l'Amér. bor.-occ.  
**L. rediviva** Pursh, *l. c.* ; *Bot. Mag.* t. 3395 ; Hooker, *Bot. of Capt. Beechey's Voy.* t. 86. — Orégon. ♀



## XVIII. TAMARISCINÉES

1. MYRICARIA Desvaux in Ann. Sc. Nat., sér. 1, IV (1825) 348 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 624. — 4 esp. de l'Europe et de  
l'Asie centr.

**M. Dahurica** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 98. TAMARIX —  
Willdenow in *Acta Acad. Berol.* 1812-13 (ed. 1816) 77 n. 16. — Sibérie,  
Daourie. ʒ

## XIX. HYPÉRICINÉES

1. HYPERICUM Linné, Gen. Pl. (1737) n. 606 ; T. Durand, Ind.  
Gen. n. 631. — Environ 175 esp. dispersées dans le monde  
entier.

**H. Ægyptiacum** Linné, *Aman. Acad.* VIII (1785) 323 t. 8 fig. 3 ; *Bot.*  
*Reg.* III t. 196 ; Spach in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, V (1836) t. 4 et 5 sub  
TRIADENIA MICROPHYLLA et THYMIFOLIA. — Ile Lampedusa ; Egypte ?. ʒ

**H. Balearicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 783 ; *Bot. Mag.* t. 137. — Iles  
Baléares, Ligurie. ʒ

**H. Coris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) p. 782 ; *Bot. Mag.* t. 178 ; Reichenbach,  
*Icon. Fl. Germ.* VI t. 351. — Provence, Suisse mér., Tyrol, Italie, Corse. ʒ

**H. cuneatum** Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* (suppl.) III (1813) 699 ; Jaubert et  
Spach, *Ill. Pl. Or.* t. 25. — Asie Min., Syrie. ʒ (ʒ sec. DC.)

**H. Delphicum** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, I (1853)  
106 et *Fl. Or.* I 807. — Eubée, ile Andros. ʒ

**H. Hookerianum** Wight et Arnott, *Prodr. Fl. Ind. Or.* I (1834) 99 ;  
Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* III t. 959 ; *Bot. Mag.* t. 4949 sub H. OBLONGI-  
FOLIO Choisy. — Sikkim, Khasia, Nilgherries. ʒ

**H. Lalandei** Choisy in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 550 ;  
H. FÆTIDUM Hooker f. et Thompson in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* I (1874) 257. —  
Khasia, Afrique austr., Basse-Guinée. ʒ

**H. myrtifolium** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* IV (1797) 180 ; Torrey et  
Gray, *Fl. N.-Amer.* I, 161. — Floride, Alabama, Georgie, Caroline. ʒ

**H. nummularium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 787 ; Lamarck, *Pl. Bot.*  
*Encycl.* t. 643 fig. 3 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 346. — Pyrénées,  
Dauphiné, Savoie. ʒ

- Hypericum Orientale** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 785 ; Eichwald, *Pl. Itin. Casp.-Cauc.*, fasc. 2 t. 36 ; Tournefort, *Voy. au Levant*, t. 220 ; Boissier, *Fl. Or.* I 795. — Asie Min., Caucase. ♀
- H. patulum** Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 295 et *Icon. Fl. Jap.* t. 17 ; *Bot. Mag.* t. 2375 sub *H. URALO* Hamilton. — Japon, Népaoul. ♀
- H. serpyllifolium** Lamarck, *Encycl. Méth. Botan.* IV (1794) 176 ; Lobel, *Observ.* 216 cum ic. ex Boissier, *Fl. Or.* I 793. — Littoral de la Syrie. ♂
- H. tetrapterum** Fries, *Novitiae Fl. Suec.* ed. I (1823) 94 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 344 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* IV t. 272. — Europe (partie bor. except.)
- — var. **Corsicum** BOISSIER, *Fl. Or.* I (1867) 806. *H. CORSICUM* Steudel, *Nomencl. Bot.* I (1840) 787 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 315. — Espagne mér., Corse, Crète. ♀

## XX. TERNSTRÆMIACÉES

1. **DUPINIA** Scopoli, *Introd. ad Histor. natur.* (1777) 195 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 676. — Environ 40 esp. de l'Asie et de l'Amérique trop.
- D. Japonica** Scopoli, *loc. cit.* (1777) 195. TERNSTRÆMIA — Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 335 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* t. 81. CLEYERA — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 224. — Inde or., Ceylan, Sumatra, Chine, Japon. ♂
2. **CAMELLIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 565 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 695. — Environ 15 esp. de l'Asie trop. et subtrop., de la Chine et du Japon.
- C. Thea** Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* II (1822) 73. *THEA BOHEA* Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 734 ; *Bot. Mag.* t. 998 ; *Bot. Cab.* t. 298. *THEA VIRIDIS* Linné, *loc. cit.* (1763) 735. — La vraie patrie de cette plante est encore douteuse, elle a été indiquée à Assam, à Cachar, en Chine, à Formose, à Hainan et au Japon. ♂

## XXI. MALVACÉES

1. **ALTHÆA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 561 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 730. — Une quinzaine d'esp. de la rég. temp. de l'ancien monde.
- A. ficifolia** Cavanilles, *Monadelph. Class. Dissert.* (1786) 92 t. 28 fig. 2 ; Boissier, *Fl. Or.* I 833. *ALCEA* — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 687. — Russie mér., Dalmatie, Caucase, Sibérie. ②

**Althæa lavateræflora** A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veg.* I (1824) 437.  
ALCEA — Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 828. — Egypte, Palestine, Syrie, Perse. ʒ

2. **SIDALCEA** A. Gray, *Pl. Fendler.* (1849) 18 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 734. — 8 esp. de l'Amérique bor.-occ.

**S. candida** A. Gray, *loc. cit.* (1849) 20 et 24 ; Gray et Sprague, *Gen. Fl. Amer. Bor. illust.* II t. 120 fig. 9 ; *U. S. Pacif. Railr. Rep.* II (1855) 126 t. II (Gunnison expéd.). — Amérique bor.

**S. malvæflora** A. Gray, *Pl. Wright.* I (1852) 16. SIDA — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 474 ; Mocino et Sessé, *Fl. Mex.* t. 70 ; *Bot. Reg.* XII t. 1036. — Amérique bor.-occ. ʒ ?

3. **MALVASTRUM** A. Gray, *Pl. Fendler.* (1849) 21 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 736. — Genre de 80 esp. de l'Afrique austr. et de l'Amérique.

**M. Capense** A. Gray et Harvey, *Fl. Cap.* I (1859) 160. MALVA — Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1786) 71 t. 24 fig. 3 ; *Bot. Reg.* IV t. 295 et 296. — Cap de Bonne-Espérance. ʒ

4. **ABUTILON** Gärtner, *De Fructib. et Semin.* II (1791) 251 t. 136 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 747. — Environ 80 esp. de la région chaude des deux mondes.

**A. cryptopetalum** F. Mueller in BENTHAM, *Fl. Austral.* I (1863) 201. SIDA — F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* II (1860) 11. — Australie. ʒ

**A. vexillarium** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1864) t. 16 ; *Fl. des Serres* XV t. 4599 ; *Illustr. Hort.* XII t. 432. — Amérique mérid. ʒ

5. **SPHÆRALCEA** A. de Saint-Hilaire, *Fl. Brasil.* I (1829) 209 ; T. Durand, *Ind. Gen.* 749. — 25 esp. de l'Amérique et de l'Afrique austr.

**S. rivularis** Torrey ex A. Gray, *Fl. Fendler.* (1849) 23. MALVA — Douglas ex Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 107. S. ACERIFOLIA Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 228 ; *Bot. Mag.* t. 5404. — Amérique bor.-occ. ʒ

6. **HIBISCUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 562 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 762. — Genre de 180 esp. des rég. temp. et chaudes du monde entier.

**H. Syriacus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 695 ; Boissier, *Fl. Or.* I 839. H. CHINENSIS De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 455 ; Braam, *Icon. Pl. Chin.* (1821) t. 24. — Chine, Inde or., Asie Min., Syrie ? ʒ

**Hibiscus micranthus** Linné f., *Suppl. Pl.* (1780) 308. GOSSYPIMUM — Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1788) 311 t. 193. — Inde or. ʒ

## XXII. STERCULIACÉES

1. **FREMONTIA** Torrey in Smithson. Contrib. VI (1853) 5 t. 2 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 807. — Genre monotype.

**F. Californica** Torrey, *loc. cit.* (1853) 5 t. 2 ; *Bot. Mag.* t. 5591 ; *Fl. des Serres* XXII t. 2349 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* I 47 t. 23. — Californie. ʒ

## XXIII. TILIACÉES

1. **SPARMANNIA** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 41 ; T. Durand,  
Ind. Gen. n. 861. — 3 esp. de l'Afrique trop. et austr.

**S. Africana** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 265 ; *Bot. Mag.* t. 516 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 468 ; Ventenat, *Jard. de la Malm.* t. 78. — Cap de Bonne-Espérance. ʒ

2. **TILIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 440 ; T. Durand, Ind. Gen.  
n. 872. — Environ 12 esp. de l'Europe, l'Asie temp. et  
l'Amérique bor.

**T. Americana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 514 ; Michaux, *Arbr. forest. Amer.* III 311 t. 1 ; Watson, *Dendrol. Brit.* II t. 134 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* I 53 t. 24 et 25. — Du Canada à la Virginie et la Georgie. ʒ

— — var. **pubescens** Loudon, *Arboret. Brit.* I (1838) 374 t. 23 et 24. **T. MISSISSIPIENSIS** Bosc (ubi ?) ex Loudon, *loc. cit.*

**T. grandifolia** Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* V (1790) 158. **T. PLATYPHYLLOS** Scopoli, *Fl. Carniol.* I (1772) 373 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 316-318 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* I t. 50. — Europe (excl. bor.), Caucase. ʒ

— — var. **macrophylla** BAYER, *Monog. Til.* (1862) 44. **T. MACROPHYLLA** Mérat, *Nouv. Fl. env. Paris* ed. II (1824) 451.

**T. heterophylla** Ventenat in *Mém. Acad. Sc.* IV (1802) 16 t. 5. **T. ALBA** Michaux, *Arbr. forest. Amer.* III (1813) 316 t. 2 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* I 57 t. 28. — États-Unis (bassin de l'Atlantique). ʒ

**Tilia Mandshurica** Ruprecht et Maximowicz, *Mélang. Biol.* II (1856) 443.  
T. ARGENTEA Bayer, *Monog. Til.* (1862) 42 t. 9 fig. 3. T. ARGENTEA  $\beta$  Mandshurica Regel, *Tent. Fl. Ussur.* (1861) 30. — Japon, Mandchourie, Chihli, Chinking.  $\mathfrak{h}$

**T. ulmifolia** Scopoli, *Fl. Carn.* I (1772) 374. T. PARVIFOLIA Ehrhart, *Beitr. zur Naturk.* V (1790) 159. — Europe, Asie.  $\mathfrak{h}$

## XXIV. LINÉES

1. LINUM Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 254 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 892. — Genre de 100 esp. plus ou moins représenté dans le monde entier.

**L. usitatissimum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 277 ; *Engl. Bot.* t. 1357 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VI t. 329. — Patrie inconnue.  $\odot$

— — var. **humile** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 426. L. HUMILE Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2.

2. REINWARDTIA Dumortier, *Comment. Bot.* (1822) 19 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 893. — Genre de 7 esp. originaires de l'Inde.

**R. trigyna** Planchon in HOOKER, *Lond. Journ. Bot.* VII (1848) 522. LINUM — Roxburgh, *Fl. Ind.* II (1832) 110 ; *Bot. Mag.* t. 1100 ; *Bot. Cab.* t. 1193. — Inde or.  $\mathfrak{h}$

## XXV. GÉRANIACÉES

1. BIEBERSTEINIA Stephan in *Mém. Soc. Natur. Mosc.* I (1811) 89 t. 9 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 980. — 7 esp. décrites, mais pouvant se réduire à 3, originaires de la Grèce et de l'Asie occ. et centr.

**B. Orphanidis** Boissier, *Diagn. Pl. Or. sér. 2*, I (1853) 113 ; Boissier, *Fl. Or.* I 900. — Péloponèse, Cilicie.  $\mathfrak{z}$

2. **GERANIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 554 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 983. — Genre de 110 esp. habitant les rég. temp. et les montagnes des rég. trop.

**G. argenteum** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1759) 324 et *Sp. Pl.* ed. II (1763) 954 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 546 ; *Bot. Mag.* t. 504. — Dauphiné, Italie bor. et méd., Carniole. 2

**G. Armenum** Boissier in BOURGEOU, *Pl. Arm. exsicc.* et *Fl. Or.* I (1867) 878. **G. PSILOSTEMON** Ledebour, *Fl. Ross.* I (1842) 465. — Arménie, Transcaucasie. 2

**G. cinereum** Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 204 t. 89 fig. 1 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 573. **G. CINERACEUM** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) t. 2. — Pyrénées franç. et espagn., Aragon, Italie mér. 2

**G. Grevilleanum** Wallich, *Catal.* (1847-49) n. 8559 et *Pl. Asiat. Rar.* III t. 209. **G. LAMBERTI** Sweet, *Geraniac.* IV (1826) t. 338. — Himalaya temp. 2

**G. Ibericum** Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 209 t. 124 fig. 1 ; 87 ; *Bot. Mag.* t. 1386 ; Sweet, *Geraniac.* I t. 84. — Arménie, Caucase. 2

— — var. **platypetalum** Boissier *Fl. Or.* I (1867) 876. **G. PLATYPETALUM** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* I (1835) 68. — Caucase.

**G. maculatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 681 ; Barton, *Mater. Med. of Unit. Stat.* t. 13 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 287. — Du Canada à la Floride et au Mississipi. 2

**G. malvæflorum** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. novar.* (1852) 27. **G. TUBEROSUM** Boissier (non Linné), *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 119 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 526. — Espagne mér., Afrique bor. 2

**G. nodosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 681 ; *Engl. Bot.* XVI t. 1091 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 195. — Europe centr. et mér. 2

**G. pseudo-Sibiricum** J. Meyer in *Abhandl. Böhm. Gesell.* (1786) 238. **G. LÆTUM** Ledebour, *Fl. Alt.* III (1831) 228 et *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 148. — Orenbourg, Sibérie, Daourie. 2

**G. Robertianum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 681 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 187 ; *Engl. Bot.* t. 1456 ; Boissier, *Fl. Or.* I 883. — Europe, Caucase, Asie Min., Sibérie, Inde. 2

— — subsp. **purpureum** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 138. **G. PURPUREUM** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 174. **G. MINUTIFLORUM** Jordan. — France or. et mér.

**G. sanguineum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 683 ; *Engl. Bot.* IV t. 272 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 198 ; Boissier, *Fl. Or.* I 874. — Europe, Asie Min., Caucase, Sibérie. 2

— — var. **prostratum** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 639. **G. PROSTRATUM** Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 196 t. 76 fig. 3. — Europe (mais manque dans la partie bor. et occ.).

**Geranium subcaulescens** L'Héritier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 640. G. ASPHODELOIDES Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 661 ; Boissier, *Fl. Or.* I 872. — Dalmatie, Albanie, Serbie, Macédoine, Grèce, Asie Min. ☞

**G. tuberosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 681 ; Sweet, *Geraniac.* II t. 155 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII t. 659 ; Boissier, *Fl. Or.* I 872. — Europe méd., Afrique bor., Asie Min., Perse, Sibérie. ☞

3. **ERODIUM** L'Héritier, *Geraniologia* (1787) t. 1-6 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 984. — Environ 160 esp. originaires de l'ancien monde ; 2 ou 3 esp. ubiquistes.

**E. absinthoides** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 627 ; Jaubert et Spach, *Ill. Pl. Or.* t. 202 et 204. E. SIBTHORPIANUM Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, I (1842) 60. E. PETRÆUM Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII (1830) t. 651. E. OLYMPICUM Boissier, *Fl. Or.* I (1867) 886. — Macédoine, Asie Min., Caucase. ☞

**E. Ægyptiacum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 2, I (1853) 111 et *Fl. Or.* I 894. — Palestine, Égypte infér. ☉

**E. carvifolium** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Hisp.* in *Biblioth. Univ. Genève*, nouv. sér. XXXVIII (1842) 201 n. 9 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 534. — Espagne centr. ☞

**E. chrysanthum** L'Héritier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 645 ; *Gartenflora* I t. 27 ; Boissier, *Fl. Or.* I 887. E. ABSINTHOIDES Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII t. 652. — Grèce. ☞

**E. Ciconium** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 629 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* I t. 18. GERANIUM — Linné, *Amœn. Acad.* IV (1859) 282 et *Sp. Pl.* ed. II (1763) 952. — Europe mér., Caucase, Syrie, Pendjab. ☉

**E. daucoides** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1838) 28 n. 44 et *Voy. Bot. Esp.* t. 37<sup>b</sup> ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 534. — Castille, Murcie, Grenade. ☞

**E. hymenodes** L'Héritier, *Geraniol.* (1787) t. 4 ; Sweet, *Geraniac.* I t. 23 ; *Bot. Mag.* t. 1174. — Monts Atlas. ☞

**E. Manescavi Bubani** ex COSSON in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, V (1847) 205 t. 11 ; Regel in *Gartenflora* IV t. 124. — Pyrénées franç. ☞

**E. pelargoniflorum** Boissier et Heldreich in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, VIII (1849) 119 ; *Gartenflora* (1852) t. 19 ; *Bot. Mag.* t. 5206 ; Boissier, *Fl. Or.* I 885. — Cilicie. ☞

**E. Reichardi** De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* I (1824) 649 ; L'Héritier, *Geraniol.* t. 6. GERANIUM CHAMÉDRYŒDES Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 573. GERANIUM — Murray, *Comm. Soc. Reg. Sc. Gotting.* (1780) 11 t. 3. — Îles Baléares, Corse. ☞

**E. trichomanæfolium** L'Héritier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 645 ; Boissier, *Fl. Or.* I 887. — Syrie. ☞

4. **PELARGONIUM** L'Héritier, *Geraniologia* (1787) t. 7 à 35, 43, 44; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 985. — Genre de 200 esp. environ habitant l'Australie et particulièrement l'Afrique austr.
- P. ardens** Sweet, *Geraniaceæ* I (1820) t. 45; *Bot. Cab.* t. 139. — Hybr. des *P. LOBATUM* et *FULGIDUM*. ♀
- P. bicolor** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 425; *Bot. Mag.* t. 204. GERANIUM — Jacquin, *Hort. Vindob.* III t. 39; Sweet, *Geraniac.* I t. 97. — Afrique austr. ? ♀ Peut-être un hybride artificiel (Harvey, *Fl. Cap.* I 275).
- P. crithmifolium** Smith, *Icon. Pict. Pl. Rar.* (1793) 13 t. 13. *P. PANICULATUM* Jacquin, *Hort. Schœnb.* II (1797) t. 137; Harvey, *Fl. Cap.* I 278. — Afrique austr. ♀
- P. cuspidatum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* suppl. (1813) 48. — Hybride des *P. GRANDIFLORUM* et *GLAUCUM*. ♀
- P. daucifolium** Steudel, *Nomencl. Botan.* II (1841) 285. GERANIUM — Linné, *Syst. Veget.* ed. XIV (1784) 615; Thunberg, *Fl. Cap.* (1823) 530. — Afrique austr. ♀
- P. divaricatum** Harvey, *Fl. Cap.* I (1860) 297. GERANIUM — Thunberg, *Fl. Cap.* (1823) 525. — Afrique austr. ♀
- P. echinatum** Curtis in *Bot. Mag.* (1795) t. 309; Kerner, *Hort. Semperv.* t. 742; Sweet, *Geraniac.* I t. 54; Harvey, *Fl. Cap.* I 299. — Afrique austr.
- P. Endlicherianum** Fenzl, *Pugill. Pl. nov. Syr.* I (1842) 6 n. 16; *Bot. Mag.* t. 4946; Russegger, *Abbild. seltn. Pfl. aus Syr.* t. 3; Boissier, *Fl. Or.* I 898. — Asie Min., Syrie. ♀
- P. exstipulatum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 431; L'Héritier, *Geraniol.* t. 35. GERANIUM — Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 253 t. 123 fig. 1. *P. FRAGRANS* Willdenow, *Hort. Berol.* (1816) t. 77; Sweet, *Geraniac.* II t. 172. — Afrique austr.
- P. flavum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 418; Sweet, *Geraniac.* III t. 254 GERANIUM — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 257; Harvey, *Fl. Cap.* I 273. — Afrique austr.
- P. gibbosum** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 684; Sweet, *Geraniac.* I t. 61; Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 265 t. 103 fig. 1. — Afrique austr.
- P. glutinosum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 426; L'Héritier, *Geraniol.* t. 20; *Bot. Mag.* t. 143. GERANIUM VISCOSUM Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) t. 108 fig. 2. — Afrique austr. ♀
- P. graveolens** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 423; L'Héritier, *Geraniol.* t. 17. GERANIUM TEREBENTHINACEUM Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 250 t. 114 fig. 1. — Afrique austr. ♀
- P. inquinans** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 424; Spach, *Hist. des Végét.* t. 22. GERANIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 676. — Sainte-Hélène, Afrique austr. ♀



- Pelargonium jatrophaefolium** De Candolle, *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 48 et *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 679; Harvey, *Fl. Cap.* I 308. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- P. laciniatum** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 228. GERANIUM — Andrews, *Bot. Reposit.* II (1801) t. 131. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- P. Lechianum** Spin, *Catal. du Jard. de Saint-Sébastien.* (1818) 32; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I 678. — Hybride des P. CAPITATUM et QUERCIFOLIUM.  $\frac{1}{2}$
- P. malvæfolium** Jacquin J. F., *Eclog. Plant.* I (1811-16) 145 t. 97; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I 654. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$
- P. monstrum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 425; Sweet, *Geran.* I t. 13. — Afrique austr.
- P. nobile** Hort. ex DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 668. — ? Afrique austr.  $\frac{1}{2}$  N'est sans doute qu'un hybride artificiel.
- P. odoratissimum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 419; Sweet, *Geraniac.* III t. 299. GERANIUM — Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* (1787) 241 t. 103 fig. 1 — Afrique austr.-or.  $\frac{1}{2}$
- P. peltatum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 427; Kerner, *Hort. Semperv.* t. 705; *Bot. Mag.* t. 20. GERANIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 678. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- P. piperatum** Spin, *Catal. du Jard. de Saint-Sébastien.* (1818) 32. P. VERBENÆFOLIUM Sweet, *Geraniac.* II (1823) t. 449. — Afrique austr.
- P. pumilum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 704; *Münchn. Denkschr.* V t. 5. — Afrique austr.
- P. quercifolium** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 420; L'Héritier, *Geraniol.* t. 14, 15; Kerner, *Hort. Semperv.* t. 775. GERANIUM — Linné f., *Suppl. Plant.* (1781) 306. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- P. roseum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 161; Sweet, *Geraniac.* III t. 262. GERANIUM — Andrews, *Bot. Reposit.* III (1801) t. 173. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- P. sanguineum** Wendland, *Coll. Pl. exot. et indig.* II (1810) t. 53; Jacquin, *Eclog. Pl.* I t. 57; Sweet, *Geraniac.* I t. 76. — Hybride des P. FULGIDUM et MULTIRADIATUM?
- P. scandens** Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* VII (1792) 161; Willdenow, *Sp. Pl.* II 666; Harvey, *Fl. Capens.* I 298. — N'est vraisemblablement qu'une variété remarquable du P. ZONALE.
- P. speciosum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 706; Kerner, *Hort. Semperv.* t. 738. — Hybride des P. CUCULLATUM et CARDUIFOLIUM.  $\frac{1}{2}$
- P. spectabile** Sweet, *Geraniac.* II (1822) t. 136. — Hybride des P. CUCULLATUM et IGNESCENS.
- P. Spinii** Colla, *Hort. Ripulensis* I (1824) t. 7; Sweet, *Geraniac.* IV t. 362. Hybride?
- P. ternatum** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III (1786-93) 10 t. 544; *Bot. Mag.* t. 413. GERANIUM — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 306. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

**Pelargonium tetragonum** L'Héritier, *Geraniol.* (1788) t. 23; *Bot. Mag.* t. 136; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 132; Harvey, *Fl. Cap.* I 286. — Afrique austr. ♪

**P. tomentosum** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III (1786-1793) t. 537; Sweet, *Geraniac.* II t. 168; *Bot. Mag.* t. 518. — Cap de Bonne-Espérance. ♥

**P. tricolor** Curtis in *Bot. Mag.* (1793) t. 240; Sweet, *Geraniac.* I t. 43; Harvey, *Fl. Capens.* I 293. — Afrique austr.

**P. triste** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 418; *Bot. Mag.* t. 1641; Delaunay, *Herb. de l'Amateur* I t. 27. GERANIUM — Linné, *Syst. Veget.* ed. XIV (1784) 615. P. TUBEROSUM Hort. — Afrique austr. ♪

**P. vitifolium** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 425; L'Héritier, *Geraniol.* t. 19. GERANIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 678; Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* 245 (1787) t. 111 fig. 2 — Afrique austr. ♪

**P. zonale** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 667; *Illustr. Hort.* (1862) t. 346; *Belg. Hort.* (1862) t. 17; *Fl. des Serres* XIV t. 1444; XV t. 1543. GERANIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 678. — Afrique austr. ♪

5. **TROPÆOLUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 323; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 986. — Genre de 40 esp. du Mexique et de l'Amérique centr. et austr.

**T. azureum** Miers, *Travels in Chile, App.* ex Hooker in *Bot. Mag.* (1842) t. 3985; *Fl. des Serres* II (1846) t. VIII; *Bot. Reg.* XXVIII t. 65. — Chili. ☉  
— — var. **grandiflorum** L. VAN HOUTTE in *Fl. des Serres* XI (1856) t. 1160; *Illustr. Hort.* III (1856) 85. — Pérou.

**T. brachyceras** Hooker et Arnott, *Bot. Capt. Beechey's Voy.* (1841) 14; *Bot. Mag.* t. 3851; *Bot. Reg.* XXIII t. 1926. — Chili. ♥

**T. edule** Ruiz et Pavon (ubi?) ex Maund, *The Botanist* V t. 248; Paxton, *Magaz. of Bot.* IX t. 127. — Chili.

**T. polyphyllum** Cavanilles, *Icon. Pl. Rar.* (1797) 65 t. 395; *Bot. Mag.* t. 4042; Paxton, *Mag. of Bot.* X t. 175. — Cordillères du Chili. ☉

**T. tricolorum** Sweet, *Brit. Fl. Gard.* sér. 1, I (1828) t. 270; *Bot. Mag.* t. 3169; *Gartenflora* (1864) t. 328. — Chili. ♥

**T. tuberosum** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) t. 314; *Bot. Mag.* t. 3714; Hooker, *Icon. Pl.* VII t. 653; *Fl. des Serres* V t. 452. — Chili?, Pérou.

6. **OXALIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 377; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 996. — Genre de plus de 200 esp. représenté dans le monde entier.

**O. arbuscula** Barnéoud ex C. GAY, *Hist. Física y Polit. de Chile, Bot.* I (1846) 443 t. 14. — Chili. ♥

- Oxalis Bowieana** Loddiges in *Bot. Cab.* XVIII (1831) t. 1782 ; *Bot. Reg.* XIX t. 1585 ; Maund, *The Botan.* I t. 25. — Cap de Bonne-Espérance. ♀
- O. enneaphylla** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* V (1799) 7 t. 411 ; Hooker, *Icon. Plant.* V t. 494. — Iles Falkland. ♀
- O. Martiana** Zuccarini, *Monog. Amer. Oxalisarten* (1825) 20 n. 6 ; *Bot. Cab.* t. 1523 ; *Bot. Mag.* t. 3938 ; Progel in Martius, *Fl. Brasil.* XII pars 2, 486 ; Link et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* X (1828) 19 t. 10 sub O. FLORIBUNDA Lehmann. — Brésil. ♀
- O. Oregana** Nuttall in TORREY et GRAY, *Fl. N.-Amer.* I (1838) 211. O. ACETOSELLA Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 118 pr. p. — Californie, Oregón, territ. de Washington. ♀
- O. Ortgiesi** Regel in *Gartenflora* XXIV (1875) 1 t. 817. — Pérou. ♀
- O. violacea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 434 ; *Bot. Mag.* t. 2215 ; Jacquin, *Oxalis Monog.* t. 80 fig. 2 ; *Hort. Vindob.* II t. 180 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 211. — De Canada à la Georgie et au Texas. ♀
7. IMPATIENS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 680 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1002. — Plus de 225 esp. de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique bor.
- I. Hookeriana** Arnott in HOOKER, *Comp. Bot. Mag.* I (1833) 324 ; *Bot. Mag.* t. 4704 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* I 463. — Ceylan. ♂
- I. latifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 937. I. CUSPIDATA Wight et Arnott in Hooker, *Compan. Bot. Mag.* I (1835) 321 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. or.* III t. 741 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* I 450. — Himalaya, Ceylan, Java. ☉ ?
- I. Munronii** Wight, *Illustr. of Ind. Bot.* I (1841) 160 et *Icon. Pl. Ind. or.* III t. 1049 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* I 456. — Nilgherries occ. ♀
- I. platypetala** Lindley in *Pot. Reg.* XXXII (1846) t. 68 ; *Fl. des Serres* III (1847) t. 215. — Java. ♀
- I. Sultani** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1882) t. 6643 ; *Gartenflora* XXXII (1883) 247 cum icone. — Zanzibar. ☉

## XXVI. RUTACÉES

1. DICTAMNUS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 346 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1023. — Genre monotype.
- D. albus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 383 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* XII t. 823 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 428. D. FRAXINELLA Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 464. — Europe centr., spont. ? , Sibérie, Daourie, Himalaya. ♀

2. **CORREA** Smith in Trans. Linn. Soc. IV (1798) 249 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1050. — 5 esp. de l'Australie extratrop.

**C. speciosa** Aiton, *Epit. Hort. Kew.* (1814) 366, var. **normalis** BENTHAM, *Fl. Austral.* I (1863) 355. **C. CARDINALIS** F. Mueller mss. ex Hooker in *Bot. Mag.* (1856) t. 4912 ; *Belg. Hort.* VII t. 8 ; *Fl. des Serres* XI t. 1144. — Nouv.-Galles du Sud, Tasmanie, Victoria.  $\mathfrak{h}$

3. **CHOISYA** Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. Pl. VI (1823) 4 t. 513 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1064. — Genre monotype.

**C. ternata** Kunth, *loc. cit.* (1823) 4 t. 513. — Mexique.  $\mathfrak{h}$

4. **SKIMMIA** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 4 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1088. — 4 esp. de l'Himalaya et du Japon.

**S. japonica** Thunberg, *loc. cit.* ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* t. 68 ; *Bot. Mag.* t. 4719. **ILEX SKIMMIA** Sprengel, *Syst. Veget.* I (1825) 495. — Japon.  $\mathfrak{h}$

5. **CITRUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 605 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1102. — Plus de 30 esp. décrites, mais pouvant se réduire à 5, originaires de l'Australie, de l'Inde orient. et du Japon.

**C. Japonica** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 292 et *Icon. Fl. Jap.* t. 15 ; *Gartenflora* (1882) t. 1097 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 74. — Japon.  $\mathfrak{h}$

## XXVII. OCHNACÉES

1. **OCHNA** Schreber, Gen. Pl. (1789) 354 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1139. — Genre de 30 esp. de l'Asie trop. et de l'Afrique trop. et austr.

**O. multiflora** De Candolle, *Monog. des Ochnac. et Simaroub.* (1810) 15 t. 13 et *Prodr. Regn. Veget.* I 735 ; *Annal. Mus. Paris* XVII t. 13. — Sierra-Leone.  $\mathfrak{h}$

## XXVIII. MÉLIACÉES

1. MELIA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 357 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1171. — Une douzaine d'esp. originaires de l'Afrique trop., de l'Asie occ. et mér., l'Austral. et des îles du Pacifique.

**M. Azedarach** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 384 ; *Bot. Mag.* t. 1066 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* I t. 160 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* I 544 ; Boissier, *Fl. Or.* I 954. — Chine, Inde, Perse ; Syrie ? ; ailleurs naturalisé. ‡

2. CEDRELA Linné, Gen. Pl. ed. VI (1764) n. 277 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1198. — Plus de 20 esp. originaires de l'Asie, de l'Amérique trop. et de l'Australie.

**C. Sinensis** A. Jussieu in *Mém. Mus. Paris* XIX (1830) 294 ; C. De Candolle, *Monog. Phanerog.* I 743. — Japon ? , Chine. ‡

## XXIX. ILICINÉES

1. ILEX Linné, Gen. Pl. (1737) n. 91 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1265. — Genre de 175 esp., plus ou moins répandu dans le monde entier.

**I. Aquifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 125 ; *Engl. Bot.* VII t. 496 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 39. — Toute l'Europe, sauf la Russie, la Finlande, la Transylvanie et la Turquie insul. ‡

**I. Fortunei** Lindley in *Gard. Chron.* (1857) 868. — Chine (Chekiang). ‡

## XXX. RHAMNÉES

1. CEANOTHUS Linné, Gen. Pl. ed. VI (1764) n. 267 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1332. — 40 esp. de l'Amérique trop.

**C. Americanus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 195 ; *Bot. Mag.* t. 1479 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 264. — Du Canada à la Floride et à la Louisiane. ‡

2. **PHYLICA** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 266 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 1337*. — Genre de 65 esp. de l'Afrique extratrop. austr., des îles Tristan d'Acunha et de Madagascar.

**P. ericoides** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 193 ; *Bot. Mag. t. 224* ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl. t. 127*. — Cap de Bonne-Espérance.  $\mathfrak{h}$

### XXXI. AMPÉLIDÉES

1. **CISSUS** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 147 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 1367*. — Genre de 220 esp. des rég. trop. et sub-trop. des deux hémisphères.

**C. discolor** Blume, *Bijdrag. Fl. Ned. Indie I* (1825) 181 ; *Bot. Mag. t. 4763* ; *Fl. des Serres VIII t. 804-805*. — Java, Cochinchine, Inde.  $\mathfrak{z}$

### XXXII. SAPINDACÉES

1. **KOELREUTERIA** Laxmann in *Nov. Comm. Petrop. XVI* (1772) 561 t. 18 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 1463*. — 2 esp. de la Chine et du Japon.

**K. paniculata** Laxmann, *loc. cit.* (1772) 561 ; *Bot. Reg. t. 330* ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust. éd. 2, I t. 36*. — Japon, Chine (Chihli, Kansou).  $\mathfrak{h}$

2. **XANTHOCERAS** Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor. (1835) 11* ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 1483*. — Genre monotype.

**X. sorbifolia** Bunge, *loc. cit.* n° 63 ; *Fl. des Serres XVIII t. 1899* ; *Gartenflora XXXVI* (1887) 611 cum icone ; *Garden. Chron. (1876) I 567* cum icone. — Chine (Chihli).  $\mathfrak{h}$

## XXXIII. HIPPOCASTANÉES

1. **ÆSCULUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 462 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1491. — Environ 15 esp. de la partie chaude de l'Amérique du Nord, de la Perse, de l'Inde or. et de la Chine.

**Æ. Chinensis** Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* (1835) 10 n° 63 ; Walpers, *Repert. Bot.* I 423. — Chine (Chihli, Shensi).  $\mathfrak{h}$

**Æ. Pavia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 344 ; Schkuhr, *Botan. Handb.*, t. 104 ; *Bot. Cab.* t. 1257. **PAVIA MACROCARPA** Hort. — Virginie, Georgie, Louisiane, Arkansas.  $\mathfrak{h}$

## XXXIV. ACÉRACÉES

1. **ACER** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 317 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1493. — Genre de 85 esp. de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie bor., ainsi que de l'Himalaya et de Java.

**A. coriaceum** Tausch in *Flora* XII (1829) 550 ; Walpers, *Repert. Bot.* I 409 ; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 197. **A. CRETICUM** Trattinick, *Arch. d. Gewächsk.* I (1812) t. 45 ; Schmidt, *Österr. Baumz.* t. 15. — Patrie inconnue.  $\mathfrak{h}$

**A. dasycarpum** Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* IV (1789) 94 ; Loudon *Arbor. Brit.* I t. 37 et 38. **A. ERIOCARPUM** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 253 ; *Arbr. forest. Amér.* II t. 13. **A. SAIRA** Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* I (1869) 541. **A. SACCHARINUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1035. — Amérique bor.-atlant.  $\mathfrak{h}$

**A. Ginnala** Maximowicz, apud Ruprecht, *Mél. biol.* II (17-19 nov. 1856) 415 ; II (16-28 janv. 1857) 513 ; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 185 ; Ruprecht, *Decas Pl. Amur.* (1859) t. 3 ; *Gartenflora* (1877) 308 cum ic. — Asie centr. et or. (du Turkestan au Japon).  $\mathfrak{h}$

**A. hyrcanum** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* IV (1837) 31 ; Boissier, *Fl. Or.* 1950 ; C. Koch, *Dendrol.* I 537. — Perse bor., Turkestan.  $\mathfrak{h}$

**A. insigne** Boissier et Buhse, *Aufz. Reise Transkauk. und Pers.* (1860) 46 ; *Gartenflora* (1881) 120 cum ic. ; *Bot. Mag.* t. 6697. — Caucase, Perse.

— — var. **velutinum** Boissier et Buhse, *loc. cit.* **A. VELUTINUM** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér 1, VI (1845) 28 et *Fl. Or.* I 948.

- Acer macrophyllum** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 267; Sargent, *Sylva N.-Amer* II 86 t. 89; Loudon, *Arbor. Brit.* I t. 28. — Californie, Océan.
- A. Negundo** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1036; Michaux, *Arbr. forest. Amér.* II t. 18; Loudon, *Arboret. Brit.* I t. 46 et 47; Sargent, *Sylva N.-Amer.* II 111 t. 96. — Amérique bor.-atlant. (du Canada à la Floride).
- A. oblongum** Wallich in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 593; Cambessedes in Jacquemont, *Voyage dans l'Inde* IV 31 t. 34; Pax in Engler *Bot. Jahrb.* VII 208. — Himalaya temp., Hong-Kong, îles Loo-Choo.
- A. obtusatum** Waldstein et Kitaibel in WILLDENOW, *Sp. Pl.* IV (1805) 284; Trattinick, *Archiv. d. Gewächsk.* I 14; Tenore, *Atti R. Instit. di Napoli* VII 321 cum ic. — Péninsule balkaniqu., Italie, Croatie, Istrie, Algérie.
- — var. **malvaceum** PAX in Engler, *Bot. Jahrb.* VII (1886) 224. A. RAFINESQUIANUM Hort. ex Pax, *loc. cit.* « Spontan. vix occurit. » (Pax).
- A. palmatum** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 162; Trattinick, *Archiv. d. Gewächsk.* I t. 16; *Fl. des Serres* XII t. 1273; *Illustr. Hort.* XXVIII t. 130; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII, 201. — Japon.
- — f. **bicolor** PAX in Engler, *Bot. Jahrb.* VII (1886) 202. A. BICOLOR Hort. ex Pax, *loc. cit.* 202.
- — f. **reticulatum** ED. ANDRÉ in *Illustr. Hort.* XIV t. 18. A. RETICULATUM Hort. ex Pax, *loc. cit.* 202.
- — var. **dissectum** C. KOCH, *Dendrol.* I (1869) 525. A. DISSECTUM Thunberg, *loc. cit.* (1784) 160; Trattinick, *loc. cit.* t. 18. A. DECOMPOSITUM Hort. ex Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII (1880) 202.
- — var. **polymorphum** PAX in Engler, *Bot. Jahrb.* VII (1886) 202. A. POLYMORPHUM Siebold et Zuccarini in *Abhandl. d. K. Bayr. Akad. d. Wiss.* IV 2 (1845) 158; *Illustr. Hort.* XIV t. 526.
- — var. **septemlobum** C. KOCH, *loc. cit.* 525. A. SEPTEMLOBUM Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 160.
- — var. **linearilobum** MIQUEL in *Archiv. Neerl.* II (1867) 468.
- A. Pennsylvanicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1035; Gray et Sprage, *Gen. Fl. Amer. Bor. Ill.* t. 174; Sargent, *Sylva N.-Amer.* II 85 t. 84; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 245. — Du Canada à la Georgie.
- A. pictum** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 161 et *Icon. Fl. Jap.* t. 43; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 235. — Mandchourie, Japon.
- A. platanoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1055; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, I t. 10; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 164; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 239. — Europe, Caucase, Arménie, monts Ourals.
- A. rubrum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1055; Trattinick, *Archiv. d. Gewächsk.* I t. 9; Michaux, *Arbr. forest. Amér.* II 210 t. 14; Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 181; Sargent, *Sylva N.-Amer.* II 107 t. 94. — Du Canada à la Floride.



**Acer tataricum** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1054 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 3 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 162 ; PAX in Engler, *Bot. Jahrb.* VII, 184. — Europe centr. et or., Russie méd. et mér., Arménie.

**A. villosum** Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II (1831) 4 et 26 t. CXXXII ; Hiern in Hooker, *Fl. of Brit. Ind.* I 695 ; PAX in Engler, *Bot. Jahrb.* VII 250. — Himalaya occ.

### XXXV. ANACARDIACÉES

1. **RHUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 241 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1551. — Environ 120 esp. des rég. chaudes et subtrop. du monde entier.

**R. semialata** Murray in *Comment. Soc. Reg. Sc. Götting.* (1785) 27 t. 3 ; ENGLER in De Candolle, *Monog. phaner.* IV (1883) 380. — Inde or., Chine, îles Hawaï.

— — var. **Osbeckii** DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 67 ; Engler, *loc. cit.* — Japon.

### XXXVI. LÉGUMINOSÉES

#### Sous-ordre I. Papilionacées.

1. **BAPTISIA** Ventenat, *Decad. Gen.* Nov. (1808) 9 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1582. — Genre de 14 esp. de l'Amérique bor.

**B. Lecontei** Torrey et Gray, *Fl. of North Amer.* I (1840) 386 ; Walpers, *Repert. Bot. Syst.* I 563. — Georgie, Floride.

2. **CHORIZEMA** La Billardièrre, *Relat. Voy. Rech. La Pérouse I* (1798) 405 t. 21 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1589. — Genre de 15 esp. d'Australie.

**C. cordatum** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1838) t. 10 ; Knowles et Westcott, *Flor. Cab.* t. 50 ; Bentham, *Fl. Austral.* II, 28. — Australie occ. †

**C. Henchmanni** R. Brown in *Bot. Reg.* (1826) t. 986 ; *Bot. Mag.* t. 3607 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 31. — Australie occ. †

3. ARGYROLOBIUM Ecklon et Zeyher, Enum. Pl. Afrique austr. II (1838) 184 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1636. — Une cinquantaine d'esp. des parties chaudes de l'ancien monde.
- A. **Linnaeanum** Walpers in *Linnaea* XIII (1839) 508. CYTISUS ARGENTEUS Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1043 ; Brotero, *Phytogr. Lusit.* t. 69 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIV t. 59. — Portugal, Espagne, France mér., Italie, Corse, Dalmatie, Croatie.  $\mathfrak{h}$
4. ADENOCARPUS De Candolle in Lamarck et De Candolle, *Fl. Fr.* V (1815) 549 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1637. — Une dizaine d'esp. habitant l'Europe mér.-occ., la Rég. Médit. et la partie occ. de l'Afrique bor. et trop.
- A. **decorticans** Boissier in *Bibl. Univ. Genève*, nouv. sér. XIII (1838) 407 ; *Voy. Bot. Esp.* 145, t. 41. A. BOISSIERI Webb, *Otia Hisp.* t. 4 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 462. — Espagne.  $\mathfrak{h}$
5. LABURNUM Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 7 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1638. — 3 esp. de l'Europe mér. et de l'Asie min.
- L. **ramentaceum** C. Koch, *Dendrol.* I (1869) 20. CYTISUS — Sieber in *Flora* V (1822) 242. — Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie.  $\mathfrak{h}$
6. GENISTA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 580 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1641. — Environ 70 esp. de l'Europe, de l'Afrique bor. et de l'Asie occ.
- G. **Canariensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 709 ; *Bot. Reg.* t. 247. CYTISUS — Linné (ubi ?) ex STEUDEL, *Nomencl. Bot.* ed. 2, I (1840) 477. — Iles Canaries.  $\mathfrak{h}$
- G. **Carpetana** Lange in *Vidensk. Meddels. Natur. Foren.* (1877) 237. — Castille.
- G. **horrida** De Candolle in Lamarck et De Candolle, *Fl. Fr.* V (1815) 500 ; Gilibert, *Bot. prat.* II 239 cum icon. SPARTIUM — Vahl, *Symb. Bot.* I (1790) 61. — Espagne bor.-occ., Pyrénées or., France or.  $\mathfrak{h}$
- G. **linifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. III (1764) 997. CYTISUS — Lamarck, *Encycl. Méthod. Bot.* II (1786) 249. SPARTIUM — Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) t. 181. — Europe austr.-occ., Afrique bor., îles Canaries.  $\mathfrak{h}$

**Genista lucida Cambessedes** in *Mém. Mus. Paris* XIV (1827) 231 t. 44 ; Marès et Vigineix, *Cat. Pl. Balear.* — Iles Baléares.

**G. lusitanica Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 711 ; Andrews, *Bot. Reposit.* VI t. 449 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 422. — Portugal, Espagne.  $\mathfrak{h}$

**G. monosperma Lamarck**, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 616 ; *Bot. Reg.* XXII t. 1298. RETAMA — Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 143 ; Webb, *Otia Hisp.* t. 17. SPARTIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 995. — Portugal et Espagne mér.  $\mathfrak{h}$

**G. prostrata Lamarck**, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 618. Genet de Haller Reynier in *Mém. Hist. phys. et nat. Suisse* I (1788) 211 t. 2 ; Gaudin, *Fl. Helv.* IV 45 t. 5. — France mér.-or., Suisse mér., Italie centr.  $\mathfrak{h}$

**G. sericea Wulfen** in Jacquin, *Collect. ad Bot. Spect.* II (1788) 167 ; Jacquuin, *Icon. Pl. Rar.* t. 556 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XII t. 49 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3 (1837) 131. — Europe centr. (partie mér. et or.).  $\mathfrak{h}$

7. ERINACEA Boissier, *Voy. Bot. Espag.* (1839-45) 145 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1643. — Genre monotype.

**E. pungens Boissier**, *loc. cit.* ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 420. ANTHYLLIS ERINACEA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1014 ; *Bot. Mag.* t. 676. — Pyrénées franç. or., Espagne, Corse.  $\mathfrak{h}$

8. CYTISUS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 582 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1643. — Genre de 40 esp. de l'Europe, de l'Asie occ., de l'Afrique bor. et des îles Canaries.

**C. Adami Poiteau**, in *Ann. Soc. Hort. Paris* VII (1830) 95 ; Morren in *Belg. Hort.* (1871) 221 t. XVI-XVIII. C. LABURNO — PURPUREUS Maund, *The Botan.* I (1839) t. 7. C. LABURNUM COCCINEUM Lindley in *Bot. Reg.* XXIII t. 1695. Hybrides C. LABURNUM et PURPUREUS. —  $\mathfrak{h}$

**C. alpinus Miller**, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 2 ; Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* t. 260 ; Schkuhr, *Botan. Handb.* t. 203. — Jura, Dauphiné, Suisse, Italie bor., Autriche, Transylvanie, Hongrie?  $\mathfrak{h}$

**C. Ardoini Fournier** in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XIII (1866) 389. — Italie, (Ligurie).  $\mathfrak{h}$

**C. glabrescens Sartorelli**, *Degli Alberi Indig. Ital. Sup.* (1816) 282. C. EMERIFLORUS Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 524. — Suisse mér., Lombardie.  $\mathfrak{h}$

**C. patens Linné**, *Syst. Veget.* XIII (1786) t. 555 ; De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* II 454 ; Brotero, *Fl. Lusit.* II 83. — Portugal.  $\mathfrak{h}$

**C. purpureus Scopoli**, *Fl. Carniol.* ed. II (1772) n. 905 t. 43 ; *Bot. Mag.* t. 1176 ; *Bot. Cab.* t. 892 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II 155. — Styrie, Carinthie, Carniole, Croatie, Tyrol, Lombardie.  $\mathfrak{h}$

9. **LODDIGESIA** Sims in Bot. Mag. (1806) t. 965 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1647. — Genre monotype.

**L. oxalidifolia** Sims *loc. cit.* ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 82. — Afrique austr.  $\text{h}$

10. **ONONIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 579 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1648. — Genre de 60 esp. de l'Europe, de l'Asie occ. et de l'Afrique bor.

**O. Aragonensis** Asso, *Syn. Stirp. Aragon.* (1779) 96 t. 6 fig. 2. **O. DUMOSA** La Peyrouse, *Hist. abrég. Pyrén.* (1813) 410 ; Magnol, *Hort. Monspel.* t. 21 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I, 368. — Espagne, Pyrénées centr. franç.  $\text{z}$

**O. rotundifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 719 ; *Bot. Mag.* t. 335 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 49. — Espagne, Pyrénées, Dauphiné, Cévennes, Jura, Suisse mér., Italie bor.  $\text{z}$

11. **MEDICAGO** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 594 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1651. — Genre de 40 esp. environ de l'ancien monde.

**M. suffruticosa** Ramond in DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* IV (1805) 341 et *Icon. Pl. Gall.* t. 28 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 386. — Pyrénées centr.-or., Hérault.  $\text{z}$

12. **TRIFOLIUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 603 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1653. — Environ 200 esp. de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

**T. alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 767 ; Sturm, *Deutsch. Fl.* IV t. 15 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 418. — Espagne, France, Italie, Suisse, Autriche.  $\text{z}$

**T. Boissieri** Gussone, *Flor. Sicul. Prodr.* add. II (1845) 858. **T. SPECIOSUM** Boissier (non Willdenow), *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, IX (1849) 33. — Macédoine, Archipel Grec, Rhodes, Asie Min., Mésopotamie, Palestine.  $\odot$

**T. Lagrangei** Boissier, *Fl. Or.* II (1872) 154. — Syrie, Rhodes.  $\odot$

**T. Thalii** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* I (1786) 478 t. 41. Trèfle gazonnant Reynier in *Mém. Hist. phys. et natur. de la Suisse* I (1788) 162 t. 1. — Pyrénées, Jura, Alpes, Apennins, Transylvanie.  $\text{z}$

13. **ANTHYLLIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 601 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1654. — Environ 20 esp. de l'Europe, de l'Asie occ. et de l'Afrique bor.

**A. Barba Jovis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 720 ; Sibthorp et Smith *Fl. Græca* t. 682 ; *Bot. Mag.* t. 1927. — France mér.-or., Italie occ. et austr., Corse, Afrique bor., Crète?, Péloponèse ? ʒ ʃ

**A. montana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 719 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* IV t. 334 ; *Bot. Cab.* t. 378. — Europe mér., centr. et or. ʒ

14. **AMORPHA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 604 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1666. — 8 esp. de l'Amérique bor.

**A. fruticosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 713 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 621 ; *Bot. Reg.* V t. 427. — États-Unis. ʃ

— — var. **Caroliniana** S. WATSON, *Ind. Bibliog.* (1878) 188. **A. GLABRA** Desfontaines, *Tableau École Bot. Mus. Paris* (1804) 192.

15. **INDIGOFERA** Linné, Gen. Pl. ed. VI (1764) n. 889 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1672. — Environ 270 esp. des rég. chaudes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie.

**I. Dosua** Hamilton ex DON, *Pr. Fl. Nepal.* (1825) 244 ; *Bot. Reg.* XXVIII t. 37 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 102. — Himalaya. ʃ

16. **WISTARIA** Nuttall, Gen. Pl. Amer. II (1818) 115 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1689. — 2 ou 3 esp. de l'Amer. bor., de la Chine et du Japon.

**W. Sinensis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 390 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* t. 44 ; *Bot. Reg.* VIII t. 650. — Japon?, Chine. ʃ

17. **HALIMODENDRON** Fischer in De Candolle, 6<sup>e</sup> Mém. Légum. (1825) 283 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1715. — Genre monotype.

**H. argenteum** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 269 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 46. **ROBINIA HALIMODENDRON** Linné f., *Suppl. Plant.* (1781) 330. **CARAGANA HALIMODENDRON** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 616. — Caucase, Perse, Turkestan, Songarie, Sibérie altaïque. ʃ

18. **CARAGANA** Lamareck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 615 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1716. — 15 esp. de l'Asie russe et  
de l'Himalaya.

**C. arborescens** Lamareck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 615 t. 607 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 19. **ROBINIA CARAGANA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 722. — Sibérie.  $\mathfrak{h}$

**C. frutescens** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 268 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 43 ; *Gartenflora* (1861) t. 348. **ROBINIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 723. — Caucase, Russie méd. et mér., Songarie, Sibérie.  $\mathfrak{h}$

**C. Gerardiana** Benthām in ROYLE, *Ill. Bot. Himal. Mount.* I (1839) 198 t. 34. fig. 1. **ASTRAGALUS** — Graham in Wallich, *Catal.* (1831-32) n° 5938. **C. SPINOSISSIMA** Benthām in ROYLE, *loc. cit.* (1839) 198 ; Cambessedes in JACQUEMONT *Voy. dans l'Inde* IV 37 t. 43. — Himalaya occ.  $\mathfrak{h}$

**C. grandiflora** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 268 ; Boissier, *Fl. Or.* II 199. **ROBINIA** — Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1803) 168. — Arménie turq., Transcaucasie, Rég. Caspienne, Songarie.  $\mathfrak{h}$

**C. jubata** Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* (suppl.) II (1811) 90 ; *Gartenflora* (1861) t. 331. **ROBINIA** — Pallas in *Nov. Act. Acad. Petrop.* X (1795) 370 t. 6 et *Spec. Astragal.* 113 t. 85. — Sibérie baïkal.  $\mathfrak{h}$

**C. pygmæa** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I (1824) 268 ; *Bot. Reg.* XII t. 1021 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 45. **ROBINIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 723. — Sibérie, Daourie.  $\mathfrak{h}$

**C. Redowskii** De Candolle, 2<sup>e</sup> *Mém. Lég.* (1825) 94 t. 11 fig. 45. — Sibérie.  $\mathfrak{h}$

19. **ASTRAGALUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 570 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 1720. — Genre de 1000 esp. environ, ayant  
des représentants dans le monde entier.

**A. adsurgens** Pallas, *Spec. Astragal.* (1800) 40 t. 31 ; Ledebour, *Fl. Ross.* I 603. **A. LAXMANI** Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 37. — Sibérie, Daourie.  $\mathfrak{z}$

**A. alpinus** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1070. **PHACA ASTRAGALINA** De Candolle, *Astragal.* (1802) 64 ; *Bot. Cab.* t. 429. — Scandinavie, Russie bor., Écosse, Pyrénées, Alpes, Carpathes.  $\mathfrak{z}$

**A. angustifolius** Lamareck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 329 ; Boissier, *Fl. Or.* II 489. — Dalmatie, Monténégro, Serbie, Grèce, Macédoine.  $\mathfrak{z}$

— — var **genuinus** BOISSIER, *Fl. Or.* II (1873) 489. **A. LEUCOPHYLLUS** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1803) 1331 ; Pallas, *Spec. Astragal.* t. 4. — Grèce, Asie Min., Syrie.

**Astragalus aristatus** L'Héritier, *Stirp. Nov.* (1784) 170 ; *Bot. Cab.* t. 1278 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 733 ; Boissier, *Fl. Or.* II 309. — Suisse, France, Italie, Sicile, Grèce, Turquie. ♀

**A. falcatus** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 310 ; Pallas, *Spec. Astragal.* t. 28 ; De Candolle, *Astragal.* t. 26 ; Boissier, *Fl. Or.* II 423. — Russie mér.-or., Caucase bor., Arménie, Sibérie oural. ♀

**A. leucosemius** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, IX (1849) 96 ; *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1853) t. 100. — Caboul. h

**A. Leontinus** Wulfen in Jacquin, *Miscell. Austr.* II (1781) 59 ; Rœmer, *Fl. Europæa* t. 6 ; *Bot. Cab.* t. 432. — Suisse, Tyrol, Vénétie, Carniole. ♀

**A. Massiliensis** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 320 ; Pallas, *Spec. Astragal.* t. 4 fig. 1 et 2 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 100. **A. TRAGACANTHA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 762. — France mér., Corse, Maroc.

**A. Mulleri** Steudel et Hochstetter in *Ersicc. Un. Itin.* (1826) et in *Flora* (1827) 72. **A. ARGENTEUS** Bertoloni ex Visiani in *Bot. Zeit.* XII 1 (1829) suppl. 18 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 160. — Dalmatie, Montenegro, Croatie. ♀

**A. pannosus** Fenzl in *Shed. ad Kotschy coll. pl. Taur.* 1 n. 127 et in *Diagn. pl. or.* apud TCHIHATCHEFF, *Asie Min. Bot.* III (1860) 2 ; Boissier, *Fl. Or.* II 248. — Cilicie. ♀

**A. penduliflorus** Lamarck, *Fl. Fr.* II (1778) 636. **PHACA ALPINA** Wulfen in Jacquin, *Miscell. Austr.* II (1781) 93 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 151 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 624. — Pyrénées, Alpes, Carpathes, Italie bor., Sibérie. ♀

**A. Tauricolus** Boissier, *Diagn. Pl. Or. Nov.* sér. 2, V (1856) 86 ; Boissier, *Fl. Or.* II 259. — Asie Min. ♀.

**A. Transoxanus** Fischer in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* XXVI (1853) 338 t. 18 ; Boissier, *Fl. Or.* II 326. — Turkestan. h

20. **OXYTROPIS** De Candolle, *Astragal.* (1802) 19 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1722. — Genre de 200 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.

**O. foetida** De Candolle, *Astragal.* (1802) n. 11 t. 8. **ASTRAGALUS** — Villars, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 468 t. 43. **A. HALLERI** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 343 n. 1276. — Dauphiné, Suisse, Italie bor. ♀

**O. Pyrenaica** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I (1848) 469 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 286. — Pyrénées, Asturies, Aragon, Dauphiné?. ♀

21. **CORONILLA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 599 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1730. — Une vingtaine d'esp. de l'Europe, de l'Asie occ. et de l'Afrique bor.

**C. Emerus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I ((1753) 742 ; *Bot. Mag.* t. 445 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 710 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3, 163. — Norvège mér., Gothland, Œland, Europe centr. et mér.  $\mathfrak{h}$ .

22. **HEDYSARUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 595 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1734. — Genre de 60 esp. environ de l'Europe, de l'Asie temp. et mont., de l'Afrique et de l'Amérique bor.

**H. coronarium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 750 ; Gärtner, *De Fruct. et Sem.* II t. 153. — Espagne, Italie, Sicile, Sardaigne.  $\mathfrak{z}$

23. **EBENUS** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 764 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1737. — 8 esp. de la Rég. Médit. et de l'Asie occ.

**E. Cretica** Linné, *Sp. Pl.*, ed. I (1753) 764 ; *Bot. Mag.* t. 1092 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 739 ; Boissier, *Fl. Or.* II 554 — Crète.  $\mathfrak{h}$

24. **LESPEDEZA** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1820) 70 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1774. — Genre de 35 esp. de l'Amérique bor., de l'Asie temp. et trop. mont. et de l'Australie.

**L. bicolor** Turczaninow in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* XIV (1840) 69 ; *Gartenflora* IX t. 299 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 101. — Japon.  $\mathfrak{z}$

25. **CICER** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 594 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1775. — 7 esp. de la Rég. Médit. et de l'Asie occ.

**C. Songaricum** Stephan ex Fischer in DE CANDOLLE, 6<sup>e</sup> *Mém. Légum.* (1825) cum ic. 349 tab. 54<sup>a</sup> et *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 354. — Songarie, Sibérie altaïque.  $\odot$  ?

26. **VICIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 587 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1776. — Genre de plus de 100 esp. répandu dans tout l'hémisphère bor. et l'Amérique austr.

**V. Orobus** De Candolle in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* V (1815) 577 ; Grenier et Godfron, *Fl. de Fr.* I 467. **V. CASSUBICA** (Eder in *Fl. Dan.* (non Linné) I t. 98. — Angleterre, Norvège mér., Danemark, Pyrénées, Hérault, Auvergne, Bavière, Espagne ?  $\mathfrak{z}$



27. **LATHYRUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 590 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1778. — Genre de 120 esp. ayant la même dispersion que le genre *Vicia*.

**L. albus** Linné f. (sub OROBO), *Suppl. Pl.* (1781) 327 ; Sweet, *Fl. Gard.* t. 32 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3, 176. O. PANNONICUS Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* (1873) t. 39. — Europe centr. 2

**L. alpestris** Waldstein et Kitaibel (sub OROBO), *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* II (1805) 133 t. 126. — Croatie, Hongrie, Transylvanie, Thrace. 2

**L. aureus** Steven (sub OROBO) in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* III (1837) 42 ; *Bot. Cab.* t. 1955 ; Boissier, *Fl. Or.* II 621. — Bulgarie, Asie Min., Tauride. 2

**L. Boissieri** Nob. — OROBUS GRANDIFLORUS Boissier, *Fl. Or.* II (1873) 622. — Liban. 2

**L. filiformis** Lamarck (sub OROBO), *Fl. Fr.* II (1778) 568. L. CANESCENS Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 327 ; *Bot. Mag.* t. 3117. — Pyrénées centr. 2

**L. formosus** Steven (sub OROBO) in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* IV (1813) 50 ; *Trans. Linn. Soc.* XI t. 36 ; *Bely. Hort.* IV t. 22. — Caucase.

**L. grandiflorus** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* (1830) 67 t. 698 ; *Bot. Mag.* t. 1938 ; Boissier, *Fl. Or.* II 610. — Sicile, Naples, Grèce, Macédoine. 2

**L. neurolobus** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* sér. 1, IX (1849) 125 et *Fl. Or.* II 616 ; Raulin, *Descr. phys. Crête* t. 12. — Crête. 2

**L. splendens** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* VII (1877) 90. — Orégon. 2

**L. variegatus** Tenore (sub OROBO), *Fl. Napolit.* II (1811-1815) 144 t. 68 ; *Bot. Cab.* t. 1168 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* II t. 28. — Europe mér.-or. 2

**L. vernus** Wimmer, *Fl. v. Schles.* (1832) 166. OROBUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 728 ; *Bot. Mag.* t. 521 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 633. — Europe, Asie Min., Sibérie. 2

28. **ERYTHRINA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 571 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1796. — Genre de 45 esp. des rég. chaudes des deux mondes.

**E. Caffra** Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* (1794) 121 ; *Bot. Mag.* t. 2431 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 312. — Afrique austr. 1

29. **APIOS** Mönch, Meth. Pl. Marburg. (1794) 165 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 1796. — 3 esp. de l'Amérique bor., de la Chine et de l'Himalaya.

**A. tuberosa** Mönch, *loc. cit.* ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 282. GLYCINE APIOS Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 753 ; *Bot. Mag.* t. 1198 ; Schkuhr, *Botan. Handb.* t. 198. — Canada, États-Unis. 2

## Sous-ordre II. Cæsalpiniées.

30. GYMNOCLADUS Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 733 ex pte. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1914. — Genre monotype.

**G. Canadensis** Lamarck, *loc. cit.* ; Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* t. 51 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, VI t. 19. — Canada, États-Unis.  $\mathfrak{h}$

31. CERCIS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 349 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1938. — 3 ou 4 esp. de l'Europe mérid., de l'Asie et de l'Amérique temp.

**C. Canadensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 374 ; Guimpel, Otto et Hayne, *Abbild. fr. Holzarb.* t. 92 ; Loudon, *Arbor. Britann.* t. 101, 103. — Canada, États-Unis.  $\mathfrak{h}$

**C. Chinensis** Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* (1831) 21 ; Walpers, *Repert. Bot. Syst.* I 808. — Chine (Chihli, Kiangsu, Hupeh), Japon (indig. ?).  $\mathfrak{h}$

## Sous-ordre III. Mimosées.

32. ACACIA Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 1049 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 1997. — Rég. chaudes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie.

**A. albida** Delile, *Fl. Egypt.* ed. II (1824) 385 t. 52 fig. 3 ; Boissier, *Fl. Or.* II 637. — Syrie (indig. ?), Égypte, Nubie, Abyssinie, Sénégal.  $\mathfrak{h}$

**A. armata** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 463 ; *Bot. Mag.* t. 1633 ; *Bot. Cab.* t. 49 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 347. — Australie.  $\mathfrak{h}$

**A. concinna** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 464 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 296. **MIMOSA** — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1806) 1039. — Inde or., Ceylan, îles Malaises, Chine.  $\mathfrak{h}$

**A. crassifolia** A. Gray, *Pl. Nov. Thurberg.* in *Mém. Amer. Acad.* V (1854) 317 ; Hooker f., *Icon. Pl.* XII 60 t. 1166. — Mexique. bor.  $\mathfrak{h}$

**A. cultiformis** A. Cunningham in G. Don, *Gen. Syst. of Bot.* II (1832) 406 ; Hooker, *Icon. Pl.* t. 170 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XI t. 123 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 375. — N.-Galles du Sud.  $\mathfrak{h}$

**A. cyanophylla** Lindley in *Bot. Reg.* (1835) misc. 49 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 364. — Australie occ.  $\mathfrak{h}$

**Acacia Farnesiana** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1806) 1083. MIMOSA — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1506 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 28. — Rég. trop. des deux mondes.  $\mathfrak{h}$

**A. floribunda** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1806) 1051 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 398. MIMOSA — Ventenat, *Choix de Pl.* (1803) t. 13. — Australie.  $\mathfrak{h}$

**A. linearis** Sims, in *Bot. Mag.* (1820) t. 2156 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 399. A. LONGISSIMA Link et Wendland in Wendland, *Acacia* t. 11 ; *Bot. Reg.* VIII t. 680. — Tasmanie, Victoria, N.-Galles du Sud.  $\mathfrak{h}$

**A. linifolia** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1806) 1051 ; *Bot. Mag.* t. 2168 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 371. MIMOSA — Ventenat, *Pl. Jard. Cels* (1800) t. 2. M. LINEARIS Wendland, *Hort. Herrenh.* (1799) 8 t. 18. — N.-Galles du Sud. Queensland.  $\mathfrak{h}$

**A. longifolia** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1806) 1052 ; *Bot. Mag.* t. 1827 et 2166 ; *Bot. Reg.* V t. 362 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 397. — Australie.  $\mathfrak{h}$

**A. melanoxylon** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 462 ; *Bot. Mag.* t. 1659 ; *Bot. Cab.* t. 630 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 388. — Australie.  $\mathfrak{h}$

**A. pycnantha** Bentham in Hooker, *Lond. Journ. Bot.* I (1851) 351 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 365. A. PETIOLARIS Lehmann in *Linnaea* XXV (1852) 306. — Victoria, Australie mér.  $\mathfrak{h}$

**A. retinodes** Schlechtendal in *Linnaea* XX (1847) 664 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 364. — Victoria, Australie mér.  $\mathfrak{h}$

**A. trinervata** Sieber, *Pl. N. Holl.* n. 445 ex DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 451 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 325. — N.-Galles du Sud.  $\mathfrak{h}$

33. **ALBIZZIA** Durazzini mss. ex Boivin, *Encycl. du dix-neuvième siècle*, II 32. — Genre de 70 esp. des rég. chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie.

**A. Julibrissin** Boivin, *loc. cit.* ex Bentham in Hooker, *Lond. Journ. of Bot.* III (1844) 97 ; Boissier, *Fl. Or.* II 639. MIMOSA — Scopoli, *Delic. Fl. Faun. Insubr.* I (1786) t. 8. ACACIA — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 1065. — Littoral de la mer Caspienne.  $\mathfrak{h}$

**A. lophantha** Bentham in Hooker, *Lond. Journ. Bot.* III (1844) 86 et *Fl. Austral.* II 421. ACACIA — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 1070 ; *Bot. Reg.* t. 361 ; *Bot. Cab.* t. 716 ; *Bot. Mag.* t. 2108. MIMOSA — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 264. — Australie occ.  $\mathfrak{h}$

## XXXVII. ROSACÉES

1. **PRUNUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 396 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2019. — Genre de 100 esp. de l'Europe temp., de l'Asie temp. et subtrop. et de l'Amérique temp. et trop.
- P. Avium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 474 ; *Fl. Dan.* t. 1647. **CERASUS** — Mœnch, *Meth. Pl. Marburg.* (1794) 672 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* V 10 t. 3. — Europe, Asie Min., Afrique bor.  $\frac{1}{2}$
- — var. **duracina** LINNÉ, *loc. cit.* **CERASUS DURACINA** De Candolle in Lamarck et De Candolle, *Fl. Fr.* IV (1805) 483.
- — var. **longifolia** LAVALLÉE, *Arbor. Segrez.* (1877) 74. **P. LONGIFOLIA** Hort.
- P. cerasifera** Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* IV (1789) 17 ; *Bot. Mag.* t. 5934. **P. DOMESTICA** Linné var. **MYROBALANA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1853) 475.
- P. MYROBALANA** Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed 2, V (1812) 184 t. 57 f. 1. **P. PISSARDI** Carrière in *Rev. Hort.* XXXI (1881) 190. — Patrie douteuse (Caucase ?).  $\frac{1}{2}$
- P. Cerasus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 474 ; Hayne, *Darst. u. Beschreib. Arzneig.* IV t. 42. **P. MARASCA** Reichenbach, *Fl. Excurs.* (1832) 644. **CERASUS CAPRONIANA** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 536 ; Boissier, *Fl. Or.* II 649. — Macédoine, Asie Min., Caucase (natural. dans l'Europe centr.)  $\frac{1}{2}$
- P. Chicasa** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 284 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* V 183. **CERASUS** — Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 538. — Du Maryland à la Floride et au Texas.
- P. humilis** Bunge, *Enum Pl. Chin. Bor.* (1831) 23. **P. BUNGEI** Walpers, *Repert. Bot. Syst.* II (1843) 9. **P. JAPONICA** Carrière (non Thunberg) in *Rev. Hort.* (1873) 457 fig. 41. — Chine (Chihli, Shangtung).  $\frac{1}{2}$
- P. Laurocerasus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 474 ; Hayne, *Darst. u. Beschreib. Arzneig.* V t. 41 ; Nees, Weihe et Funcke, *Pl. officin.* t. 317. **CERASUS** — Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, V (1812) 6 ; Boissier, *Fl. Or.* II 650. — Thrace, Asie Min., Perse bor.  $\frac{1}{4}$
- — var. **myrtifolia** LAVALLÉE, *Arbor. Segrez.* (1877) 77. **P. MYRTIFOLIA** Hort.
- P. Lusitanica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 473. **CERASUS** — Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, V (1812) 5. — Portugal bor. et méd., Espagne occ., Canaries.  $\frac{1}{2}$
- P. nana** Linné (sub **AMYGDALÉ**) *Sp. Pl.* ed. I (1753) 473 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 6 ; *Bot. Mag.* t. 161 ; *Bot. Cab.* t. 1114 ; Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* IV 115 t. 30. — Europe méd. et or., Asie occ. et bor.  $\frac{1}{2}$

- Prunus Persica** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Nat.* (1843) 14.  
 AMYGDALUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 472 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.*  
 t. 430. PERSICA VULGARIS Miller, *Gard. Dict.* ed. VII (1759) n. 1 ; Boissier, *Fl.*  
*Or.* II 640. — Chine (A. de Candolle) et naturalisé sur beaucoup de points de  
 l'Asie centr. et occ.  $\mathfrak{h}$
- P. prostrata** Labillardière, *Decad. Pl. Syr.* IV (1812) t. 6 ; Sibthorp et  
 Smith, *Fl. Græca* V t. 478. CERASUS — Loiseleur in De Candolle, *Prodr.*  
*Regn. Veget.* II (1825) 538 ; *Bot. Reg.* II t. 136 ; Boissier, *Fl. Or.* II 648. —  
 Europe mér. et or., Asie occ., Himalaya.  $\mathfrak{h}$
- P. Pseudo-Cerasus Lindley**, in *Trans. Hort. Soc. Lond.* VI (1826) 91.  
 P. CERASUS Thunberg (non Linné) *Fl. Jap.* (1784) 201. CERASUS SERRULATA  
 G. Don in Loudon, *Arbor. Brit.* II (1838) 701 fig. 407. C. SIEBOLDII Car-  
 rière in *Rev. Hort.* (1866) 371 cum ic. — Japon, Chine, Mandchourie, Sac-  
 chalin.  $\mathfrak{h}$
- P. Sibirica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 474 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 3 ;  
 Pallas, *Fl. Ross.* I 15 t. 8. — Daourie.  $\mathfrak{h}$
- P. tomentosa** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 203 ; Siebold et Zuccarini, *Fl.*  
*Jap.* I 51 t. 22 ; *Gartenflora* XXV t. 852 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 344.  
 — Japon (indig. ?), Chine, Inde bor.-occ.  $\mathfrak{h}$
- P. triloba** Lindley in *Gard. Chron.* (1857) 268 ; *Ill. Hort.* VIII (1861)  
 t. 308. PRUNOPSIS LINDLEYI André in *Rev. Hort.* (1883) 368 cum xylogr. —  
 Chine (Tchihli, Shangtung).  $\mathfrak{h}$

### Tribus Spirææ.

2. SPIRÆA Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 409 : T. Durand, *Ind.*  
*Gen.* n. 2025. — Environ 50 esp. originaires d'Europe,  
 d'Asie et d'Amérique<sup>1</sup>.

- S. ariæfolia** Smith in REES, *Cyclopædia* XXXIII (1819) n. 16 ; *Bot. Reg.*  
 XVI t. 1365. — Orégon, Californie.  $\mathfrak{h}$
- S. astilboides** Maximowicz (sub ARUNCUS) in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879)  
 171. S. ARUNCUS Linné, var. ASTILBOIDES Maximowicz olim in sched. ex  
 Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I (1875) 121. — Japon (Nippon).  $\mathfrak{h}$
- S. bella** Sims in *Bot. Mag.* (1823) t. 2426 ; *Bot. Cab.* t. 1268 ; Hooker f.,  
*Fl. Brit. Ind.* II 324. S. EXPANSA Wallich, *Catal.* (1829) n. 702. S. HOOKERI  
 Hort. — Himalaya temp.  $\mathfrak{h}$

<sup>1</sup> C.-J. Maximowicz, *Annotatones de Spiræaceis* in *Acta Horti Petropolitani* VI (1879)  
 105-261.

- Spiræa Blumei** G. Don, *Gen. Syst. of Bot.* II (1832) 518. *S. CHAMÆDRIFOLIA* Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825) 1114. *S. RUPESTRIS* Hort. ; *Belg. Hort.* (1858) t. 37. — Japon, Chine?  $\frac{1}{2}$
- S. bullata** Maximowicz in *Gartenflora* XXXV (1886) 65 t. 1215. *S. CRISPIFOLIA* Hort. — Japon.  $\frac{1}{2}$
- S. cæspitosa** Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* (1840) 418 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 170. — Montagnes Rocheuses.  $\frac{1}{2}$
- S. canescens** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 227. *S. CUNEIFOLIA* Wallich, *Catal.* (1829) n. 699 ; Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV 47 t. 57 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 325. — Himalaya temp.  $\frac{1}{2}$
- S. chamædrifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 489 ; Boissier, *Fl. Or.* II 689 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 15 ; *Bot. Reg.* XV t. 1222 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 140. *S. FLEXUOSA* Fischer in *Ann. Sc. Nat.* I (1824) t. 25. — Europe centr.-or., Sibérie, Mandchourie.  $\frac{1}{2}$
- S. Douglasii** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 172 ; *Bot. Mag.* t. 5171 ; *Fl. des Serres* II t. 2. — Amérique bor.-occ. (de la Californie à l'Idaho).  $\frac{1}{2}$
- S. Filipendula** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 490 ; Boissier, *Fl. Or.* II 691 ; *Engl. Bot.* IV t. 284 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* VII t. 488. — Europe, Asie Min., Caucase, Songarie, Sibérie.  $\frac{1}{2}$
- S. grandiflora** Sweet, *Hort. Brit.* (1827) 194 ; *Bot. Mag.* t. 4795 ; *Fl. des Serres* IX t. 954 ; *Bot. Cab.* t. 1988. *SORBARIA* — Maximowicz in *Act. Hort. Petrop.* XI (1879) 222. *SPIRÆA PALLASII* G. Don, *Gen. Syst. of Bot.* II (1832) 520. — Sibérie or.  $\frac{1}{2}$
- S. hypericifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 489 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 134 ; Ledebour, *Icon. Fl. Ross.* t. 428-430. *S. NANA* Hort. — Mongolie, Daourie, Songarie. En Europe, seulement naturalisé (Nyman).  
— — var. *thalicteroides* Ledebour, *Fl. Ross.* II (1844) 13. *S. THALICTROIDES* Pallas, *Fl. Ross.* I (1784) 34 t. 18. — Avec le type.
- S. Japonica** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 262 ; Maximowicz in *Act. Hort. Petrop.* VI 187. *S. CALLOSA* Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 209. *S. FORTUNEI* Planchon in *Fl. des Serres* IX (1853) 35 t. 871 ; *Bot. Mag.* t. 5164. — Japon, Chine centr., Himalaya or.
- S. lævigata** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 244 ; Gartner, *De Fruct. et Sem.* t. 69 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 439. — Sibérie altaïq.  $\frac{1}{2}$
- S. media** Schmidt, *Österr. Baumz.* I (1792) 53 t. 54 ; Maximowicz in *Act. Hort. Petrop.* VI 187. *S. OBLONGIFOLIA* Waldstein et Kitaibel, *Illustr. et Descr. Pl. Hung.* III (1812) 261 t. 235. *S. CONFUSA* Regel et Kerner in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 58. — Hongrie, Russie, Sibérie, Mongolie.  $\frac{1}{2}$
- S. palmata** Pallas, *Reise Prov. Russisch. Reich.* III app. (1776) 735 tab. g fig. 1 et *Fl. Ross.* I (1784) 40 t. 27. *FILIPENDULA* — Maximowicz in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879) 250. *SPIRÆA DIGITATA* Willdenow, *Sp. Pl.* II (1799) 1061. — Daourie, Mongolie, Mandchourie, Sacchaline, Kuriles.  $\frac{1}{2}$

**Spiræa prunifolia** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* (1835) 130 t. 70 ; Otto in *Gartenzeit.* (1847) t. 1 ; *Fl. des Serres* II t. 153-154. S. CRENATA Thunberg var., *Fl. Jap.* (1784) 210. — Japon. ♪

**S. Thunbergii** Siebold in BLUME, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825) 1115 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I 130 t. 69. S. CRENATA Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 210 (excl. var. fl. plen.). — Chine (Chekiang), Japon. ♪

**S. trilobata** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 244 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 17 ; *Bot. Cab.* t. 1271. S. GROSSULARIFOLIA et ROTUNDIFOLIA Hort. — Turkestan, Chine bor., Sibérie. ♪

3. **GILLENIA** Moench, *Meth. Pl. Marburg.*, suppl. (1802) 286 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2029. — 2 esp. de l'Amérique bor.

**G. trifoliata** Moench, *loc. cit.* (1802) 286 ; Baillon, *Hist. Fam. Pl.* I 388 fig. 442. SPIRÆA — Linné, *Sp. Pl.* ed I (1753) 490 ; *Bot. Mag.* t. 489. — Canada, États-Unis (partie or.). ♥

4. **KERRIA** De Candolle in *Trans. Linn. Soc.* XII (1816) 156 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2030. — 1 ou 2 esp. de la Chine bor. et du Japon.

**K. Japonica** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 54 ; *Bot. Reg.* t. 1878 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* t. 98. CORCHORUS — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 227. — Japon. ♪

5. **RHODOTYPUS** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 185 t. 99 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2031. — Genre monotype.

**R. kerrioides** Siebold et Zuccarini, *loc. cit.* (1835) 187 t. 99 ; *Bot. Mag.* t. 5805 ; *Gartenflora* (1866) t. 505 fig. 2 et 3. — Japon, Chine. ♪

6. **NEVIUSIA** A. Gray, *Botan. Mem.* in *Mem. Amer. Acad.*, new ser. VI (1859) 374 tab. XXX ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2032. — Genre monotype.

**N. Alabamensis** A. Gray, *loc. cit.* ; Baillon, *Hist. Fam. Pl.* I 398. — Alabama. ♪

## Tribus Rubeæ.

7. RUBUS Linné, Gen. Pl. (1737) n. 443 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2042. — On en a décrit près d'un millier d'esp., mais il n'y en a guère plus de 100 bien distinctes. Rég. arct., temp. et trop. du monde entier.

**R. arcticus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 494 ; *Bot. Mag.* t. 132 ; *Gartenflora* (1861) t. 314 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 70. — Canada, Sibérie. ♀

**R. australis** Forster, *Fl. Insul. Austral. Prodr.* (1786) n. 224 ; Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* t. 14 et *Handb. N. Zeal. Fl.* 54. — N.-Zélande. ♀

**R. Barbeyi** A. Favrat et Gremli in *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* XVII (1881) 505 ; Gremli, *Excurs. Fl. Schweiz* ed. IV (1881) 150. — Suisse (Vaud). ♀

**R. deliciosus** Torrey in *Ann. Lyc. N.-York* II (1827) 196 ; *Bot. Mag.* t. 6062 ; Loudon, *Arbor. Brit.* II 746 fig. 446. — Montagnes Rocheuses (vers le 41°).

**R. leucodermis** Douglas in TORREY et GRAY, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 454 ; *Gartenflora* XIX t. 670. — Californie, Utah, Orégon, Arizona. ♂.

**R. macilentus** Cambessedes in JACQUEMONT, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 49 t. 60 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 336. — Himalaya temp.

8. DALIBARDA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 431 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2043. — 3 ou 4 esp. de l'Amérique bor., de l'Himalaya et peut-être du Maroc.

**D. repens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 491. RUBUS DALIBARDA Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 708 ; Smith, *Icon. Pl. Rar.* t. 20 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 441. D. VIOLACEOIDES Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) t. 27. — Amérique bor.

## Tribus Potentilleæ.

9. DRYAS Linné, Gen. Pl. (1737) n. 419 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2049. — 3 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique temp. et arct.

**D. Drummondii** Richardson *miss.* ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1830) t. 2972 ; Walpers, *Repert. Bot. Syst.* II 40. — Montagnes Rocheuses. ♀



**Dryas integrifolia** Vahl in *Skriv. af Naturhist.-Selsk. Hafn.* IV (1798) 171; *Fl. Dan.* t. 1216; Hooker, *Exot. Fl.* t. 220. D. TENELLA Pursh, *Fl. Amer. Sept.* (1814) 350. — Amérique arct., New-Hampshire. ♀

**D. octopetala** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 501; *Fl. Dan.* I t. 31; *Engl. Bot.* VII t. 451; Boissier, *Fl. Or.* II 696. — Europe bor. et mont., Sibérie, Caucase, Amérique arct., Montagnes Rocheuses. ♀

10. **GEUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 418; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2051. — Genre de 30 esp. habitant les rég. temp. et froides du monde entier; 1 esp. dans l'Afrique austr.

**G. chilense** Balbis mss. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 551; Spach, *Hist. Pl. Phaner.* t. 6; *Bot. Reg.* XVI t. 1348 (var. *GRANDIFLORUM*). — Chili.

**G. coccineum** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 354 et *Fl. Græca* t. 485; Boissier, *Fl. Or.* II 697. — Macédoine, Thrace, Asie Min. ♀

**G. heterocarpum** Boissier, *Elench. Pl. Nov.* (1837) 40 n. 69; *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 201 t. 63; *Fl. Or.* II 698. **G. UMBROSUM** Boissier, *Voy. Bot. Esp. suppl.* (1845) 728; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III, 239. — Espagne mér., Dauphiné, Algérie, Asie Min., Syrie, Perse. ♀

**G. molle** Visiani et Pancic, *Pl. Serb. Rar.* I (1862) 7 t. 1. — Italie mér., Serbie, Bosnie, Monténégro, Herzégovine. ♀

**G. Pyrenaicum** Ramond in *Bull. Soc. Philom. Par.* (1800) n. 42 t. 10 fig. 3; Rœmer, *Fl. Europæa* t. 2; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 239. — Espagne, Pyrénées franç. ♀

**G. reptans** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 501; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 22; Sturm, *Deutsch. Fl.* IV t. 14; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 183. — Dauphiné, Italie bor., Suisse, Autriche, Hongrie, Transylvanie. ♀

11. **WALDSTEINIA** Willdenow in N. Schr. *Nat. Fr. Berl.* II (1799) 106; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2052. — 4 esp. de l'Europe centr. et or., de l'Asie bor. et de l'Amérique temp. orientale.

**W. fragarioides** Trattinick, *Rosac. Monog.* III (1824) 107; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 426. **DALIBARDA** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 300 t. 28; *Bot. Mag.* t. 1567. **COMAROPSIS** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 555. — Canada, États-Unis (partie bor. et or.) ♀

12. **COLURIA** R. Brown in Parry's First Voy. (append.) (1823) 276 in nota ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2053. — Genre monotype.

**C. geoides** R. Brown, *loc. cit.* (1823) 276 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 21. **GEUM LAXMANNI** Gärtner, *De Fruct. et Sem.* I (1788) 352 t. 74 fig. 1. — Sibérie. ♀

13. **FRAGARIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 414 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2054. — Genre de 6 esp. bien distinctes, habitant la rég. temp. de l'hémisphère bor., le Chili, le Brésil et l'Inde or.

**F. lucida** Elise Vilmorin in DECAISNE, *Jard. Fruit. du Mus.* IX (1862-1875) 52 cum ic. — Californie.

14. **POTENTILLA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 415 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2055. — Esp. décrites environ 400, dont 160 seulement bien distinctes. — Rég. temp. et arct. de l'hémisphère bor., ailleurs à peine observé.

**P. alpestris** Haller f. in *Mus. Helv.* (1818) 53 t. 8 fig. a ; *Bot. Cab.* t. 449. **P. AUREA** Retz (non Linné), *Fl. Dan.* t. 114. **P. VERLOTI** Jordan. — Groënland, Amérique arct., Europe bor. et méd.-mont., Arménie, Caucase. ♀

**P. argyrophylla** Wallich, *Catal.* (1829) n. 1020 ; Lehmann, *Monog. Potent.* suppl. t. 9. **P. JACQUEMONTIANA** Cambessedes in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV t. 63 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 356. — Himalaya centr. et occ., Afghan. ♀

**P. aurea** Linné, *Centuria II Plant.* (1756) n. 154 ; *Engl. Bot.* VIII t. 561 ; *Bot. Cab.* t. 77. — Hautes montagnes de l'Europe occ., centr. et or. ♀

**P. Breunia** Huter ex KERNER, *Schedæ ad Fl. exsicc. Austro-Hung.* IV (1886) 14 n. 1251 ; Zimmeter, *Potent. Eur. Suppl.* I n. 180<sup>a</sup>. **P. NIVEA** × **VERNA**. — Tyrol. ♀

**P. Buschakii** Blocki, nomen nudum in *Österr. Bot. Zeitschr.* XXXV (1885) 291 ; Zimmeter, *Potent. Eur., Suppl.* I n. 69<sup>b</sup>. — Galicie. ♀

**P. calycina** Boissier et Balansa in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, V (1856) 94 et *Fl. Or.* II 707. — Cilicie. ♀

**P. caulescens** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 513 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 220 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* II t. 1 ; Lehmann, *Revis. Potent.* 132. — Espagne, Pyrénées, Europe centr. et or. ♀

- Potentilla Clusiana** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II (1774) 40 t. 416; *Bot. Mag.* t. 1327; Lehmann, *Monog. Potent.* 128 et *Revis. Potent.* 133. — Europe centr. (du Tyrol à la Bosnie). ♀
- P. collina** Wibel, *Prim. Fl. Werthemensis* (1799) 267; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II 238; Lehmann, *Revis. Potent.* 98. P. SUBARGENTEA Krockner, *Fl. Siles.* IV (1823) 513. P. THYRSIFLORA Hülsen in Kerner, *Sched. ad Fl. Austr.* II (1882) 21 et *Potent. Enum.* n. 77. — Europe centr.
- P. congesta** Douglas (sub HORKELIA) in Hooker, *Bot. Mag.* (1829) t. 2880 et in *Fl. Bor.-Amer.* I 496; Brewer et Watson in *Geol. Surv. of Calif. Bot.* I (1876) 181. — Orégon, Californie?. ♀
- P. davurica** Nestler, *Monog. Potent.* (1816) 32 t. 1<sup>b</sup>; Lehmann, *Revis. Potent.* 15. P. FRUTICOSA Linné, var. DAVURICA Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 579. P. GLABRA Loddiges in *Bot. Cab.* X (1824) t. 914.; *Bot. Mag.* t. 3676. — Daourie. ♀
- P. frigida** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 563; Nestler, *Monog. Potent.* t. 40 fig. 3; Lehmann, *Revis. Potent.* 158. — Dauphiné, Savoie, Italie bor., Tyrol, Carinthie, Styrie. ♀
- P. gracilis** Douglas in Hooker, *Bot. Mag.* (1829) t. 2984. P. BLASCHKEANA Turczaninow in Lehmann, *Revis. Potent.* (1856) 107 t. 64. — Du Saskatchewan à l'Alaska, la Californie et le N.-Mexique.
- P. grammopetala** Moretti in *Giorn. d. Fisico di Pavia* (1826) 4 t. 2; Lehmann, *Nov. vel min. cogn. Stirp. Pugill.* IX 63 et *Revis. Potent.* 139. — Italie bor., Suisse mér. ♀
- P. grandiflora** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 499; *Bot. Mag.* t. 75; Lehmann, *Revis. Potent.* 156 t. 164. — Dauphiné, Suisse, Italie bor., Tyrol, Styrie. ♀
- P. Haynaldiana** Janka, *Breviar. Pl. Turc.* (1872) 176 et in Boissier, *Fl. Or.* II (1873) 704. — Thrace, Macédoine, Transylvanie. ♀
- P. Herbiehii** Blocki, nomen nudum in *Æsterr. Bot. Zeitschr.* XXXV (1885) 294; Zimmeter, *Potent. Eur., Suppl.* n. 51<sup>b</sup>. — Podolie, Galicie, Bukovine. ♀
- P. inclinata** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 567; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 533; Lehmann, *Revis. Potent.* 400. — Europe bor. centr. et mér., Caucase, Sibérie.
- P. Kurdica** Boissier et Hohenacker in Boissier, *Diagn. Fl. Or.* ser. 1, III (1843) 4 et *Fl. Or.* II 711; Lehmann, *Revis. Potent.* 109 t. 62 fig. 2. — Kurdistan, Turquie, Perse. ♀
- P. Leopoliensis** Blocki, nomen nudum in *Æsterr. Bot. Zeitschr.* XXXVII (1887) 334; Zimmeter, *Potent. Eur. Suppl.* n. 69<sup>b</sup>. — Galicie. ♀
- P. leucopolitanoides** Blocki, nomen nudum in *Æsterr. Bot. Zeitschr.* XXXVII (1887) 334. P. PSEUDO-LEUCOPOLITANA Zimmeter, *Potent. Eur., Suppl.* n. 76. — Galicie.

**Potentilla Libanotica Boissier**, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, III (1843) 4 et *Fl. Or.* II 704; Lehmann, *Revis. Potent.* 139 t. 49. — Syrie. ♀

**P. micropetala D. Don**, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 231; Lehmann, *Nov. vel min. cogn. Pugill.* III 8 et *Monog. Potent.* (suppl.) t. 2 fig. 2. **SIBBALDIA** **POTENTILLOIDES** Cambessedes in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 54 t. 67; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 332. — Himalaya (du Garwhal au Sikkim). ♀

**P. minima Haller f.** in SCHLEICHER, *Pl. Exsicc. Cent.* I (1796) n. 59; *Musée Helv.* t. 8; *Bot. Cab.* t. 480; Lehmann, *Revis. Potent.* 139; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 190. **P. BRAUNIANA** Hoppe in *Bot. Taschenb.* (1800) 137; Zollikoffer, *Alpenfl.* t. 8 (sub MINIMA). — Italie bor., Dauph., Eur. centr. ♀

**P. multifida Linné** *Sp. Pl.* ed. I (1753) 496; Nestler, *Monog. Potent.* t. 33; Lehmann, *Revis. Potent.* 34 t. 64; Boissier, *Fl. Or.* II 710. — Dauphiné, Piémont, Suisse, Russie méd.-or., Caucase, Perse, Tibet, Daourie, Sibérie, Laponie. ♀

**P. Nevadensis Boissier**, *Elench. Pl. Nov.* (1838) 40 n. 70 et *Voy. Bot. Esp.* 203 t. 59; Lehmann, *Revis. Potent.* 128; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 233. — Espagne (Sierra Nevada). ♀

**P. nitida Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 714; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 25; Sturm, *Deutschl. Fl.* VI t. 22; Lehmann, *Revis. Potent.* 143. — Dauphiné, Italie bor., Tyrol, Carniole, Carinthie, Sibérie? ♀

**P. nivalis La Peyrouse** in *Mém. Acad. Toul.* I (1827) 210; Lehmann, *Revis. Potent.* 136; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 523; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 229. — Pyrénées, Dauphiné, Espagne bor. ♀

**P. nivea Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 715; *Bot. Cab.* t. 460; *Bot. Mag.* t. 2982 (var. **MACROPHYLLA** Hooker); Lehmann, *Revis. Potent.* 165; Boissier, *Fl. Or.* II 725. — Europe, Asie et Amérique arctiques, Alpes, Pyrénées, Caucase, Himalaya. ♀

**P. Pensylvanica Linné**, *Mant. Pl.* (1771) 76; Jacquin, *Hort. Vindob.* II t. 189; Lehmann, *Monog. Potent.* 53 et *Revis. Potent.* 57. — Amérique angl., États-Unis (partie occ.) ♀

— — var. **Hippiana** TORREY et GRAY, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 438. **P. HIPPIANA** Lehmann, *Nov. Stirp. Pugill.* II (1830) 7 et *Revis. Potent.* 62. **P. LEUCOPHYLLA** TORREY (non Pallas) in *Ann. Lyc. Nat. N.-York* (1827) 197; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I t. 64. — Avec le type.

**P. Podolica Blocki**, nomen nudum in *Österr. Bot. Zeitschr.* XXXV (1885) 291; Zimmeter, *Potent. Eur. Suppl.* n. 69<sup>b</sup>. — Podolie, Galicie. ♀

**P. Pyrenaica Ramond** in LAMARCK et DE CANDOLLE, *Fl. Fr.* IV (1805) 459 et VI 542; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 529. **P. MACULATA** Pourret var. **PYRENAICA** Lehmann, *Revis. Potent.* (1856) 120. — Catalogne, Aragon, Pyrénées franç. ♀

- Potentilla recta** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 497; Nestler, *Monog. Potent.* t. 6; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* IV t. 483; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 339; Lehmann, *Revis. Potent.* 82. — Europe mér., méd. et or., Asie occ., Sibérie. ♀
- — var. **obscura** LEHMANN, *Revis. Potent.* (1836) 82. P. OBSCURA Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 1100. — Europe, Asie russe.
- P. rupestris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 496; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II t. 114; *Engl. Bot.* XXIX t. 2058; Boissier, *Fl. Or.* II; Lehmann, *Revis. Potent.* 31. — Europe, Arménie, Caucase, Daourie, Sibérie. ♀
- — var. **macrocalyx** LEHMANN, *Revis. Potent.* (1856) 52. P. MACROCALYX Huet in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, XIX (1853) 252. — Pyrénées.
- P. Salessoyii** Stephan in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* II (1809) 6 t. 3; Lehmann, *Monog. Potent.* 35 t. 1 et *Revis. Potent.* 13; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 348; — Sibérie, Tibet, Cachemire, Chine. ♀
- P. Saxifraga** Ardoine in *Ind. Sem. Hort. Genuens.* (1848) et in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, XII (1849) 350; Lehmann, *Revis. Potent.* 134 t. 48. — Italie bor. (Ligurie).
- P. speciosa** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 1110; Nestler, *Monog. Potent.* 168 t. 11; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V t. 484; Boissier, *Fl. Or.* II 705. — Dalmatie, Europe mér.-or., Crète, Asie Min., Mésopotamie. ♂
- P. subobscura** Blocki in *Æst. Bot. Zeitschr.* (1889) 34. — Galicie.
- P. supina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 711; *Fl. Dan.* XIII t. 2175; Dietrich, *Fl. Boruss.* IX t. 585; Lehmann, *Revis. Potent.* 193; Boissier, *Fl. Or.* II 725; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 359. — Europe bor. (partie mér.) occ., centr. et or., Sibérie, Inde or., Afrique trop. et austr.
- P. Thuringiaca** Bernhardt in LINK, *Enum. Plant. Hort. Berol.* II (1822) 64; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II 578. P. HEPTAPHYLLA Miller var. PARVIFLORA Lehmann, *Revis. Potent.* 77. — France, Allemagne, Suisse.
- P. tridentata** Solander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 216 t. 9; *Engl. Bot.* XXXI t. 2389. P. RETUSA Mueller in *Fl. Dan.* V t. 799; Lehmann, *Monog. Potent.* 66 et *Revis. Potent.* 22. — Groënland, Canada. ♀
- P. umbrosa** Steven in MARSCHALL BIBERSTEIN, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 357; Ledebour, *Fl. Ross.* II 53; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II 574; Lehmann, *Revis. Potent.* 91. — Caucase. ♀
- P. valderia** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 714; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 24; Bertoloni, *Fl. Ital.* V 262; Lehmann, *Monog. Potent.* 124 et *Revis. Potent.* 130. — Piémont, Illyrie. ♀
- P. Visianii** Pancic, *Fl. Principat. Serbie* (1874) 273. — Serbie. ♀

## Tribus Poterieæ.

15. **ALCHEMILLA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 83 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2058. — Une quarantaine d'esp. de la rég. temp. des deux hémisphères et de l'Afrique austr.

**A. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 179 ; *Engl. Bot.* t. 244 ; *Fl. Dan.* t. 49 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 201 ; Boissier, *Fl. Or.* II 730. — Europe bor. centr. et or., Espagne, Portugal, Asie Min. (Olympe de Bithynie), Sibérie, Groënland. ♀

**A. coniuncta** Babington in *Annals and Mag. of Nat. Hist.* X (1842) 24 ; *Engl. Bot. Suppl.* V t. 2983. **A. ARGENTEA** G. Don in *Hb. Borr.* (non Trevelyan). **A. ALPINA** var. **GODETI** Ducommun, *Taschenb. Schweiz. Bot.* I 227 (1869). — Alpes françaises et suisses, Jura français.

**A. cuneata** Gaudin, *Fl. Helv.* IV (1829) 638 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 201. **A. HEPTAPHYLLA** Schl. apud Rchb., *Fl. Exc.* (1832) 609. **A. GROSSIDENS** × **PENTAPHYLLA** Buser in *Bull. Soc. Dauph.* sér. II (1892) 96. — Suisse (Piémont ?).

**A. pentaphylla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 179 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 201 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 565. — Pyrénées, Alpes de la France, de la Suisse, du Tyrol et de l'Italie. ♀

**A. pubescens** Willdenow, *Hort. Berol.* II (1808 ou 1809) t. 79 ; *Enum. Hort. Berol.* (1809) 170 ; M. B., *Fl. Taur. Cauc.* I (1808) 114 p. p. (sub nom. **A. PUBESCENS** Lamk. ; ipse M. B. nunquam **A. PUBESCENTEM** exavit !). **A. SERICATA** Rchb., *Iconogr.* I (1823) 6 t. 4 fig. 9. **A. VULGARIS** var. **BIEBERSTEINII** Boissier, *Fl. Or.* II (1872) 730. **A. VULGARIS** var. **CAUCASICA** Beck, *Fl. N.-Est.* (1892) 766. — Caucase, Lazistan.

**A. splendens** Christ in Gremlé, *Excurs. Fl.* ed. II (1874) 179 ; *Bull. Soc. Dauph.* sér. II (1892) 103. — Alpes suisses.

**A. subsericea** Reuter in *Bull. Soc. Hallérienne* I (1853-54) 20 p. p. — Alpes de la France, de la Suisse, du Piémont et du Trentin.

16. **ACENA** Linné, *Mant. Pl.* II (1774) 145 ; T. Durand. *Ind. Gen.* n. 2065. — 37 esp. environ, de la rég. extratrop. austr., de la Californie et des îles Sandwich.

**A. microphylla** Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* I (1853) 55 et *Handb. N. Zeal. Fl.* — Nouvelle-Zélande. ♀

**A. ovalifolia** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* I (1798) 67 t. 103 fig. c ; Richard, *Voy. de l'Astrol., Bot.* t. 25. **ANGISTRUM REPENS** Ventenat, *Descr. Pl. Jard. Cels.* (1800) t. 5. — Pérou. b

**Acæna ovina** Cunningham in *Field's N. S. Wales* (1825) 368 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 433. — Australie.  $\frac{1}{2}$

**A. pinnatifida** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* I (1798) 68 t. 104 fig. b ; Richard, *Voy. de l'Astrol., Bot.*, t. 25 ; *Bot. Reg.* t. 1271. A. MYRIOPHYLLA Lindley, *Bot. Reg.* sub t. 9271. — Chili.

**A. Sanguisorbæ** Vahl, *Enum. Pl.* II (1806) 294 ; Richard, *Voy. de l'Astrol., Bot.* t. 24 ; Bentham, *Fl. Austral.* II 434. A. SARMENTOSA Carmichael in *Trans. Linn. Soc.* XII (1817) 502. — Nouv.-Zélande, Tristan d'Acunha, île Lord Auckland, Australie.  $\frac{1}{2}$

17. **POTERIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 722 : T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2066. — Une vingtaine d'esp. des rég. temp. et chaudes de l'hémisphère bor.

**P. lateriflorum** Cosson, *Notes Pl. Crit. ou Nouv. Esp.* II (1851) 107 et 162 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 203. — Espagne.  $\frac{1}{2}$

### Tribus Roseæ.

18. **HULTHEMIA** Dumortier, *Note nouv. Genre Pl.* (1814) 13 ; — Genre monotype.

**H. berberifolia** Dumortier, *loc. cit.* ; Boissier, *Fl. Or.* II 668. ROSA — Pallas in *Nov. Acta Acad. Petrop.* X (1795) 379 t. 10 fig. 5. LOWEA — Lindley in *Bot. Reg.* (1829) t. 1261. — Perse, Tartarie chinoise.  $\frac{1}{2}$

19. **ROSA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 442 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2069. — Genre de 60 esp. environ, habitant les rég. temp., subalp. et subtrop. de l'hémisphère bor<sup>1</sup>.

**R. Beggeriana** Schrenk, *Enum. Pl. Nov.* (1841) 73 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 82 ; Crépin in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XIV 45 ; Christ in Boissier, *Fl. Or. Suppl.* 208. R. SILVERHIELMI Schrenk in *Bull. Acad. St-Petersb.* II (1844) 195. R. LEHMANIANA Bunge, *Pl. Lehm.* (1851) 287 n. 468. R. REGELII Reuter, *Cat. Gr. Jard. Genev.* (1867) 4. R. ANSERINIFOLIA Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. VII (1845) 51 et *Fl. Or.* II 677, *Suppl.* 209. — Altaï, Songarie, Turkestan, Afghanistan, Perse bor.

**R. Californica** Chamisso et Schlechtendal in *Linnaea* II (1827) 35 ; Crépin, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 49. — États-Unis occ.  $\frac{1}{2}$

**R. foliolosa** Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 460 ; Crépin in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 70. — États-Unis (Arkansas, Indian territ., Texas).

<sup>1</sup> M. F. Crépin a bien voulu rédiger cet article pour l'Hortus.

- Rosa gymnocarpa Nuttall** in TORREY et GRAY, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 461 ; Torrey, *Rep. on the Unit. States and Mexic. Bound. Survey Part I, Bot. of the Bound.* 61 t. 21 ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 72. — États-Unis occ. (entre le 50° et le 35° de lat.)
- R. laevigata Michaux**, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 295 ; *Bot. Reg.* XXIII t. 1922 ; *Bot. Mag.* t. 2847 ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 77. **R. SINICA** Lindley, *Ros. Monog.* (1820) 126 t. 16. **R. HYSTRIX** Lindley, *loc. cit.* 129 t. 17. — Espèce originaire d'Asie (Chine, Japon, Formose) et abondamment naturalisée dans les États-Unis mér., à la Jamaïque, aux îles Canaries, à Madère et au Cap de Bonne-Espérance.
- Obs. Le **R. FORTUNEANA** Lindley in LINDLEY et PAXTON, *Fl. Gard.* II (1852) peut être considéré comme un hybride des **R. LAEVIGATA** Michaux et **R. BANKSII** R. BROWN (?? W. B.)
- R. laxa Retzius** in HOFFMANN, *Phytograph. Blätter* I (1803) 39 ; Wikström in *Kongl. Svenska Vetén. Acad. Handl.* (1820) 275 t. III ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XIV 26. — Sibérie.
- R. lutea Miller**, *Gard. Dict.* ed. 6, VIII (1768) n. 41 ; Boissier, *Fl. Or.* II 671 et *Suppl.* 205. **R. EGLANTERIA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 703 pro parte. **R. FETIDA** Hermann, *Diss.* (1762) 18. — Asie Min., Arménie, Perse.
- R. montana Chaix** in VILLARS, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 547 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 558 ; Déséglise in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 292. — France or., Suisse, Italie bor. **h**
- R. moschata Herrmann**, *Diss.* (1762) ; Miller, *Gard. Dict.* ed. 6, VIII (1768) n. 13 ; Redouté, *Roses* I 33 cum ic. ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XVIII 287. **R. BRUNONII** Lindley, *Ros. Monog.* (1820) 120 t. 14. — Asie et Abyssinie ; naturalisé ou spontané sur quelques points de la Rég. Médit.
- R. multiflora Thunberg**, *Fl. Jap.* I (1784) 214 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 134, II 343 ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XIII 250. **R. POLYANTHA** Siebold et Zuccarini. **R. INTERMEDIA** Carrière in *Rev. Hort.* (1868) 269 fig. 29 et 30. — Chine, Corée, Japon, îles Formose et Luçon.
- R. pisocarpa A. Gray** in *Proc. Amer. Acad.* VIII (1872) 382 ; *Bot. Mag.* t. 6857 ; Crépín in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 44. — États-Unis occ.
- R. rugosa Thunberg**, *Fl. Jap.* I (1784) 213 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I 66 t. 28 ; *Bot. Reg.* t. 420 ; Redouté, *Roses* I 47 cum ic. — Chine bor., Mandchourie, Corée, île Sacchaline, Kamtchatka, îles Kouriles, Japon.
- Obs. Le **R. IBARA** Siebold, *Cat. Pl. Jap.* (1863) 6 peut être considéré comme un hybride des **R. RUGOSA** et **MULTIFLORA**.
- R. sempervirens Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 704 ; Redouté, *Roses* II 18 cum ic. ; Boissier, *Fl. Or.* II 688 ; Déséglise in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XV 208 ; Crépín in id. XVIII 316 — France, Dalmatie, Italie, Grèce, Turquie d'Europe, Algérie, Maroc. **h**



**Rosa sulphurea** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 201 ; Christ in Boissier, *Fl. Or. Suppl.* 200. R. HEMISPHERICA Herrmann, *Diss.* (1762) 18. R. BUNGEANA Boissier et Buhse, *Aufz. Reise Transcauc. u. Persien* (1860) 84 t. 6 fig. 1. R. RAPINI Boissier et Balansa in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, VI (1859) 72 et *Fl. Or.* II 216. — Asie Min., Arménie, Perse.

**R. Webbiana** Wallich in ROYLE, *Illust. Bot. Himalay. Mount.* (1839) 208 t. 42 fig. 2 ; Crépin in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XIII 273 ; Christ in Boissier, *Fl. Or. Suppl.* 207. R. UNGICULARIS Bertoloni in *Mém. Acad. Bologne* XII 255 t. 3. R. FEDTSCHENKOANA Regel, *Ros. Monog. Tent.* 30. — Turkestan, Afghanistan, Himalaya bor.-oc.  $\frac{1}{2}$

**R. xanthina** Lindley, *Ros. Monog.* (1820) 132. R. PLATYACANTHA Schrenk in *Bull. Acad. St-Petersb.* X (1842) 254. — Chine bor.  $\frac{1}{2}$

### Tribus Pomeæ<sup>1</sup>.

20. CYDONIA Jussieu, *Gen. Pl.* (1789), 335 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2072. — 4 esp. de l'Europe mér. et de l'Asie chaude.

**C. Japonica** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 40 ; Savi, *Fl. Ital.* I t. 18 ; *Bot. Cab.* t. 1594. PYRUS CYDONIA Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 207 ; *Bot. Mag.* t. 692. CHENOMELES JAPONICA Lindley in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1822) 97. — Japon, Chine.  $\frac{1}{2}$

— — var. **Mœrlosii** CH. LEMAIRE in *Ill. Hort.* III (1856) t. 107. C. MÆRLOSII Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* 223.

— — var. **umbilicata** PLANCHON in *Fl. des Serres* V (1849) t. 510-12. PYRUS UMBILICATA Hort. CHENOMELES JAPONICA Lindley var. UMBILICATA Siebold et De Vriese, *Jaarb. K. Ned. Maatsch. Tuinb.* (1848) cum iconc.

21. PYRUS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 408 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2074. — Environ 50 esp. des rég. temp. de l'hémisphère bor. et des mont. de l'Inde.

**P. Americana** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 637 ; Loudon, *Arboret. Brit.* III t. 184 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 79 t. 171 et 172. Sorbus — Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1809) 520. — Amérique bor.  $\frac{1}{2}$

**P. baccata** Linné, *Mant. Pl.* (1767) 75 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 10 ; *Bot. Mag.* t. 6112 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 373. — De la Sibérie et de l'Himalaya à la Mandchourie.  $\frac{1}{2}$

<sup>1</sup> La façon de comprendre les genres et les espèces des Pomacées varie beaucoup suivant les auteurs. Pour plus de détails nous renvoyons surtout aux travaux suivants : Decaisne, *Mémoire sur la famille des Pomacées* in *Nouv. Annales du Muséum.* X 114-191 ; T. Wenzig in *Linnaea* XLIII (1880-82) 67 et in *Jahrb. d. königl. Bot. Gart. Berlin*, II (1883) 287.

- Pyrus coronaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 480 ; *Bot. Mag.* t. 2009 ; *Bot. Reg.* VIII t. 651 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 240 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 17 t. 167. — Canada, États-Unis.  $\frac{1}{2}$
- P. domestica** Smith, *Engl. Bot.* (1796) t. 550. SORBUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 477 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 447 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, III t. 34. — Europe mér., Afrique bor., Grèce, Tauride ; aill. natur.  $\frac{1}{2}$
- P. edulis** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 527 ; C. Koch, *Dendrol.* 195 ; Guimpel, Otto et Hayne, *Abbild. Fremd. Holz.* t. 80 ; Watson, *Dendrol. Brit.* I t. 52. — Patrie inconnue. Himalaya ?
- P. Malus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 479 ; *Fl. Dan.* VII t. 1101 ; *Engl. Bot.* III t. 179 ; Boissier, *Fl. Or.* II 656. MALUS COMMUNIS Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* (1793) t. 435. — Toute l'Europe (à l'except. de la Scandinavie et de la Russie bor.), Asie Min., Caucase, Perse, Inde bor.-occ.  $\frac{1}{2}$
- — var. **tomentosa** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III (1837) 204. MALUS ARME-  
NIACEFOLIA Hort.
- P. nivalis** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II (1774) t. 107 ; *Bot. Reg.* XVIII t. 1484. P. SALVIEFOLIA De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 634 ; *Bot. Reg.* XVIII t. 1482. — Autriche, Hongrie, Transylvanie, Croatie, Asie Min.  $\frac{1}{2}$
- Obs. D'après NYMAN, ce n'est peut être qu'une forme cultivée du P. ELÆAGNI-  
FOLIA Pallas, originaire de la Tauride.
- P. Pashia** Hamilton in D. DON, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 236 ; Decaisne, *Jard. fruit. Muséum* (Le Poirier) t. 7 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 374. P. VERRUCULOSA Bertoloni, *Piant. Nuov. Asiat.* II 10 t. 2. — Himalaya, Ava, Yunnan.  $\frac{1}{2}$
- P. pumila** C. Koch, *Dendrol.* I (1869) 203. MALUS — Miller, *Gard. Dict.* ed. VII (1759) n. 4. PYRUS SIEVERSH, Ledebour, *Fl. Alt.* II (1830) 222 et *Fl. Ross.* II 97. — Russie mér.-or., Caucase, Altaï, Turkestan.  $\frac{1}{2}$
- P. spectabilis** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 175 ; *Bot. Mag.* t. 267 ; *Bot. Cab.* t. 1729. P. FLORIBUNDA Lindley, *Bot. Reg.* XIII (1826) t. 1006. MALUS — Siebold in *Fl. des Serres* XV (1865) 161 t. 1885-89. PYRUS RIVERSH Sieb. ex C. Koch, *Dendrol.* I (1869) 209. — Chine.  $\frac{1}{2}$
- P. spuria** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 637. SORBUS — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 38. — Patrie inconnue.
- P. Toringo** Siebold, *Cat. rais. pl. Japon et Chine* (1863) 4 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 139. P. SIEBOLDII Regel in *Gartenflora* VIII (1889) 52. MALUS — Carrière in *Rev. Hort.* (1872) 210 fig. 25. — Japon.  $\frac{1}{2}$
- — var. **incisa** FRANCHET et SAVATIER, *loc. cit.* I (1875) 139. MALUS RINGO Siebold, *Catal. rais. plantes Japon et Chine* (1863) 5. PYRUS — Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* I 213.
- P. trilobata** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 636. CRATÆGUS — Labillardière, *Decad. Pl. Syr.* IV (1812) t. 10. SORBUS — Boissier, *Fl. Or.* II (1872) 657. — Syrie.  $\frac{1}{2}$

**Pyrus vestita Wallich**, *Catal.* (1829) n. 679 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 373. **P. CRENATA** Lindley (non Don) in *Bot. Reg.* (1834) t. 1633 ; Wenzig in *Linnaea* XXXVIII (1874) 60. — Himalaya temp.  $\frac{1}{2}$

22. **MESPILUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 407 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2075. — Genre ne comprenant que 1 ou 2 esp. originaires de l'Europe occ., centr., mér. et or. et de l'Asie occ.

**M. Germanica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 478 ; C. Koch, *Dendrol.* I 129 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. XIII fig. 4 ; Boissier, *Fl. Or.* II 659. — Europe occ., centr., mér. et or., Caucase, Perse.  $\frac{1}{2}$

23. **CRATÆGUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 404 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2076. — Genre d'environ 60 esp. habitant les rég. temp. de l'hémisphère bor.

**C. cordata** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 168 ; *Bot. Reg.* XIV t. 1151 ; Loudon, *Arboret. Brit.* II t. 137 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 107 t. 186. **C. POPULIFOLIA** Walter, *Fl. Carol.* (1788) 147. — De la Virginie à la Georgie.  $\frac{1}{2}$

**C. Douglasii** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1833) t. 1810 ; Loudon, *Arboret. Brit.* III 823 t. 134 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 86 t. 175. — Californie.  $\frac{1}{2}$

**C. Orientalis** Pallas ex MARSHALL BIEBERSTEIN, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 387 ; *Bot. Reg.* XII t. 1852 ; Boissier, *Fl. Or.* II 660. — Macédoine, Asie Min.  $\frac{1}{2}$

**C. Oxyacantha** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 477 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 292 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 132 ; Boissier, *Fl. Or.* II 664. — Europe (Scandinavie et Russie bor. except.), Caucase, Sibérie, Afrique bor.  $\frac{1}{2}$

**C. pinnatifida** Bunge, *Enum. Pl. Chin.* (1831) 26 ; *Gartenflora* (1862) t. 366 ; *Gardener's Chron.* sér. 2, XXVI 620 fig. 121. — Chine, Corée, Mandchourie.  $\frac{1}{2}$

**C. punctata** Jacquin, *Hort. Vindob.* I (1770) 10 t. 28 ; Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II 169 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 103 t. 184 ; Loudon, *Arboret. Brit.* II 818 t. 123. **MESPILUS** — Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et des Arbust.* 2<sup>e</sup> ed., IV (1809) 152. — Canada, États-Unis or.  $\frac{1}{2}$

**C. Pyracantha** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 37 ; Boissier, *Fl. Or.* II 665. **MESPILUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 478 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 13. **COTONEASTER** — Spach, *Hist. Veg. Phan.* II (1834) 73. — France mér., Italie, Grèce, Caucase, Asie Min.  $\frac{1}{4}$

**C. tomentosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 478 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 466 ; A. Gray, *Manual Bot. N. Unit. States* ed. VI 466 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 101 t. 183. — États-Unis or.  $\frac{1}{2}$

24. **COTONEASTER** Medicus, *Philos. Bot.* I (1789) 155 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2077. — Genre de 18 esp. environ, habitant les rég. temp. de l'hémisphère bor., l'Inde et le Mexique.

**C. buxifolia** Wallich, *Catal.* (1829) n. 661 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* III t. 992 ; Payer, *Organog.* t. 102. **C. LANATA** Hort. ex Regel in *Gartenflora* IX (1860) 59 ; C. Koch, *Dendrol.* I 177. — Himalaya, Nilghiri.  $\frac{1}{2}$

**C. microphylla** Wallich, *Catal.* (1829) n. 661 ; *Bot. Cab.* t. 1374 ; *Bot. Reg.* XIII t. 1114 ; C. Koch, *Dendrol.* I 177. — Himalaya temp., Chine.  $\frac{1}{2}$

**C. rotundifolia** Wallich, *Catal.* (1829) n. 663 ; Saunders, *Refug. Bot.* I t. 54 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 386. **C. MICROPHYLLA** Wallich var. **Uva Ursi** Lindley in *Bot. Reg.* XIV (1828) t. 1187. — Nepaul.

25. **PHOTINIA** Lindley in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1821) 103, t. 10 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2077. — Genre de 30 esp. originaires de l'Inde, de la Chine, du Japon et de la Californie.

**P. Japonica** Franchet et Savatier, *Enum. Fl. Jap.* I (1875) 142. **MESPILUS** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 226 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, IV t. 38. **ERIOBOTRYA** — Lindley in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1821) 102 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I t. 97. — Japon, Chine.  $\frac{1}{2}$

26. **AMELANCHIER** Lindley in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1821) 100 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2085. — 4 esp. de l'Europe, de l'Asie Min., du Japon et de l'Amérique bor.

**A. alnifolia** Nuttall in *Journ. Acad. Philad.* VII (1834) 22 ; Wenzig in *Linnaea* XXXVIII (1874) 113 ; Decaisne in *Nouv. Annal. Mus.* X 135 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 131 t. 196. **ARONIA** — Nuttall, *Gen. N.-Amer. Pl.* I (1818) 306. **PYRUS** — Sprengel, *Syst. Veg.* II (1825) 509. **AMELANCHIER FLORIDA** Lindley in *Bot. Reg.* XIX (1833) t. 1589.

**A. Canadensis** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 473 ; Sargent, *Sylva N.-Amer.* IV 127 t. 194. **MESPILUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 478. **A. BOTRYAPIUM** Lindley in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1821) 100 ; — Canada, États-Unis or.  $\frac{1}{2}$

— var. **oblongifolia** TORREY et GRAY, *loc. cit.* **A. ovalis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II (1825) 682.

## XXVIII. SAXIFRAGÉES

1. **ASTILBE** Hamilton in D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 210 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2089. — 6 esp. de l'Himalaya, de Java, du Japon et de l'Amérique bor.-or.

**A. decandra** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 211. *TIARELLA BITERNATA* Ventenat, *Jard. Malm.* I (1803) t. 54 ; *Annal. Sc. Natur.* sér. 2, II t. 11 fig. 11 et 12. — Caroline, Georgie. 2

**A. rubra** Hooker f. et Thomson in *Bot. Mag.* (1857) t. 4959 ; *Fl. des Serres* (1857) t. 1207 ; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 389. — Khasia.

**A. Thunbergii** Miquel, *Prol. Fl. Jap.* (1865-67) 260 et in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* III (1867) 96 ; *Icon. Jap.* : *So mokou Zousetsu* X fol. 16 verso (sub TORI ASHI) ; *Phouzo Zoufou* VII fol. 22 verso 23 (id.). — Japon, Chine.

2. **SAXIFRAGA** Linné<sup>1</sup>, *Gen. Pl.* (1737) n. 368 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2092. — Genre de 200 esp. environ, originaires des rég. temp. et arctiq. de l'hémisphère bor. et des Andes.

**S. aizoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 403 ; *Fl. Dan.* t. 72 ; *Engl. Bot.* t. 39 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 233. — Europe bor., Pyrénées, Alpes, Carpathes, Asie (Oural), Amérique bor. 2

**S. Aizoon** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V (1778) 438 t. 438 ; *Engl. Bot.* I t. 39 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* I t. 7 ; Boissier, *Fl. Or.* II 800 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III, 230. **S. COTYLEDON** Linné var.  $\varepsilon$  Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 523 — Europe bor., centr., mér. et or., Amérique bor., Asie Min. 2

— — forma **brevifolia** ENGLER, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 244. **S. STABIANA** Tenore, *Syll. Fl. Neapol.* (1831) 201. — Italie mér.

**S. ajugæfolia** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1753) 271 ; La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* t. 31 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 648 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 116. — Pyrénées. 2

**S. altissima** Kerner, *Nov. Pl. Spec. Dec.* I in *Zeitsch. Ferdinandeums f. Tyrol* XV (1870) 273 t. 1 fig. VIII ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 240. — Styrie 2

**S. Andrewsii** Harvey in HOOKER, *Lond. Journ. of Bot.* VII (1848) 570. Engler (*loc. cit.* 252) considère ce Saxifrage comme étant un **S. GEUM**  $\times$  **AIZOON**. Il a été observé dans les jardins botaniques de Breslau et de Berlin.

<sup>1</sup> Engler, *Monographie der Gattung Saxifraga* (1872) in-8°, 292 pages.

- Saxifraga aphylla** Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 40 t. 11<sup>b</sup> fig. 3 ; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* 24 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 201. **S. STENOPEOTALA** Gaudin in *Meisner Anz.* (1818) 70. — Alpes de la Suisse et de l'Autriche. ♀
- S. aquatica** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) 53 t. 28 et 29 ; Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* t. 18 fig. 3 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 19. — Pyrénées, Corse. ♀
- S. aretioides** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) 28 t. 13 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 656 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 108. — Pyrénées occ. et centr., Alpes de Savoie. ♀
- S. aspera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 402 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 31 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 8 fig. 1. — Espagne, Pyrénées, Auvergne ?, Alpes, Apennins, Banat. ♀
- S. biflora** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 71 t. 21 fig. 1. **S. ROSEA** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) t. 17. — Europe centr. (du Dauphiné à la Transylvanie), Piémont. ♀
- S. biternata** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 689 t. 64<sup>a</sup> ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 121. — Espagne mér. ♀
- S. Boryi** Boissier et Heldreich, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, II (1856) 65 ; *Fl. Or.* II 801. — Laconie. ♀
- S. bronchialis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 404 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* IV 164 t. 65 fig. 2 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 10 fig. a b. — Sibérie, Daourie, Kamtchatka, Amérique bor., N.-Mexique.
- — var. **cherlerioides** Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 216. **S. CHERLERIODES** D. Don in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1822) 382. **S. STELLERIANA** Merck mss. ex Regel in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 49. — Sibérie or., Kamtchatka, Amérique arct.
- S. bryoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 400 ; Scopoli, *Fl. Carn.* I t. 15 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 8 fig. 2. — Pyrénées, Auvergne, Alpes Sudètes, Carpathes.
- S. Burseriana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 400 ; Wulfen in Jacquin, *Miscell. Bot.* I t. 17 fig. 3 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 10<sup>b</sup> fig. 1, 2, 3. — Europe centr. (du Tyrol à la Transylvanie), Lombardie.
- S. caesia** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 571 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* IV t. 374 ; *Bot. Cab.* t. 421 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 231. — Pyrénées, Alpes, Apennins, Carpathes. ♀
- S. canaliculata** Boissier et Reuter mss. ex Engl. *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 169. — Espagne. ♀
- S. capitata** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) 53 t. 30 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 648 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 117. **S. AJUGEFOLIA** × **AQUATICA** Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 203. — Pyrénées.

**Saxifraga Carpathica** Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830-32) 552.  
S. SIBIRICA Wahlenberg, *Fl. Carpat.* (1814) 121. — Carpathes.

**S. cartilaginea** Willdenow in Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 5 t. 3<sup>e</sup> ;  
Boissier, *Fl. Or.* II 800. CHONDROSEA — Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821)  
12. S. KOLENATIANA Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 39. — Caucase,  
Arménie.

— Obs. Engler (*loc. cit.* 216) considère ce Saxifrage comme une variété du  
S. AIZOON Jacquin.

**S. cernua** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 403 ; *Fl. Dan.* t. 22 ; *Engl. Bot.*  
t. 664 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 390. — Hautes montagnes et régions arct.  
de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

**S. conifera** Cosson et Durieu in Bourgeau, *Pl. d'Esp.* (1864) n. 2727 et in  
*Bull. Soc. Bot. Fr.* XI (1864) 332 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 192 ;  
Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 114. — Espagne. 2

**S. cordifolia** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 157 ; De Candolle, *Prodr.*  
*Regn. Veget.* IV 38. MEGASEA — Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 7. —  
Sibérie.

— Obs. Ledebour, *Fl. Ross.* II 215, le réunit au S. CRASSIFOLIA Linné.

**S. Cossoniana** Boissier et Reuter in Boissier, *Diagn. Pl. Or. Nov.* ser. 2, II  
(1856) 70 ; Willkomm et Lange, *Consp. Fl. Hisp.* III, 119. — Espagne or. 2

**S. Cotyledon** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 398 ; *Fl. Dan.* t. 41 ; *Fl. des*  
*Serres* XIV t. 1443 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 446. S. PYRAMIDALIS La  
Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) 32 et *Hist. abrég. Pyrén.* 225. — Pyrè-  
nées, Alpes, Laponie, Norvège, Islande. — 2

**S. crassifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 573 ; *Bot. Mag.* t. 196 ; De Can-  
dolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 37 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 214. MEGASEA —  
Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 6. — Sibérie altaïque, Daourie.

**S. crustata** Vest in *Bot. Zeit.* (1805) 42 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 239 ;  
Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* t. 238. — Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol. 2

**S. cuneata** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 658. S. CUNEIFOLIA Cavanilles (non  
Linné), *Icon. et Descr. Pl.* III (1794) 25 t. 248. — Espagne.

**S. cuneifolia** L., *Sp. Pl.* ed. II (1763) 574 ; Scopoli, *Fl. Carniol.* I t. 13 ;  
Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* I t. 44. S. MULTICAULIS  
Lange in *Ind. Sem. Hort. Hamb.* (1863) 4. — Hautes montagnes de l'Eu-  
rope mér. et centr.

**S. cuscuteiformis** Loddiges in *Bot. Cab.* II (1818) t. 186 ; *Bot. Mag.*  
t. 2631. — Japon ?.

**S. Daourica** Pallas, *Reise Prov. Russ. Reiche* III app. (1776) 647 t. XXXIII  
fig. 1 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II 13 t. 5. — Daourie, Kamtchatka,  
Amérique arct. 2

**Saxifraga diapensioides** **Bellardi** in *Act. Acad. Taurin.* V (1890-91) 227 t. 5 et *Append. ad Fl. Pedem.* 21 t. 3. — Alpes de la France, de la Suisse et du Trentin. ♀

**S. diversifolia** **Wallich**, *Catal.* (1829) n. 452 et in Sternberg, *Saxifr.* suppl. II t. 22 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 125 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 393 ; *Bot. Mag.* t. 6603. — Himalaya.

**S. erioblasta** **Boissier** et **Reuter** in Boissier, *Diagn. Pl. Or. Nov.* ser. 2, II (1856) 67 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 115. — Espagne (Grenade). ♀

— Obs. Engler (*loc. cit.* 193) en fait une variété du *S. SPATHULATA* Desfontaines.

**S. erosa** **Pursh**, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 311 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 150. — Virginie, Caroline, Pensylvanie, monts Alleghanis.

**S. exarata** **Villars**, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 674 t. 45. *S. HYPNOIDES* Allioni (non L.), *Fl. Pedem.* II (1785) 72 t. 21 fig. 4 ; t. 88 fig. 2 ; Boissier, *Fl. Or.* II 805. — Auvergne, Alpes, Pyrén., Carpathes, Italie bor. et méd., Grèce, Asie Min., Caucase. ♀

— — **intricata** **Engler**, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 180 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 111. *S. INTRICATA* La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795-1801) 179 t. 33. — Pyrénées.

**S. flagellaris** **Willdenow** in Sternberg, *Revis. Saxifr.* 25 t. 6 ; Ledebour, *Icon. Pl. Ross.* t. 321 ; Boissier, *Fl. Or.* II 809 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II, 397. *S. ASPERA* Marschall Bieberstein, *Fl. Taur. Cauc.* I (1808) 314. — Europe arct. et Asie, Caucase, Tibet, Himalaya, Montagnes-Rocheuses.

**S. florulenta** **Moretti**, *Tent. ill. Sinon. Gen. Saxifr.* (1823) 9 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 248 ; Bertoloni, *Misc. Bot.* XXI fig. 2 et in *Mem. Acad. Bon.* (1861) t. 12. — Alpes maritimes. ♀

**S. Fortunei** **Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1863) t. 5377 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 155. — Connu seulement en culture. (Engler, *loc. cit.*)

**S. Friderici Augusti** **Biasoletto**, *Viagg. per l'Istr., Dalm. e Monten.* (1841) 199 t. β 1. *S. OLYMPICA* Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV (1823) t. 376. — Europe or. (de la Dalmatie à la Thrace et l'Eubée), Asie Min. (Pont).

— Obs. Boissier (*Fl. Or.* II 802) le rapporte comme synonyme au *S. POROPHYLLA* Bertoloni.

**S. geranioides** **Linné**, *Amæn. Acad.* IV (1759) 271 ; Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* t. 18 fig. 2 ; La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* t. 43 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II (1831) t. 19 fig. 6, 7. *S. PALMATA* La Peyrouse, *Hist. abrég. Pyrén.* 236. — Pyrénées, Monts d'Auvergne ?.

**S. Geum** **Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 401 ; *Engl. Bot.* t. 2893 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 628. — Pyrénées cantabres, Aragon, Navarre, Irlande mér.-occ. ; ailleurs introd. ♀



**Saxifraga Gibraltarica** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 47; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 114. — Gibraltar. ♀

— Obs. M. Engler (*loc. cit.* 194) en fait une variété du *S. GLOBULIFERA* Desfontaines.

**S. globulifera** Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 342 t. 96 fig. 1; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* II 230. *S. GRANATENSIS* Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 46; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 113. — Espagne mér., Algérie. ♀

— — var. **Oranensis** ENGLER, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 194. *S. ORANENSIS* Munby in *Bull. Soc. Bot. Fr.* II (1855) 284. — Algérie.

**S. granulata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 403; *Fl. Dan.* t. 514; *Engl. Bot.* III t. 500; Dietrich, *Fl. Boruss.* IV t. 243. — Europe, Algérie. ♀

**S. hieracifolia** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* I (1802) 17 t. 18. *MICRANTHES* — Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 45. — Carpathes, Norvège, Russie bor., Spitzberg, Sibérie or., Amérique arct.

**S. Hirculus** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 402; *Fl. Dan.* t. 200; Gmelin, *Fl. Sibir.* t. 65 fig. 3; *Engl. Bot.* t. 1009; Boissier, *Fl. Or.* II 808. — Europe bor. et centr., Caucase, Tibet, Himalaya, Sibérie, Amérique arct. ♀

**S. Hohenwartii** Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 20; Host, *Fl. Austr.* I 506; Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 36. *S. SEDOIDES* Linné, var. *HOHENWARTH* Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 200. — Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol.

**S. Hostii** Tausch, *Syll. Soc. Ratisb.* II (1828) 240; Kerner, *Nov. Pl. Spec. Decad.* I t. 1. *S. LONGIFOLIA* La Peyrouse, var.  $\beta$  *MEDIA* Sternberg, *Revis. Saxifr.* I (1810) 1 t. 1<sup>a</sup>. *S. ELATIOR* Mertens et Koch, *Deutschl. Fl.* VII (1831) 115. — Apennins, Alpes marit., Tyrol, Vénétie, Carniole, Carinthie.

— — var. **rhætica** ENGLER, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 240. *S. RHÆTICA* Kerner mss. ex Engler, *loc. cit.* — Autriche occ.

**S. hypnoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 405; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 45; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 190; Villars, *Hist. Pl. Dauph.* IV t. 45. — Portugal, Espagne, France mér.-or. (Indiqué aussi en Islande, en Irlande et dans le nord de l'Angleterre.)

**S. imbricata** Royle, *Illustr. of Himal. Pl.* (1839) 226 t. 49 fig. 1; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 204; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 394. — Himalaya et Tibet occ. ♀

**S. integrifolia** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 249 t. 86; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 149. — Montagnes Rocheuses, Orégon, Californie.

**S. irrigua** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 460 et *Icon. Pl. Ross.*, cent. I t. 73; *Bot. Mag.* t. 2207; Boissier, *Fl. Or.* II 806. — Chersonèse taurique, Caucase. ♀

- Saxifraga Jacquemontiana** Decaisne in JACQUEMONT, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 68 t. 78 fig. 2; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* II 393. — Cachemire, Sikkim, Kumaon. 2
- S. Kotschyi** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, II (1856) 63 et *Fl. Or.* II 804; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 259; *Bot. Mag.* t. 6063. — Asie occ. (Taurus, Arménie). 2
- S. latepetiolata** Willkomm in WILLKOMM et LANGE, *Prodr. Fl. Hisp.* III (1880) 120. — Espagne mérid. (Valence). 2
- S. latiflora** Hooker f. et Thomson in *Journ. Linn. Soc.* II (1852) 71; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 122; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 392. — Himalaya or. 2
- S. Laurentiana** Seringe in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 33; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I 243. **S. rivularis** Linné, var. **LAURENTIANA** Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 77. — Ile du Saint-Laurent, détroit de Behring, Unalashka. 2
- S. lingulata** Bellardi in *Act. Acad. Taur.* V (1790-91) 226; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 235; Moris, *Fl. Sardo* t. 74. — Provence, Alpes marit., Italie, Sardaigne, Sicile.
- — var. **Lantosca** ENGLER, *loc. cit.* (1872) 237. **S. LANTOSCA** Boissier et Reuter in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, II (1856) 63. — Alpes marit.
- — var. **Catalaunica** ENGLER, *loc. cit.* (1872) 237. **S. CATALAUNICA** Boissier et Reuter, *loc. cit.* (1856) 64. — Catalogne.
- — var. **Australis** ENGLER, *loc. cit.* (1872) 237. **S. AUSTRALIS** Moricand, *Fl. Veneta* append. (1820) 431. **S. LINGULATA** Bellardi, var. **CLARIONI** Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II (1831) 33 t. 17 fig. 1. — Naples.
- — var. **cochlearis** ENGLER, *loc. cit.* (1872) 237. **S. COCHLEARIS** Reichenbach, *Fl. Excurs.* 559. — Alpes marit. 2
- S. longifolia** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) 26 t. 11; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 234; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 107. **CHONDROSEA** — Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 11. — Pyrénées; Aragon.
- S. luteo-viridis** Schott et Kotschy in *Öst. Bot. Zeitschr.* (1851) 63; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 258. — Transylvanie.
- S. Lyallii** Engler, *Ind. Saxifr.* in *Verh. d. Zool.-Bot. Gesellsch.* (1869) 542 et in *Monog. Gatt. Saxifr.* 141. **S. DAHERICA** Lyall in *Herb. Kew.* ex Engler, *loc. cit.* — Montagnes Rocheuses (Fort Colville).
- S. marginata** Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. I (1822) 1 t. 1 fig. 1; Tenore, *Fl. Napolit.* t. 234. — Italie mér., Grèce. 2
- S. Maweana** Baker in *Gard. Chron.* (1871) 1355 cum. icone; Ball, *Spicil. Fl. Marocc.* 448; *Bot. Mag.* t. 6384. — Maroc. 2

**Saxifraga media** Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 27; Lamarck, *Pl. Encycl. Bot.* t. 378 fig. 6; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 108. S. CALYCIFLORA La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) 28. — Pyrénées. ♀

**S. Mertensiana** Bongard, *Observ. sur Végét. Ile Sitcha* in *Mém. Acad. Sc. St-Petersb.* sér. 6, II (1833) 141; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 139. S. HETERANTHA Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1834) 252. — Amérique bor., Sitcha, Montagnes Rocheuses, Californie. ♀

**S. mixta** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) 41 t. 20 et *Hist. abrég. Pyrén.* 228 et 636; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 110; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 181. S. PUBESCENS De Candolle, *Fl. Fr.* IV (1805) 375. — Pyrénées orientales.

— — var. **Iradiana** ENGLER, *loc. cit.* (1872) 182. S. IRADIANA F. Schultz in *Fl. Gall. et Germ. Exsicc.* (1849) n. 1754 et in *Arch. Fl. Fr. et Allem.* (1850) 176; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 109. S. GRÆNLANDICA La Peyrouse, *loc. cit.* (1795) 39 t. 19. — Pyrénées centr. et or., Catalogne, Aragon. ♀

**S. moschata** Wulfen in JACQUIN *Miscell. Austr.* II (1781) 128 t. 21 fig. 2. S. CESPITOSA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 404 p. 1<sup>re</sup>; La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* t. 37 et 38. S. MUSCOSA Suter, *Fl. Helv.* I (1802) 251. — Pyrénées, Jura, Alpes, Apennins, Carpathes.

— — var. **atropurpurea** STERNBERG in Sturm, *Revis. Saxifr.* (1810) 41; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 176. S. ATROPURPUREA Sternberg in Sturm, *Deutschl. Fl.* IX 33, t. 35. S. PORPHYRANTHA Hort. Gætt. ex Engler *loc. cit.* (1872) 176. — Suisse, Tyrol, Carniole.

**S. muscoides** Wulfen in JACQUIN, *Miscell. Austr.* II (1781) 123; Boissier, *Fl. Or.* II 805. S. CESPITOSA Scopoli (non Linné), *Fl. Carniol.* (1760) t. 14; Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II 460. — France, Espagne bor., Italie bor. et méd., Alpes, bassin du Danube, Arménie, Caucase. ♀

**S. mutata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 570; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III t. 466; *Bot. Mag.* t. 351. CHONDROSEA — Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 13. — Europe centr. (du Dauphiné à la Transylvanie). Italie bor. ♀

**S. nervosa** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) 63 t. 39; *Hist. Abrég. Pyrén.* 235; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 52. S. WILLKOMMIANA Boissier niss. ex Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 180. — Pyrénées orient. et centrales. Espagne. ♀

— Obs. Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 113 font du S. WILLKOMMIANA Boissier, une var. LEPTOPHYLLA du S. CAMPOSI Boissier et Reuter.

**S. nivalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 401 et *Fl. Lappon.* t. 2 fig. 5; *Fl. Dan.* t. 28 fig. 12; *Engl. Bot.* VII t. 440; Bentham, *Handb. Brit. Fl.* t. 381. — Europe boréale et centr. (Riesengebirge), Asie et Amérique bor. ♀

**S. obscura** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I (1848) 646; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 169. S. MIXTA La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) t. 21 ? — Pyrénées orientales.

- Saxifraga Olympica** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, III (1843) 19 et *Fl. Or.* II 810. *S. ROTUNDIFOLIA* Linné, var. *OLYMPICA* Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 117. — Grèce (Parnasse, Olympe de Thessalie). ♀
- S. oppositifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 402 et *Fl. Lappon.* 179 t. 2 fig. 1 ; *Fl. Dan.* t. 34 ; *Engl. Bot.* I t. 9 ; *Bot. Cab.* t. 869. — Europe arct. et mont., Asie et Amérique arct. ♀
- S. patens** Gaudin, *Fl. Helv.* III (1828) 92 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II 49. *S. CÆSIA* Linné, var. *PATENS* Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 22. *CHONDROSEA PATENS* Haworth, *Saxifr. Enum.* (1821) 14. *S. CÆSIA* × *AIZOIDES* Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 274. — Suisse (Valais).
- S. pedatifida** Ehrhart, *Pl. Select.* n. 15 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 164. *S. LADANIFERA* La Peyrouse, var.  $\beta$  *PEDATIFIDA* Duby, *Bot. Gall.* I (1828) 210. — France mér.-or. ♀
- S. Pedemontana** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 73 t. 2 fig. 5, 6 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 162. *S. CYMOSA* Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* I (1802) 91 t. 88. — Suisse mér., Piémont, Ligurie.  
— — var. *cervicornis* Engler, *loc. cit.* (1872) 163. *S. CERVICORNIS* Viviani, *Prodr. Fl. Cors.* app. I (1825) et App. alt. 7. — Corse, Sardaigne.
- S. peltata** Torrey in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1848) 311 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 108. — Californie. ♀
- S. Pensylvanica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 399 ; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* II 39 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 149. — Canada, New-York, Pensylvanie, Virginie, Kentucky, Ohio. ♀
- S. pentadactylis** La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* (1795) 64 t. 44 et *Hist. Abrég. Pyrén.* 235 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 51 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 171 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 112. — Pyrénées or. ♀
- S. petræa** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 578 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II 88 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 82 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 238. *S. PONE* Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 47. — Lombardie, Tyrol, Carniole, Istrie, Croatie, Hongrie, Transylvanie, Bosnie, Serbie. ☉
- S. pseudo-sancta** Janka in *Æsterr. Bot. Zeitschr.* (1871) 25 et in Boissier, *Fl. Or.* II (1872) 804 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 272. — Monts Balkans.
- S. punctata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 401 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* IV 151 t. 65 fig. 1 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. I (1822) t. 5 fig. 1 ; suppl. II 7 t. 7 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 137. — Hautes montagnes de la Sibirie et de l'Amérique du Nord (partie bor.) et îles arctiques. ♀
- S. retusa** Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 28 t. 18 fig. 1 ; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 37 et *Suppl.* II 92 ; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 281. *S. PURPUREA* Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 71 t. 21 fig. 2. *S. BAUMGARTENI* Schott in *Æsterr. Bot. Zeitschr.* (1857) 126. *S. WULFENIANA* Schott, *loc. cit.* (1857) 125. — Dauphiné, Suisse, Piémont, Ligurie, Tyrol, Styrie, Carinthie, Hongrie, Transylvanie. ♀

- Saxifraga Reuteriana** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* add. (1815) 730; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 193; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 114. Espagne (Grenade). ʒ
- S. Rocheliana** Sternberg in Host, *Fl. Austr.* I (1827) 501 et in *Revis. Saxifr.* suppl. II 55 t. 11; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 261. S. PSEUDOCÆSIA Rochel, *Pl. Banat. Rar.* (1828) 35. — Banat, Transylvanie, Serbie. ʒ
- S. rotundifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 401; *Bot. Mag.* t. 424; Sturm, *Deutschl. Fl.* IX t. 33; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 113. — Pyrénées, Cévennes, Jura, Europe centr. et or., Caucase, Asie Min. ʒ
- — var. **glandulosa** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 336. S. LASIOPHYLLA Schott, *Analecta Bot.* (1854) 29. — Apennins, Istrie, Croatie, Roumélie.
- — var. **repanda** Engler, *loc. cit.* (1872) 115. S. REPANDA Willdenow in Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 17 t. 5. — Sicile, Calabre, Istrie, Banat, Caucase, Bithynie.
- S. sancta** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* I (1843) 333; Boissier, *Fl. Or.* II 803; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 271. — Macédoine.
- S. sedoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 404; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 27 t. 7 fig. 2<sup>ab</sup>. S. TRICHODES Scopoli, *Fl. Carniol.* (1760) 295 t. 15.
- S. Sibirica** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 577. S. GRANDIFLORA Sternberg, *Revis. Saxifr.* t. 12 fig. 4; t. 25 fig. 1 et *Suppl.* I t. 6; II 31; Boissier, *Fl. Or.* II 807; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 390. — Asie Min., Caucase, Sibérie, Tibet, Himalaya occ. ʒ
- S. Sibthorpii** Boissier et Sprunner in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 III (1843) 22 et *Fl. Or.* II 811. S. Cymbalaria Sibthorp et Smith (non Linné), *Fl. Græca* IV (1823) t. 378. — Grèce. ②
- S. spathulata** Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 342 t. 96 fig. 2; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* 231; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 192. — Algérie. ʒ
- S. squarrosa** Sieber in Tausch, *Syll. Soc. Ratisb.* II (1828) 241; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II 58 t. 17 fig. 2. S. CÆSIA Scopoli (non Linné), *Fl. Carniol.* I (1760) 294 t. 15. — Tyrol, Vénétie, Styrie, Carniole, Illyrie, Transylvanie, Galicie. ʒ
- S. stellaris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 400; *Fl. Dan.* t. 23; *Engl. Bot.* t. 167; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 131; Boissier, *Fl. Or.* II 809. — Europe bor. et centr., Espagne, Italie mér., Macédoine, Thrace, Sibérie, Amérique arct. ʒ
- S. Stracheyi** Hooker f. et Thomson in *Journ. Linn. Soc.* II (1858) 61; *Bot. Reg.* (1843) t. 63; *Bot. Mag.* t. 5967; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 398; Boissier, *Fl. Or.* suppl. 249. — Kumaon, Cachemire, Afghanistan. ʒ
- S. Taygetea** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 19 et *Fl. Or.* II 810. S. GEUM Sibthorp et Smith, *Fl. Græca Prodr.* I (1806) 276. S. ROTUNDIFOLIA Linné, var. TAYGETEA Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* (1872) 117. — Grèce. ʒ

- Saxifraga tenella** Wulfen in JACQUIN, *Collect. Bot.* III (1789) 144 t. 17; Don in *Trans. Linn. Soc.* XIII 377; Sternberg, *Revis. Saxifr.* 30; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 212. — Styrie, Carinthie, Illyrie, Tyrol. ♀
- S. Tolmiei** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* (1840) 567; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 195; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 129. — Amér. bor. (litt. bor.-occ.). ♀
- S. Tombeanensis** Boissier MISS. EX ENGLER, *Monog. Gatt. Saxifr.* 268. — Tyrol, Lombardie. ♀
- S. tricuspidata** Retz, *Prodr. Fl. Scand.* ed. II (1795) n. 522; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 47; *Fl. Dan.* t. 976; Rottbœll in *Act. Acad. Hafn.* X t. 6; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 217. — Amérique arctique, Montagnes Rocheuses. ♀
- S. trifurcata** Schrader, *Hort. Gœtt.* fasc. I (1809) 13 t. 7; *Bot. Mag.* t. 1651; Schrank, *Hort. Monac.* t. 92; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 170. **S. CERATOPHYLLA** Dryander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, III (1811) 70. — Espagne (Asturies, Monts Cantabres). ♀
- S. umbrosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 574; La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* 44 t. 22; *Engl. Bot.* t. 663 et 2891; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII fig. 841; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 125. — Portugal, Espagne, Irlande, Jura, Vosges.
- — var. **serratifolia** D. DON in *Trans. Linn. Soc.* XIII (1822) 352. **S. SERRATIFOLIA** Mackay in Reichenbach, *Plant. Crit.* VII (1829) 12 t. 845; Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. II (1831) t. 11. — Irlande.
- S. Valdensis** De Candolle, *Fl. Fr.* suppl. (1815) 501. **S. COMPACTA** Sternberg, *Revis. Saxifr.* suppl. I (1822) 9 t. 1; II t. 17 fig. 1; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 267. **S. CÆSIA** L. var. Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 642. — Piémont, Dauphiné.
- S. Vandellii** Sternberg, *Revis. Saxifr.* (1810) 34 excl. ic. et suppl. II (1822) 59 t. 26; Engler, *Monog. Gatt. Saxifr.* 269. **S. BURSERIANA** Linné var. Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 572. — Tyrol et Suisse mér., Lombardie. ♀
- S. Virginensis** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 269; Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I 310; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I 310. — Amérique bor.-occ. (de la Pensylvanie au Saskatchewan). ♀

### 3. HEUCHERA Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 196; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2102. — Genre de 20 esp. environ originaires de l'Amérique bor.

- H. Americana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 226; Gärtner, *De Fruct.* t. 36; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 184; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 58. — De la N.-Angleterre à la Caroline et au Missouri, St-Domingue?, Pérou? ♀
- H. cylindrica** Douglas in HOOKER, *Fl. Bor.-Amer.* I (1834) 236; *Bot. Reg.* XXIII t. 1924; Payson, *Organog.* t. 82. — Orégon, Californie. ♀

**Heuchera glabra** Willdenow ex Roemer et Schultes, *Syst. Veget.* VI (1829) 216 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* t. 79. H. *DIVARICATA* Fischer ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 51. — Asie et Amérique arctique, Kamtchatka. ♀

**H. hispida** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 188. H. *LUCIDA* Schlechtendal, *Ind. Sem. Hort. Hal.* (1848) 8. H. *RICHARDSONI* R. Brown in Richardson, *Append. Frankl. Journ.* (1823) 765 t. 29. — Montagnes Rocheuses, vallée du Missouri, Caroline, Virginie. ♀

**H. micrantha** Douglas in Lindley, *Bot. Reg.* XX (1830) t. 1302 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I 236 ; Seringe in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 667. États-Unis (bassin du fleuve Colombie, Orégon, Nootka). ♀

**H. rubescens** Torrey in Torrey, *Exped. to the Valley Great Salt Lake Utah (Stansbury's Report)* (1852) 388 t. 5 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 200 ; Walpers, *Annal.* V 29. — Utah, Californie, N.-Mexique, Mexique bor.

**H. sanguinea** Engelm., *Bot. Wislizenus's Exped.* (1848) 23 ; A. Gray, *Pl. Wright.* II 63 ; Walpers, *Annal.* III 897 ; *Bot. Mag.* t. 6929. — Arizona, N.-Mexique. ♀

**H. villosa** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 172. H. *PARVIFLORA* Bartling, *Ind. Sem. Hort. Götting.* 1838 ex *Linnaea* (1839) 96. H. *CAULESCENS* Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 188. — Canada, Maryland, Caroline, Virginie. ♀

4. **TOLMIEA** Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 582 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2103. — Genre monotype.

**T. Menziesii** Torrey et Gray, *loc. cit.* ; Baillon, *Hist. Fam. Pl.* III 334 f. 373. **HEUCHERA** — Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1834) 237 t. 80. **TIARELLA** — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 313. — Vallée de l'Orégon. ♀

5. **CHRYOSPLENIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 326 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2104. — Environ 50 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique temp.

**C. oppositifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 398, *Fl. Dan.* III t. 365 ; *Engl. Bot.* VII t. 429 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* IV t. 242. — Europe (Suède, Russie bor., Turquie, Grèce except.).

— — subsp. **rosulare** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 276. **C. ROSULARE** Schur, *Herb. Transylv.* n. 333. — Hongrie, Transylvanie.

6. **PARNASSIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 250 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2108. — Genre de 15 esp. originaires de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique bor. et de l'Inde.

**P. Caroliniana** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) p. 184 ; *Bot. Mag.* t. 1459 ; Maund, *Bot. Gard.* XII t. 550 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 149. — Du Canada à la Caroline et à la Floride, et, à l'ouest, au Mississipi. ♀

**Parnassia fimbriata** Banks in KÖENIG et SIMS, *Annals of Bot.* I (1803) 391 ; Hooker, *Bot. Miscell.* I 43 t. 23 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 150.  
— De la Californie et de l'Oregon à la Colombie anglaise. ♀

7. **FRANCOA** Cavanilles in Ann. Cienc. Nat. IV (1800) 227. —  
Genre de 1 ou 2 esp. originaires du Chili.

**F. rupestris** Poeppig, *Herb. Pl. Chil.* n. 127 ex KUNZE in *Flora* XIV, I (1831) 369. — Chili. ♀

8. **HYDRANGEA** Linné, *Gen. Pl.* ed. II (1742) n. 435 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2111. — Genre de 35 esp. environ de l'Asie mér. et or. et de l'Amérique.

**H. arborescens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 397 ; *Bot. Mag.* t. 437 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 119 ; K. Koch, *Dendrol.* I 351. — De la Pensylvanie à la Virginie et, à l'ouest, au Missouri. ♂

**H. Hortensia** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 15 ; *Bot. Mag.* t. 438 ; Siebold in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XIV, 2 (1829) 689 ; Savi, *Fl. Ital.* III t. 110. — Japon, Chine. ♂

— Obs. D'après Franchet, *Enum. Pl. Jap.* I 150, il faudrait adopter pour cette espèce le nom de *H. hortensis* Smith, *Icon. Pict. Pl. Rar.* I (1792) t. 12.

**H. robusta** Hooker f. et Thomsen in *Journ. Linn. Soc.* II (1858) 76 ; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 405. *H. cyanema* Nuttall in *Bot. Mag.* (1858) t. 5038. — Himalaya temp. or. ♂

**H. virens** Siebold in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XIV, 2 (1829) 690 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I 114 t. 60 ; Maximowicz, *Revis. Hydrang.* 6. **VIBURNUM** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 123. **H. scandens** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 660. — Japon. ♂

9. **DEUTZIA** Thunberg, *Dissert. Nov. Gen.* I (1781) 19 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2117. — 7 esp. de la Chine, de l'Himalaya et du Japon.

**D. gracilis** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1842) 22 t. 8 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 44 ; *Fl. des Serres* VI t. 611 ; Maximowicz, *Revis. Hydrang.* 28. — Japon. ♂

**D. scabra** Thunberg, *Dissert. Acad.* I (1799) 20 t. 1 ; *Bot. Mag.* t. 3838 ; *Bot. Reg.* XX t. 1718. **D. crenata** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1842) 19 t. 6 ; *Illustr. Hort.* VI (1864) t. 389. **D. fortunei** Carrière in *Rev. Hort.* (1866) 338. — Japon. ♂



10. PHILADELPHUS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 392 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2119. — Genre de 12 esp. de l'Europe centr., de l'Amérique bor., du Japon et de l'Himalaya.

**P. coronarius** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 470 ; *Bot. Mag.* t. 391 ; Lamark, *Pl. Bot. Encycl.* t. 420 ; Boissier, *Fl. Or.* II 814. — Europe mér., Orient, Himalaya, Chine, Japon.  $\mathfrak{h}$

— — var. **Satsumi** MAXIMOWICZ, *Revis. Hydrang.* (1867) 40. P. SATSUMI Paxton, *Fl. Gard.* II (1852) 203 t. 188. P. SATZUMANUS Siebold, *Cat. Rais. Pl. Jap. et Chine* (1863). — Japon.

**P. grandiflorus** Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* I (1809) 511 ; *Bot. Reg.* VII t. 570 ; Watson, *Dendrol. Brit.* I (1828) t. 46 ; Guimpel, Otto et Hayne, *Abbild. fremd. Holz.* t. 44 ; Loudon, *Arbor. Brit.* II 954 fig. 676. — De la Virginie à la Georgie.  $\mathfrak{h}$

11. CARDIANDRA Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 119 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2121. — Genre monotype.

**C. alternifolia** Siebold et Zuccarini, *loc. cit.* 121 t. 65 et 66 ; Regel in *Gartenflora* (1865) t. 486. H. ALTERNIFOLIA Siebold in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XIV 2, (1829) 692. — Japon, Chine (province de Kiangsi).  $\mathfrak{h}$

12. CARPENTERIA Torrey in Smithson. Contrib. VI (1853) 12 t. 7 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2125. — Genre monotype.

**C. Californica** Torrey, *loc. cit.* ; *Bot. Mag.* t. 6911 ; *Gard. Chron.* sér. 2, XXVI (1886) 115 fig. 22 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 203. — Californie.  $\mathfrak{h}$

13. ITEA Linné, *Gen. Pl.* ed. II (1742) n. 198 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2139. — 5 esp. de l'Amérique bor., de l'Asie or. et de l'Himalaya.

**I. Virginica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 199 ; *Bot. Mag.* t. 2409 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, VI t. 9. — Du New-Yersey et de la Pensylvanie à la Floride et à la Louisiane.  $\mathfrak{h}$

14. ANOPTERUS Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* I (1804) 85 t. 112. — 2 esp. de la Tasmanie et de l'Australie.

**A. glandulosa** Labillardière, *loc. cit.* 86 t. 112 ; *Bot. Mag.* t. 4377 ; Lamark, *Pl. Bot. Encycl.* t. 939. — Tasmanie.  $\mathfrak{h}$

15. **GEISSOIS** Labillardière, *Sertum Austro-Caledon.* (1825) 50 t. 50 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2151. — Genre de 4 esp. de la N.-Calédonie, des îles Viti et de l'Australie.

**G. racemosa** Labillardière, *loc. cit.* (1825) 50 t. 50 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 834. — N.-Calédonie.  $\frac{1}{2}$

16. **RIBES** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 195 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2168. — Genre de 75 esp. habitant l'Europe, l'Asie et l'Amérique temp. et les Andes de l'Amérique mér.

**R. multiflorum** Kitaibel in RÖMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* V (1819) 493 ; *Bot. Mag.* t. 2368 ; *Bot. Cab.* t. 1331 ; Boissier, *Fl. Or.* II 816. — Italie méd., Croatie, Dalmatie, Grèce, Chine, Mandchourie.  $\frac{1}{2}$

**R. petraeum** Wulfen in JACQUIN, *Miscell. Austr.* II (1781) 36 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 49 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 481 ; Boissier, *Fl. Or.* II 816. **R. CAUCASICUM** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 160. — Europe centr. et or., Italie bor., Caucase, Sibérie, Chine.  $\frac{1}{2}$

**R. sanguineum** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 164 ; *Bot. Mag.* t. 3335 ; *Bot. Reg.* XVI t. 1349 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 207. — De la Californie à la Colombie anglaise.  $\frac{1}{2}$

## XXIX. CRASSULACÉES

1. **CRASSULA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 255 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2176. — 1 esp. existe dans l'Himalaya, les autres esp. du genre au nombre de 129 habitent l'Afrique trop. et surtout l'Afrique austr.

**C. Abyssinica** A. Richard, *Tent. Fl. Abyss.* I (1847) t. 309 ; Walpers, *Anal. Bot.* II 667 ; Britten in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II 388. — Afrique trop. (de l'Angola à l'Abyssinie).  $\frac{1}{2}$

**C. alpestris** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 189 ; Thunberg, *Fl. Capens.* ed. Schultes (1823) 283 et in *Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* VI 336 t. 5<sup>b</sup> ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 341. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

**C. arborescens** Willdenow, *Sp. Pl.* I (1798) 1554 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 387 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 337. **COTYLEDON** — Miller, *Gard. Dict.* ed. VII (1759) n. 1. **CRASSULA COTYLEDON** Curtis in *Bot. Mag.* (1797) t. 384 ; Jacquin, *Miscell. Bot.* t. 19. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

**C. canescens** Schultes, *Syst. Veget.* VI (1820) 734 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 364. **GLOBULEA** — Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 61 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 391. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

- Crassula ciliata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 283; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 98; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 7; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 360. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. dejecta** Jacquin, *Hort. Schœnbr.* IV (1804) t. 433; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 343. CURTOGYNE — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 392. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. falcata** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 341; *Bot. Mag.* t. 2035; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 338. ROCHEA — De Candolle, *Pl. Grass.* (1799-1827) t. 103 et *Prodr. Regn. Veget.* III 393. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. filicaulis** Haworth in *Philos. Mag.* (1824) 188; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 384; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 366. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$  ou ② ?
- C. lactea** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 496; *Bot. Mag.* t. 1771; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 37; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 337. Afrique australe.  $\mathfrak{h}$
- C. lycopodioides** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 173; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 385; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 351. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. nemorosa** Ecklon et Zeyher (sub *Petrogetone*) in *Enum. Pl. Afric. Austr.* (1836) 292; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II (1862) 356. — Afrique austr.
- C. orbicularis** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 361; Dillenius, *Hort. Eltham.* 100 fig. 118; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 43 et *Prodr. Regn. Veget.* III 389; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 349. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. perfoliata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 283; Andrews, *Bot. Reposit.* X t. 656; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 338. ROCHEA — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 393 et *Pl. Grass.* t. 13. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. perforata** Linné f., *Sp. Pl.* (1781) 190; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 385; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 338. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. portulacea** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 172; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 79 et *Prodr. Regn. Veget.* III 383; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 367. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. punctata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 406; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 388; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 367. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. quadrifida** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* V. (1871) t. 298; *Gard. Chron.* (1873) 363. — Afrique austr.
- C. rosularis** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 13; *Bot. Mag.* t. 5393; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 339; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* 350. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- C. Schmidtii** Regel in *Gartenflora* XXXV (1886) 345 t. 1225. C. GRACILIS Haage et Schmidt ex Regel *loc. cit.* — Afrique austr.

**Crassula Septas Thunberg**, *Fl. Capens.* ed. Schultes (1823) 291 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 358. **SEPTAS CAPENSIS** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 489 ; Jacquin, *Fragm. Bot.* I t. 2 ; *Bot. Reposit.* II t. 90. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

**C. spathulata Thunberg**, *Prodr. Fl. Capens.* (1794) 58 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 386 et *Pl. Grass.* t. 49 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 348. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

**C. sulcata Harvey** in HARVEY et SONDER, *Fl. Capens.* II (1862) 365. **GLOBULEA** — Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 18 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 391. — Cap de Bonne-Espérance.  $\frac{z}{j}$

**C. tetragona Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 283 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 384 et *Pl. Grass.* t. 19 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 339. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

2. **ROCHEA** De Candolle, *Pl. Grass.* n. 405 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2178. — 4 esp. de l'Afrique austr.

**R. coccinea De Candolle**, *Pl. Grass.* t. 11 et *Prodr. Regn. Veget.* III 394 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 368. **CRASSULA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 292 ; *Bot. Mag.* t. 495 ; *Bot. Cab.* t. 486. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

**R. jasminea De Candolle**, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 395 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 369. **CRASSULA** — Sims in *Bot. Mag.* (1820) t. 2178 ; *Bot. Cab.* t. 1049. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

**R. odoratissima De Candolle**, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 394 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* III 369. **CRASSULA** — Andrews, *Bot. Reposit.* I (1798) t. 26 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV t. 434. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

3. **KALANCHOE** Adanson, *Fam. des Plantes* II (1763) 248 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2181. — 35 esp. ont été trouvées dans l'Asie et l'Afrique trop. et 1 au Brésil.

**K. rotundifolia Haworth** in *Philos. Mag.* (1825) 31 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 395 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 379. **CRASSULA** — Haworth, *loc. cit.* (1824) 88. — Afrique austr.  $\frac{h}{j}$

4. **COTYLEDON** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 382 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2182. — Genre de 75 esp. des parties chaudes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique et du Mexique.

**C. agavoides Baker** in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) t. 67. **ECHEVERIA** — Lemaire in *Illustr. Hort.* X (1863) miscell. 78 ; *Fl. des Serres* XIX (1873) 427 t. 2003 ; *Belg. Hort.* (1874) 156 cum ic. — Mexique.

**C. Aizoon Fenzl** (sub **Umbilico**), *Pugill. Pl. Nov. Syr.* (1842) n. 51 ; Boissier, *Fl. Or.* II 774. — Asie Mineure.  $\frac{z}{j}$

- Cotyledon bracteolata** Link, Klotzsch et Otto (sub *Echeveria*), *Icon. Pl. Rar.* II (1842) 68 t. 27; Walpers, *Report. Bot.* II 259. — Caracas. ♀
- C. caespitosa** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 180; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* I t. 69. *KALANCHOE* — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 401. *C. LINGUÆFORMIS* Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, III (1811) 109. — Californie, Mexique.
- C. chrysantha** Boissier (sub *Umbilico*), *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 15 et *Fl. Or.* II 773; Walpers, *Annal. Bot.* II 669. — Tauride, Cappadoce. ♀
- C. Cooperi** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) t. 72; *Gartenflora* XXV 87; *Gard. Chron.* sér. 2, II (1874) 167. — Afrique austr.
- C. coruscans** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 25; *Bot. Mag.* t. 2601; *Bot. Cab.* t. 1030; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 396; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 371. — Afrique austr. ♀
- C. crassifolia** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 123. — Afrique austr. ♀
- C. cristatus** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 123; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 399; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 376. — Afrique austr. ♀
- C. edulis** Brewer in BREWER et WATSON, *Bot. of Calif.* I (1880) 211. *SEDUM* — Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 560. — Californie.
- C. fascicularis** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 106; Burmann, *Rar. Afric. Plant. Dec.* V 41 t. 18; *Bot. Mag.* t. 5602; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 397; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* III 374. *C. TARDIFLORUM* Bonpland, *Descr. Pl. Malm.* t. 39. — Afrique austr. ♀
- C. fimbriata** Turczaninow, *Catal. Pl. Baical et Dahur.* (1838) n. 469; Hemsley et Forbes in *Journ. Linn. Soc.* XXIII 281. *UMBILICUS* — Turczaninow, *Fl. Baical.-Dahur.* I (1842-43) 432. — Chine, Mongolie, Daourie. ♀
- C. Funckii** H. de Smet (sub *Echeveria*), *Catal.* n. 9 (1876) 1. — Patrie? — Obs. Nous ne savons si cette plante a été décrite.
- C. gibbiflora** Moçino et Sessé ex DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 401. *Echeveria* — DE CANDOLLE, *loc. cit.* (1828) 401 et *Mém. Fam. Crassul.* t. 5; *Bot. Reg.* XV t. 1247; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 324. — Mexique. ♀
- — var. **grandis** HORT.; A. Van Geert, *Catal. Exposit. Gand* (1862).
- — var. **metallica** BAKER (ubi ?); Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXIV (1874) 153 t. 7.
- C. laxa** Benthham et Hooker ex BREWER et WATSON, *Bot. of Calif.* I (1880) 212; II 447. *Echeveria* — Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 292; Walpers, *Annal. Bot.* II 669. *C. CALIFORNICA* Baker in Saunders, *Refug. Bot.* I (1869) t. 70. — Californie.
- C. Libanotica** Labillardière, *Icon. Pl. Syr.* III (1809) 3 t. 1. *UMBILICUS* — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 399; Boissier, *Fl. Or.* II 772. — Syrie, Palestine. ♀

- Cotyledon Lieveni** Ledebour, *Fl. Altaïca* II (1829) 197 et *Icon. Fl. Ross.* t. 57. **UMBILICUS** — Ledebour, *Fl. Ross.* II (1844) 173 ; Boissier, *Fl. Or.* II 775. — Turkestan, Songarie, Sibérie oural. et altaïque, Perse. 2
- C. maculata** Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* I (1820) 5 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 398 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 378. — Afrique austr. 1
- C. mucronata** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) sub t. 55 n. 4. **Echeveria** — Schlechtendal in *Linnaea* XIII (1839) 411 et *Hort. Halens.* III 19 t. 10 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 259. — Mexique.
- C. nodulosa** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) t. 57. **Echeveria** **MIS-**  
**TICA** Hort de Smet. — Mexique.
- C. nuda** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) t. 56. — Mexique.
- C. Oregonensis** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII (1882) 373. — Orégon.
- C. pachyphytoides** L. de Smet (sub **Echeveria**), *Catal.* (1874). — Hybride des **PACHYPHYTUM BRACTEOSUM** et **Echeveria METALLICA**.
- C. papillaris** Thunberg, *Fl. Capens.* ed. Schultes (1823) 397 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 397 (excl. syn.) ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 372. — Afrique austr. 2
- C. Peacockii** Baker in *Gard. Chron.* sér. 2, II (1874) 256. **Echeveria** — Hort. E. **DESMETIANA** Ed. Morten in *Belg. Hort.* XXIV (1874) 159. — N.-Mexique.
- C. Peruviana** Meyen (sub **Echeveria**), *Beitr. Bot. Reise u. d. Erde* I (1843) 448 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 794. — Pérou.
- C. platyphylla** Schrenk (sub **Umbilico**), *Enum. Pl. Nov.* (1841) 71 ; Boissier, *Fl. Or.* II 773. **SEDUM RADICOSUM** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 45. — Perse bor., désert songaro-kirghisien. 2
- C. pubescens** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) sub t. 56 ; III t. 97. **Echeveria** — Schlechtendal in *Linnaea* XIII (1839) 411 et *Hort. Halens.* III (1853) 19 t. 9 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 250. — Mexique mér.
- C. pulverulenta** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* (1869) t. 66. **Echeveria** — Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 560. — États-Unis mér.-occ.
- C. ramosissima** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 25 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 395 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 372 ; *Bot. Mag.* t. 6417. — Afrique austr. 1
- C. reticulata** Thunberg, *Fl. Capens.* ed. Schultes (1823) 393 ; De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* III 398 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 376. — Afrique austr. 1

- Cotyledon retusa** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) sub t. 64. ECHEVERIA — Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* II (1847) 302 et in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 57; Paxton, *Flow. Gard.* t. 73; Walpers, *Annal. Bot.* I 323; III, 893. — Mexique.
- C. roseata** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) sub t. 55. ECHEVERIA ROSEA Lindley in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) t. 22. COURANTIA ECHEVERIOIDES Lemaire, *Jard. Fleur.* I (1851) miscell. 93 cum. ic. — Mexique.
- C. Scheideckeri** H. de Smet (sub *Echeveria*).  
— Obs. L'*Echeveria* qui a été mis dans le commerce et qui a figuré sous ce nom à l'Exposition horticole d'Anvers, en 1875, ne semble pas avoir été décrit.
- C. secunda** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* I (1869) sub t. 66. ECHEVERIA — Lindley in *Bot. Reg.* XXV (1839) miscell. n. 112; XXVI (1840) t. 57; Walpers, *Repert. Bot.* II 259. E. ROSACEA Linden et André in *Illustr. Hort.* (1873) 64 t. 124 ? — Mexique.
- C. Sempervivum** Marschall Bieberstein, *Beschr. Länd. Kasp. Meer* (1800) 176 append. n. 46 et *Fl. Taur.-Cauc.* I 351. UMBILICUS — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 399; Knowles et Westcott, *Fl. Cab.* t. 116; Boissier, *Fl. Or.* II 771. — Caucase, Perse bor. 2
- C. serrata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 429; Dillenius, *Hort. Eltham.* I t. 93; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 444. UMBILICUS — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 400; Boissier, *Fl. Or.* II 771. — Crète, îles de l'Archipel, Asie Min. 2
- C. spathulata** C. B. Clarke in HOOKER f., *Fl. Brit. Ind.* II (1878) 416. UMBILICUS — Hooker f. et Thomson in *Journ. Linn. Soc.* II (1858) 92. — Himalaya.  
— Obs. **C. spathulata** HORT. DELEUIL (sub *Echeveria*). La plante qui est dans le commerce sous ce nom ne semble pas avoir été décrite. Hybride des E. BRACTEOSA et GRANDIFLORA.
- C. spinosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 429; Murray, *Comm. Soc. Gætt.* VII 23 t. 5. UMBILICUS — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 400. — Sibérie, Chine, Japon. 2
- C. spuria** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 614; Burmann, *Rar. Pl. Afr. Dec.* II t. 19 fig. 1; Commelyn, *Pl. Rar.* t. 23; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 397. — Afrique austr. 2
- C. tuberculosa** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 139; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 86 et *Prodr. Regn. Veget.* III 397; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 375. — Afrique austr. 2
- C. Turkestanica** Regel et Winkler (sub *Umbilico*) ex ANTOINE in *Esterr. Bot. Zeitschr.* (1882) 278 cum ic.; *Gartenflora* XXIX t. 998 fig. 1. — Turkestan.
- C. Umbilicus** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 615. C. LUSITANICA Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 140; *Engl. Bot.* IV t. 325. UMBILICUS PENDULIFLORUS De Candolle, *Pl. Grass.* t. 156 et *Prodr. Regn. Veget.* II 400; Boissier, *Fl. Or.* II 709. — Madère, Angleterre, Portugal, Espagne, Serbie, Grèce, Asie Min., Syrie. 2

5. **SEDUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 383 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2183. — Genre de 150 esp. habitant les rég. temp. et froides de l'hémisphère bor.
- S. Alberti Regel** in *Gartenflora* XXIX (1880) 227 t. 1019 fig. 2. — Turkes-tan or.
- S. altissimum Poiret**, *Encycl. Méth. Bot.* IV (1797) 634 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 40 ; Mutel, *Fl. Fr.* t. 19 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 285 ; Boissier, *Fl. Or.* II 785. — Portugal ; Rég. médit. de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. ♀
- S. amplexicaule De Candolle**, *Rapp. Voy. Bot. Fr.* I (1808) 80 et *Crassul.* t. 7 ; Boissier, *Fl. Or.* II 786. **SEMPERVIVUM TENUIFOLIUM** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V t. 474. — De l'Espagne à l'Asie Min. et la Syrie, Algérie. ♀
- S. Anacampseros Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 430 ; *Bot. Mag.* t. 118 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 33 et *Prodr. Regn. Veget.* III 403. — Pyrénées, Lot, Dauphiné, Suisse, Podolie, Ukraine ? . ♀
- S. Beyrichianum (?) Masters** in *Gard. Chron.* sér. 2, X (1878) 376. — Amérique bor. ? .
- S. brevifolium De Candolle**, *Rapp. Voy. Bot. Fr.* II (1810) 79 et *Mém. Fam. Crassul.* t. 4 ; *Prodr. Regn. Veget.* III 406. — Espagne, Portugal, Pyrénées, Lozère, Hérault, Corse. ♀
- S. cyaneum Rudolph** in *Mém. Acad. St-Petersb.* IV (1811) 351 t. 2 fig. 2 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 182 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 404. — Sibérie or. ♀
- S. dasphyllum Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 431 ; *Engl. Bot.* X t. 656 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 93 et *Prodr. Regn. Veget.* III 406 ; Boissier, *Fl. Or.* II 780. — Europe occ., centr., mér. et or., Afrique bor. ♀
- — var. **glanduliferum MORIS**, *Fl. Sard.* II (1843) 125 ; *Bot. Mag.* t. 6027. **S. GLANDULIFERUM** Gussone, *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 519. **S. CORSICUM** Duby, *Bot. Gallie.* I (1828) 292.
- S. Douglasii Hooker**, *Fl. Bor.-Amer.* I (1834) 228 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 559 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* t. 210. — Orégon, Californie. ☉ ♀ ?
- S. ebracteatum Moçino et Sessé** inéd. ex DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 409 et *Mém. Crassul.* 37 t. 6 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* IV t. 221. — Mexique. ♀ ? h
- S. Ewersii Ledebour**, *Fl. Altaïca* II (1830) 191 et *Icon. Fl. Ross.* II t. 58 ; *Gartenflora* IX t. 395 ; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* II 421 ; Boissier, *Fl. Or.* suppl. 245. — Afghanistan, Himalaya temp., Songarie, Sibérie. ♀
- S. hispidum Desfontaines**, *Fl. Atlant.* I (1798) 361 ; Ball, *Spicil. Fl. Maroc.* in *Journ. Lin. Soc.* XVI 454 ; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algér.* I 325. — Maroc, Algérie. ☉



- Sedum hybridum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 617; Murray, *Nov. Comm. Gætt.* VI t. 5; Gmelin, *Fl. Sibir.* IV t. 67 fig. 1. — Sibérie. ♀
- S. involucratum** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 352; Ledebour, *Fl. Ross.* II 183; Boissier, *Fl. Or.* II 778. — Caucase. ♀
- S. Japonicum** Siebold ex Miquel in *Ann. Mus. Lugd.-Bat.* II (1855) 136; *Gartenflora* (1866) 196 t. 513 fig. 3 et 4. — Himalaya temp., Chine, Japon.
- S. Kamtchaticum** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* VII (1840) 54; Ledebour, *Fl. Ross.* II 182; *Gartenflora* (1883) 250 cum ic.; *So Mokou Zoussetz* vol. 8 fol. 44 sub KIRIN soo. — Japon, Kamtchatka, Sibérie or., Mandchourie.
- S. Magellense** Tenore, *Prodr. Fl. Nap.* I (1811) XXVI et *Fl. Nap.* t. 39; Raulin, *Descr. Phys. Crête* t. 13 fig. 2; Tchihatcheff, *Asie Min. Bot.* t. 18; Boissier, *Fl. Or.* II 780. — Italie mér., Europe mér.-or., Asie Min., Algérie. ♀
- S. Maximowiczii** Regel in *Gartenflora* XV (1866) 355 t. 528 et in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 98; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 268. — Japon, bassin de l'Amur. ♀
- S. Middendorffianum** Maximowicz, *Prim. Fl. Amur.* (1859) 116; Walpers, *Annal. Bot.* VII 921; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 267. — Bassin de l'Amur.
- S. Monregalense** Balbis in *Mém. Acad. Turin* VII (1804) 23 t. 6; Lodiges, *Bot. Cab.* t. 464; Mutel, *Fl. Fr.* t. 19; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 275. **S. cruciatum** Desfontaines, *Catal. Hort. Paris* (1829) 162. — Italie bor. et centr., Corse, Sicile. ♀
- S. multiceps** Cosson et Durieu in *Bull. Soc. Bot. Fr.* IX (1862) 171; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, VI (1876) fig. 45 et X (1878) 717 fig. 120; Batandier et Trabut, *Fl. de l'Algér.* I 326. — Algérie. ♀
- S. Nevii** A. Gray, *Manual of Bot. of North U.-S.* ed. V (1868) 172; Meehan, *Flow. Pl. Un. States* t. 24; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 376. — Alabama, Virginie.
- S. Oreganum** Nuttall in Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I (1840) 559; Walpers, *Repert. Bot.* II 242; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 209. — États-Unis (de la Californie au territoire de Washington). ♀
- S. oxypetalum** Humboldt. Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp.* VI (1823) 45; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* I 397. — Mexique. ♂
- S. parvum** Hemsley, *Diagn. Pl. Nov.* III (1880) 50 et *Biol. Centr.-Amer.* I 398. — Mexique.
- S. pilosum** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 252 et *Cent. Pl. Rar. Ross.* t. 40; Boissier, *Fl. Or.* II 786. **COTYLEDON PUBESCENS** C.-A. Meyer, *Verzeichn. Pfl. Reise Cauc.* (1831) 150. **UMBILICUS** — Ledebour, *Fl. Ross.* II (1844) 175. — Caucase, Arménie. ○

**Sedum populifolium** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 242 ; *Bot. Mag.* t. 244 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 110 et *Prodr. Regn. Veget.* III 403. — Sibérie.

**S. rhodanthum** A. Gray in *Amer. Journ. of Sc.* XXXIII (1862) 405 ; S. Watson in *U. S. Geolog. Expl. 40th Parall.*, *Bot.* (1871) 101 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* VII 921. — Montagnes Rocheuses (Colorado, Utah, Montana).

**S. Rhodiola** De Candolle, *Fl. Fr.* ed. 3, IV (1805) 386 ; *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 401 et *Pl. Grass.* t. 143, 143 bis ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 819 ; *Gartenflora* (1863) 210 t. 403 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 417. — Rég. alp. et arct. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. ♀

— — var. **linifolium** Regel in *Gartenflora* XXXI (1882) t. 1080.

**S. Selskianum** Regel et Maack, *Tent. Fl. Ussuriensis* (1861) 66 t. VI fig. 9-11 et in *Gartenflora* (1862) t. 361 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 268. — Amur, Mandchourie. ♀

**S. sempervivoides** Fischer in Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III suppl. (1819) 213 ; *Bot. Mag.* t. 2474 ; Link et Otto, *Icon. Pl. Hort. Berol.* I t. 57. — Asie Min., Caucase. ♀

**S. Sieboldi** Hort. ex Sweet, *Hort. Brit.*, ed. III (1839) 270 (nomen nudum), *Bot. Mag.* (1863) t. 5358 ; *Illustr. Hort.* (1863) t. 373 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 591. — Japon. ♀

**S. spathulifolium** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* I (1833) 227 ; *Gartenflora* (1872) 297 t. 741 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 376 fig. 68 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 559. — De la Californie à l'île Vancouver. ♀

**S. stenopetalum** Pursh, *Fl. Amer.-Sept.* I (1814) 234 ; *Gartenflora* (1872) 297 t. 741 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 626 ; Torrey et Gray, *Fl. N.-Amer.* I 210. — Montagnes Rocheuses, Orégon, Nevada. ♀

**S. Stephani** Chamisso in *Linnaea* VI (1831) 549 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 263. — Sibérie baïkal., Kamtchatka. ♀

— Obs. Regel, *Gartenflora* (1863) 219, en fait un synonyme de *S. Rhodiola* DC.

**S. telephioides** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 277 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 336. — États-Unis (Monts Alleghanis). ♀

**S. umbilicoides** Regel in *Gartenflora* XXVI (1877) 290 t. 917 ; Masters in *Gard. Chron.* ser. 2, X (1878) 376. — Turkestan (Alatau). ♀

6. **SEMPERVIVUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 389; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2184. — 50 esp. environ de l'Europe, de l'Asie bor. et or. et de l'Afrique bor. et trop.

**S. acuminatum** Decaisne in JACQUEMONT, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 63 t. 74 fig. 2; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 422; Boissier, *Fl. Or.* (suppl.) 247. **S. HIMALAYENSE** Klotzsch in *Reise Pr. Waldem. Bot.* (1862) t. 43. — Afghanistan, Himalaya alp., Tibet. ♀

**S. arachnoideum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 465; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 42; *Bot. Mag.* t. 68; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 106. **S. LAGGERI** Schott. — Alpes, Pyrénées, Cévennes, Auvergne, Apennins, Carpathes. ♀

— — subsp. **Fauconneti** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 259. **S. FAUCONNETI** Reuter in *Cat. pl. vasc. Genève*, ed. 2 (1861) 298.

**S. arenarium** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I (1837) 833; ed. III (1857) 227; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIX t. 83. — Tyrol, Salzbourg, Carinthie, Transylvanie. ♀

**S. Arvernense** Leccoq et Lamotte, *Catal. Pl. Plat. centr. France* (1847) 179; Lamotte, *Étud. gen. Semp.* (1864) 24; Boreau, *Fl. centr. Fr.* éd. 3, I (1857) 259. — France centr. et mér. ♀

— — subsp. **Boutignyanum** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 259. **S. BOUTIGNYANUM** Billot, *Archiv. Fl. Fr.* (1853) 263. — Pyrénées.

**S. assimile** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* (1853) 19; Walpers, *Annal. Bot.* V 14. — Herzégovine, Bosnie, Transylvanie, Serbie.

**S. barbulatum** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* III (1853) 91; Walpers, *Annal. Bot.* V 15. — Carniole. ♀

— Obs. Nyman (*Consp. Fl. Eur.* 259) en fait une sous-espèce du **S. PILIFERUM** Jordan.

**S. blandum** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* III (1853) 29; Walpers, *Annal. Bot.* V 14. — Transylvanie.

**S. calcareum** Jordan, *Obs. Pl. Nouv. Rar. Crit. France* VII (1849) 26; Jordan et Fourreau, *Icon. ad Fl. Europ.* t. 132 fig. 194. — Dauphiné. ♀

**S. Canariense** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 464; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 141 et 141<sup>b</sup> et *Prodr. Regn. Veget.* III 412. **ÆONIUM** — Webb et Berthelot, *Phytog. Canar.* I (1836-40) 196; Walpers, *Repert. Bot.* V 803. — Canaries. ♀

**S. ciliatum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1809) 508; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 411 et *Mém. Fam. Crassul.* t. 10. — Canaries. ♀

**S. flagelliforme** Fischer ex LINK, *Enum. Pl. Hort. Berol.* II (1822) 20; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 413. — Sibérie. ♀

**S. Funkii** F. Braun ex KOCH in *Flora* XV (1832) 461; Jordan et Fourreau, *Icon. ad Fl. Europ.* t. 150 fig. 218; Reichenbach, *Pl. Crit.* X t. 969. — Styrie, Tyrol, Salzbourg; Carinthie, Carniole, Transylvanie (naturalisé en France et en Belgique). ♀

- Sempervivum glandulosum** Aiton *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 148 ; Haworth, *Syn. Pl. Succ.* 166 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 441 ; Lowe, *Fl. of Madeira* I 332. — Madère.  $\frac{1}{2}$
- S. globiferum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 665 ; *Bot. Mag.* t. 507 et 2115 ; Mutel, *Fl. Fr.* t. 20 ; Boissier, *Fl. Or.* II 797. — Europe centr.-or., Caucase, Cappadoce, Arménie turq.  $\frac{1}{2}$
- S. glutinosum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 147 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV t. 464 ; *Bot. Mag.* t. 1963 ; *Bot. Reg.* IV t. 278 ; Lowe, *Fl. of Madeira* I 335. — Madère.  $\frac{1}{2}$
- S. heterotrichum** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* III (1853) 83 ; Walpers, *Annal. Bot.* V 15. — Styrie, Salzbourg.  $\frac{1}{2}$
- S. Heuffelii** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* II (1852) 18 ; Walpers, *Annal. Bot.* V 16. — Transylvanie.
- S. hirtum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 665 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 107 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 65 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 12. — Provence, Piémont, Lombardie, Suisse ?, Autriche, Europe centr.-or.  $\frac{1}{2}$
- S. montanum** Linné, *S. Pl.* ed. I (1753) 465 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 41 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 413 et *Pl. Grass.* t. 105. — Pyrénées, Alpes.  $\frac{1}{2}$
- S. Neilreichii** Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta Bot.* (1854) 19 ; Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* V (1855) 367 ; Walpers, *Annal. Bot.* V 15. — Autriche infér.
- Obs. Nyman (*Consp. Fl. Eur.* 260) en fait une sous-espèce du *S. ARENARIUM* Koch.
- S. patens** Grisebach et Schenk, *Iter Hung.* in *Wiegmann's Archiv.* XVIII (1852) 315 ; Boissier, *Fl. Or.* II 797. (1853) 18. — Banat, Transylvanie, Macédoine, Serbie, Herzégovine, Monténégro, Bosnie.  $\frac{1}{2}$
- S. piliferum** Jordan, *Obs. Pl. Nouv. ou Crit. Fr.* VII (1849) 27 ; Lamotte, *Etud. gen. Semp.* 44. — Dauphiné.
- S. Pittonii** Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta Bot.* (1854) 19 ; Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* V (1855) 373 ; Walpers, *Annal. Bot.* V 15. — Styrie.
- S. Schlehani** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* III (1853) 12 ; Walpers, *Annal. Bot.* V 15. — Autriche.
- S. Schottii** Baker in *Gard. Chron.* ser. 2, II (1874) 103. *S. ACUMINATUM* Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* (1853) 28. — Tyrol mér., Istrie.
- S. sedoides** Decaisne in JACQUEMONT, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 63 t. 74 fig. 2 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 423. *S. FIMBRIATUM* Klotzsch in *Bot. Ergebn. Reise Prinz. Waldem.* (1862) t. 43. — Himalaya occ.
- S. soboliferum** Sims in *Bot. Mag.* (1812) t. 1457 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* V t. 542 ; Schmidel, *Icon. Plant.* t. 17. — Europe centr.

**Sempervivum tectorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 664 ; Schmidel, *Icon. Plant.* t. 53 et 54 ; Curtis, *Fl. Londin.* III t. 105 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 104 ; Boissier, *Fl. Or.* II 796. — De l'Angleterre et la Norvège à la Russie méd. et la Grèce ; Caucase, Perse, Sibérie. ♀

— — subsp. **Mettenianum** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* I (1878) 259. S. METTENIANUM Schnittspahn et Lehmann in *Flora* (1855) 4. — Tyrol, Suisse. ♀

— Obs. Le S. METTENIANUM est considéré par quelques auteurs comme le type spontané du S. TECTORUM Linné.

**S. tortuosum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 148 ; *Bot. Mag.* t. 296 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 156 et *Prodr. Regn. Veget.* III 411. — Iles Canaries. ♀ h

**S. Wulfenii** Hoppe ex KOCH, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3, I (1857) 220 ; Sturm, *Deutsch. Fl.* VI t. 23. S. GLOBIFERUM Wulfen in Jacquin *Fl. Austr. Icon.* I (1773) t. 40. — Europe centr. (de la Suisse à la Transylvanie), Piémont, Lombardie. ♀

17. **MONANTHES** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 68 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2185. — 4 esp. bien distinctes habitant les îles Canaries.

**M. Agriostaphys** Webb et Berthelot (sub PETROPHYDE) *Phytog. Canar.* (1836-40) t. 36<sup>c</sup>. — Canaries.

**M. brachycaulon** Webb et Berthelot (sub PETROPHYDE) *Phytog. Canar.* (1836-40) t. 36<sup>c</sup>. — Canaries.

**M. muralis** C. Mueller in WALPERS, *Annal. Bot.* VII (1868) 931. PETROPHYTES — Webb mss. ex C. Bolle in *Bonplandia* VII (1859) 244. — Canaries.

**M. polyphylla** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 68. PETROPHYTES — Webb, *Phytog. Canar.* I (1836-40) 203 t. 36<sup>b</sup>. SEMPERVIVUM MONANTHES Aiton in *Bot. Mag.* (1789) t. 93 et in *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 149 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 157 et *Prodr. Regn. Veget.* III 414. — Canaries. ♀

### XXX. HAMAMÉLIDÉES

1. **PARROTIA** C.-A. Meyer, *Verzeich. Pfl. Cauc.* (1831) 46 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2194. — 2 esp. de la Perse et du Cachemire.

**P. Persica** C.-A. Meyer, *loc. cit.* (1831) 47 ; *Bot. Mag.* t. 5744 ; Boissier, *Fl. Or.* II 818. HAMAMÉLIS — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 268. — Transcaucasie, Perse bor. h

2. **CORYLOPSIS** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 45 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2198. — 4 esp. du Japon, de la Chine, de Khasia et de l'Himalaya.
- C. spicata** Siebold et Zuccarini *loc. cit.* 47 t. 19 ; *Bot. Mag.* t. 5458 ; *Fl. des Serres* (1874) t. 2135 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 434. — Japon, Chine.
3. **HAMAMELIS** Linné, *Gen. Pl. ed. II* (1742) n. 125 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2200. — 2 esp. de l'Amérique bor.-or. et du Japon.
- H. Virginiana** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 124 ; *Bot. Cab.* t. 598 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* éd. 2, VII t. 60. — Du Canada à la Louisiane.  $\mathfrak{h}$
4. **LIQUIDAMBAR** Linné, *Gen. Pl. ed. II* (1742) n. 878 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2210. — 2 esp. originaires, l'une des parties chaudes de l'Amérique, l'autre de l'Asie Mineure.
- L. Orientalis** Miller, *Gard. Dict.* ed. VII (1759) n. 2 ; *Bonplandia* V (1857) 49 cum ic. **L. IMBERBIS** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 365. — Carie, Lycie.  $\mathfrak{h}$

## XXXI. MYRTACÉES

1. **CALLISTEMON** R. Brown in Flinder's Voy. II (1814) 547 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2288. — Genre d'une douzaine d'esp. originaires de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie.
- C. lineare** De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* III (1828) 223 ; Bentham, *Fl. Austr.* III 122. **METROSIDEROS** — Smith in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 273 ; Jacquin, *Hort. Schœnbr.* IV t. 405 ; De Launay, *Herb. gen. Amat.* IV t. 257. — Nouvelles-Galles du Sud.
2. **MELALEUCA** Linné, *Mant. Pl.* (1767) 14 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2210. — Une centaine d'esp. de l'Australie et une esp. largement dispersée dans l'Asie trop.
- M. aspalathoides** Schauer in LEHMANN, *Pl. Preiss.* I (1844-45) 140 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 747 ; Bentham, *Fl. Austral.* III 161. — Australie occ.  $\mathfrak{h}$
- M. densa** R. Brown in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, IV (1812) 416 ; Colla in *Mém. Acad. Turin* XXXI t. 4 ; De Launay, *Herb. gen. Amat.* III t. 221 ; Bentham, *Fl. Austral.* III 156. — Australie occ.  $\mathfrak{h}$

**Melaleuca Preissiana** Schauer in LEHMANN *Pl. Preiss.* I (1844-45) 143 ; Bentham, *Fl. Austral.* III 143. **M. CURVIFOLIA** Schlechtendal in *Linnaea* XX (1847) 654. — Victoria, Australie occ. et mér.  $\frac{1}{2}$

3. **METROSIDEROS** Banks in Gaertner, *De Fruct. et Semin.* I (1788) 170 t. 34 ex pte ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2306. — Une vingtaine d'esp. de l'archipel Indien, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des îles du Pacifique et de l'Afrique austr.

**M. robusta** A. Cunningham in *Annals of Nat. Hist.* III (1839) 112 ; *Journ. Hort. Soc. Lond.* III t. 311 ; Hooker, *Fl. Nov. Zél.* t. 17. **M. FLORIDA** Hooker in *Bot. Mag.* (1849) t. 4471. — Nouvelle-Zélande.  $\frac{1}{2}$

**M. tomentosa** A. Richard, *Essai Fl. Nov. Zél.* (1832) 336 t. 37 ; *Bot. Mag.* t. 4488 ; Lemaire, *Jard. Fl.* II t. 146 ; Hooker, *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1864) 72. — Nouvelle-Zélande.  $\frac{1}{2}$

4. **MYRTUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 399 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2318. — Genre comprenant une cinquantaine d'esp. originaires des rég. chaudes du monde entier.

**M. tenuifolia** Smith in *Trans. Linn. Soc.* III (1797) 280 ; Bentham, *Fl. Austral.* III 274. — Nouvelles-Galles du Sud, Queensland.  $\frac{1}{2}$

5. **EUGENIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 391 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2327. — Genre de plus de 560 esp. bien distinctes, originaires de l'Asie et de l'Amérique trop., de l'Afrique, de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie.

**E. myrtifolia** Sims in *Bot. Mag.* (1821) t. 2230 ; *Bot. Reg.* t. 627 ; *Bot. Cab.* t. 625 ; Bentham, *Fl. Austr.* III 286. **JAMBOSA AUSTRALIS** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 287. — Queensland, Nouv.-Galles du Sud.  $\frac{1}{2}$

## XXXII. MÉLASTOMACÉES

1. **CENTRADENIA** G. Don, *Gen. Syst. Gard.* II (1832) 765 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2367. — 4 esp. du Mexique et de l'Amérique centr.

**C. grandifolia** Endlicher, *Gen. Pl.* (1836-1850) 1207 ; *Bot. Mag.* t. 5228, *L'Horticult. franç.* (1861) t. 9. — Mexique mér., Guatémala.

**Centradenia inæquilateralis** G. Don, *Gen. Syst. Gard.* II (1832) 763.  
C. ROSEA Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) 29 t. 20; Paxton, *Mag. of Bot.*  
X t. 101. — Mexique, Amérique centr.

2. **TIBOUCHINA** Aublet, *Hist. Pl. Guiane franç.* I (1775) 445 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2383. — Environ 200 esp. de l'Amérique trop.-austr.

**T. semidecandra Cogniaux** in *Fl. Brasil.* XIV pars III (1885) 309. **LASIAN-**  
**DRA MACRANTHA** Linden et Seemann in Seemann, *Journ. of Bot.* II (1864) 361  
t. 24; *Illustr. Hort.* XVI (1869) t. 594. — Brésil or.

3. **RHEXIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 953 pr. pte; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 2401. — 7 esp. des États-Unis, de Cuba et de  
Porto-Rico.

**R. glabella Michaux**, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 222; *Bot. Cab.* t. 366 ;  
Sweet, *Brit. Fl. Gard.* t. 41. — De la Caroline à la Floride, l'Alabama, la  
Louisiane, le Texas; Cuba, Porto-Rico. ♀

**R. Virginica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 346; *Bot. Mag.* t. 968; *Bot. Cab.*  
t. 840; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 234. — Du Massachussets et du Connec-  
ticut à la Louisiane, à l'Arkansas et au Texas. ♀

4. **MONOCHLETUM** Naudin in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, IV (1845)  
48 t. 2; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2402. — 30 esp. de  
l'Amérique trop.

**M. calcaratum Triana**, *Mélast.* (1871) 63. **ARTHROSTEMMA** De Candolle,  
*Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 138. **MONOCHLETUM ENSIFERUM** Naudin, *loc. cit.*  
(1845) 50 t. 2; *Bot. Mag.* t. 5132; *Belg. Hort.* VII 257 t. 242 fig. 1. —  
Mexique.

**M. quadrangulare Triana**, *Mélast.* (1871) 63; **RÖZLIA GRANADENSIS** Regel  
in *Gartenflora* (1871) 353 t. 706. — Nouvelle-Grenade.

5. **BERTOLONIA** Raddi, *Piant. Nuov. Brasil.* (1820) 5; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 2434. — Genre brésilien de 9 esp.

**B. marmorata Naudin** in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, XV (1851) 318; Cogniaux  
in *Fl. Brasil.* XIV pars IV (1886) 53 et in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.*  
VII 532. **ERIOCNEMA**? — Naudin in *Rev. Hort.* (1848) 381; Paxton, *Fl. Gard.*  
I 27 fig. 14; *Fl. des Serres* VII t. 750. (E. MARMOREA). — Brésil.

— — var. **ænea** COGNIAUX, *loc. cit.* (1886) 54. **ERIOCNEMA ÆNEA** Naudin in *Rev.*  
*Hort.* (1848) 382. **BERTOLONIA** — Naudin, *loc. cit.* XV (1851) 318.

**B. ovata** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 113; Cogniaux in *Fl.*  
*Brasil.* XIV pars I, 52 et in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.* VII 531.  
— Brésil.



6. **SALPINGA** Martius ex De Candolle, Prodr. Regn. Veget. III (1828) 112 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2436. — 3 esp. du Brésil austral.

**S. margaritacea** Triana, *Mélast.* (1871) 80 t. VI ; Cogniaux in *Fl. Brasil.* XIV pars 4, 62 t. 12 et in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.* VII 537. BERTOLONIA — Hort. W. Bull ex Naudin in *Fl. des Serres* XVI (1867) 163 t. 1697. — Brésil austr.

7. **MEDINILLA** Gaudichaud in Freycinet, Voy. Bot. (1826) 484 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2450. — Environ 100 esp. de l'Asie trop. et des îles Madagascar, Maurice et Fernando-Po.

**M. Teysmanni** Miquel in *Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.* I (1850) 247 ; Cogniaux in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.* VII 593. **M. AMABILIS** Dyer in *Gard. Chron.* ser. 1, I (1874) fig. 84 et (1882) fig. 87 ; *Bot. Mag.* t. 6681. — Célèbes, Nouv.-Guinée.

8. **MONOLENA** Triana in Benthams et Hooker Gen. Pl. I (1867) 756 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2438 — 4 esp. de la Nouvelle-Grenade et du Pérou.

**M. Curtisii** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1883) t. 6730 ; *Gartenflora* XXXIII 241 cum ic. ; *Gard. Chron.* ser. 2, XX (1883) 621 fig. 108. — Sumatra occ.

**M. magnifica** Lindley in PAXTON, *Fl. Gard.* I (1850) 55 t. 12 ; *Bot. Mag.* t. 4533 ; *Gartenflora* (1861) t. 325 ; *Fl. des Serres* IX t. 968. — Ile Luçon.

**M. primulæflora** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1870) 5818 ; *Gard. Chron.* (1870) 309 fig. 53 et 54 ; *Fl. des Serres* XVIII 162 cum ic. ; Triana, *Mélast.* 80 t. VI fig. 82 ; Cogniaux in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.* VII 538. BERTOLONIA — Hort. ex Hooker f., *loc. cit.* — Pérou, Nouvelle-Grenade.

9. **MICONIA** Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. et Chil. Prodr. (1794) 60 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2462. — Environ 520 esp. de l'Amérique trop.

**M. magnifica** Triana, *Mélast.* (1871) 131. **CYANOPHYLLUM** — Hort. ex Cogniaux in A. et C. De Candolle, *Monog. Phan.* VII (1891) 937. — Mexique.

## XXXIII. ONAGRARIÉES

1. **EPILOBIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 319; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2520. — Genre de 60 esp. des rég. temp. et froides du monde entier.
 

**E. latifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 347; *Fl. Dan.* IV t. 565. *E. speciosum* Decaisne in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde Bot.* (1844) t. 69. — Europe et Asie bor., Himalaya, Amérique arct., mont. Rocheuses. ♀
2. **FUCHSIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 74; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2530. — Genre de 50 esp. dont 4 originaires de la Nouvelle-Zélande, le reste croissant au Mexique et dans l'Amérique austr.
 

**F. arborens** Sims in *Bot. Mag.* (1825) t. 2620; *Bot. Reg.* (1826) t. 943; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 37. — Mexique. ♂  
— — var. **syringæflora** HORT. ex *Fl. des Serres* IV (1848) 416-417.

**F. cordifolia** Benth., *Pl. Hartweg.* (1842) 74; *Bot. Reg.* XXVII t. 70; Paxton, *Mag. of Bot.* IX t. 99; Hooker, *Icon. Pl.* V t. 450. — Guatémala. ♂

**F. corymbiflora** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) t. 325; *Bot. Mag.* t. 4000; *Bot. Reg.* XXVI t. 70. — Pérou. ♂  
— — var. **alba** « HORT-SALTER » ex *Fl. des Serres* VI (1850) 29 t. 547.

**F. fulgens** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 39; *Bot. Mag.* t. 3801; *Bot. Reg.* XXIV t. 1; Paxton, *Mag. of Bot.* V t. 221. — Mexique mér. ♂

**F. macrostemma** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) t. 324; *Bot. Mag.* t. 3521; *Bot. Reg.* X t. 487; Walpers, *Repert. Bot.* II 94. — Chili. ♂

**F. procumbens** R. Cunningham ex A. CUNNINGHAM, *Bot. Isl. N.-Zel.* in *Ann. Nat. Hist.* III (1839) 31; Hooker, *Icon. Pl.* V t. 421; Walpers, *Repert. Bot.* II 95. — Nouvelle-Zélande. ♂

**F. serratifolia** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) t. 323; *Bot. Mag.* t. 4174; *Bot. Reg.* XXXI t. 41; *Fl. des Serres* V (1849) t. 447. — Pérou. ♂

**F. splendens** Zuccarini in *Flora* II (1832) 102; *Bot. Mag.* t. 4082; *Bot. Reg.* (1842) t. 67. — Mexique mér. ♂

**F. triphylla** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 1191; *Bot. Mag.* t. 6795. *F. racemosa* Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 565 et *Pl. Bot. Encycl.* t. 282; Descourtils, *Fl. Médic. Antill.* II (1822) 161 t. 109. — Saint-Domingue. ♂

3. **LOPEZIA** Cavanilles, *Icon. Pl. Rar.* I (1791) 42 t. 48 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2533. — 15 esp. originaires du  
Mexique et du Guatémala.

**L. miniata** De Candolle, *Catal. Pl. Hort. Monsp.* (1813) 121 ; Jacquin, *Eclog. Pl.* t. 109 ; *Gartenflora* VI t. 203 ; De Candolle, *Prodr.* III 62. — Mexique.  $\mathfrak{h}$

4. **CIRCLEA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 9 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2540. — Genre de 6 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.

**C. mollis** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap. Fam. Nat.* I (1843) t. 26 ; Hance in *Journ. Linn. Soc.* XIII 80 et in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) 260 ; *So mokou Zoussetz* vol. 1 fol. 38 (sub SHIRO HA) ; *Phouzo Zoufou* vol. 20 fol. 9 recto (sub OUCHI TAKÉ SO). — Japon, Mandchourie, Chine.

#### XXXIV. PASSIFLORÉES

1. **PASSIFLORA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 692 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2584. — Genre de 175 esp. environ des parties trop. de l'Asie, de l'Amérique et de l'Australie.

**P. cœrulea** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 959 ; *Bot. Mag.* t. 28 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* éd. 2, II t. 12 ; Cavanilles, *Monadelph. Class. Diss.* t. 295. — Brésil, Pérou, Uruguay ; ailleurs naturalisé.  $\mathfrak{h}$

**P. edulis** Sims in *Bot. Mag.* (1817) t. 1989 ; Jacquin, *Eclog. Pl.* t. 124 ; *Annal. de Gand.* (1845) t. 35 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 772. — Brésil, Guatémala.  $\mathfrak{h}$

**P. Hahnii** Masters, *Fl. Brasil.* XIII pars I (1872) 569. **DISEMMA** — E. Fournier in *Revue Hort.* (1869) 430 cum ic. — Mexique.

#### XXXV. CUCURBITACÉES

1. **MELOTHRIA** Linné, *Hort. Cliffort.* (1737) 490 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2651. — 58 esp. dispersées dans les régions chaudes du monde entier.

**M. punctata** Cogniaux in A. et C. DE CANDOLLE, *Monog. Phan.* III (1881) 615. **BRYONIA** — Thunberg, *Prodr. Fl. Cap.* (1794) 43. **PILOGYNE SUAVIS** Schrader in *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1835). — Afrique austr., Abyssinie, Java, Célèbes.  $\mathcal{Z}$

## XXXVI. BÉGONIACÉES

1. **BEGONIA** Linné, *Gen. Pl. ed. II* (1742) n. 992 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2695. — Genre de plus de 400 esp. de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique trop. et des îles du Pacifique.
- B. Ascotiensis** Webb (ubi ?) ; Vilmorin, *Suppl. Fl. pleine terre* (1884) 34. — Patrie ?
- B. Boliviensis** De Candolle in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XI (1859) 122 et *Prodr. Regn. Veget.* XV 1 (1864) 287 ; *Fl. des Serres* XVII (1867) 21, t. 1723 ; *Belg. Hort.* XVIII (1868) 63 t. 5. — Bolivie. ♀
- B. coccinea** Hooker in *Bot. Mag.* (1843) t. 3990 ; Paxton, *Mag. of Bot.* X 73 cum ic. PRITZELIA — Klotzsch, *Begoniac.* (1854) 107 ; Walpers, *Annal. Bot.* IV 923. — Brésil.
- B. conchæfolia** Dietrich in *Allg. Gartenz.* XIX (1851) 258 ; Saunders, *Refug. Bot.* t. 246 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 337. GI-REOUDIA — Klotzsch, *Begoniac.* (1854) 84 ; Walpers, *Annal. Bot.* IV 917. — Costa-Rica. ♂
- B. Davisii** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1876) t. 6252 ; E. Morren in *Belg. Hort.* XXVII 237 t. 12. — Pérou.
- B. diversifolia** Graham in *Edinb. Phil. Journ.* (1829) 183 ; *Bot. Mag.* t. 2966. A. De Candolle (*Prodr. Regn. Veget.* XV 1, 310) considère ce BEGONIA comme une var. HORTENSIS du B. GRACILIS Kunth, du Mexique.
- B. Evansiana** Andrews, *Bot. Reposit.* X (1810) t. 627 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 313 ; *Bot. Mag.* t. 1473. B. DISCOLOR R. BROWN in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V 184 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 206. KNESEBECKIA — Klotzsch in Walpers, *Annal. Bot.* IV (1857) 888. — Pulo-Pinang, Chine, Japon, Java. ♀
- B. Frœbelii** A. De Candolle in *Gard. Chron.* ser. 2, II (1874) 552 ; Ed. André in *Illustr. Hort.* XXII (1875) 170 t. 223. — Equateur. ♀
- B. fruticosa** A. De Candolle in *Fl. Brasil.* IV pars I (1861) 377 et *Prodr. Regn. Veget.* XV 1, 374. B. CASTANEEFOLIA Schott in Sprengel, *Syst. Veget.* IV app. (1827) 407. — Brésil. ♂
- B. Lindleyana** Walpers, *Repert. Bot.* II (1843) 209 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 336. B. VITIFOLIA Lindley (non Schott) in *Bot. Reg.* (1852) misc. n. 20. — Guatémala. ♂
- B. lobata** Schott in Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 408. B. VERNICOSA Hort. EWALDIA LOBATA Klotzsch, *Begoniac.* (1854) 54 t. 3 fig. c. ; Walpers, *Annal. Bot.* IV 893. — Brésil mér. ♂

- Begonia macrophylla** Dryander in *Trans. Linnean Soc.* I (1791) 164 ; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 416. GIREOUDIA — Klotzsch, *Begoniac.* (1854) 84 ; Walpers, *Annal. Bot.* IV 916. — Jamaïque.
- B. Martiana** Link et Otto, *Icon. Pl. Rar.* II (1830) 49 t. 25. KNESEBECKIA — Klotzsch in Walpers, *Annal. Bot.* IV (1857) 890 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XII t. 151. B. GRACILIS Kunth var. MARTIANA A. de Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I (1864) 309. — Mexique. ☉
- B. mollis** A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I (1864) 391. — Java, Sumatra. ♀
- B. octopetala** L'Héritier, *Stirpes Novæ* fasc. IV (1783) 101 ; *Bot. Mag.* t. 3559 ; *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2056-57 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 297 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* I 283. HUSZIA — Klotzsch in Walpers, *Annal. Bot.* IV (1857) 874. — Pérou. ♀
- B. Pearcei** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1865) t. 5545. — Bolivie. ♀
- B. Rex** Putzeys in *Fl. des Serres* XII (1858) t. 1255-56 ; XIII t. 1317 ; *Bot. Mag.* t. 5101 ; *Belg. Hort.* IX t. 24. — Assam.
- B. rosæflora** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1867) t. 5680 ; *Fl. des Serres* (1869-70) 53 t. 1853 ; *Illustr. Hort.* XV t. 553. — Pérou.
- B. sanguinea** Raddi ex SPRENGEL, *Syst. Veget.* II (1825) 625 ; *Bot. Mag.* t. 3520 ; Link et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* t. 13 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 213. Brésil. ♂
- B. Seemanniana** A. De Candolle in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XI (1859) 132 et *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 332. — Amérique centr. ♂
- B. semperflorens** Link et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* (1828) t. 5 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 215 et *Annal. Bot.* IV 879 ; *Bot. Mag.* t. 2920 ; *Bot. Cab.* t. 1439. — Brésil. ♂
- B. Socotrana** Hooker f. in *Gard. Chron.* ser. 2, XV (1881) 8 cum ic. ; *Bot. Mag.* t. 6555. — Ile de Socotra.
- B. suaveolens** Loddiges, *Bot. Cab.* I (1817) t. 69 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 294. B. MACROPHYLLA Lamarck ?, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 394. B. HUMILIS Aiton, *Bot. Reg.* (1818) t. 284 excl. descr. — Guadeloupe, Saint-Domingue. ♂
- B. suffruticosa** Meissner in *Linnaea* XIV (1840) 502 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 481. — Natal.
- B. Veitchii** Hooker f. in *Gard. Chron.* (1867) 734 ; *Bot. Mag.* t. 5663 ; *Gartenflora* XXXIV 22 cum ic. ; *Fl. des Serres* (1878) 119 t. 2326. — Pérou.

## XXXVII. CACTÉES

1. **MELOCACTUS** Link et Otto, in Verh. Preuss. Rer. Gartenb. III (1827) 417 tab. 11 et 12; T. Durand, Ind. Gen. n. 2701. — Une trentaine d'esp. du Mexique, des Indes occ., du Brésil et de la Nouvelle-Grenade.
- M. Zuccarinii** Miquel in *Linnaea* XI (1837) 645 et in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVIII, 1 107 t. 10; Walpers, *Repert. Bot.* II 308. — Curaçao.  $\frac{1}{2}$
2. **MAMILLARIA** Haworth, Syn. Pl. Succul. (1812) 177; T. Durand, Ind. Gen. n. 2701. — Genre de 360 esp. répandues surtout dans les parties chaudes de l'Amérique bor.; quelques espèces dans les Indes occ., le Brésil et la Bolivie.
- M. affinis** De Candolle, *Mém. Esp. Cact.* (1834) 11 t. 6; Walpers, *Repert. Bot.* II 285; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 327. — Mexique.  $\frac{1}{2}$
- M. anguinea** Otto ex SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* ed. I (1841) 101; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 381. — Mexique.  $\frac{1}{2}$
- M. angularis** Otto in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 12; Walpers, *Repert. Bot.* II 285; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 366. — Mexique.
- M. applanata** Engelmänn in *Bost. Journ. Nat. Hist.* VI (1850) 198; Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 109; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 332. — Texas.
- M. Arizonica** Engelmänn in *Geol. Survey of Calif. Bot.* I (1876) 244; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 306. — Arizona, Mexique.
- Obs. Engelmänn, dans les *U. S. Geograph. Surveys* (Wheeler exped.) VI (1878) 127, considère cette espèce comme un gigantesque *M. vivipara*, de 3-5' de haut, et 4' de diamètre.
- M. aureiceps** Lemaire, *Cact. aliq. nov.* (1838) 8; *Linnaea* XIX 346; Walpers, *Repert. Bot.* II 300; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 293. Mexique.
- M. auricoma** A. Dietrich ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XIV (1848) 308; Walpers, *Annal. Bot.* I 322. — Mexique.
- M. autumnalis** A. Dietrich ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XIV (1848) 297; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 355. — Patrie inconnue.

- Mamillaria bicolor** Lehmann, *Delect. Sem. Hort. Hamburg.* (1830) ; *Linnæa* VI (*Litteratur-Bericht*) 11 ; Pfeiffer et Otto, *Abbild. u. Beschreib. Kakt.* I t. 3 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 287. — Mexique.
- — var. **longispina** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1844). M. EBURNEA Miquel in *Linnæa* XII (1838) 14 tab. 2 fig. 11. M. NIVEA Wendland, *Cat. Hort. Herrenh.* (1835). — Mexique.
- M. Bockii** Förster ex OTTO et DIETRICH, in *Allg. Gartenzeit.* XV (1847) 50 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 345 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 330. — Mexique
- M. Caput-Medusæ** OTTO ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 22 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 287 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 342. — Mexique. h
- — var. **tetracantha** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 15 ; Förster-Rümppler, *loc. cit.* 342.
- M. centricirra** Lemaire, *Cact. Hort. Monvill.* (1839) 42 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 297 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 362. — Mexique mér.
- — var. **macrothele** LEMAIRE, *loc. cit.* (1839) 42 ; Walpers, *loc. cit.* 297.
- — var. **Hopferiana** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 123. M. HOPFERIANA Linke ex Föster-Rümppler, *Handb. de Cacteenk.* (1885) 363.
- M. cirrifera** Martius in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 334 ; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Kakt.* I t. 7 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 365. — Mexique mér.
- M. crinita** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 112 et *Mém. Esp. Cact.* 7 t. 3 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 292 ; Förster-Rümppler *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 261. — Mexique mér.
- M. crocidata** Lemaire *Cact. aliq. nov.* (1838) 9 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 298 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 340. — Mexique mér.
- M. crossispina** Pfeiffer ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VIII (1840) 406 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 311 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 297. — Mexique.
- M. densa** Link et Otto, *Icon. Pl. Rar.* II (1831) t. 35 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 283 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 380. — Mexique mér.
- M. depressa** Scheidweiler in *Bull. Acad. Bruxell.* V (1838) 494 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 301. — Mexique.
- Obs. Salm-Dyck ne considèrait ce MAMILLARIA que comme une variété du M. ADUNCA Scheidweiler.
- M. discolor** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 277 ; De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 28 t. 2 fig. 2. M. PULCHELLA Hort. ex Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 10 et 94. — Mexique.
- M. divergens** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 113 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 285. — Mexique.

- Mamillaria dolichocentra** Lemaire, *Cact. aliq. nov.* (1838) 3; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 321 cum xylogr. fig. 31; Walpers, *Repert. Bot.* II 300. — Mexique.
- M. echinaria** De Candolle, *Mém. Fam. Cact.* (1828) 110 et *Mém. Esp. Cact.* (1834) 3 (sub *M. ECHINATA*); Walpers, *Repert. Bot.* II 283; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 379. — Mexique.
- M. elegans** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 111; Walpers, *Repert. Bot.* II 289; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 283. — Mexique.
- M. elongata** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 109; Walpers, *Repert. Bot.* II 289; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 381. — Mexique.
- M. Fischeri** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 20; Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 16 et 118; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 348. — Mexique mér.
- M. flavescens** De Candolle, *Rev. Fam. Cat.* (1828) 27. CACTUS — De Candolle, *Catal. Pl. Hort. Monsp.* (1813) 83. CACTUS STRAMINEUS Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 494; Walpers, *Repert. Bot.* II 284. — Mexique.
- M. fulvispina** Haworth in *Philos. Magaz.* (1830) 109; Walpers, *Repert. Bot.* II 290; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 312. — Mexique, Brésil.
- M. geminata** Scheidweiler ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* IV (1836) 48; Walpers, *Repert. Bot.* II 299; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 351. — Mexique.
- M. gladiata** Martius in *N. Acta Acad. Natur. Curios.* XVI 1 (1832) 336; Walpers, *Repert. Bot.* II 286; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 375. — Mexique.
- M. glauca** A. Dietrich ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* (1848) 339; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 363. — Mexique.
- M. glochidiata** Martius in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 336 t. 23; Walpers, *Repert. Bot.* II 293; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 259. *M. CRINIFORMIS* De Candolle, *Mém. Esp. Cact.* (1834) 8 t. 4. — Mexique.
- M. gracilis** Pfeiffer ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* VI (1838) 275; Walpers, *Repert. Bot.* II 302; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 384. — Mexique mér.
- M. hæmatactina** Ehrenberg ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* VI (1838) 266; Walpers, *Annal. Bot.* II 673. — Mexique.
- M. Karwinskiana** Martius in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 335 t. 22; Walpers, *Repert. Bot.* II 287; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* 348. — Mexique mér.
- M. Kewensis** Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 15 et 112; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 324. — Patrie?
- — var. *albispina* SALM-DYCK, *loc. cit.* *M. SPECTALILIS* Hort.



- Mamillaria Klugei Ehrenberg** in *Bot. Zeit.* II (1844) 834 ; Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XII 11 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 811. — Mexique. ♀
- M. Lehmanni**, *Hort. Berol.* ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 23 ; *Bot. Mag.* t. 3634 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 288 et *Annal. Bot.* I 331 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 390. — Mexique. ♀
- M. leucocentra Bergmann** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VIII (1840) 130 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 297 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 285. — Mexique.
- M. longimamma De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 113 et *Mém. Esp. Cact.* 10 t. 5 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 288 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 244. — Mexique.
- — var. **hexacentra** BERGMANN ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VIII (1840) 130.
- M. loricata Martius** in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 13 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 285. — Mexique. ♂
- M. macracantha De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 113 et *Mém. Esp. Cact.* (1834) 15 t. 9 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 377.
- M. ZUCCARINIANA** Martius in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 331 t. 20 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 287. — Mexique.
- M. macromeris Engelmann** in *Bot. of Wislizenus's Exp. et Cact. U. S. and Mexic. Bound. Survey* t. XXIV et XXV (1848) 97 ; Walpers, *Annal. Bot.* III 893 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 378. — Mexique bor.
- M. magnimamma Haworth** in *Philos. Magaz.* LXIII (1824) 41 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 286 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 373. — Mexique.
- — var. **arietina** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 17. **M. ARIETINA** Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839).
- M. melaleuca Karwinski** ex SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 108 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 336. — Mexique.
- M. microceras Lemaire**, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 5 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 293 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 33. — Mexique.
- M. microthele Muhlenpfordt** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XVI (1848) 11 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 283. — Mexique.
- M. multiceps Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 81 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 260. — Mexique.
- M. mutabilis Scheidweiler** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* IX (1841) 43 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 298 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 354. — Mexique.
- M. Mystax Martius** in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 332 t. 21 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 287 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 356. — Mexique mér.

- Mamillaria nigra Ehrenberg** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* (1849) 287 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 314. — Mexique.
- M. obvallata Otto** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XIV (1846) 308 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 330. — Mexique. ♀
- M. Odieriana Lemaire**, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 86 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 301 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 294. — Mexique mér.
- M. pachythele Poselger** (ubi?), Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 369. — Mexique.
- M. pentacantha Pfeiffer** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VIII (1840) 406 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 298 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 372. — Mexique.
- M. polythele Martius** in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI, I (1832) 328 t. 19 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 284 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 325. — Mexique austr.
- M. prismatica Hemsley**, *Biol. Centr.-Amer. Bot.* I (1879) 519. ANHALONIUM — Lemaire, *l'Hort. Univers.* I (1839) 231 t. 1 ; Scheidweiler, *Descr. Cact. nonn. Nov.* (1738-39) 2 t. 1 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 230. — Mexique.
- M. procera Ehrenberg** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XVII (1849) 241 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 338. — Mexique.
- M. pusilla De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 29 t. 2 fig. 1 ; Engelmann, *U. S. and Mexic. Bound. Surv.* (Emory), *Cactaceae of the Bound.* V (1859) 5 tab. 5 (var. TEXANA). C. PUSILLUS DC., *Adn. bot. Cat. Plant. Hort. Monsp.* (1813) 84 C. STELLARIS Willdenow, *Enum. Plant. Hort. Berol. suppl.* (1813) 30. M. STELLARIS Haworth ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 79. — Indes occ., Texas.
- M. pyrrocephala Scheidweiler** ex OTTO et DIETRICH, in *Allg. Gartenzeit.* IX (1841) 42 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 299 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 359. — Mexique mér.
- M. recurva Lehmann** in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 15 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 286 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 377. — Mexique mér.
- M. rhodantha Link et Otto**, *Icon. Pl. Rar.* II (1838-41) t. 26 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 290 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 290. — Mexique.
- — var. **sulphurea** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 11. M. SULPHUREA Förster, *Handb. d. Cact.* ed. I (1846) 200.
- M. rhodocantha Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 96 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 320. — Patrie inconnue.
- M. Salm-Dyckiana Scheer** in SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 134 ; Scheer ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XVIII (1850) 394 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1850) 405. — Mexique bor.

- Mamillaria sanguinea** « Haage » REGEL in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1883) 276 et in *Gartenflora* XXXII (1883) t. 1111 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 270-71 cum ic. — Mexique.
- M. Schelhasii Pfeiffer** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VIII (1840) 180 ; *Gartenflora* VI t. 207 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 296 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 253. — Mexique mér.
- M. Schlechtendalii Ehrenberg** in *Linnea* XIV (1840) 377 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 294 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cact.* (1885) 387. — Mexique.
- M. Sempervivi De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 114 et *Mém. Esp. Cact.* (1834) 13 t. 8 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 342. — Mexique mér.
- M. spinosissima Lemaire**, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 4 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 302 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 265. — Mexique.
- M. subangularis De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 112 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 295 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 367. — Mexique.
- M. supertexta Martius** ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 25 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 288 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 279. — Mexique.
- M. uberiformis Zuccarini** in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 23 ; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Kakt.* I t. 13 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 298 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 243. — Mexique mér.
- M. uncinata Zuccarini** in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 34 ; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Kakt.* I t. 19 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 291 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 346. — Mexique.
- M. variamamma Ehrenberg** ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XVII (1849) 243 ; Walpers, *Annal. Bot.* II 675. — Mexique.
- M. vetula Martius** in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI 1 (1832) 338 t. 24 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 291 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 252. — Mexique.
- M. viridis Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 16 et 116 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 349. — Mexique.
- M. Webbiana Lemaire**, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 45 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 293 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 339. — Mexique.
- M. Zepnickii C. Ehrenberg** in *Bot. Zeit.* II (1844) 835 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 812 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 296. — Mexique.
3. PELECYPHORA Ehrenberg in *Bot. Zeit.* I (1843) 737 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2703. — Genre monotype.
- P. aselliformis Ehrenberg**, *loc. cit.* (1843) 737 ; *Illustr. Hort.* V t. 186 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 822 ; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 236 fig. 21. — Mexique.

4. **LEUCHTENBERGIA** Hooker in Bot. Mag. (1848) t. 4393 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 2704. — Genre monotype.

**L. Principis** Hooker, *loc. cit.* ; *Gartenflora* VI t. 242 ; *Belg. Hort.* (1855) 259 t. 40 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 605 fig. 77. — Mexique mér.

5. **ECHINOCACTUS** Link et Otto in Verh. Preuss. Gartenb.  
Ver. III (1826) t. 420 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2705. —  
Esp. décrites, environ 260, originaires du Texas, du Mexique  
et de l'Amérique centr.

**E. acifer** Hopfer ex FÖRSTER, *Handb. d. Cacteenk.* ed. I (1846) 520 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 547. — Mexique.

**E. bicolor** Galeotti in PFEIFFER et OTTO, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* (1843-48) t. 25 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 587. — Texas, Mexique bor.

**E. cinnabarinus** Hooker in Bot. Mag. (1847) 4326 ; C. Morren in *Annal. de Gand* IV (1848) t. 474 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 334 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 617. — Bolivie. ʒ

**E. corynodes** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 55 ; Bot. Mag. t. 3906 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 311. **MALACOCARPUS** — Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 141 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 452 fig. 52. — Montévidéo ? , Mexique ? . Origine douteuse.

**E. crispatus** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 461 et *Rev. Fam. Cact.* (1829) 37 t. 8 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 313. — Mexique, Guatémala. h

— Obs. T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 545 rapporte cette espèce à l'**E. ARRIGENS** Link.

**E. cylindraceus** Engelmann (sub **E. viridescens**) in SILLIMAN, *Amer. Journ. of Science* ser. 2, XIV (1852) 5 et *Pacif. Railroad Report.* IV (1856) 32 ; *Cact. of U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 25 t. 30 ; Fenzi in *Bull. Soc. Tosc. Orticult.* II 54 fig. 7 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 40 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 474 fig. 53. — Californie.

**E. echidne** De Candolle, *Mém. sur quelq. Esp. de Cact.* (1834) 19 t. 11 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 312 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 498. **E. DOLICHACANTHUS** Lemaire et E. VANDERHEYI Lemaire, *Cact. alig. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 20 ; Walpers, *loc. cit.* II 316. — Mexique.

**E. echinoides** C. d. Cels. ex SALM-DYCK in *Allg. Gartenzeit.* XIII (1845) 356 et *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 26 et 144. — Bolivie, Chili.

— var. **Pepinianus** LABOURET, *Monog. Fam. Cact.* (1852) 178. **CEREUS PEPINIANUS** Lemaire mss. ex Salm.-Dyck in Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeit.* XIII (1845) 354 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 819. **ECHINOCACTUS** — Hort.

**Echinocactus electracanthus** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 24; Walpers, *Repert. Bot.* II 316; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 495. — Mexique.

**E. erinaceus** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 16; Walpers, *Repert. Bot.* II 317. MALACOCARPUS — Salm-Dyck, *Cat. Hort. Dyck.* (1850) 25; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 455 fig. 53. — Brésil, Montévidéo.

**E. formosus** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 50; Walpers, *Repert. Bot.* II 310; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 638. MELOCACTUS GILLIESII Hort. ex Walpers, *loc. cit.* — Chili.

**E. gibbosus** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 431; Walpers, *Repert. Bot.* II 325. CACTUS — Haworth in *Bot. Reg.* (1816) t. 137. GYMNO-CALYCIUM REDUCTUM Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* II (1850?) t. 12. — Jamaïque, Mexique, Guatémala.

— — var. **leucodictyus** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 34. E. LEUCODICTYUS Hort. ex Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 583.

**E. glaucescens** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 115; Walpers, *Repert. Bot.* II 312; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer. Bot.* I 531. — Mexique.

**E. hexædrophorus** Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 27; *Bot. Mag.* t. 4311; Walpers, *Repert. Bot.* II 322. — Mexique.

— — var. **subcostatus** SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 34. E. FOSSULATUS Scheidweiler in *Allg. Gartenzeit.* (1841) 49.

**E. humilis** T. Rümpler in FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 471. — Patrie?.

**E. hystrichacanthus** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1839) 17; Walpers, *Repert. Bot.* II 317; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 495. — Mexique.

**E. Lecontei** Engelmänn in *Pacif. Railroad Report.* IV (1856) 29 t. 2 fig. 3-5; *Cact. of U. S. and Mexic. Bound.* 22 t. 27; *Gartenflora* XXXII (1883) 148 cum ic.; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 40; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 511 fig. 62. — Californie, N.-Mexique, Mexique bor.

**E. Linkii** Lehmann in *Nov. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI 1 (1832) 316 t. 14; Walpers, *Repert. Bot.* II 310; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 554. — Mexique.

**E. leucacanthus** Zuccarini ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 66; Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* I t. 14; Walpers, *Repert. Bot.* II 314. — Mexique austr.

— — var. **tuberosus** FÖRSTER ex Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 586. C. TUBEROSUS Pfeiffer?, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 102.

**E. longehamatus** Galeotti ex FÖRSTER, *Handb. d. Cacteenk.* (1846) 321; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* II t. 16; *Bot. Mag.* t. 4632; Engelmänn, *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 22 t. 21-24; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 39; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 512 fig. 63. — Texas, Mexique.

- Echinocactus Malletianus**, *Cat. Cels*; Salm-Dyck in *Allg. Gartenzeit.* XIII (1845) 387; *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 27 et 146; Walpers, *Repert. Bot.* V 813; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 481. — Chili.
- E. Monvillei Lemaire**, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 14; Walpers, *Repert. Bot.* II 322; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 574. — Paraguay, Uruguay.
- E. multiflorus Hooker** in *Bot. Mag.* (1845) t. 4181; Walpers, *Repert. Bot.* V 816; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 578. — Mexique ?
- E. myriostigma Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1845) 20; *Bot. Mag.* t. 4177. *ASTROPHYTUM* — Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 3 et 4; *Gartenflora* XXXIV 56 cum xylogr.; Walpers, *Repert. Bot.* V 817; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 460 fig. 54. — Mexique bor.
- E. obvallatus De Candolle**, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 462 et *Rev. Fam. Cact.* (1828) 37 t. 9; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* II t. 22; Walpers, *Repert. Bot.* II 313. — Mexique austr.
- E. ochroleucus Jacobi** (ubi ?); Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 542. — Patrie ?
- E. ornatus De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 114. *E. MIRBELII* Lemaire ex Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 27; Walpers, *Repert. Bot.* II 313; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 492. — Mexique austr.
- E. Ottonis Link** et **Otto**, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* (1828-31) 31 t. 16; *Bot. Mag.* t. 3107; *Bot. Reg.* XXIV 42; Walpers, *Repert. Bot.* II 309; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 553. *CACTUS* — Lehmann, *Ind. Sem. Hort. Hamburg.* (1827) 16. — Brésil austr., Mexique ?
- E. pilosus Galeotti** ex SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 27 et 148; *Belg. Hort.* IX (1854) 21 t. 2. — Mexique bor.
- — var. **Stainesii** SALM-DYCK, *loc. cit.*; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 489. *E. STAINESII* Hooker.
- E. polyacanthus Link** et **Otto** in *Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* III (1826) 422 t. 16 fig. 1; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 52; Walpers, *Repert. Bot.* II 310. *CEREUS ERINACEUS* Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 74. — Brésil.
- E. robustus Otto** mss. ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 61; Walpers, *Repert. Bot.* II 313; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 499. — Mexique.
- — var. **prolifer** PFEIFFER, *loc. cit.* (1837) 361. *E. AGGLOMERATUS* Karwinski.
- E. Salmianus Cels**, *Portef. des Horticult.* (1847) 180 ex Labouret, *Monog. Fam. Cact.* (1858) 231. — Chili.
- E. Scheerii Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 129 et 155; Engelmann, *Cact. U. S. and Mexic. Bound.* 18 t. 17; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 38; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 524. — Mexique bor., Californie.

- Echinocactus Sellowii** Link et Otto in *Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* III (1826) t. 22 ; Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Kact.* I t. 1. E. SELLOWIANUS Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 53. MALACOCARPUS — Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 142 ; *Bot. Mag.* t. 3569. — Brésil or., Uruguay.
- E. setispinus** Engelmann in A. GRAY, *Pl. Lindheim.* (1845) 201 ; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 21 et 75 t. 20 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 39 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 521 fig. 65. — Texas.
- E. sinuatus** Dietrich ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XIX (1851) 345 ; Engelmann, *Cact. U. S. and Mexic. Bound.* 21 t. 74 fig. 11-14 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 39. — Texas, Mexique bor.
- E. spina-Christi** Zuccarini mss. ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 58 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 312. ECHINOCACTUS et ECHINOPSIS FISCHERI Hort. — Mexique.
- E. submamillosus** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 20 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 318. — Patrie ?
- E. sulphureus** Dietrich ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XIII (1846) 170 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 315 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 541. — Mexique austr.
- E. tenuispinus** Link et Otto in *Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* III (1826) 421 t. 19 fig. 1 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 936 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 534. — Brésil (Rio-Grande.)
- E. tephracanthus** Link et Otto, *loc. cit.* 422 t. 16 fig. 2 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 311 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 554. — Brésil.
- E. Texensis** Hopffer ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1845) 317 ; Engelmann in *Pl. Lindheim.* 202 ; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* t. 33 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 41 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 502 fig. 58 et 59.
- E. tortuosus** Link et Otto, *Icon. Pl. Hort. Berol.* II (1838-41) t. 15 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 310 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 552. — Brésil (Rio-Grande).
- E. tortus** Scheidweiler in *Bull. Acad. Bruxell.* V (1838) 493 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 319. E. ORNATUS De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 114 ; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 62. E. MIRBELII Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 22. — Mexique.
- E. Treculianus** Labouret, *Monog. Fam. Cact.* (1858) 202 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 504. — Texas.
- E. Tulensis** Poselger (ubi ?) ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 595. — Mexique.
- E. Williamsii** Lemaire ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XIII (1845) 385 ; *Bot. Mag.* t. 4296 ; Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Kact.* II t. 21 ; Walpers, *Repert. Bot.* V 816. ANHALONIUM — Lemaire ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 233. — Mexique.

**Echinocactus Wislizenii** Engelm. in *Bot. Wislizenus's Exped.* II (1848) 97 et *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* t. 25 et 26; Walpers, *Annal. Bot.* III 894; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 509 fig. 61. — Texas, Mexique bor.

6. **CEREUS** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 178; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2706. — Genre de 220 esp. de l'Amérique subtrop. et trop., des Indes occ. et des îles Galapagos.

**C. acutangulus** Otto mss. ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 407; Walpers, *Repert. Bot.* II 334; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 755. — Mexique.

**C. albispinus** Salm-Dyck in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 85. **PILOCEREUS** — Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 649. **C. octogonus** Hort. — Amérique mér.

**C. Baumannii** Lemaire in *l'Horticult. Univers.* (1844) 126 et 315; Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XVI 44; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 48; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 740. **C. TWEEDIEI** Hooker in *Bot. Mag.* (1850) t. 4498; *Fl. des Serres* VI t. 71. — Paraguay, Uruguay.

— Obs. Dans sa belle monographie des espèces brésiliennes, K. Schumann, *Fl. Brasil.*, fasc. CVIII (1891) 199 considère le **C. TWEEDIEI** comme une espèce distincte.

**C. Berlandieri** Engelm. in *Proc. Amer. Acad.* III (1856) 285 et *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* (1859) 38 t. 58; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 46. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler, Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 776 fig. 97. — Texas mér.

**C. Blanckii** Poselger ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* XXI (1853) 434; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 779. — Mexique.

**C. Bonplandi** Parmentier ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 408; Walpers, *Repert. Bot.* II 335; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 730. — Brésil.

**C. Brunnovii** Fr.-Ad. Haage (sub **PILOCEREO**), *Catal.* (anno?); Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 651 cum icone. — Introduit en 1870 de la Bolivie par Ræzl.

**C. cæsius** Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 205. — Patrie ?

**C. calvescens** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 116; Walpers, *Repert. Bot.* II 325. — Mexique.

— Obs. T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 706, considère ce **CEREUS** comme une forme régionale du **C. PERUVIANUS**.

**C. candelans** Gillies ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 91; Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 43; Walpers, *Repert. Bot.* II 330. — **ECHINOCEREUS** — Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 832. — Mendoza, La Plata.



- Cereus Celsianus** (*Catal. Cels.*) Salm-Dyck (sub PILOCEREO), *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 185; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 653. — Bolivie, Colombie, Pérou.
- C. Chilensis** Colla, *Hort. Ripul.* app. 2 (1825) 342; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 86; Walpers, *Repert. Bot.* II 328; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 696. **C. SUBREPANDUS** Hort. ex Walpers, *loc. cit.* — Chili.
- C. cinerascens** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 116; Walpers, *Repert. Bot.* II 332. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 786. — Mexique.
- C. cirrhiferus** Labouret, *Monog. Fam. Cact.* (1858) 311. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 778. — Mexique.
- C. coccineus** Salm-Dyck in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 122; *Abbild. und Beschreib. Cakt.* I t. 15; Walpers, *Repert. Bot.* II 338. **ECHINOCEREUS** — Engelmann, *Bot. Wislizenus's Exped.* II (1848) 93; Walpers, *Annal. Bot.* II 684. — Mexique.
- C. cœrulescens** Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* (1834) 335; *Bot. Mag.* t. 3922; Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Kakt.* II t. 24; Walpers, *Repert. Bot.* II 328. **CEREUS** et **PILOCEREUS CÆRULEUS** Hort. — Brésil.
- C. colubrinus** Otto ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1846) 409; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 742. **C. SUBTORTUOSUS** Hort. ex Förster-Rümppler, *loc. cit.* — Patrie ?.
- C. Dautwitzii** Seitz (sub PILOCEREO) in AD.-FR. HAAGE, *Catal.* (1870); *Fl. des Serres* XXI (1875) 33 t. 2163; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 656 cum icone. — Bolivie.
- C. Decaisneanus** Lemaire (sub ECHINONYCTANTHO), *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 55. **ECHINOCACTUS** — Steudel, *Nomencl. Bot.* II (1841) 536. **ECHINOPSIS** — Walpers, *Repert. Bot.* II (1843) 324; Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 38 et 150; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 621 cum ic. — Patrie ?.
- C. durangensis** Poselger (sub ECHINOCEREO) (ubi?), ex T. RÜMPLER in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 799. — Mexique.
- C. Duvalii** Auct. ? ex T. RÜMPLER (sub ECHINOPSIDE), in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 620. — Patrie ?
- C. Ehrenbergii** Pfeiffer ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* (1840) 282; Walpers, *Repert. Bot.* II 341. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 775. — Mexique.
- C. Emoryi** Engelmann in SILLIMAN, *Amer. Journ. of Sc.* ser. 2, XIV (1852) 338; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 40 t. 60 fig. 1-4; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 46. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 804. — Californie, Mexique bor.

- Cereus Engelmanni Parry** ex ENGELMANN in SILLIMAN, *Amer. Journ. of. Sc.* ser. 2, XIV (1852) 338; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* t. 57; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 44. ECHINOCEREUS — T. Rümpler in Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 805. — Californie, Mexique bor., Arizona, Utah.
- C. enneacanthus Engelmann** in *Bot. of Wislitz. Exped.* (1848) 111; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 34 t. 48 fig. 1-4 et t. 49; Walpers, *Annal. Bot.* III 896; V 44. ECHINOCEREUS — T. Rümpler in Förster-Rümpler; *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 794 fig. 103. — N.-Mexique, Mexique bor.
- C. eriophorus Otto** mss. ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 94; Pfeiffer et Otto, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* t. 22; Walpers, *Repert. Bot.* II 331; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 700. C. SUBREPANDUS Hort. — Cuba.
- C. euphorbioides Haworth**, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 75; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 92; Walpers, *Repert. Bot.* II 330. PILOCEREUS — Hort. ex T. Rümpler in Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 658. — Mexique.
- C. Eyriesii Otto** in *Allg. Gartenzeit.* (1834) 399. ECHINOCACTUS — Turpin, *Obs. Fam. Cact.* (1830) 58 t. 2; *Bot. Reg.* t. 1797; *Bot. Mag.* t. 3411; Walpers, *Repert. Bot.* II 321. ECHINONYCTANTHUS — Lemaire. *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 85. ECHINOPSIS — Zuccarini in *Abhandl. d. Bayer. Akad.* II (1836) 730; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 624 cum xylogr. — Brésil austr., Uruguay.
- C. formosus Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 50 et 213; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 738. — Uruguay.
- C. geometrizzans Martius** ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 90; Walpers, *Repert. Bot.* II 329; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 720. — Mexique austr.
- C. gladiator Lemaire**, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 28; Dietrich ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* VI (1838) 34; Walpers, *Repert. Bot.* II 340. — Mexique austr.
- C. glycyomorphus Förster** (sub ECHINOCEREO) ex FÖRSTER-RÜMLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 800. — Patrie inconnue.
- C. grandiflorus Haworth**, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 184; Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Cakt.* II t. 21; *Bot. Mag.* t. 3381; Walpers, *Repert. Bot.* II 336; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 748; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 52. CACTUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 467. — Antilles, Amérique centr. ?
- C. humilis De Candolle**, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 468; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 115; Walpers, *Repert. Bot.* II 336; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 767. — Amérique austr.
- C. Jamacaru Salm-Dyck** ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 98; Walpers, *Repert. Bot.* II 332; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 718. C. CESIUS Pfeiffer, *loc. cit.* 89. C. CYANEUS et GLAUCUS Hort. C. VALIDUS Haworth in *Philos. Mag.* X (1831) 414. — Brésil.

- Cereus lætus Salm-Dyck** (non Humboldt et Bonpland) in Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 50 et 212; Walpers, *Repert. Bot.* II 334. **C. FORMOSUS** Hort. ex Förster, *Handb. d. Cacteenk.* (1846) 404; Förster-Rümppler, ed. II (1885) 738. — Montévidéo.
- C. Lagermanni Dietrich** (ubi?) ; Labouret, *Monog. des Cactées* (1852) 306 (nomen solum) — Patrie ?.
- C. lamprochlorus Lemaire**, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 30 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 340. **CEREUS NITENS** Salm-Dyck ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* (1845) 354. **ECHINOCEREUS LAMPROCHLORUS** T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 831. — Bolivie.
- C. Landbeckii Philippi** ex REGEL in *Gartenflora* XXIV (1875) 162 t. 832 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 706 t. 832. — Chili.
- C. lutescens Salm-Dyck** ex Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 84 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 328. **C. TRICHACANTHUS**, *Hort. Berol.* ex Pfeiffer, *loc. cit.* — Patrie ?
- C. macrogonus Salm-Dyck**, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 46 et 203 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 706. — Brésil (province de Rio de Janeiro).
- C. marginatus De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 116 ; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 97 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 331 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 723. **C. MIRBELII** *Hort. Belg.* — Mexique.
- C. Martianus Pfeiffer**, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 110 ; *Bot. Mag.* t. 3768 Labouret, *Monog. Fam. Cact.* 386. — Mexique.
- C. Martini Labouret** (ubi?) ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 454 (sub MALACOCARPO). — Patrie ?.
- C. multiplex Pfeiffer**, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 70. **ECHINOPSIS** — Zuccarini ex Otto et Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Kakt.* (1843) t. V ; Walpers, *Repert. Bot.* II 323 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 632 fig. 8 et 9. **ECHINOCACTUS** — *Hort. Berol.* ex Förster-Rümppler, *loc. cit.* — Brésil mér.
- C. oxygonus Pfeiffer**, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 70. **ECHINOCACTUS** — Link et Otto in *Verh. Gartenb. Ver. Preuss.* VI (1829 ?) 419 t. 1 ; *Bot. Reg.* t. 1717. **ECHINOPSIS** — Zuccarini in *Abhandl. d. Bayr. Akad.* II (1837) 730 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 324. **ECHINONYCTANTHUS** — Lemaire, *Cact. Gen. et Spec. Hort. Monvill.* (1839) 85. — Brésil austr.
- C. paucispinus Engelmann**, *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* (1859) 37 t. 56 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 45. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 794. — Texas occ.
- C. pentalophus De Candolle**, *Rev. Fam. Cact.* (1829) 117 ; *Bot. Mag.* t. 3651 (var. **SUBARTICULATUS** Pfeiffer) ; Walpers, *Repert. Bot.* II 333 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 774. — Mexique.

- Cereus Pentlandi** Salm-Dyck (sub **Echinopside**), *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 38; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 611. **ECHINOCACTUS** — Hooker f. in *Bot. Mag.* t. 4124; Walpers, *Repert. Bot.* V 843; *Illustr. Hort.* VI (1859) t. 214. — Pérou.
- — var. **longispina** HORT. ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 612.
- — var. **Pfersdorffii** HORT. ex FÖRSTER-RÜMPLER, *loc. cit.* (1885) 613.
- C. Peruvianus** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 88 et *Abbild. und Beschreib. Kakt.* II t. 5; Walpers, *Repert. Bot.* II 329; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 703. **CACTUS** — L., *Sp. Pl.* ed. I (1753) 467; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 38. — Toute l'Amérique trop.
- C. Phoeniceus** Engelmann, *Pacif. Railroad. Report.* IV (1856) 34 t. 4 fig. 1 et *Syn. Cact. Unit. Stat.* 284; C. Mueller in Walpers, *Repert. Bot.* V 45. **ECHINOCEREUS** — Engelmann in *Bot. of Wislitz. Exped.* (1848) n. 9; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 788. — Californie, Texas, Colorado, Arizona.
- C. Poselgerianus** Link (ubi?) ex T. Rümppler. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 779. — Mexique.
- C. procumbens** Engelmann in *Mem. Amer. Acad.* IV (1849) 49; in *Bost. Journ. Nat. Hist.* VI (1850) 203 et *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* t. 59 fig. 1-11; Walpers, *Annal. Bot.* II 683; V 46. **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 781. — Texas, Mexique bor.
- C. pteranthus** Dietrich et Otto in *Allg. Gartenzeit.* (1834) 209. — **C. NYCTICALLUS** Link in *Verh. Gartenb. Ver. Preuss.* X (1834) 373 t. 4; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 753; Walpers, *Repert. Bot.* II 336. — Mexique, Colombie.
- C. Roemerii** Engelmann in litt. ex SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 44 et 189; Engelmann in *Mem. Amer. Acad.* IV (1849) 49; *Bost. Journ. Nat. Hist.* VI (1850) 204; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 44. — **ECHINOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 792. — Texas.
- C. rostratus** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* I (1838) 40; Walpers, *Repert. Bot.* II 339; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 758. — Mexique.
- C. Russelianus** Hort. Berol. ex FÖRSTER, *Handb. d. Cacteenk.* (1846) 387. **PILOCEREUS** — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 682. — Vénézuëla.
- C. senilis** Salm-Dyck in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* (1828) 464; Walpers, *Repert. Bot.* II 325. **CACTUS** — Haworth in *Philos. Magaz.* LXIII (1824) 41. **PILOCEREUS** — Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 6; Walpers, *loc. cit.* V 818; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 584 fig. 91 et 92. — Mexique, Guatémala.

- Cereus serpentinus** Lagasca in *Anal. Cienc. Nat. Madrid* IV (1801) 261; De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* 31 t. 42; *Bot. Mag.* t. 3561; Walpers, *Repert. Bot.* II 333; *Gartenflora* (1882) t. 1079; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 738 fig. 95. CACTUS — Willdenow in Schlecht., *Enum. Pl. Hort. Berol.* suppl. 31; Link et Otto, *Icon. Pl. Hort. Berol.* (1823) t. 42. — Mexique austr.
- C. Spachianus** Lemaire in *l'Hort. Univ.* I (1841) 225; Labouret, *Monog. Fam. Cact.* 324. ECHINOCEREUS — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 807. — Mexique.
- C. speciosissimus** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 117; *Bot. Mag.* t. 3822; *Bot. Reg.* t. 436; Walpers, *Repert. Bot.* II 338. CACTUS — Desfontaines in *Mém. Mus. Paris* III (1817) 190 t. 9; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 770. — Mexique, Guatémala.
- C. stramineus** Engelmann, *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* II (1859) 35 t. 46, 47 et 48 fig. 1; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 44. ECHINOCEREUS — T. Rümppler in Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 797; Texas, Mexique bor.
- C. subrepandus** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 78; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 93; Walpers, *Repert. Bot.* II 330. — Iles Caraïbes, Saint-Domingue.
- C. Thurberi** Engelmann in *Amer. Journ. of Sc.* XVII (1854) 234; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 44 t. 74 fig. 15; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 47. — Sonora, Arizona, Mexique bor.
- C. tilophorus** Pfeiffer ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VI (1835) 380; *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 100; Walpers, *Repert. Bot.* II 339. PILOCEREUS OLIGOGONUS Förster ex Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 677. — Mexique, Brésil.
- C. tortuosus** Forbes mss. ex OTTO et DIETRICH in *Allg. Gartenzeit.* VI (1835) 35; Walpers, *Repert. Bot.* II 340; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 728. — Buenos-Ayres.
- C. triangularis** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 180; Walpers, *Repert. Bot.* II 337; *Bot. Reg.* t. 1807; *Bot. Mag.* t. 1884; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 764. CACTUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 468. — Brésil (prov. de Rio-de-Janeiro).
- C. tuberosus** Poselger ex ENGELMANN, *Syn. Cact. Unit. Stat.* (1856) 30; *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 39 t. 59 fig. 12; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 46. — Mexique.
- C. tubiflorus** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 71; Hartinger, *Parad. Vindobon.* I t. 8. ECHINOCACTUS — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1838) t. 3627. ECHINOPSIS — Zuccarini in *Abhandl. d. Bayr. Akad.* II (1837) 730. ECHINONYCTANTHUS — Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 85. ECHINOPSIS ZUCCARINII Pfeiffer; Walpers, *Repert. Bot.* II 324; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1886) 634. — Brésil austr.

**Cereus turbinatus** Pfeiffer ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* III (1835) 59; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 72 et *Abbild. und Beschreib. Kakt.* II t. 7. ECHINOPSIS ZUCCARINII in *Abhandl. d. Bayr. Akad.* II (1837) 673; Walpers, *Repert. Bot.* II 324; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 623. ECHINONYCTANTHUS — Lemaire, *Cact. Gen. et Sp. Hort. Monvill.* (1839) 84. — Brésil austr.

7. **PHYLLOCACTUS** Link, *Handb. Erkenn. vorkomm. Gewächse* II (1831) 40; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2710. — 13 espèces de l'Amérique trop.

**P. biformis** Labouret, *Monog. Fam. Cact.* (1858) 418; *Bot. Mag.* t. 6156. DISISOCACTUS — Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 9; Lemaire, *Jard. fleur.* III (1853) t. 321; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 875 fig. 120. — Honduras.

**P. Cooperi** Haage ex Regel in *Gartenflora* XXXII (1883) 218. — Hybride du *P. crenatus* et du *CEREUS GRANDIFOLIUS*.

**P. crenatus** Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 55 et 224; *Gartenflora* (1821) t. 321; (1862) t. 367; Walpers, *Repert. Bot.* V (1846) 820; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 844. *CEREUS* — Lindley in *Bot. Reg.* (1844) t. 31. — Honduras.

8. **EPIPHYLLUM** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 197; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2711. — Genre de 3 espèces.

**E. Phyllanthus** Haworth, *loc. cit.* (1812) 197; K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII t. 44. *CEREUS* — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 469. *CACTUS* — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 459; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 145. *PHYLLOCACTUS* — Link ex Pfeiffer et Otto, *Beschreib. und Abbild. Kakt.* (1843) t. 10; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 848. — Brésil austr., Guyane, Antilles.

**E. Russelianum** Hooker in *Bot. Mag.* (1839) t. 3717; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1886) 873 fig. 119. *CEREUS* — Gardner in *Bot. Mag. loc. cit.* — Brésil (prov. de Rio-de-Janeiro).

**E. truncatum** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 85. *CACTUS* — Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* II (1822) 24; *Bot. Cab.* t. 1207; *Bot. Reg.* IX t. 696; *Bot. Mag.* t. 2562; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 869. *CEREUS* — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 470. *ZYGOCACTUS* — K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII (1890) 224 t. 46. — Brésil occ.

9. RHIPSALIS Gærtner, *De Fruct. et Sem. I* (1788) 137 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 2712. — 30 esp. de l'Amérique trop. ; une esp. existe dans l'Afrique austr. et dans les îles Ceylan et Maurice.

**R. communis** K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII (1891) 280. LEPISMUM — Pfeiffer ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* (1833) 313 ; *Bot. Mag.* t. 3763 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 897 fig. 103. — Brésil, République Argentine.

**R. cribrata** T. Rümpler in FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 889. HARIOTA — Lemaire in *Ill. Hort.* IV (1837) misc. 84. — Brésil (Minas-Gerães).

**R. micrantha** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 476 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 343 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 884. CACTUS — Kunth, *Syn. Pl. aequinoct.* III (1824) 369. — Equateur.

**R. Myosurus** K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII (1891) 280. CACTUS — Salm-Dyck in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 369. LEPISMUM — Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 139 ; *Bot. Mag.* t. 3755 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 897. — Brésil or.

**R. paradoxa** Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 228 ; K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII 280 t. LV fig. 1. LEPISMUM — Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 140. — Brésil.

**R. pentaptera** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 132 ; Pfeiffer ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* (1836) 105 et *Abbild. und Beschreib. Kact.* I t. 17 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 284. — Brésil austr., République Argentine.

**R. ramulosa** Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 130 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 343 ; K. Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII 287 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 879. CEREUS — Salm-Dyck in Pfeiffer, *loc. cit.* — Costa-Rica.

**R. Saglionis** Otto in WALPERS, *Repert. Bot.* II (1843) 936 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 336 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 891. HARIOTA — Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 39. R. CEREUSCULA Haworth in *Philos. Mag.* (1830) 109. R. BRACHIATA Hooker in *Bot. Mag.* (1843) t. 4039. — Uruguay, Buenos-Ayres.

**R. salicornioides** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 183 ; Hooker in *Bot. Mag.* t. 2461 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 345 ; *Bot. Cab.* t. 369 ; *Rev. Hort.* (1861) t. 110 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 892. CACTUS — Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 497. HARIOTA — De Candolle in VIIIe *Mém. sur quelques esp. Cact.* (1834) 22 ; Sims, *Bot. Mag.* t. 2461. — Brésil.

**R. teres** Steudel, *Nomencl. Bot.* II (1841) 449. CACTUS — Vellozo, *Fl. Flum.* V (1827) t. 30. RHIPSALIS CONFERTA Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 60 et 229 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 885. — Brésil or. et austr.

10. *OPUNTIA* Miller, Garden. Dict. ed. VIII (1768); T. Durand, Ind. Gen. n. 2712. — Genre de plus de 200 esp. des régions chaudes et trop. de l'Amérique. Une esp. largement dispersée dans l'ancien monde.

- O. acanthocarpa** Engelmann et Bigelow in *Pacif. Railroad Report. (Whipple exped.)* IV (1856) 51 t. 18 fig. 1-3; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 984; Walpers, *Annal. Bot.* V 56. — Arizona, Utah.
- O. albicans** Salm-Dyck ex Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 155; Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 67 et 237; Walpers, *Repert. Bot.* II 349; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 941. — Mexique.
- O. Amyclæa** Tenore, *Fl. Nap.* append. 3 (1826) t. 236 et in *Att. d. Acad. d. Sc.* V t. 2, VI 1 t. 2; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 159; Walpers, *Repert. Bot.* II 350. *O. MAXIMA* Haworth (non Miller), *Syn. Pl. Succ.* (1812) 210. — Mexique, Italie mër., Sardaigne, Sicile, Dalmatie (indig. en Europe?).
- O. basilaris** Engelmann et Bigelow in *Pacif. Railroad Report. (Whipple exped.)* IV (1856) 43 tt. 13 et 23; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 935; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 52. — États-Unis mër.-occ.
- O. Boliviana** Salm-Dyck ex Otto et Dietrich in *Allg. Gartenzeit.* XIII (1845) 388; Walpers, *Repert. Bot.* V 821; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1886) 907. — Bolivie.
- O. Brasiliensis** Haworth, *Supp. Pl. Succ.* (1819) 79; Otto et Pfeiffer, *Abbild. und Beschreib. Kact.* I t. 29; *Bot. Mag.* t. 3293; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 966; Schumann in *Fl. Brasil.* fasc. CVIII 304 t. LI. *CACTUS* — Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* suppl. (1813) 33. — Brésil, République Argentine, Paraguay.  $\frac{1}{2}$
- O. camanchica** Engelmann et Bigelow in *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1856) 40 tt. 9 et 22; Walpers, *Annal. Bot.* V 50; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 953. — États-Unis mër.-occ.
- O. candelabriformis** Martius inss. ex Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 159; Walpers, *Repert. Bot.* II 350; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 946. — Mexique.
- O. clavarioides** Otto in Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 173; Walpers, *Repert. Bot.* II 353; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 975. *CEREUS* — *Catal. Cact. Hort. Berol.* (1833) ex Walpers. — Mexique.
- O. corrugata** « *Hort. Angl.* » ex Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 144; *CACTUS* — Lamarck (ubi?) ex Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 909. *O. Eburnea* Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 35; Walpers, *Repert. Bot.* II 355. — Patrie?
- O. crinifera** Salm-Dyck in Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 157. *O. FULVISPINIA* et *LANIGERA* Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 65 et 234. *O. SENILIS* Parmentier in Pfeiffer, *loc. cit.* — Brésil.



- Opuntia cylindrica** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 471 ; *Bot. Mag.* t. 3304 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 352 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 977. CACTUS — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 539. CEREUS — Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 183. — Madère.  $\frac{1}{2}$
- O. cymochila** Engelm. et Bigelow in *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1856) 42 tt. 12 et 23 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 923. — États-Unis occ.
- O. decipiens** De Candolle, *Rev. Fam. Cact.* (1828) 118 ; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 172 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 353. — Mexique.
- O. diademata** Lemaire, *Cact. aliq. Nov. Hort. Monvill.* (1838) 36 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 353 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 912. — La Plata.
- O. Dillenii** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 79 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 472 ; Wight, *Illustr. of Ind. Bot.* I t. 114 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 985 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 351. CACTUS — *Bot. Reg.* III (1818) t. 255. — Amérique trop., mais natur. dans l'Inde et en Espagne.  $\frac{1}{2}$
- O. elatior** Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 4 ; Haworth, *Syn. Pl. Succ.* 188 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 351 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 958. TUNA ELATIOR Dillenius, *Hort. Eltham.* (1732) fig. 397. — Amér. mér.  $\frac{1}{2}$
- O. Emoryi** Engelm., *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* (1859) 53 tt. 70 et 71 ; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 54 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 972. — Arizona, Colorado, Californie, Texas, Mexique.
- O. Engelmanni** Salm-Dyck, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 235 ; Engelm., *Cact. U. S. and Mexic. Bound. Surv.* 47 t. 75 fig. 1-4 ; Walpers, *Annal. Bot.* II 686 et V 49. — Californie, Texas.
- — var. **occidentalis** ENGELMANN in Brewer et Watson, *Geol. Surv. of Calif., Bot.* I (1876) 248. O. OCCIDENTALIS Engelm. et Bigelow in *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1856) 38 t. 7. — Californie, Texas.  $\frac{1}{2}$
- O. horrida** Salm-Dyck mss. ex DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 472 ; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 161 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 351. CACTUS HUMILIS Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 187. OPUNTIA — Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 189. O. TUNA Miller, var. HUMILIOR Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 949. — Amérique mér.
- O. leonina** Haage et Schmidt (ubi ?) ex FÖRSTER-RÜMPLER, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 974 cum icone nigr. — Chili.  $\frac{1}{2}$
- O. microdasys** Lehmann, *Ind. Sem. Hort. Hamburg.* (1827) 16 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 346 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 932. — Texas, Mexique mér.
- O. Missouriensis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 472 ; Engelm. et Bigelow in *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1856) 44 tt. 14 et 23 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 349. CACTUS FEROX Nuttall (non Willdenow), *Gen. N.-Amer. Pl.* I (1818) 296 ; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 968. — Plaines du Mississipi, Montagnes Rocheuses.

- Opuntia monacantha** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 81; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 954; *Bot. Mag.* t. 3911; *Bot. Reg.* XX t. 1726; Walpers, *Repert. Bot.* II 351. CACTUS — Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* suppl. (1813) 34. — Brésil, République Argentine.
- O. nigricans** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 189; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 165; Walpers, *Repert. Bot.* II 351; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 957. CACTUS — Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 187. C. TUNA Linné, var. NIGRICANS Sims in *Bot. Mag.* (1813) t. 1567. — Amérique.
- O. oligacantha** « *Hort. Vindob.* » ex SALM-DYCK, *Cact. Hort. Dyck.* (1850) 68 et 241; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 945. — Mexique.
- O. phæacantha** Engelmänn in *Mem. Amer. Acad.* IV (1849) 52 et *Cact. of U. S. and Mexic. Bound. Surv.* t. 75 fig. 9-13; Walpers, *Annal. Bot.* II 686 et V 50; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 956. — Texas, Mexique bor.
- O. polyantha** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 190; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 138; Walpers, *Repert. Bot.* II 351; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 947 fig. 130. CACTUS — Sims in *Bot. Mag.* (1826) t. 2691. — Amérique mér.
- O. Rafinesquii** Engelmänn in ENGELMANN et BIGELOW, *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1856) 41 t. 10 fig. 3-5 et 22 fig. 7 et 8; *Rev. Hort.* (1868) 90 fig. 10 et 11; C. Mueller in Walpers, *Annal. Bot.* V 51; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 922. CACTUS OPUNTIA Torrey (non Linné), *Fl. of Unit. Stat.* (1824) 467 pr. pe. — Kansas, Nebraska.
- O. Salmiana** Parmentier in PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 172; *Bot. Mag.* t. 4512; Walpers, *Repert. Bot.* II 353; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 73 et 670; Lemaire, *Jard. Fleur.* II (1852) t. 191; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 919. — Brésil.
- O. stricta** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 191; Walpers, *Repert. Bot.* II 348; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 931. O. INERMIS De Candolle, *Pl. Grass.* t. 138. CACTUS STRICTUS Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 188. Amérique trop.
- O. triacantha** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III (1828) 473; Pfeiffer, *Enum. Diagn. Cact.* 163; Miquel in *Bull. Sc. Phys. et Nat. Néerl.* (1848) 49; Walpers, *Repert. Bot.* II 351; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1886) 944. CACTUS — Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* suppl. (1813) 34. Amérique mér.
- O. tuberosa** « *Hort. Angl.* » ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 146; Walpers, *Repert. Bot.* II 348; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 911. O. ALPINA Gillies. — La Plata.
- O. Tuna** Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 3; Spach, *Hist. Veget. Phan.* t. 46; Walpers, *Repert. Bot.* II 350; Förster-Rümppler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 948. CACTUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 268. OPUNTIA — Linné, var. TUNA De Candolle, *Pl. Grass.* t. 138. — Mexique, Equateur, Colombie, (subsp. en Espagne et en Portugal).  $\frac{1}{2}$

**Opuntia tunicata** Ottó, mss. ex PFEIFFER, *Enum. Diagn. Cact.* (1837) 170; Walpers, *Repert. Bot.* II 352; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 983. CACTUS — Lehmann in *N. Acta Acad. Nat. Curios.* XVI 1 (1832) 319. — Mexique bor.

**O. vulgaris** Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 1; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 414; Walpers, *Repert. Bot.* II 347; Förster-Rümpler, *Handb. d. Cacteenk.* (1885) 921. CACTUS OPUNTIA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 268; *Bot. Mag.* t. 2393. — Amérique bor. (Europe mér. introd.).

## XXVIII. FICOIDÉES

1. **MESEMBRYANTHEMUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 453; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2716. — Genre de 300 esp. représenté dans la Rég. Médit., l'Arabie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et surtout l'Afrique australe.

**M. acinaciforme** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 485; *Bot. Mag.* t. 5539; Andrews, *Bot. Reposit.* t. 508; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 428; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 19 t. 6; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 442. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

**M. adscendens** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 220; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 226; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 8 t. 4; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 403. — Afrique austr.  $\frac{2}{4}$

**M. æquilaterale** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 77; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 19 t. 1; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* III 429; Benth, *Fl. Austral.* III 324; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 251. — Australie, côtes du Chili et de la Californie.  $\frac{2}{4}$

**M. agninum** Haworth in *Philos. Mag.* LXVIII (1826) 127; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 5 t. 8; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 398. — Afrique austr.  $\frac{2}{4}$

**M. albicaule** Haworth in *Philos. Mag.* LXVIII (1826) 331; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 433. — Afrique austr.

**M. attenuatum** Haworth in *Philos. Mag.* LXVIII (1826) 126; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 51 t. 2; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 445. — Afrique austr.  $\frac{2}{4}$

**M. aureum** Linné, *Syst. Nat.* ed. X (1759) 1050; *Bot. Mag.* t. 262; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 11 et *Prodr. Regn. Veget.* III 437; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 25 t. 3; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 448. — Afrique austr.  $\frac{2}{4}$

- Mesembryanthemum bellidiflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed I (1753) 482 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 41 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 12 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 406. — Afrique austr. 2
- M. blandum** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 95 ; *Bot. Reg.* t. 582 ; Lodiges, *Bot. Cab.* t. 599 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 26 t. I ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 418. — Afrique austr. 3
- M. bulbosum** Haworth in *Philos. Mag.* LXIV (1824) 428 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 52 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 447. — Afrique austr. 3
- M. candens** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 186 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 51 t. 4 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 445. — Afrique austr. 3
- M. caninum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 159 et *Syn. Pl. Succ.* 217 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 5 t. 9 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 398 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 95 (var. **PLURIDENTATUM** Sonder). — Afrique austr. 2
- M. coccineum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 247 et *Syn. Pl. Succ.* 265 ; *Bot. Mag.* t. 59 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 83 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 46 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 436. — Afrique austr. 3
- M. conspicuum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 240 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 27 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 419. — Afrique austr. 3
- M. corniculatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 676 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 108 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 15 t. 6 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 408. — Afrique austr. 2 3
- M. cruciatum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 173 et *Syn. Pl. Succ.* 224 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 7 t. 7 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 401. — Afrique austr. 2
- M. cultratum** Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* (1820) 7 et *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 8 t. 5 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 403. — Afrique austr. 2
- M. curtum** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 126 et *Syn. Pl. Succ.* 334 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 36 t. 6 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 426. — Afrique austr. 3
- M. curvifolium** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 88 et *Syn. Pl. Succ.* 290 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 47 t. 2 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 438. — Afrique austr.
- M. dolabriforme** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 482 ; *Bot. Mag.* t. 32 ; De Candolle, *Pl. Grasses* t. 6 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 6 t 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 400. — Afrique austr. 3

- Mesembryanthemum echinatum** Aiton, *Hort. Kew.* II (1789) 194 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 24 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 53 t. 2 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 448. — Afrique austr.
- M. Ecklonis** Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* (1836-63) fasc. 49 t. 5 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 441. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. falciforme** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 299 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 29 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 420. — Afrique austr.
- M. fastigiatum** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 173 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 433. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. felinum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 161 et *Syn. Pl. Succ.* 216 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 152 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 5 t. 2 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 397. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. filamentosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 694 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 212 fig. 273 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 20 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 413. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. formosum** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 165 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1293 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 27 t. 4 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 419. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- H. geminatum** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 92 et *Syn. Pl. Succ.* 280 ; Jacquin, *Fragm. Bot.* t. 50 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 422. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. glabrum** Aiton, *Hort. Kew.* II (1789) 196 ; Andrews, *Bot. Reposit.* I t. 57 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 459. HYMENOGYNE — Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 192. — Afrique austr.  $\odot$
- M. glaucum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 486 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 146 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV t. 439 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 23 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 417. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. glomeratum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 694 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1043 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 439. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. grandiflorum** Haworth in *Philos. Mag.* LXVIII (1826) 328 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 8 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 403. — Afrique austr.  $\mathfrak{z}$
- M. heteropetalum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 294 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 21 t. 2 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 413. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. inclaudens** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 133 ; *Bot. Mag.* t. 1663 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 21 t. 4 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 430. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. Lehmanni** Ecklon et Zeyher, *Enum. Pl. Afr. Austr.* (1834-37) n. 1996 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 430. — Afrique austr.

- Mesembryanthemum linguæforme** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 188 et *Syn. Pl. Succ.* 221 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 71 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1307 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 404. — Afrique austr.
- — var. **latum** Salm-Dyck, *loc. cit.* fasc. 6 t. 5 ; Sonder, *loc. cit.* II 404. M. **latum** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 98.
- M. lupinum** Haworth in *Philos. Mag.* LXIV (1824) 111 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 397. — Afrique austr. h
- M. micans** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 485 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 158 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 50 t. 8 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 443. — Afrique austr. h
- M. minimum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 126 et *Syn. Pl. Succ.* 203 ; Petiver, *Gazophyl. Nat. Artis. Decad.* t. 39 fig. 3 ? ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 392. — Afrique austr. h
- M. multiceps** Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* (1836-63) fasc. 6 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 399. — Afrique austr.
- M. multiflorum** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 96 et *Syn. Pl. Succ.* 285 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 37 t. 1. M. **imbricatum** Haworth ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 426. — Afrique austr. h
- M. multipunctatum** Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* (1836-63) fasc. 3 t. 6 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 395. — Afrique austr. 2
- M. muricatum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 364 et *Syn. Pl. Succ.* 297 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 195 fig. 246 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 30 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 421. — Afrique austr. h
- M. mutabile** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 377 et *Syn. Pl. Succ.* 294 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 21 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 414. M. **filamentosum** De Candolle (non Linné), *Pl. Grass.* t. 60. — Afrique austr. h
- M. noctiflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 481 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 495 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 43 t. 2 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 431. — Afrique austr. h
- M. obeordellum** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 21 et *Syn. Pl. Succ.* 203 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 1 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 332. — Afrique austr. 2
- M. polyanthum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 270 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1281 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 439. — Afrique austr. h
- M. pustulatum** Haworth, *Suppl. Pl. Succ.* (1819) 88 et *Revis. Pl. Succ.* 96 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 8 t. 10 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 404. — Afrique austr. 2
- M. rhomboideum** Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* (1836-63) fasc. 6 t. 5 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 400. — Afrique austr.

- Mesembryanthemum rigidum** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 95 et *Syn. Pl. Succ.* 283 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 425. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. roseum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 335 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 24 t. 4 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 420. — Afrique austr.
- M. rostratum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 486 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 186 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 3 t. 7 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 395. — Afrique austr.  $\mathfrak{z}$
- M. rubricaulis** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 239 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 20 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 413. — Afrique austr.
- M. Schollii** Salm-Dyck, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1820) 10 et *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 17 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 410. **M. aduncum** Jacquin, *Fragm. Bot.* (1809) t. 51 fig. 2. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. spectabile** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 385 et *Syn. Pl. Succ.* 240 ; *Bot. Mag.* t. 396 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 153 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 27 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 419. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. stellatum** Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 14 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 29 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 447. — Afrique austr.
- M. subincanum** Haworth in *Philos. Mag.* (1824) 427 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 49 t. 4 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 441. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. tigrinum** Haworth, *Obs. on Gen. Mesembr.* (1794) 164 et *Syn. Pl. Succ.* 216 ; *Bot. Reg.* t. 260 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 5 t. 1 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 397. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. tuberosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 484 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 78 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 440. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. tumidulum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 286 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 37 t. 3 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 426. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- — var. **foliosum** Sonder, *loc. cit.* II (1862) 426. **M. foliosum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 130.
- M. umbellatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 481 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 208 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 427. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. umbelliflorum** Jacquin in Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 354 et *Hort. Schœnbr.* IV t. 478 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 44 t. 6 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 433. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$
- M. uncinatum** Miller, *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 18 ; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 54 ; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 423. — Afrique austr.

- Mesembryanthemum vaginatum** Haworth, *Miscell. Nat.* (1803) 95 et *Syn. Pl. Succ.* 284; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 423. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- M. verruculatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 486; De Candolle, *Pl. Grass.* t. 36; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 39 t. 1; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 428. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$
- M. violaceum** De Candolle, *Pl. Grass.* (1799-1829) liv. 14 n. 84 et in *Annal. Sc. Nat.* sér. 3, XVIII (1852) t. 10 fig. 1 à 16; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 439. **M. PUNICEUM** Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV (1804) t. 442. — Afrique austr.
- M. virgatum** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 290; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Mesembr.* fasc. 23 t. 1; Sonder in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* II 416. — Afrique austr.  $\frac{1}{2}$

## XXIX. OMBELLIFÈRES

1. **HYDROCOTYLE** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 200; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2710. — Environ 60 esp. des régions tempérées et chaudes du monde entier.
- H. Asiatica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 234; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* II 669. **H. FICARIOIDES** Richard in *Annal. Gén. Sc. Phys. Bruxel.* IV (1820) 177 t. 53. — Asie, Afrique, Océanie (rég. chaudes et trop.).  $\frac{1}{2}$
- H. moschata** Forster, *Fl. Insul. Austral. Prodr.* (1786) 136; Richard, *Monog. Gen. Hydrocot.* 42 t. 64; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 67; Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* 87. — Nouvelle-Zélande.
2. **ERYNGIUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 199; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2758. — Environ 100 esp. bien distinctes habitant les régions chaudes et tempérées du monde entier (Afrique austr. exceptée).
- E. Alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1853) 233; *Bot. Mag.* t. 922; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 55; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1847; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 755. — Pyrénées, Dauphiné, Jura, Suisse, Piémont, Lombardie, Carniole, Carinthie, Monténégro.  $\frac{1}{2}$
- E. Bourgati** Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 7 t. 3; Trattinick, *Thesaur. Bot.* fasc. XX t. 74 et *Archiv. d. Gewächsk.* t. 183, 183<sup>a</sup>; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 11; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 756. — Pyrénées franç., Espagne.  $\frac{1}{2}$



**Eryngium glaciale** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 44 et *Voy. Bot. Esp.* 235 t. 65 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 9. — Espagne. 2

**E. macrocalyx** Schrenk, *Enum. Pl. Nov.* (1841) 60 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II (1844-46) 238. — Sibérie altaïque. 2

3. **ASTRANTIA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 202 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2761. — 6 esp. de l'Europe et de l'Asie occ.

**A. Biebersteiniana** Fischer in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* II (1835) 28 ; Boissier, *Fl. Or.* II 830. **A. MAJOR** Marschall Bieberstein (non Linné) *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 202. — Caucase. 2

**A. Carniolica** Wulfen in JACQUIN, *Fl. Austr. Icon.* V (1778) 31 t. 10 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1845. **A. MINOR** Scopoli (non Linné), *Fl. Carniol.* I (1772) 187. — Tyrol, Istrie, Carinthie, Carniole. 2

**A. gracilis** Bartling in *Ind. Sem. Hort. Gœtt.* (1840) ; Caruel, *Fl. Ital.* VIII 218 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1845. — Hongrie, Dalmatie, Frioul. 2

**A. major** Linné, *Sp. Pl.* éd. I (1753) 235 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 191 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* XI t. 749 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1843 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 752 ; Boissier, *Fl. Or.* II 830. — Europe centr., mér. et or., Caucase, Daghestan. 2

**A. minor** Linné, *Sp. Pl.* éd. I (1753) 235 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 93 ; Smith, *Exot. Fl.* t. 77 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1844 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 753. — Wurtemberg, Suisse mér., Pyrénées, Dauphiné, Savoie, Piémont, Lombardie, Tyrol, Styrie. 2

**A. pauciflora** Bertoloni in DESVAUX, *Journ. de Bot.* IV (1813) 76 et *Fl. Ital.* III 128 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 378 et *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1846 ; Caruel, *Fl. Ital.* VIII 213. — Italie, Étrurie, Naples. 2

4. **HACQUETIA** Necker, *Elem. Bot.* I (1790) 182 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2762. — Genre monotype.

**H. Epipactis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 85 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1842. **ASTRANTIA** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 177 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 10 ; Scopoli, *Fl. Carniol.* I t. 6. **DONDIA** — Sprengel, *Umbellif. Prodr.* (1813) 21 t. 1. — Europe centr. Piémont. 2

5. **ERIGENIA** Nuttall, *Gen. Amer. Pl.* I (1818) 187 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2790. — Genre monotype.

**E. bulbosa** Nuttall, *Gen. N.-Amer. Plant.* I (1818) 187 ; Torrey, *N.-York State Fl.* t. 39 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I 645. **SISON** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 169. — États-Unis, New-York, Pensylvanie, Ohio, bassin du Missouri. 2

6. **BUPLEURUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 225 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2792. — Genre comprenant environ 60 esp. bien distinctes habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique bor.
- B. angulosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 236 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 718 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 76. **B. PYRENEUM** Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 8 t. 4 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IX t. 918 et *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1882. — Pyrénées. ♀
- B. longifolium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 237 ; Schrank, *Fl. Monac.* IV t. 306 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1881 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 717. — De la France et de l'Allemagne à la Pologne et la Bosnie. ♀
7. **PIMPINELLA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 236 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2814. — Genre de 75 esp. environ habitant le monde entier (l'Australie exceptée).
- P. anthriscoides** Boissier, *Fl. Or.* II (1873) 874. — Syrie, Arménie, Perse. ♀
- P. siifolia** Leresche in TRIMEN, *Journ. of Bot.* XVII (1879) 198. — Espagne.
8. **CRYPTOTENIA** De Candolle in *Coll. Mém.* V (1829) 42 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2818. — Genre monotype.
- C. Canadensis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 119 ; Torrey et Gray *Fl. of N.-Amer.* I 613. Sison — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 252. **C. JAPONICA** Hasskarl, *Retzia* I (1853) 113. — Amérique bor.-or., Chine, Japon.
9. **CHÆROPHYLLUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 227 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2825. — 36 esp. de l'Europe, de l'Asie bor., occ. et centr. de l'Afrique et de l'Amérique bor.
- C. elegans** Gaudin, *Fl. Helv.* II (1828) 364. **C. HIRSUTUM** Linné, var. **VERTICILLATUM** Schleicher, *Pl. Phænog. Helv. Cent.* III (1805) n. 40 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 227. — Suisse mér., Tyrol, Lombardie, Transylvanie. ♀
- C. roseum** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 234 et III 239 ; Hoffmann, *Umbellif.* 35 et 212 t. I β fig. 33 ; Boissier, *Fl. Or.* II 906. — Caucase or., Arménie russe. ♀

10. **ANTHRISCUS** Hoffmann, Umbellif. I (1814) 38 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2829. — Genre de 10 esp. habitant l'hémisphère bor. de l'ancien monde.

**A. nemorosa** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 237 ; Sprengel, *Umbellif. Prodr.* (1813) 27 ; *Comm. Gætt. Rec.* II t. 4 ; Boissier, *Fl. Or.* II 914. — Europe centr. (bassin du Danube), Russie centr. et mér., Asie occ., Sibérie, Chine. ♀

11. **ATHAMANTA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 211 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2832. — Genre de 2 ou 3 esp. de l'Europe et de l'Asie occ.

**A. Matthioli** Wulfen in Jacquin, *Coll. Bot.* I (1786) 211 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 57 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1934 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 236. — Europe centr. et or. ♀

12. **SESELI** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 228 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2835. — Genre de 40 esp. environ bien distinctes habitant l'hémisphère bor. de l'Ancien Monde.

**S. Ramondianum** Nobis (non **SESELI TENUIFOLIUM** Ledebour). **LIGUSTICUM TENUIFOLIUM** Ramond in De Candolle, *Fl. Fr.* IV (1803) 309. **WALLROTHIA** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1830) 172 et *Mém. sur les Ombellif.* t. 1. **DETHAVIA** — Endlicher, *Gen. Pl.* (1836-40) 775 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 706 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 57. — Pyrénées. ♀

13. **XATARDIA** Meissner, Plant. Vasc. Gen. (1838) 145 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2841. — Genre monotype.

**X. scabra** Meissner, *loc. cit.* 145 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 706 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 57. **SELINUM** — La Peyrouse, *Hist. Abrég. Pl. Pyrén.* (1813) 147. **ANGELICA** — Petit in *Annal. Sc. Obs.* I 1829 99 t. 3. **PETITIA** — J. Gay in *Annal. Sc. Nat.* sér. 1, XXVI (1832) 217. — Pyrénées. ♀

14. **LIGUSTICUM** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 217 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 2871. — Genre de 25 esp. de l'hémisphère bor. de l'Ancien et du Nouveau Monde.

**L. simplex** Bentham (non Allioni), *Cat. Pl. Pyrén.* (1826) 93. **LASERPITUM** — La Peyrouse, *Hist. Abrég. Pl. Pyrén.* (1813) 152. **ENDRESSIA PYRENAICA** J. Gay in *Annal. Sc. Nat.* sér. 1, XXVI (1832) 223 t. 26 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 700 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 55. — Pyrénées. ♀

15. **ACIPHYLLA** Forster, *Char. Gen.* (1776) 135 t. 68 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2873. — Genre d'une vingtaine d'esp. de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

**A. squarrosa** Forster, *Char. Gen. Plant.* (1776) t. 38 ; Hooker, *Icon. Pl.* tt. 607, 608 et *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1864) 92. — Nouvelle-Zélande. ♀

16. **FERULA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 215 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2884. — Genre de 80 esp. de l'Europe mér., de l'Afrique bor. et de l'Asie occ.

**F. monticola** Boissier et Heldreich (sub *FERULAGINE*) in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, II (1856) 91 ; Boissier, *Fl. Or.* II 1002. — Thessalie, Macédoine, Péloponèse. ♀

17. **HERACLEUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 231 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2888. — Genre de 60 esp. environ, bien distinctes, de la rég. temp. de l'hémisphère bor., et de l'Asie trop. montagneuse.

**H. Pollinianum** Bertoloni, *Fl. Ital.* III (1830) 433 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1976. **H. ORSINII** Gussone, *Pl. Rar. Aprut.* (1826) 133 t. 27. **SPHONDYLIUM BRANCA** Caruel, var. **AMPLIFOLIUM** Caruel, *Fl. Ital.* VIII (1888) 249. — Tyrol, Dalmatie, Italie, Monténégro. Péloponèse. ♀

— Obs. Boissier (*Fl. Or.* II 1040) réunit les **H. POLLINIANUM** et **ORSINII** à l'**H. PALMATUM** Baumgarten, *Enum. Stirp. Transylv.* I (1816) 215.

**H. Pyrenaicum** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 403 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 1974 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 697. **H. AMPLIFOLIUM** Lamarck, *Hist. Abrég. Pl. Pyrén.* (1813) 153. — Espagne, Pyrénées, Auvergne, Dauphiné, Europe centr. et centr.-or. ♀

18. **LASERPITIUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 216 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2911. — Une vingtaine d'esp. de l'Europe, de l'Afrique bor., de l'Asie russe et occ.

**L. canescens** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1830-45) 256 t. 25. **GUILLONEA** — Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III (1880) 31. — Espagne. ♀

## XXX. ARALIACÉES

1. **ARALIA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 251 : T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2923. — Genre de 33 esp. de l'Asie trop. et or. temp., de l'Amérique bor. et du Mexique.

**A. elegantissima** Hort. ex *Gard. Chron.* ser. 2, IV (1875) 224 ; *Illustr. Hort.* (1876) 9 t. 229 ; *Gartenflora* (1877) 26 cum xylogr. et 184. — Nouv.-Calédonie.  $\mathfrak{h}$

**A. hispida** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 188 ; *Bot. Mag.* t. 1083 ; *Lodiges, Bot. Cab.* t. 1306. — De la Baie d'Hudson à la Virginie.

**A. Mandschurica** Maximowicz in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* XV (1837) 134. **A. CHINENSIS** Linné var. **ELATA** Lavallée, *Arbor. Segrez.* (1877) 123. — Mandchourie.

**A. nudicaulis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 274 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 237 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I 646 ; Nees, *Pl. Officin.* suppl. t. 88 ; Torrey, *New-York State Fl.* t. 40. — Amérique bor., Labrador.

**A. quinquefolia** Planchon et Decaisne in *Rev. Hort.* (1854) 104 ; A. Gray in *Mem. Amer. Acad.* VI (1859) 391. **PANAX** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1058 ; *Bot. Mag.* t. 1333 ; *Gartenflora* (1862) t. 375 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I 647. — Du Canada à la Georgie, Mandchourie, Chine or., Japon.

**A. Veitchii**, *Catal. Veitch* (1873) 11 cum icone ; *The Garden* (1873) 483 cum icone ; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornement.* t. 48. — Nouvelle-Calédonie.  $\mathfrak{h}$

2. **FATSIA** Decaisne et Planchon in *Rev. Hort.* III (1854) 105 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2940. — 3 esp. du Japon et de l'Amérique bor.-occ.

**F. Japonica** Decaisne et Planchon in *Rev. Hort.* (1854) 105 ; *Gartenflora* (1863) t. 420 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 194. **ARALIA** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 128. — Japon.

**F. papyrifera** Bentham et Hooker, *Gen. Pl.* I (1867) 939. **ARALIA** ? — Hooker f. in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1832) 53 t. 1 et 2 ; *Bot Mag.* t. 4897 ; *Fl. des Serres* VIII t. 806-807. — Formose, Chine (Hupeh, indig.?)

3. **HEDERA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 160 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2963. — 2 esp. des rég. temp. et chaudes de l'hémisphère bor. et de l'Australie.

**H. Helix** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 202 ; *Engl. Bot.* XVIII t. 1267 ; *Fl. Dan.* IX t. 1027 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 1 ; Boissier, *Fl. Or.* I 1090. — Toute l'Europe (sauf la Russie et la Scand. bor.), Asie occ. et centr., Inde bor., Japon.  $\frac{1}{2}$

— — var. **conglomerata** LAVALLÉE, *Arbor. Segrez.* (1877) 127. **H. CONGLOMERATA** Hort. ex Lavallée, *loc. cit.*

— — var. **Rœgneriana** LAVALLÉE, *Arbor. Segrez.* (1877) 126. **H. CAUCASICA** Hort. ex Lavallée, *loc. cit.*

### XXXI. CORNACÉES

1. **CORNUS** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 80 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2974. — Genre de 25 esp. environ de l'Asie et de l'Amérique temp., du Mexique, du Pérou et de l'Himalaya.

**C. alba** Linné, *Mant. Pl.* (1767) 40 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 34 ; Hooker in *Journ. of Bot.* (1850) t. 5 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 379. — Sibérie, Daourie, Chine bor.  $\frac{1}{2}$

**C. florida** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 117 ; *Bot. Mag.* t. 526 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* III t. 3 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I 652. — Du Canada à la Louisiane et au Mexique mér.  $\frac{1}{2}$

**C. Suecica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 118 ; Meerburgh, *Pl. Select.* t. 1 ; L'Héritier, *Cornus* t. II ; *Engl. Bot.* t. 310 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I 653. — Europe bor., Russie centr. ; du Canada à la Georgie et à la Louisiane.  $\frac{1}{2}$

2. **AUCUBA** Thunberg, *Dissert. Nov. Gen.* III (1783) 61 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2976. — Genre de 3 ou peut-être 5 esp. distinctes, de la Chine, du Japon et de l'Himalaya or.

**A. Japonica** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 44 et 64 t. 12 et 13 ; *Bot. Mag.* t. 1197 et 5512 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, IV t. 28 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 197. — Japon, Corée, îles Loo-Choo.  $\frac{1}{2}$

3. **GARRYA** Douglas in Lindley, *Bot. Reg.* XX (1834) t. 1686 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2978. — 8 esp. de la Californie, du Mexique et des Antilles.
- G. elliptica** Douglas in LINDLEY, *Bot. Reg.* XX (1834) t. 1686 ; Schnizlein, *Icon. Fam. Nat.* II t. 96 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 276. — De la Colombie Brit. à la Californie.  $\frac{1}{2}$
- G. Fadyeni** Hooker, *Icon. Pl.* IV (1841) t. 333. — Jamaïque.
- G. Fremontii** Torrey in *Pacif. Railroad Report (Whipple exped.)* IV (1836) 136 ; Brewer et Watson, *Bot. of Calif.* I 276. — Orégon, Californie.  $\frac{1}{2}$
4. **GRISELINIA** Forster, *Char. Gen.* (1776) 153 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2979. — 8 esp. de la Nouvelle-Zélande, du Chili et du Brésil.
- G. littoralis** Raoul, *Choix de Pl. N.-Zélande* (1846) 22 t. 19 ; Hooker f., *Handb. New-Zeal. Fl.* 103. PUKATERIA — Raoul in *Annal. Sc. Nat.* sér. 3 II (1844) 120. — Nouvelle-Zélande.  $\frac{1}{2}$

## XXXII. CAPRIFOLIACÉES

1. **VIBURNUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 245 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2988. — Genre de 80 esp. des régions tempérées et tropicales du monde entier.
- V. Buergeri** Miquel in *Annal. Mus. Lugd. Bat.* II (1866) 268 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 201. — Japon.  $\frac{1}{2}$
- V. Daouricum** Pallas, *Fl. Ross.* II (1788) 30 t. 58 fig. f et g ; *Bull. Soc. Mosc.* (1864) t. 1 ; Ærsted in *Vidensk. Meddelelser* (1860) t. 7 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 386. — Sibérie or., région de l'Amur.  $\frac{1}{2}$
- V. macrocephalum** Fortune in *Journ. Hort. Soc. Lond.* II (1847) 244 ; *Bot. Reg.* (1847) t. 43 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 365 ; Maximowicz, *Mélang. Biol.* X 652. V. KETELEERI Carrière in *Rev. Hort.* (1863) 269 fig. 31. — Chine.  $\frac{1}{2}$
- V. nervosum** Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 141 ; C. B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 8. V. GRANDIFLORUM Wallich, *Catal.* (1829) n. 464 ; Ærsted in *Vidensk. Meddelelser* (1860) 295 t. 6 fig. 1-4. — Himalaya (de Kashmir à Sikkim).  $\frac{1}{2}$

**Viburnum nudum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 268 ; *Bot. Mag.* t. 2281 , P. W. Watson, *Dendrol. Brit.* I t. 20. — Du Canada et de Terre-Neuve à la Louisiane et à la Floride.  $\bar{h}$

— var. **cassinoides** TORREY et GRAY, *Fl. of N.-Amer.* II (1841) 14. V. **CASSINOIDES** Linné, *Sp. Pl.* ed. 2 (1762) 384. — Avec le type.

**V. Oxycoccos** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 203 ; Guimpel, *Fremd. Holzgew.* t. 20 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1123. — Amérique bor.  $\bar{h}$

**V. plicatum** Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 332 ; *Bot. Reg.* XXXIII t. 51 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 88 ; *Fl. des Serres* III (1847) t. 278. V. **DENTATUM** Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 122. — Japon.  $\bar{h}$

**V. Tinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 267 ; *Bot. Mag.* t. 38 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* II t. 37 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1170 ; Boissier, *Fl. Or.* II 4. — Europe mér., Afrique bor., Syrie.  $\bar{h}$

2. **TRIOSTEUM** Linné, *Sp. Plant.* ed. I (1753) 176 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2990. — 3 esp. de l'Himalaya et de l'Amérique bor.

**T. perfoliatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 176 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 150 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* II t. 45 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 41 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 12. — États-Unis.  $\bar{h}$

3. **ABELIA** R. Brown, *Charac. et Descr. Pl. Abel.* in C. Abel, *Narative Journey interior China* (1818) 376 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2993. — Genre de 10 esp. de l'Himalaya et de l'Amérique bor.

**A. biflora** Turczaninow in *Bull. Soc. Mosc.* X (1837) 152 ; Walpers, *Repert. Bot.* II 446 ; Maximowicz, *Mélang. Biol.* XII 477 ; Franchet, *Pl. David.* 151 t. 11. — Chine bor.  $\bar{h}$

**A. triflora** R. Brown in WALLICH, *Plant. Asiat. Rar.* I (1830) 44 t. 15 ; Paxton, *Fl. Gard.* t. 91 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III t. 319 ; C. B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 9. — Himalaya tempéré (du Kashmir au Kumaon.)  $\bar{h}$

4. **LINNAEA** Gronovius ex Linné, *Fl. Lappon.* (1737) 250 t. 12 fig. 4 ; T. Durand, *Ind. Gen.* 2994. — Genre monotype.

**L. Borealis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 631 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 183 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1171 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 280. — Europe bor. et centr., Lombardie, Piémont, Asie bor. et centr., Amérique arct. et bor. (jusqu'au Maryland), Montagnes Rocheuses,  $\pi$   $\bar{h}$



5. **LONICERA** Linné, *Sp. Plant.* ed. I (1753) 173 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 2995. — Genre d'une centaine d'esp. des régions temp. et trop. de l'hémisphère boréal.

**L. Alberti** Regel in *Gartenflora* XXX (1881) 370 et 387 t. 1065. — Turkestan or. ‡

**L. arborea** Boissier in *Biblioth. Univ. Genève*, nouv. sér. XIII (1838) 409 et *Voy. Bot. Esp.* 297 t. 82 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 333. — Espagne. ‡

— Obs. L'espèce indiquée, sous ce nom, dans le Liban en est distincte.

**L. ciliata** Muhlenberg, *Catal. Pl. Amer. Sept.* (1813) 22 ; Torrey, *Fl. State N.-York* t. 42 ; A. Gray, *Man. Bot. N.-United States* ed. VI 220. — Amérique bor. (au sud jusqu'au Maryland et au Wisconsin). ‡

**L. hispida** Pallas in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 258 ; Pallas, *Fl. Ross.* II 389 et *Icon. Fl. Ross.* 212 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV 338 ; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 11. — Inde bor., Chine, Sibérie. ‡

**L. hispidula** Douglas mss. in Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II (1841) 8 ; A. Gray, *Bot. of Calif.* I 280. CAPRIFOLIUM — Douglas ex Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1761. **L. MICROPHYLLA** Hooker (non Willdenow), *Fl. Bor.-Amer.* I (1834) 223. — Orégon. ‡

**L. Karelini** Bunge in Kirilow, *Die Loniceren des Russ. Reich.* (1849) 34 ; Herder, *Fl. Sib. or.* III t. 1 fig. 4 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 389 ; Regel in *Act. Hort. Petrop.* V 610. **L. TSCHNOWSKII** Maximowicz. — Turkestan. ‡

**L. Morrowii** A. Gray, *List of dried plants coll. in Jap.* in *Narrative Exped. Amer. Squadron, China Seas and Jap.* II (1857) 313 ; Franchet et Savatier, *Enum. Fl. Jap.* I 205. **L. CHRYSANTHA** Miquel (non Turczaninow), *Prol. Fl. Jap.* 158. — Yéso. ‡

**L. obovata** Royle mss. ex Hooker et Thomson in *Journ. Linn. Soc. London* II (1858) 169 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 14. — Himalaya tempéré, Sikkim. ‡

**L. Pyrenaica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 174 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, I t. 15 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1175 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 333. — Pyrénées. ‡

**L. Regeliana** Kirschner (ubi?) ex Lavalée, *Arboret. Segrez.* (1877) 141. — Russie. ‡

**L. splendida** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 54 et *Voy. Bot. Esp.* 276 t. 81 ; *Fl. des Serres* XI (1856) 117 t. 1130. — Espagne ‡

**L. Standishii** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1868) t. 5709 ; *Gard. Chron.* ser. 2, IX (1878) 106 fig. 20. — Chine (districts de Kiangsi et de Hupeh). ‡

6. **DIERVILLA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 150; T. Durand, Ind. Gen. n. 2997. — Genre de 7 esp. de l'Amérique bor.-or., de la Chine et du Japon.

**D. florida** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 75; Carrière in *Rev. Hort.* (1853) 309. **CALYSPHYRUM** — Bunge, *Enum. Pl. Chine bor.* (1832) in *Mém. Sav. Étr. Acad. St. Pétersb.* II (1835) 107. **WEIGELIA ROSEA** Lindley in *Journ. of the Hort. Soc.* I (1846) 65 t. 6. **WEIGELIA** — De Candolle in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, XI (1839) 241; *Bot. Mag.* t. 4396; *Fl. des Serres* III t. 211. **DIERVILLA ROSEA** Walpers, *Annal. Bot.* I (1848) 365. — Chine.  $\mathfrak{h}$

### XXXIII. RUBIACÉES

1. **RONDELETIA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 169; T. Durand, Ind. Gen. n. 3063. — Genre de 60 esp. de l'Amérique trop. et des Indes occ.

**R. cordata** Bentham, *Pl. Hartweg.* (1841) 85. **ROGIERA** — Planchon in *Fl. des Serres* V (1849) 442<sup>b</sup>, VIII (1852-53) t. 754; Lemaire, *Jard. Fleur.* II (1852) t. 122. — Guatemala, Costa-Rica.  $\mathfrak{h}$

**R. elegantissima** Regel in *Gartenflora* XIV (1865) t. 490. — Mexique.  $\mathfrak{h}$

**R. gratissima** Hemsley, *Diag. Pl. Nov.* pars altera (1879) 25 et *Biol. Cent. Amer. Bot.* II 49. **ROGIERA** — Planchon et Lindley, *Fl. des Serres* XV (1862-65) t. 1570 et 1571. — Mexique mérid.  $\mathfrak{h}$

2. **HIGGINSIA** Persoon, Syn. Plant. I (1805) n. 133; T. Durand, Ind. Gen. n. 3146. — Genre de 20 esp. environ de l'Amérique tropicale.

**H. refulgens** Hooker in *Bot. Mag.* (1862) t. 5346; *L'Horticult. franç.* (1863) t. 8; *Gartenflora* XXXII (1883) 217 cum ic. — Mexique.  $\mathfrak{h}$

3. **GARDENIA** Ellis in Philosoph. Transac. LI, II (1761) 935 t. 23; T. Durand, Ind. Gen. n. 3181. — Environ 70 esp. des régions trop. et subtrop. de l'ancien monde.

**G. citriodora** Hooker in *Bot. Mag.* (1857) t. 4987; *Fl. des Serres* XII (1857) 139 t. 1254. — Port Natal.  $\mathfrak{h}$

- Gardenia florida** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 305 et 1619 ; *Bot. Mag.* t. 2627 et 3349 ; *Bot. Reg.* VI t. 449 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, III t. 45 ; Bentham, *Fl. Hong-Kong.* 153. — Chine, Japon.  $\frac{1}{2}$
- — var. **Fortuneana** LINDLEY in *Bot. Reg.* XXXII (1846) t. 43 ; *Fl. des Serres* II (1846) 233 t. 177. G. FORTUNEI Hort. — Chine.
- G. jasminoides** Ellis, in *Philos. Trans.* LI, II (1761) 935. — A. RADICANS Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 109 t. 29 ; *Bot. Mag.* t. 1842 ; *Bot. Reg.* I t. 73 ; Maximowicz, *Mélang. Biol.* XI 793. — Japon.  $\frac{1}{2}$
4. **IXORA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 73 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3257. — Environ 135 esp. des régions trop. du monde entier.
- I. Chinensis** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 344. I. STRICTA Roxburgh, *Hort. Bengal.* 10 et *Fl. Ind.* I 379 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* I t. 184 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 143. I. CROCATA Lindley in *Bot. Reg.* X (1824) t. 782 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 965. — Chine, Moluques, ailleurs natural.  $\frac{1}{2}$
5. **COFFEA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 158 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3261. — Genre de 30 esp. environ de l'Asie et de l'Afrique trop., et des îles Mascareignes.
- C. Arabica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 172 ; *Bot. Mag.* t. 1303 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* I t. 53 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 160. — Abyssinie, Mozambique, Guinée.  $\frac{1}{2}$
- C. Liberica** W. Bull ex HIERN in *Trans. Linn. Soc. Lond.* ser. 2, I (1876) 171 t. 24 ; *Gartenflora* XXVIII (1879) 96 et XXIX (1880) 88. C. ARABICA Bentham in Hooker (non Linné), *Niger Fl.* (1849) 413 p. pe. — Guinée.  $\frac{1}{2}$
6. **MITCHELLA** Linné, *Gen. Plant.* ed. VI (1764) n. 134 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3325. — Deux esp. de l'Amérique bor. et du Japon.
- M. repens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 111 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 979 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 63. — Du Canada et de la Nouvelle-Écosse au Mexique.  $\frac{1}{2}$
7. **NERTERA** Banks et Solander in Gärtner, *De Fruct. et Sem.* I (1788) 124 t. 26 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3329. — Genre de 6 esp. des Andes de l'Amérique austr., de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles antarctiques.
- N. depressa** Banks et Solander, *loc. cit.* ; *Bot. Mag.* t. 5799 ; Hooker, *Fl. Nov. Zeal.* t. 28 et *Handb. New-Zeal. Fl.* 120. — Amérique austr., Nouv.-Zélande, îles antarctiques.  $\frac{1}{2}$

8. **GALIUM** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 65 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3365. — Plus de 300 esp. décrites, mais 170 seulement bien distinctes habitant les régions temp. et chaudes de l'ancien et du nouveau monde.

**G. Boryanum** Walpers, *Repert. Bot. Syst.* II (1843) 454 ; Boissier, *Fl. Or.* III 64. **SHERARDIA PUSILLA** Bory et Chaubard, *Fl. Pélop.* (1838) 10 t. 16 fig. 1. — Péloponèse. ‡

**G. cespitosum** Ramond in *Mém. Mus. Paris* XIII (1825) 266 et in *Annal. Sc. Nat.* VIII (1826) 155 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 36. — Pyrénées. ‡

**G. coronatum** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 90 et *Fl. Græca* t. 123 ; Boissier, *Fl. Or.* III 79. — Grèce, Asie Min., Caucase, Perse, Syrie, Palestine. ‡

**G. insubricum** Gaudin, *Fl. Helv.* I (1828) 424 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1188 et 1189. — Suisse.

— Obs. D'après Koch, c'est une forme des lieux ombragés du **G. MOLLUGO** L.

**G. jungermannioides** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, III (1843) 43 et *Fl. Or.* III 66. — Liban. ‡

**G. pulvinatum** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 102 et *Voy. Bot. Esp.* 287 t. 85<sup>b</sup> ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 318. — Espagne.

**G. Pyrenaicum** Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 5 t. 1 fig. 4 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1194 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 37 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 317. — Pyrénées, Apennins. ‡

9. **ASPERULA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 66 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3368. — Environ 100 esp. décrites, mais plusieurs faisant double emploi, habitant l'Europe, la région Méditerr., l'Asie et l'Australie.

**A. Arcadiensis** Sims in *Bot. Mag.* (1820) t. 2146 ; Boissier, *Fl. Or.* III 37. **A. MOLLIS** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, III (1843) 31. — Arcadie, Achaïe. ‡

**A. hirta** Ramond in *Bull. Soc. Philomat. Paris* (1800) 131 t. IX fig. 1-3 ; Römer, *Fl. Eur.* t. 1 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 48 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 301. — Pyrénées. ‡

**A. nitida** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 89 et *Fl. Græca* t. 124 ; Boissier, *Fl. Or.* III 39. — Bithynie, Lydie. ‡

**A. suberosa** Sibthorp et Smith, *loc. cit.* I (1806) 89 et *Fl. Græca Prodr.* t. 123 ; Boissier, *Fl. Or.* III 37. **A. ΑΓΓΙΑ** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 62. — Macédoine, Monténégro. ‡

10. **CRUCIANELLA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 69 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3369. — Environ 25 esp. de la région Méd. et de l'Asie occ.

**C. stylosa** Trinius in *Mém. Acad. St-Petersb.* VI (1818) 485 t. 11 ; *Bot. Reg.* XXIV t. 55 ; Knowles et Westcott, *Fl. Cab.* t. 55. **ASPERULA** — Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, III (1843) 31 et *Fl. Or.* III 27. — Perse bor. 2

### XXXIV. VALÉRIANÉES

1. **VALERIANA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 21 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3377. — Genre de 150 esp. de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

**V. alliariaefolia** Vahl, *Enum. Pl.* II (1806) 11 ; Buxbaum, *Pl. minus cognit.* Cent. II t. 11 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* t. 9 ; Boissier, *Fl. Or.* III 85. — Eubée, Asie Min., Caucase, Perse. 2

**V. Celtica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 32 ; Jacquin, *Collect. Bot.* I t. 1 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XI t. 44 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 719. — Suisse, Piémont, Lombardie, Autriche. 2

**V. dioica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 31 ; *Fl. Dan.* IV t. 687 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 724 et *Pl. Crit.* I t. 59 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 55 ; Boissier, *Fl. Or.* II 85. — Europe bor., occ. et centr. ; Bithynie?

**V. elongata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1664 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 219 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 720 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIII t. 54. — Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole, Tyrol, Transylvanie. 2

**V. globulariaefolia** Ramond in DE CANDOLLE, *Fl. Franç.* IV (1803) 236 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 723 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 56 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 3. — Pyrénées françaises et espagnoles. 2

**V. montana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 32 ; *Bot. Mag.* t. 1825 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 269 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 727 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 57 ; Boissier, *Fl. Or.* III 86. — France, Espagne, Europe centr., Serbie, Grèce. 2

**V. saxatilis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 33 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 267 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 720. — Suisse mcr., Italie, Autriche, Hongrie, Transylvanie, Monténégro. 2

**V. supina** Linné, *Mant. Pl.* (1767) 27 ; Rœmer, *Fl. Eur.* t. 5 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 729. — Suisse, Italie bor., Salzbourg, Styrie, Carinthie. 2

**Valeriana tuberosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 33 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIII t. 54 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 723 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 55 ; Boissier, *Fl. Or.* II 90. — Europe mér.-occ., mér. et centr., Russie mér., Sibérie, Afrique bor. ☞

2. **CENTRANTHUS** De Candolle, *Fl. Franç.* IV (1805) 238 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3378. — 8 esp. de la région Méd.

**C. nervosus** Moris, *Stirp. Sard. Elench.* II (1827-29) 4 et *Fl. Sard.* II 322 t. 78 fig. 2 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 53 ; Tanfani et Caruel, *Fl. Ital.* VII 138. — Corse, Sardaigne. ☞

### XXXV. DIPSACEES

1. **SCABIOSA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 24 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3386. — Environ 110 esp. de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie occ. et temp.

**S. crenata** Cyrillo, *Pl. Rar. Regn. Neap.* I (1788) 11 t. 3 ; Bertoloni, *Fl. Ital.* II 50 ; Tanfani in Caruel, *Fl. Ital.* VII 248 ; Boissier, *Fl. Or.* III 138. **S. CORONOPIFOLIA** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 114. — Italie mér., Sicile, Turquie mér., Grèce, Algérie. ☞

**S. graminifolia** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1759) 267 ; Waldstein et Kitaibel, *Icon. et Descr. Pl. Hung.* t. 188 ; *Bot. Reg.* X 833 ; Tanfani in Caruel, *Fl. Ital.* VII 245. — Montagnes de l'Europe centr. et mérid. ☞

**S. Hookeri** C.-B. Clarke in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* III (1881) 218. — Sikkim. ☞

**S. pterocephala** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 100 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 113. **PTEROCEPHALUS PARNASSI** Sprengel, *Syst. Veget.* I (1825) 384 ; Boissier, *Fl. Or.* II 148. — Grèce, Macédoine. ♪

**S. silenifolia** Waldstein et Kitaibel, *Icon. et Descr. Pl. Hung.* II (1805) t. 157 ; Bertoloni, *Fl. Ital.* II 52 ; Tanfani in Caruel, *Fl. Ital.* VII 235. — Italie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie, Croatie.

**S. variifolia** Boissier in Bourgeau, *Exsicc.* (1870) n. 171 ; Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 137. — Iles de Rhodes et de Karpathos. ♪

**S. vestina** Facchini mss. ex Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III (1857) 297. — Tyrol mérid. ☞

## XXXVI. COMPOSÉES

1. **EUPATORIUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 638 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3460. — Genre de 560 esp. bien distinctes des Rég.temp. et trop. du monde entier ; une espèce en Australie.

**E. reticulatum** Desvaux in HAMILTON, *Prodr. Pl. Ind. occ.* (1825) 51 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 183. — Jamaïque. ♀ ?

2. **LIATRIS** Schreber, *Gen. Plant.* II (1791) 542 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3469. — Genre de 16 esp. de l'Amérique bor.

**L. tenuifolia** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 131 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 128 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 70. — De la Caroline à la Georgie et la Floride. ♀

3. **GRINDELIA** Willdenow in *Mag. Naturf. Fr. Gess. Berl.* I (1807) 259 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3479. — Genre de 25 à 30 esp. de la partie chaude de l'Amérique du Nord et de l'Amérique austr.-extratrop.

**G. robusta** Nuttall in *Trans. Amer. Philos. Soc.* VII (1841) 314 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 247 ; A. Gray, *Bot. of Calif.* I 304. — Californie.

**G. squarrosa** Dunal in *Mém. Mus. Paris* V (1819) 50 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 315 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 248. DONIA — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 559 ; *Bot. Mag.* t. 1706. — Missouri. ♀

4. **SOLIDAGO** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 651 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3493. — Genre de 80 esp. bien distinctes habitant surtout l'Amérique du Nord ; deux espèces dans l'ancien monde.

**S. Canadensis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 878 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 346 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 330 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 223. — De l'Amérique subarct. à la Louisiane et au Texas (ailleurs naturalisé). ♀

5. **BELLIUM** Linné, *Mant. Plant.* (1771) 157; T. Durand, *Ind.*  
Gen. n. 3526. — 3 esp. de la rég. Méditer.

**B. bellidioides** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 285; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 684; Viviani, *Fl. Ital.* t. 10; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 303; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 105. — Baléares, Corse, Sardaigne. ♀ ☉?

**B. minutum** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 286; Boissier, *Fl. Or.* II 173. **PECTIS MINUTA** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1250. **BELLIUM BELLIDIROIDES** Urville (non Linné), *Enum. Pl. Archip.* in *Mém. Soc. Linn. Paris* I (1822) 368. — Eubée et îles de l'Archipel. ☉

6. **ASTER** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 652; T. Durand, *Ind.*  
Gen. n. 3545. — Plus de 350 esp. décrites, mais seulement 250 bien distinctes, habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

**A. alpinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 872; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 88; *Bot. Mag.* t. 609; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 100; Boissier, *Fl. Or.* III 157. — Espagne, France, Italie, Europe centr. et or., Asie occ. et centr. ♀

**A. Altaicus** Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* (1809) 881; Boissier, *Fl. Or.* III 158. **CALLIMERIS** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 258. — Sibérie, Songarie, Tibet, Perse, Turkestan, Afghanistan. ♀

**A. diplostephioides** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* II (1873) 272; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 251. **HETEROCHLETA** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 282. — Himalaya. ♀

**A. peregrinus** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 556; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 228; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 155. — Amérique bor. (partie bor.-occ.), Unalashka, Sitcha?. ♀

**A. ptarmicoides** Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II (1841) 160. **DÖELLINGERIA** — Nees, *Gen. et Sp. Aster.* (1832) 183. **DIPLOPAPPUS ALBUS** Lindley ex Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1840) 21. **HELEASTRUM ALBUM** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 264 (syn. excl.); Torrey, *Fl. State New-York* (1843) t. 52. — Canada, États-Unis. ♀

**A. Pyrenæus** De Candolle, *Fl. Franç.* IV (1805) 146; La Peyrouse, *Fl. Pyrén.* t. 180; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 101. — Hautes Pyrénées. ♀

**A. sericeus** Ventenat, *Pl. Nouv. Jard. Cels* (1800) t. 33; Savi, *Fl. Ital.* II t. 67; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 233; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 112. — Bassins du Missouri et du Mississipi. ♀?

**A. Sikkimensis** Hooker f. et Thomson in *Bot. Mag.* (1851) t. 4557; Le-maire, *Jard. fleur.* t. 91; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 252. — Népal or., Sikkim. ♀



7. **OLEARIA** Mönch, *Meth. Plant. Marburg. suppl.* (1802) 254 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 3551. — Genre de 85 esp. de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

**O. Haastii** Hooker f., *Handb. New-Zeal. Fl.* (1861) 126. — Nouvelle-Zélande.  $\frac{1}{2}$

8. **ERIGERON** Linné, *Hort. Clifort.* (1737) 407 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 3561. — Genre de 110 esp. répandu dans le monde entier.

**E. bellidioides** Benthām in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* II (1873) 281 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 256. **ASTER** — Buch. Hamilton ex D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 177 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II t. 101. — Himalaya centr. et occ.  $\frac{1}{2}$

**E. glaucus** Ker.-Gawl in *Bot. Reg.* I (1815) t. 10 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V 284 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 172 ; A. Gray, *Bot. of Calif.* II 330. **STENACTIS** — Nees, *Gen. et Sp. Aster.* (1832) 275. — République Argentine.  $\frac{1}{2}$

**E. pulchellus** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 287 ; Boissier, *Fl. Or.* III 164. **ASTER ALWARTENSIS** Loddiges, *Catal.* (1807) ex *Bot. Mag.* t. 2321. **ASTER** — Willdenow, *Sp. Pl.* III (1804) 2019. **E. CAUCASICUS** Steven in *Mém. Soc. Nat. Moscou* IV (1813) 63. — Sibérie, Songarie, Dahourie, Perse, Caucase, Arménie.  $\frac{1}{2}$

**E. uniflorus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 864 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 867 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 914 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 99 ; Boissier, *Fl. Or.* II 165. — Amérique arct., hautes montagnes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.  $\frac{1}{2}$

9. **LEONTOPODIUM** R. Brown in *Trans. Linn. Soc.* XII (1817) 144 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 3618. — Cinq esp. des montagnes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

**L. alpinum** Cassini in *Dict. des Sc. Natur.* XXV (1822) 474 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 100. **GNAPHALIUM LEONTOPODIUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 855 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 86 ; *Bot. Mag.* t. 1958. **FILAGO LEONTOPODIUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1312. — Alpes de l'Europe et de l'Asie centr., Himalaya, Tibet, Afghanistan.  $\frac{1}{2}$

10. **GNAPHALIUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 645 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3626. — Genre de 100 esp. répandu dans le monde entier.

**G. uliginosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 856 ; *Engl. Bot.* t. 1194 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* XI t. 771. **G. TOMENTOSUM** Hoffmann, *Deutschl. Fl.* (1791) 292. — Europe, Sibérie, Dahourie, Amérique bor., Terre-Neuve. ☉

11. **HELICHRYSUM** Gaertner, *De Fruct. et Sem.* V (1791) 404 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3632. — Genre de 270 esp. habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**H. Billiardieri** Boissier et Blanche in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, V (1844) 111. **H. VIRGINEUM** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 177. — Liban. ‡

**H. frigidum** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1804) 1908 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 177 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 186. **XERANTHEMUM** — Labillardière, *Icon. Pl. Syr.* II (1791) 9 t. 4. — Sardaigne, Corse. ☿  
— Obs. Boissier, *Fl. Or.* III 239, dit que cette espèce a été indiquée en Syrie par erreur.

**H. Lamarekii** Cambessedes, *Enum. Pl. Baléar.* in *Mém. Mus. Paris* XIV (1827) 269 t. 7 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 181. **GNAPHALIUM CRASSIFOLIUM** Lamarck (non Linné), *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 746. — Iles Baléares. ‡

**H. lanatum** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1838) 298. **GNAPHALIUM ARENARIUM** Sibthorp et Smith (non Linné), *Fl. Græca* IX (1837) t. 859. **G. GRAVEOLENS** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 299. **HELICHRYSUM** — Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 232. — Bithynie, Lycie, Tauride. ☿

**H. plicatum** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1836) 183 ; Boissier, *Fl. Or.* II 231. **GNAPHALIUM ANATOLICUM** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 14. — Macédoine, Asie mineure, Perse. ☿

**H. Tchabanicum** C. Koch in *Linnaea* XXIV (1851) 349 ; Boissier, *Fl. Or.* III 234. — Arménie. ☿

**H. virgineum** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumelicæ* II (1844) 196 ; Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 238. **GNAPHALIUM** — Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* (1837) t. 860. — Grèce (mont Athos). ☿ ‡

12. **CRASPIDIA** Forster, *Prodr. Fl. Ins. Austr.* (1786) 306 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3666. — Genre de 5 esp. de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

**Craspidia Richea** Cassini in *Dict. des Sc. Natur.* XI (1818) 353 ; *Bot. Mag.* t. 5271. **C. GLAUCA** Sprengel, *Syst. Veget.* III 441 ; *Bot. Reg.* XXII t. 1908. — Australie or., Tasmanie. ☿

13. **TELEKIA** Baumgarten, Enum. Stirp. Transsilv. III (1816) 148; T. Durand, Ind. Gen. n. 3716. — Deux esp. de l'Europe centr. et or.

**T. speciosa** Baumgarten, *loc. cit.* III (1816) 149; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 305. **BUPHTHALMUM** — Schreber, *Icon. Pl. min. cogn. Decas* I (1766) 11 t. 6. **T. CORDIFOLIA** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 485. — Europe centr. 5

14. **BALSAMORHIZA** Hooker f., Fl. Bor.-Amer. I (1833) 313; T. Durand, Ind. Gen. n. 3863. — Genre de 6 à 10 esp. de l'Amérique du Nord.

**B. Hookeri** Nuttall in *Trans. Amer. Phil. Soc.* ser. 2, VII (1841); A. Gray, *Bot. of Calif.* II 348. — Californie, Orégon. 2

15. **MARSHALLIA** Schreber, Gen. Plant. II (1791) 810; T. Durand, Ind. Gen. n. 3864. — Genre de 3 esp. de l'Amérique du Nord.

**M. caespitosa** Nuttall in *litt.* (1825) ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* V (1836) 680; *Bot. Mag.* t. 3704; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* II 391. — États-Unis, du Kansas au Texas. 2

16. **ACHILLEA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 661; T. Durand, Ind. Gen. n. 3950. — Genre de 100 esp. environ habitant l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord.

**A. ageratifolia** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Plant.* II (1873) 420; Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 275. **ANTHEMIS** — Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IX (1837) 68 t. 886. — Thessalie, Crète. 2

— var. **Aizoon** BOISSIER, *Fl. Or.* III (1875) 276. **PTARMICA** — Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 210. — Grèce, Macédoine.

**A. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 899; Ledebour, *Fl. Altaica* IV 123. **PTARMICA** — De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* VI (1837) 22. — Suisse, Lombardie, Sibérie. 2

**A. Clavennæ** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 898; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 76; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 106. **A. ARGENTEA** Visiani, *Fl. Dalm.* II (1847) 81 t. IX fig. 2. — Europe centr. (des Alpes allemandes à la Bosnie).

- Achillea Herba-rota** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 180 t. 9 fig. 3 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1016 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* I 166. — Dauphiné, Piémont. ♀
- A. magna** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1267 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 25 ; Rochel, *Pl. Banat. Rar.* t. 32. — Europe centr. et or. ♂
- A. moschata** Wulfen in JACQUIN, *Fl. Austr.* V app. (1778) 45 t. 33 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1017 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 318. — Autriche-Hongrie, Suisse, Lombardie, Piémont, Transylvanie. ♀
- A. Ptarmica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 898 ; *Engl. Bot.* t. 757 ; *Fl. Dan.* t. 643. PTARMICA VULGARIS De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 25. — Europe, Sibérie, Amérique bor. ♀
- — var. **pubescens** De Candolle, *Fl. Franç.* IV (1805) 211 et *Prodr. Regn. Veget.* VI 23. A. PYRENAICA Sibthorp in herb. ex De Candolle, *loc. cit.* — Pyrénées.
- A. tomentosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 897 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1022 ; *Bot. Mag.* t. 498 ; Boissier, *Fl. Or.* III 264. — Espagne, France et Suisse mér., Italie contin., Russie mér., Caucase ?, Sibérie occ. ♀
- A. Tournefortii** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 28 ; Tournefort, *Relat. d'un Voy. au Levant* I 228 cum icône ; Boissier, *Fl. Or.* III 260. A. ÆGYPTIACA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 900. — Archipel (îles Stenosa et Caloyero). ♂
- A. umbellata** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* II (1813) 192 ; Boissier, *Fl. Or.* III 276. — Grèce. ♀
17. **SANTOLINA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 640 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3951. — Huit esp. de l'Europe centr. et de la Région Méditerr.
- S. Chamæcyparissus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 842 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 671 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 239 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 160 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 80. — Europe méd., Valais, Styrie, Carniole. ♂
18. **ANTHEMIS** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 660 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3953. — Genre d'environ 70 esp. bien distinctes habitant l'Europe, l'Asie et l'Afrique bor.
- A. Biebersteiniana** C. Koch in *Linnaea* XXIV (1851) 320 ; Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 286. CHRYSANTHEMUM — Adam in Weber et Mohr, *Beitr. z. Naturk.* I (1806) 70. — Caucase, Arménie. ♀
- A. rosea** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* II (1813) 191 et *Fl. Græca* IX t. 887 ; Boissier, *Fl. Or.* III 303. — Chypre, Lycie. ☉

19. **CHRYSANTHEMUM** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 654 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3964. — Genre d'environ 90 esp. bien distinctes, habitant les régions temp. et froides de l'ancien monde, l'Amérique du Nord et l'Afrique bor. et austr.

**C. alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 889 ; Frœlich, *Alpenpfl.* I t. 2 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* V t. 19 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 325. **LEUCANTHEMUM** — Lamarck. — Pyrénées, Dauphiné, Italie, Europe centr. ☞

**C. Kotschyi** Boissier (sub **PYRETHRO**), *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VI (1845) 88 et *Fl. Or.* III 339. — Cataonie, Perse. ☞

**C. Myconis** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1254 ; Jacquin, *Observ. Bot.* IV 10 t. 94 et *Eclog. Pl.* t. 147 ; Boissier, *Fl. Or.* III 335. — Toute la Rég. Méditerranéenne. ☉

— — var. **hybridum** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 61. **C. HYBRIDUM** Gussone, *Cat. Pl. Hort. Boccadif.* (1821) 70. — Sicile.

**C. myriophyllum** C.-A. Meyer (sub **PYRETHRO**), *Verz. Pfl. Reise Cauc.* (1831) 74 ; Boissier, *Fl. Or.* III 350. **GYMNOCLINE ARGYROPHYLLA** C. Koch in *Linnaea* XXIV (1851) 340. — Cappadoce, Arménie. ☞

— — var. **variegatum** Boissier, *Fl. Or.* III 351. **TANACETUM KOTSCHYI** Boissier in Kotschy, *Exsicc.* ex Boissier, *loc. cit.* T. **HETEROPHYLLUM** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VI (1845) 90. — Perse austr.

**C. pulchellum** Turczaninow (sub **PYRETHRO**) in *litt.* (1830) ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 55 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 548. — Sibérie. ☞

20. **COTULA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 657 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 3968. — Environ 40 esp. bien distinctes habitant les régions temp. et subtrop. de l'ancien monde ; l'Amérique austr.-extratrop., l'Afrique austr. et l'Australie.

**C. dioica** Hooker f., *Handb. of New-Zeal. Fl.* (1864) 143. **LEPTINELLA** — Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* I (1853) 129. — Nouvelle-Zélande. ☞

**C. scariosa** Cassini (sub **LEPTINELLA**) in *Bull. Soc. Philom. Paris* (1822) 127 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 141. — Chili, Terre-de-Feu. ☞

21. **ARTEMISIA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 644 : T. Durand, Ind. Gen. n. 3989. — Plus de 200 esp. décrites, dont 150 environ bien distinctes, habitant l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Abyssinie et les îles Sandwich.

**Artemisia Abrotanum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 845 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1041 ; Nees, Weihe, Wille et Funke, *Pflanze officinales* t. 232 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II, 72. — Espagne ; ailleurs naturalisé. ☞

**Artemisia atrata** Lamarck, *Dict. Bot. Encycl.* I (1783) 263. A. TANACETIFOLIA Allioni, *Fl. Pedem.* III (1785) n. 608 t. 10 fig. 3; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 693 fig. 3. — Dauphiné, Piémont, Lombardie, Carniole, Transylvanie. ♀

**A. Baumgarteni** Besser, *Tentam. de Abrotanis* in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou* III (1834) 73. — Hongrie, Transylvanie. ♀

**A. glacialis** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1187; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 35; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1030; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 128. — Pyrénées franç., Dauphiné, Italie, Europe centr. ♀

**A. lanata** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1800) 1823; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1838) 423. A. ASSOANA Willkomm, *Prodr. Fl. Hisp.* II (1870) 69. — Murcie, Castille, Aragon. ♀

— — subsp. **Pedemontana** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1878) 376. A. PEDEMONTANA Balbis in Loiseleur, *Notice Pl. ajout. Fl. France* (1810) 126. — Piémont, Lombardie. ♀

**A. nana** Gaudin, *Fl. Helv.* V (1829) 231; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 98; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1036; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 132. — Dauphiné, Suisse mér. ♀

**A. Royleana** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 115. — Inde bor.-occ. ♀

— Obs. Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 329, considère cet *Artemisia* comme une espèce douteuse.

**A. Villarsii** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 130; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 1031. A. RUPESTRIS Villars (non Linné), *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 246. — Pyrénées franç., Dauphiné, Savoie. ♀

22. **HOMOGYNE** Cassini in *Bull. Soc. Philom.* Paris (1816) 198; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 3999. — Trois esp. des montagnes de l'Europe.

**H. discolor** Cassini in *Dict. des Sc. Natur.* XXI (1821) 412; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 903. TUSSILAGO — Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* (1775) III t. 217. — Lombardie, Corse?, Alpes autrich., Hongrie, Transylvanie. ♀

**H. sylvestris** Cassini, *Dict. des Sc. Natur.* XXI (1821) 412; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 903. TUSSILAGO — Scopoli, *Fl. Carniol.* II (1772) 156; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V append. t. 12. — Styrie, Carniole, Carinthie, Frioul, Croatie, Transylvanie, Monténégro. ♀

23. **DORONICUM**, Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 650 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4003. — Genre de 15 esp. de l'Europe et de l'Asie temp.

**D. caucasicum** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 321 ; *Bot. Mag.* t. 3143 ; Rochel, *Pl. Banat. Rar.* t. 31 ; Boissier, *Fl. Or.* III 380. **D. ERIORRHIZON** Gussone in *litt.* (1831) ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 320. — Europe centr.-or. et mér.-or., Italie, Sicile, Crète, Asie Min., Caucase. ♀

**D. macrophyllum** Fischer in *Cat. Hort. Gorenk.* ed. II (1812) 40 ; Horne-mann, *Hort. Reg. Bot. Hafn.* Suppl. (1819) 400 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XVIII t. 80 ; Boissier, *Fl. Or.* III 379. **D. AUSTRIACUM** Marschall Bieberstein (non Jacquin, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 321. — Caucase centr. et or., Perse. ♀

24. **CRASSOCEPHALUM** Mœnch, *Meth. Pl. Marburg.* (1794) 516 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4021. — Genre de 20 esp. de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie trop. et subtrop.

**C. aurantiacum** De Candolle (sub *GYNURA*), *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 300. **CACALIA** — Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indië* XV (1826) 908. — Java. ♀ ?

25. **SENECIO** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 647 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4025. — Genre de plus de 950 esp. bien distinctes, représenté dans le monde entier.

**S. abrotanifolius** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 869 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 79 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 967. — Europe centr., Suisse, Italie bor. ♀

**S. aconitifolius** Turczaninow, *Enum. Pl. China bor.* in *Bull. Soc. Nat. Moscou* VII (1837) 155 ; *Gartenflora* XXV (1876) 356 t. 887. — Chine. ♀

**S. argenteus** Kunze in PÆPPIG, *Collect. Pl. Chil.* III n. 192 ex De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 415. **S. LINEARIFOLIUS** Colla in *Mem. Acad. Taur.* XXXVIII 31 t. 29. — Chili. ♂

**S. arnicoides** Wallich, *Catal.* (1831) n. 3138 pr. p. ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 351. **LIGULARIA** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 314 ; Royle, *Illustr. Bot. Himal.* t. 60 fig. 2. — Himalaya centr. et occ. ♀

**S. artemisiæfolius** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 435 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* V t. 485 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 118. **S. ADONIDIFOLIUS** Loiseleur, *Fl. Gall.* ed. II (1828) 239 t. 19 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 114. — Pyrénées, Cévennes, France centr. et mér.-or. ♀

- Senecio Cineraria** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 355 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 968 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 116 ; Boissier, *Fl. Or.* III 395 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 118. CINERARIA MARITIMA Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1244. — Portugal, Rég. Médit. ; îles de Mélo ? et de Rhodes ?  $\mathfrak{h}$
- S. crassifolius** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1804) 1982 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 344 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 113. — France médit.  $\odot$
- S. Doronicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1222 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V t. 45 ; Gérard, *Fl. Galloprov.* t. 7 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 121. SOLIDAGO — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 880. — Pyrénées, France centr., Jura, Alpes, Apennins, Istrie, Dalmatie, Carpathes.  $\mathfrak{z}$
- S. eleagnifolius** Hooker f., *Fl. Nov. Zeland.* I (1853) 150 t. 44 ; et *Handb. New-Zeal. Fl.* 162. — Nouvelle-Zélande.  $\mathfrak{h}$
- S. gonocaulos** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 425. — Amérique austr.  $\mathfrak{z}$
- S. incanus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 869 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 968 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 117. — Dauphiné, Piémont, Suisse, Tyrol, Lombardie, Transylvanie ?, Hongrie.  $\mathfrak{z}$
- S. Lagascanus** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IV (1837) 357 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 115. — Espagne.  $\mathfrak{z}$
- S. Ledebourii** Nob. CINERARIA MACROPHYLLA Ledebour (non SENECIO MACROPHYLLUS Marschall Bieberstein), *Icon. Pl. Fl. Ross.* IV (1833) t. 367. LIGULARIA — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 316 ; *Bot. Reg.* IX t. 812. — Sibérie altaïque.  $\mathfrak{z}$
- S. Ligularia** Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III (1881) 349. S. SIBIRICUS Ledebour (non Linné), *Fl. Ross.* II (1844-46) 238. — Himalaya temp. et subalp., Sibérie, Dahourie, Japon.  $\mathfrak{z}$
- S. macrophyllus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 639 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 352 ; Boissier, *Fl. Or.* III 406. JACOBÆA — C.-A. Meyer, *Verzeichn. Pfl. Reise Caucas.* (1831) 81. S. DORIA C. Koch (non Linné) in *Linnaea* XVII (1843) 48. — Transylvanie, Serbie, Russie mérid., Sibérie occid.  $\mathfrak{z}$
- S. Othonnæ** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 308 ; Boissier, *Fl. Or.* III 410. CINERARIA ANOMALA Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IX (1837) t. 872. JACOBÆA OTHONNÆ C.-A. Meyer, *Verzeichn. Pfl. Reise Caucas.* (1831) 81. — Serbie, Macédoine, Asie Min., Perse.  $\mathfrak{z}$
- S. pauciflorus** Pursh, *Fl. Bor.-Amer.* II (1814) 529 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 431 ; Torrey et Gray, *Fl. of N.-Amer.* I part. 2, 391. — Labrador ?, Caroline.



**Senecio scaposus** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 403 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* III 406. — Afrique austr.

— — var. **caulescens** HARVEY in Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* III (1865) 406. **S. CALAMIFOLIUS** Hooker in *Bot. Mag.* (1843) t. 4011. Avec le type.

**S. spathulæfolius** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 362 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVI t. 978 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 122. **CINERARIA** — Gmelin, *Flora Badensis* III (1808) 454 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* II t. 126. — Espagne, France, Belgique, Europe centr., Lombardie. ♀

**S. Tournefortii** Lapeyrouse, *Hist. abrég. Pyrén.* (1813) 516 ; De Candolle, *Fl. Franç.* V 475 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 121 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 114. **S. PERSICIFOLIUS** Ramond in *Bull. Soc. Philom.* n. 43, 146 t. 11. — Portugal, Espagne, Pyrénées. ♀

26. **OTHONNOPSIS** Jaubert et Spach ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4031. — Huit espèces de l'Afr. bor. et austr. et de l'Asie occ.

**O. cheirifolia** Battandier in BATTANDIER et TRABUT, *Fl. de l'Algérie* (1888) 477. Othonna — LINNÉ, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 926 ; *Bot. Reg.* t. 266 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 17. — Algérie, Tunisie. ♂

27. **OTHONNA** Linné, *Hort. Cliffort.* (1737) 502 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4037. — Une esp. de l'Afrique centr. et 80 esp. de l'Afrique austr.

**O. carnosa** Lessing, *Syn. Gen. Composit.* (1832) 88 ; Harvey et Sonder, *Fl. Capens.* III 336. **CINERARIA CACALIODES** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 374. — Afrique austr.-or. ♂

28. **CALENDULA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 672 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4042. — Genre de 10 esp. bien distinctes de l'Europe, de l'Asie occ. et de l'Afrique bor.

**C. suffruticosa** Vahl, *Symb. Bot.* II (1791) 94 ; Boissier, *Voyage Bot. Esp.* t. 89. **C. LUSITANICA** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 83. **C. ALGARBIENSIS** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, VI (1859) 106. — Portugal.

29. **ECHINOPS** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 625 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4065. — Genre de 75 esp. de l'Europe mérid. de l'Afrique et de l'Asie temp. et subtrop.

**E. glaberrimus** De Candolle in *Annal. Sc. Natur.* sér. 2, II (1834) 260 et *Prodr. Regn. Veget.* VI 525 ; Boissier, *Fl. Or.* III 427. **E. spinosus** Bové ex De Candolle, *loc. cit.* — Arabie Pétrée. ♀

**E. niveus** Wallich, *Catal.* (1831) n. 2986 ; Royle, *Illustr. Himal. Plant.* t. 56 fig. 1 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 359. — Himalaya bor.-occ. ♂

**E. spinosus** Linné, *Mant. Pl.* (1767) 119 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 924 ; Boissier, *Fl. Or.* II 429. **E. echinophorus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, X (1849) 87. — Égypte, Tunisie, Chypre, Syrie. ♀

30. **AMPHORICARPUS** Visiani, *Fl. Dalmatica* II (1844) 27 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4071. — Genre monotype.

**A. Neumayeri** Visiani, *loc. cit.* II (1844) 28 t. 10 fig. 2 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 739, 816. — Dalmatie, Herzégovine, Monténégro. ♀

31. **CARLINA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 634 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4072. — Genre de 14 esp. de l'Europe, de l'Afrique bor., de l'Asie centr. et occ.

**C. acanthifolia** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1789) 156 t. 51 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 740 ; Boissier, *Fl. Or.* III 448. **C. acaulis** Lamarek (non Linné), *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 623. — Pyrénées, France centr. et or., Italie, Dalmatie, bassin du Danube, Russie austr.-occ. ?, Arcadie. ♀

32. **ATRACTYLIS** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 635 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4073. — Cinq esp. de la rég. Méditerran. de l'Orient, du Japon, de la Chine et des Canaries.

**A. comosa** Sieber ex Cassini in *Dict. des Sc. Natur.* I (1816) 58 ; Boissier, *Fl. Or.* III 453. **A. speciosa** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 549 ; Delessert, *Icon. Select. Pl.* IV (1839) t. 71. — Palestine, Syrie. ♀

33. **CARDUUS** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 630 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4077. — Genre de 30 esp. bien distinctes de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et des îles Canaries.

**C. tenuifolius** Gaudin, *Fl. Helv.* V (1829) 174. — Suisse. ♀  
— Obs. Nyman fait de ce *Carduus* une sous-espèce du *C. defloratus* Linné.

34. **CNICUS** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 633 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4078. — Genre d'environ 160 esp. bien distinctes de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique (ailleurs naturalisé).

**C. gnaphalodes** Willdenow ex Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 373. **CHAMÆPEUCE** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 658. **CARDUUS** — Cyrillo, *Pl. Rar. Regn. Neapol.* I (1788) 27 t. 9. **CIRSIUM** — Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 373. — Calabre. ♂

**C. niveus** Presl, *Delic. Prag.* (1822) 108. **CHAMÆPEUCE** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 659. **CIRSIUM** — Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 373. — Italie mér., Sicile. ♀

35. **SAUSSUREA** De Candolle in *Annal. Mus. Paris* XVI (1810) 156 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4086. — Genre de 70 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.

**S. albescens** Hooker f. et Thomson in CLARKE, *Compos. Ind.* (1876) 233 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 374. **SERRATULA** — Wallich, *Catal.* (1831) n. 2918. **APLOTAXIS** — De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI (1837) 540. — Himalaya centr. et occ. ♀

**S. alpina** De Candolle in *Annal. Mus. Paris* XVI (1810) 199. **SERRATULA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 816 ; *Fl. Dan.* I t. 37 ; *Engl. Bot.* IX t. 599. — Europe bor. et centr., Italie bor., Sibérie. — Amérique bor. ♀

**S. discolor** De Candolle in *Annal. Mus. Paris* XVI (1810) 199 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 818. **SERRATULA** — Willdenow, *Sp. Pl.* III (1804) 1641 ; Rochel, *Pl. Banat. Rarior.* t. 37. — Europe centr. (du Dauphiné à la Transylvanie), Sibérie, Amérique bor. ♀

36. **JURINEA** Cassini in *Bull. Soc. Philom. Paris* (1821) 140 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4089. — Genre de 40 esp. de l'Europe mér. et de l'Asie centr. et occ.

**J. alata** Cassini in *Dict. des Sc. Nat.* XXIV (1822) 288 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 675 ; Boissier, *Fl. Or.* III 576. **SERRATULA** — Desfontaines, *Cat. Hort. Par.* ed. 2 (1815) 108. **CARDUUS** — Don ex Sweet, *Brit. Fl. Gard.* II (1825) t. 103 et *Prodr. Fl. Nepaul.* 167. — Caucase occ. ②

**J. macrocephala** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* II (1873) 474 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III (1881) 378. **CARDUUS** — Wallich, *Catal.* (1831) n. 2904. **DOLOMIEA** — De Candolle in Guill. *Archives de Bot.* II (1833) 330 ; Delessert, *Icon. Select. Plant.* IV (1839) t. 70 ; Royle, *Illustr. Bot. Himal.* t. 57. — Himalaya occ. ♀

37. **BERARDIA** Villars, *Prospect. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 27 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4090. — Genre monotype.

**B. subacaulis** Villars, *Prosp. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 27 et *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 27 t. 22 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 887 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 271. **ARCTIUM LANUGINOSUM** Lamarck, *Fl. Franç.* II (1778) 70. — Dauphiné, Piémont. 2

38. **SERRATULA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 628 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4093. — Genre de 35 esp. de l'Europe, de l'Afrique bor. et de l'Asie temp.

**S. heterophylla** Desfontaines, *Catal. Hort. Par.* (1804) 93 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 804 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 209. **CARDUUS LYCOPIFOLIUS** Villars, *Prospect. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 30. — France mér.-or., Allemagne or., Istrie, bassin du Danube, Russie centr. et mér. 2

**S. nudicaulis** De Candolle, *Fl. Franç.* IV (1805) 86 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 803 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 209. **CENTAUREA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 4300. — Espagne, France mér.-or., Suisse, Italie. 2

39. **LEUZZEA** De Candolle, *Fl. Franç.* IV (1805) 109 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4099. — Deux ou 3 esp. de la rég. Médit.

**L. rhaponticoides** Grælls, *Rumill. de Plant. Esp.* (1859) 101 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 174. — Castille. 2

40. **CENTAUREA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) 420 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4100. — Plus de 400 esp. décrites, mais 350 seulement bien distinctes et plus ou moins répandues dans le monde entier.

**C. Babylonica** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 460 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* t. 428 ; *Rev. Hort.* (1859) 540 cum icône ; Boissier, *Fl. Or.* III 681. **SERRATULA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1148. — Pamphylie, Isaurie, Cilicie, Syrie, Palestine. ②

**C. Canariensis** Broussonnet in Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 928 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VI 577 ; Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canar.* t. 118. — Ténériffe. 5

**C. Cineraria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 912 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 92 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 772. **C. CANDIDISSIMA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 669. — Italie mér., Sicile, Dalmatie, Tunisie. 2

**Centaurea Clementei Boissier** in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1838) 303 et *Voy. Bot. Esp.* t. 102<sup>a</sup>; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 150. — Espagne. 2

**C. dealbata Willdenow**, *Sp. Pl.* III (1804) 2295; Marschall Bieberstein, *Cent. Plant. Ross. Merid.* t. 53. PSEPHELLUS — Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 608. — Caucase, Perse bor. 2

— — var. **humilior** MARSHALL BIBERSTEIN, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 349. PSEPHELLUS LAZICUS Boissier in Balansa, *Exsicc.* ex Boissier, *loc. cit.* — Aver le type.

**C. Favratii Vetter** ex FAVRAT in *Bull. Soc. Bot. Genève* V (1888) 11. C. ORIENTALIS × ADLERIANA, nomen tantum.

**C. Haussknechtii Boissier**, *Fl. Or.* III (1875) 670. — Syrie bor. 2?

**C. insignis Boissier** (sub PHEOPPAPO) *Fl. Or.* suppl. (1888) 312. — Perse, Assyrie ?. 2

**C. Moehrleniana Vetter**, *Fl. Env. Orbe* in *Bull. Soc. Vaudoise Sc. Nat.* XXII (1887) 277. C. ORIENTALIS × SCABIOSA.

**C. Pindicola Grisebach**, *Iter Rumel.* II (1841) 164; Boissier, *Fl. Or.* III 637. C. CANA Sibthorp et Smith, var. Griseb., *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 236. — Thessalie, Macédoine. 2

**C. procumbens Balbis** in *Acta Acad. Taurin.* (1806) 32 t. 1; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XV t. 760. — Piémont, Ligurie, Corse. 2

**C. rutifolia Sibthorp et Smith**, *Fl. Græce Prodr.* II (1813) 205 et *Fl. Græca* X (1840) 11 t. 916; Boissier, *Fl. Or.* III 642. — C. CINERARIA, Urville (non Linné) *Enum. Plant. Archipel.* in *Mém. Soc. Linn. Paris* I (1822) 371. — Thrace, Bulgarie. 2

**C. uliginosa Brotero**, *Fl. Lusit.* I (1804) 368 et *Phytog. Lusit.* I t. 30. — Portugal. 2

41. **STIFFTIA Mikan**, *Delect. Fl. et Faun. Brasil.* (1820) cum tab.; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4127. — Cinq esp. du Brésil et de la Guyane.

**S. chrysantha Mikan**, *loc. cit.*; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 26; *Bot. Mag.* t. 4438; *Fl. des Serres* IV t. 391. — Brésil. 5

42. **POLYACHYRUS Lagasca**, *Amen. Nat.* I (1811) 37; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4151. — 7 esp. du Chili et du Pérou.

**P. Poeppigii Kunze** ex LESSING in *Linnæa* V (1830) 5; Poepp. et Endl., *Nov. Gen. Plant.* I (1835) t. 23; Delessert, *Icon. Select. Plant.* IV (1839) t. 84. — P. AURITUS Don in *Phil. Mag.* (1832) 390. — Chili. 2

43. **HIERACIUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 620 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4193. — Plus de 1000 esp. décrites, mais 200 seulement bien distinctes, habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

**H. alpinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 800 ; Frœlich, *Alpenpfl.* X t. 6 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1506 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 363. — Écosse, Scandinavie, Alpes, Vosges, Sudètes, Carpathes, Apennins.  
— — subsp. **rheticum** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 447. **H. RHETICUM** Fries, *Episc. Gen. Hierac.* (1862) 46. — Suisse.

**H. armerioides** Arvet-Touvet, *Essai Pl. Dauphiné* (1871) 48. **H. MURITHIANUM** Favre, *Sapp. Guide bot. St-Bernard* in *Bull. Soc. Murith.* IV<sup>e</sup> fasc. (1874) 64. — Dauphiné, Savoie, Suisse.

**H. aurantiacum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 801 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 440 ; Allioni, *Fl. Pedem.* III t. 14 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 348. — Europe mér.-occ., centr. et centr.-or. (Norvège mér., Germanie bor., indig. ?)

**H. Burnati** Arvet-Touvet in BURNAT et GREMLI, *Hierac. Alp. Marit.* (1883) 57. — Alpes Marit. ♀

**H. crinitum** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* II (1813) 134 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1525 ; Boissier, *Fl. Or.* II 875 pr. p. — Grèce, Macédoine, Bithynie. ♀

**H. eximium** Backhouse, *Monog. British Hierac.* (1856) 20. **H. CALENDULIFLORUM** Backhouse. — Norvège, Écosse.

**H. humile** Jacquin, *Hort. Vindob.* III (1776) 2 in obs. ; Sturm, *Deutschl. Fl.* X t. 30. **H. PUMILUM** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II (1776) 53 t. 189. **H. JACQUINI** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* III (1789) 123 t. 28. — Pyrénées, Alpes, Jura, Bade, Bavière, Italie, Carpathes. ♀

**H. incisum** Hoppe apud Sturm, *Deutsch. Fl.* Hef. 39 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 390. — Suisse, Tyrol, Bavière. ♀

**Hieracium lanatum** Waldstein et Kitaibel, ex WILLDENOW *Sp. Pl.* III (1804) 1586 ; Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* (1805) 135 t. 127 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1555. **H. WALDSTEINII** Tausch in *Flora* XI (1828) I Erg. 65. — Croatie, Dalmatie, Monténégro, Bosnie, Transylvanie ?, Serbie. ♀

**H. lasiophyllum** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II (1843) 522 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1550. — Autriche. ♀

**H. lycopsifolium** Frœlich in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1838) 224 ; Fries, *Symb. ad Hist. Hierac.* 163 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 382. — France mér.-or.

— — subsp. **Favрати** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* suppl. (1889) 491. **H. FAVRATI** Muret ex Gremli, *Excurs. Fl. Schweiz* ed. II 273. — Suisse. ♀

- Hieracium phlomoides** Frœlich in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1839) 233. H. LAWSONI Villars, var.  $\gamma$  Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II (1870) 261. — Espagne, Pyrénées.  $\gamma$
- H. pictum** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 374 ; Schleicher, *Cat. Pl. Helv.* (1815) 17 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 216. — Dauphiné, Suisse, Savoie.  $\gamma$
- H. porrectum** Fries, *Symb. ad Hist. Hierac.* (1847) 106 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1523 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 371. — France, Suisse, Styrie.  $\gamma$
- H. rupestre** Auct. ex FRIES, *Symb. ad Hist. Hierac.* (1847) 96 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1547. H. RUPESTRE Grenier et Godron (non Allioni), *Fl. de Fr.* II (1850) 367 ; Reichenbach, *loc. cit.* t. 1942. — Pyrénées franç., Dauphiné.  $\gamma$
- H. stelligerum** Frœlich in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1838) 214 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1552 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 369. — France mér., Piémont.  $\gamma$
- H. valdepilosum** Villars, *Prosp. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 34 et *Hist. Pl. Dauph.* III 106 t. 30 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1515 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 381. — Dauphiné, Savoie, Suisse mér.-occ.  $\gamma$
44. **LEONTODON** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 618 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4198. — Genre de 40 esp. bien distinctes habitant l'Europe, l'Asie centr. et occ. et l'Afrique bor.
- L. Villarsii** Loiseleur, *Fl. Gall.* ed. I (1806-7) 514 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 300. APARGIA — Willdenow, *Sp. Pl.* III (1804) 1552. — Espagne, France mér., Italie.  $\gamma$
- — subsp. **Rosani** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 468. L. ROSANI De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1830) 104. APARGIA — Tenore, *Sylog. Fl. Neapol.* append. 5 (1842) 26. — Italie mér.
45. **TARAXACUM** Haller, *Enum. Stirp. Helv.* II (1742) 739 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4201. — Environ 40 esp. décrites, mais 10 seulement bien distinctes, disséminées dans le monde entier, mais surtout dans l'hémisphère bor.
- T. Apenninum** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1837) 148. LEONTODON — Tenore, *Syll. Pl. Fl. Neap.* (1831) 392. L. ALPINUM Gussone, *Plant. Rarior.* (1826) 391. — Italie centr. et mérid.  $\gamma$
- — subsp. **Pacheri** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 437. T. PACHERI Schultz-Bipontinus in *Flora* XXXI (1848) 170 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1403. — Savoie, Carinthie.

46. SCORZONERA Linné, Gen. Plant. (1737) n. 624 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4219. — Genre de 100 esp. bien distinctes habitant l'Europe, l'Afrique bor., l'Asie centr. et occ.

**S. coronopifolia** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) 220 t. 212 ; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* 588. **S. brevicaulis** Vahl, *Symb. Bot.* II (1791) 88 t. 44. — Algérie, Tunisie. ♀

### XXXVII. LOBELIACÉES

1. PRATIA Gaudichaud in Freycinet, Voy. Bonite (1826) 456 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4260. — Quinze esp. de l'Asie trop., de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Amérique austr.

**P. montana** Hasskarl, *Catal. Pl. Hort. Bogor.* (1844) 406 ; Clarke in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* III 423. **PIDDINGTONIA PATENS** et **MONTANA** Miquel, *Fl. Ind. Bat.* II (1859) 573. — Himalaya, Assam, Java.

2. LOBELIA Linné, Gen. Plant. (1737) n. 678 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4260. — Genre de plus de 200 esp. habitant les régions temp. et chaudes des deux hémisphères.

**L. cardinalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 930 ; *Bot. Mag.* t. 320 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 724 ; A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* II part. I, 3. — Canada, États-Unis (jusqu'à la Floride et au Texas). ♀

3. CYPHIA Berg, Descr. Pl. Cap. B. Spei (1767) 172 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4269. — Genre de 20 esp. de l'Afrique austr. et de l'Abyssinie.

**C. volubilis** Willdenow, *Sp. Pl.* I (1798) 952 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 500. **LOBELIA** — Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* (1794) 39 et *Fl. Capens.* (ed. Schultes) 179. — Afrique austr. ♂



XXXVIII. CAMPANULACÉES

1. **JASIONE** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 266 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4270. — Douze esp. de l'Europe temp., et de la rég. Méditerranéenne.

**J. foliosa** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* II (1793) 38 t. 148 fig. 1 ; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* 398 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 285. **PHYTEUMA RIGIDIFOLIUM** Dufour in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 88. **P. MINUTUM** Rœmer et Schultes, *loc. cit.* V (1819) 86. — Pyrénées. ♀

2. **PLATYCODON** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 49 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4275. — Genre monotype.

**P. grandiflorum** A. De Candolle, *loc. cit.* (1830) 125 t. 3. **CAMPANULA** — Jacquin, *Hort. Vindob.* III (1776) 4 t. 2 ; *Bot. Mag.* t. 252. — Sibérie, Chine, Daourie, Japon. ♀

3. **CODONOPSIS** Wallich in Roxburgh, *Fl. Ind.* (ed. Carey) II (1824) 103 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4278. — Genre de 12 esp. de l'Himalaya, de la Mandchourie, du Yunnan et du Japon.

**C. ovata** Benthām in ROYLE, *Illustr. Bot. Himal.* (1839) 253 t. 69 fig. 3 ; Lindley in *Garden. Chron.* (1856) 468 cum icone ; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 433. **WAHLENBERGIA ROYLEI** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1839) 425. — Himalaya, Afghanistan, Songarie?.

4. **CANARINA** Linné, *Mant. Plant.* II (1771) 588 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4281. — Genre monotype.

**C. Campanula** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 598 ; *Bot. Mag.* t. 444 ; A. De Candolle, *Mém. Campanul.* t. 4. **CAMPANULA CANARIENSIS** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 168. — Iles Canaries. ♀

5. **PHYTEUMA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 130 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4294. — Environ 50 esp. habitant l'Europe, la rég. Méditerranéenne et l'Asie temp.

**P. betonicaefolium** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* II (1787) 518 t. 12 ; *Bot. Mag.* t. 2066 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 250 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 403. — Pyrénées, Dauphiné, Piémont, Suisse, Allemagne. ♀

**P. comosum** Linné, *Sp. Pl.* ed I (1753) 171 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* append. t. 50 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1579 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 404. — Autriche, Italie. ♀

**P. hemisphaericum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 170 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 333 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 363 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 400. — Pyrénées, France centr., Dauphiné, Suisse, Alpes autrich., Carpathes, Banat. ♀

**P. humile** Schleicher, *Pl. Phænog. Helvetiae, Cent.* III (1806) n. 32 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 2 (1839) 451 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 364 et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1580 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 402. — Piémont, Lombardie, Suisse, Tyrol, Salzbourg, Carinthie, Transylvanie. ♀

**P. limonifolium** Sibthorp et Smith, *Fl. Graecae Prodr.* I (1806) 148 et *Fl. Graeca* III t. 218. **PODANTHUM** — Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 951. — Italie, Dalmatie, Croatie, Serbie, Grèce, Asie Min. ♀

— — var. **alpinum** BOISSIER, *Fl. Or.* III (1875) 951. **PHYTEUMA REPANDUM** Sibthorp et Smith, *loc. cit.* (1806) 143. — Eubée, Bithynie, Lycie.

**P. pauciflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 170 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 364 et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1579 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 400. — Pyrénées, Dauphiné, Piémont, Lombardie, Alpes. ♀

6. **MUSSCHIA** Dumortier, *Comment. Bot.* (1823) 28 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4292. — Deux esp. de Madère.

**M. aurea** Dumortier, *loc. cit.* (1823) 28 ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* t. 4 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 495. **CAMPANULA** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 141 ; Ventenat, *Pl. Jard. Malmaison* t. 116. — Madère. ♂

7. **CAMPANULA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 129 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4296. — Genre de 250 esp. environ, habitant l'hémisphère bor.

**C. Allionii** Villars, *Fl. Delph.* (1785) 18 ; *Prosp. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 22 et *Hist. Pl. Dauph.* II 512 t. 10 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 408. **C. NANA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 585. — Dauphiné. ♀

- Campanula alpina** Jacquin, *Enum. Stirp. Agr. Vindob.* (1762) 210 et *Fl. Austr. Icon.* II t. 118; *Bot. Mag.* t. 937; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 409. — Lombardie, Europe centrale. ♀
- C. Americana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 164; A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* II part 1, 14 et *Bot. N. U. St.* ed. VI 309. **C. OBLIQUA** Jacquin, *Hort. Schœnbr.* III (1798) t. 336. États-Unis (du Niagara à la Géorgie). ♀
- C. caespitosa** Scopoli, *Fl. Carniol.* ed. 2, I (1772) 143 t. 4; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1604; Schrank, *Fl. Monacens.* IV t. 350; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 471; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 403. — Italie, Carniole, Styrie, Autriche, Galicie, Croatie ?, Transylvanie, Serbie. ♀
- C. Carnica** Schiede in MERTENS et KOCH, *Deutschl. Fl.* II (1826) 158; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1602; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 277 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 470; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3 (1857) 406. **C. LINIFOLIA** Scopoli, *Fl. Carniol.* I (1760) 144. — Carinthie, Carniole, Lombardie, Transylvanie. ♀
- C. Carpatica** Jacquin, *Hort. Vindob.* I (1770) 22 t. 37; *Bot. Mag.* t. 117; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 479; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1612. — Hongrie, Transylvanie, Galicie. ♀
- — subsp. **turbinata** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 482. **C. TURBINATA** Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta Bot.* (1854) 14. — Transylvanie.
- C. colorata** Wallich, *Catal.* (1829) n. 1287 et in Roxburgh, *Fl. Ind.* (ed. Carey) II 101; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 293 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 473; *Bot. Mag.* t. 4535; C. B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 440. **C. RAMULOSA** Wallich, *Cat.* (1829) n. 1286; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 1178. — Himalaya temp., Caboul. ♀
- — var. **Moorcroftiana** A. DE CANDOLLE, *loc. cit.* (1830) 293 et *loc. cit.* VII 473. **C. MOORCROFTIANA** Wallich, *Catal.* (1829) n. 1288. Avec le type.
- C. crassipes** Heuffel in *Æsterr. Bot. Zeitschrift* VIII (1858) 27; Nyman, *Syll. Fl. Eur.* suppl. 16 et *Consp. Fl. Eur.* 480. — Hongrie mér.-or., Bannat, Serbie. ♀
- C. Cymbalaria** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 139; Boissier, *Fl. Or.* III 920. **C. BILLARDIERI** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 303 t. 13. — Asie Min., Syrie. ♀
- C. elatinoides** Moretti, in *Bragnat. Giorn. Fis.* II v (1822) 110; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1607; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 475. **C. ELATINES** Pollini (non Linné), *Fl. Veron.* I (1822) 278. — Lombardie.
- C. excisa** Schleicher, *Plantæ Phænogam. Helvetiæ Cent.* I (1802) n. 23; Gaudin, *Fl. Helv.* II (1828) 147 t. 2; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 561; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1603 et *Pl. Crit.* I t. 78; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 403. — Suisse ?, Lombardie ?, Transylvanie.
- C. flexuosa** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 109; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 291 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 472. — Caroline, Géorgie, Kentucky. ♀

- Campanula fragilis** **Cyrillo**, *Plant. Rar. Regn. Neapolit.* I (1792) 32 t. 11 fig. 2; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 476; Tenore, *Fl. Napol.* t. 119; *Bot. Reg.* XX t. 1738 (var. *humilis* A. De Candolle); Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1611. C. CAVOLINI Tenore, *Syll. Pl. Vasc. Neap.* (1831) 94 et *Fl. Napol.* t. 213. — Italie mér., Dalmatie.
- C. Garganica** **Tenore** in *Cat. Sem. Hort. Napol.* (1827) 3; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* ser. II t. 252; *Bot. Reg.* t. 1768; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 475; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1608. — Italie, Dalmatie, Istrie, Croatie, Céphalonie.
- C. Grosseckii** **Heuffel** in *Flora* XVI, 1 (1833) 353; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 464; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1592. — Hongrie, Transylvanie, Serbie. 2
- C. Herminii** **Hoffmannssegge** et **Link**, *Fl. Portug.* II (1820) 9 t. 79; Boissier, *Voy. Bot. Esp.* t. 120 fig. 3; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 328 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 481. — Portugal, Espagne. ☉ ?
- C. isophylla** **Moretti** in *Brugnat. Giorn. Fis.* II, VII (1824) 44, 98 (SCHOMB. append. *Prosp. Fl. Ital.* (1824) 22); A. De Candolle, *Monog. Camp.* 306 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 476. C. FLORIBUNDA Viviani, *Fl. Libycæ specimen* (1824) 67. — Ligurie. 2
- C. Jaubertiana** **Timbal-Lagrange** in *Bul. Soc. Bot. France* XV (1868) XCVII t. III. — Pyrénées.
- Obs. Nyman (*loc. cit.*) réunit ce CAMPANULA au C. FICARIOIDES.
- C. latifolia** **Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 233; *Fl. Dan.* I t. 85; *Engl. Bot.* t. 302; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 264 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 469; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1599; Boissier, *Fl. Or.* III 921. — Europe occ., centr., mér. et or., Asie occ., Perse, Sibérie. 2
- — var. **eriocarpa** A. DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1839) 469. C. ERIOCARPA — Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 149. — Avec le type.
- C. Leutweinii** **Heldreich**, *Index Sem. Hort. Athen.* (1860) 17; Boissier, *Fl. Or.* III 896. C. INCURVA Aucher in A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 464. — Eubée, Thessalie. ② ?
- C. linifolia** **Lamarck**, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 579; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 279 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 471. — France or. et centr. 2
- — subsp. **ficarioides** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 479. C. FICARIOIDES Timbal-Lagrange in *Mém. Acad. Toulouse sér. 3*, VI (1862) 33. Pyrénées.
- C. macrorrhiza** **J. Gay** ex A. DE CANDOLLE, *Monog. Camp.* (1830) 302; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 475; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1604. — Espagne, Provence, Ligurie. 2

- Campanula Morettiana** Reichenbach, *Pl. Crit.* IV (1826) 18 t. 320 fig. 499 et 500 et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1609 ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 304 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 476 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III, 407. C. PULLA Parolini (non Linné) in Pollini, *Fl. Veron.* I (1822) 268. C. FILIFORMIS Moretti (non Ruiz et Pavon) in Brugat, *Giorn. Fis.* II, IX (1826) 155. — Tyrol mér., Lombardie.
- C. pelviformis** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 586 ; Desfontaines, *Choix Pl. Coroll. Tournef.* t. 31 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 459 ; Boissier, *Fl. Or.* III 900. C. CORYMBOSA Desfontaines, *loc. cit.* (1808) 40 t. 30. — Crète. ②
- C. petiolata** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 278 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 471. — Amérique bor. ④
- C. petraea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 236 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 466 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1595 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 408 — Provence, Lombardie, Tyrol mér. ④
- C. pilosa** Pallas in Rømer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 148 ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 228 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 460 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 877. C. ALTAICA A. De Candolle, *loc. cit.* (1830) t. 10 fig. 3. C. PALLASIANA Vest in Rømer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 138. — Sibérie altaïque et baicalienne, Daourie. ④
- C. Portenschlagiana** Rømer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 93 ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 303 t. 13 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 476 ; Lindley in *Bot. Reg.* XXIII t. 1995 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1611. C. MURALIS Portenschlag ex A. De Candolle, *loc. cit.* (1838) 303. — Dalmatie ?, Croatie.
- C. primulaefolia** Brotero, *Fl. Lusit.* I (1804) 288 et *Phytogr. Lusit.* I t. 20 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 478 ; *Bot. Mag.* t. 4879. C. PEREGRINA Hoffmannssegg et Link (non Linné), *Fl. Portug.* II (1820) 15 t. 83. — Portugal mérid. ④
- C. pulla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 231 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 280 ; *Bot. Mag.* t. 2492 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1606 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 405. — Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole, Croatie, Transylvanie. ④
- C. punctata** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 536 ; Gmelin, *Fl. Sibir.* III t. 30 ; *Bot. Mag.* t. 1723 ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 242 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 465 ; Schrank, *Hort. Monac.* IX t. 87 ; Ledebour, *Fl. Ross.* II 878. — Sibérie, Daourie, Japon. ④
- C. pusilla** Hænke in Jacquin, *Collect. Bot.* II (1788) 79 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1606 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 405. — Pyrénées, Alpes, Jura, Auvergne, Vosges, Sudètes ?, Carpathes.
- — subsp. **cæspitosa** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 479. C. CÆSPITOSA Villars (non Scopoli), *Hist. Pl. Dauph.* II (1787) 500. — Dauphiné.

- Campanula pyramidalis** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 233 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 477 ; Jaume Saint-Hilaire, *Pl. de Fr.* t. 416 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1612 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 407. — Lombardie, Carniole, Istrie, Croatie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine.
- C. Rainerii** Perpentin in *Bibl. Ital.* V (1817) 134 cum icones ; A. De Candolle, *Monog. Camp.* 305 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 476 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* III t. 211 et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1610 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 407. — Lombardie, Suisse et Tyrol mérid.
- C. rhomboidalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 233 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 470 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1598 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 406. **C. AZUREA** Soland. et Banks in Sims, *Bot. Mag.* (1802) t. 551. — France centr., or. et mér., Suisse, Piémont, Lombardie. 2
- C. rotundifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 232 ; *Fl. Dan.* t. 1086 ; *Engl. Bot.* t. 866 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 471 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1603 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 405 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 415. — Toute l'Europe (le Portugal excepté.)
- — var. **lancifolia** MERTENS et KOCH, *Deutschl. Fl.* II (1826) 154, C. BAUMGARTENI Becker, *Fl. Frankfurt a. M.* I (1828) 264. — Avec le type.
- C. speciosa** Pourret in *Act. Acad. Toul.* III (1788) 309 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 468 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1596 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 407. **C. LONGIFOLIA** La Peyrouse, *Fig. Fl. Pyrén.* I (1795) t. 6. — Catalogne, Pyrénées, France mér. 2
- C. thyrsoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 235 ; *Bot. Mag.* t. 1290 ; Lodiges, *Bot. Cab.* t. 1644 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 468 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1597 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III t. 408. — Jura, Alpes (du Dauphiné à la Croatie ?), Transylvanie.
- C. tomentosa** Ventenat, *Choix Pl. Jard. Cels* (1803) t. 48 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* t. 422 ; Boissier, *Fl. Or.* III 897. **C. CELSI** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 217. — Grèce, Archipel, Macédoine. 2
- C. versicolor** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca Prodr.* I (1806) 138 et *Fl. Græca* IV t. 307 ; Andrews, *Bot. Repos.* VI t. 396 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 476 ; Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 914. — Macédoine, Thrace.
- C. Waldsteiniana** Reimer et Schultes, *Syst. Veget.* V (1819) 99 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 85 et *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1601 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 472. **C. FLEXUOSA** Waldstein et Kitaibel (non Michaux), *Descr. et Icon. Pl. Hung.* II (1805) 145 t. 136. — Croatie, Dalmatie.
- — subsp. **Tommasiniana** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1879) 480. **C. TOMMASINIANA** Reuter, *Catal. Hort. Genev.* (1865) 4. — Istrie.
- C. Zoysii** Wulfen in JACQUIN, *Collect. Bot.* II (1789) 122 et *Icon. Pl. Rar.* II t. 334 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1610 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 482 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 404. — Styrie, Carinthie, Carniole, Transylvanie.

8. **SYMPHYANDRA** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 365 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4300. — Genre de 7 esp. de l'Orient.
- S. Lazica** Boissier et Balansa in Boissier, *Fl. Or.* III (1875) 888. — Anatolie (Lazistan). ♀
- S. pendula** A. De Candolle, *Monog. Camp.* (1830) 366 et *Prodr. Regn. Veget.* VII 494 ; Boissier, *Fl. Or.* III 889. **CAMPANULA** — Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 154 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* ser. II t. 66. — Caucase.
- S. Wanneri** Heuffel in *Flora* (1854) 292. **CAMPANULA** — Rochel, *Pl. Banat. Rar.* (1828) 41 t. 5 fig. 12 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIX t. 1615 ; Boissier, *Fl. Or.* III 888. **C. HETEROPHYLLA** Baumgarten (non Linné), *Enum. Stirp. Transilv.* III suppl. (1846) 342. — Transylvanie, Serbie, Banat, Bosnie, Roumémie.

## XXXIX. VACCINIACÉES

1. **MACLEANIA** Hooker f., *Icon. Plant.* II (1837) t. 109 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4302. — Douze esp. habitant les Andes du Mexique au Pérou.
- M. floribunda** Hooker f., *loc. cit.* II (1837) t. 109 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 577. — Andes du Pérou. ♀
2. **OXYCOCCOS** Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 478 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4323. — Genre de 2 esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.
- O. macrocarpus** Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 449 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 577. **VACCINIUM** — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1811) 43 t. 7 ; *Bot. Mag.* t. 25. — Hollande (île de Terschelling), Amérique bor. (de Terre-Neuve et du Canada à la Caroline). ♂
3. **CHIOGENES** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* II (1817) 94 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4327. — Deux esp. de l'Amérique bor.-occ. et du Japon.
- C. Serpyllifolia** Salisbury, *loc. cit.* II (1817) 94. **C. HISPIDULA** Torrey et Gray ex Torrey, *Fl. State N. York* I (1843) 450 t. 68. — Amérique bor., Japon.

## XL. ERICACÉES

1. **PERNETTYA** Gaudichaud in Ann. Sc. Nat. V (1825) 102 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4331. — Genre d'une quinzaine d'esp. habitant l'Amérique austr.-extratrop., l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**P. coccinea** Hort. ex LAVALLÉE, *Arboret. Segrez.* (1871) 147. Patrie?

2. **GAULTHERIA** Kalm ex Linné, Diss. Chen. (1751) 20 in Amœn. Acad. III (1787) 14 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4332. — Genre d'une centaine d'esp. habitant l'Amérique, l'Asie trop., le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**G. nummularioides** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 150 ; Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 260 t. 63 fig. 2 ; Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 518 fig. 2. — Himalaya, Khasia, Java. ♀

3. **CASSANDRA** D. Don in Edinb. New Philos. Journ. XVII (1834) 158 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4335. — Genre monotype.

**C. calyculata** D. et G. Don, *loc. cit.* (1831) 158 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 610 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1161. **LYONIA** — Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* I (1830-32) 414. **ANDROMEDA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 394 ; *Bot. Mag.* t. 1286 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 862. — Europe or. et bor., Asie et Amérique bor. ♂

4. **CASSIOPE** D. Don in Edinb. New Philos. Journ. XVII (1834) 157 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4336. — Genre de 10 esp. des rég. froides de l'hémisphère bor., du Japon et de l'Himalaya.

**C. tetragona** D. Don, *loc. cit.* (1834) 158 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 611. **ANDROMEDA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 393 ; *Fl. Dan.* t. 1030 ; *Bot. Mag.* t. 3181. — Europe arct., Sibérie, Amérique arct., Canada.



5. **EPIGÆA** Linné, *Diss. Chen.* (1751) 27 in *Amœn. Acad.* III (1787) 17 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4339. — Genre de 2 esp. de l'Amérique bor.-or. et du Japon.

**E. repens** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 395 ; Andrews, *Bot. Repos.* t. 102 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 160 ; *Bot. Reg.* III t. 201 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 591. — Amérique bor. (du Canada à la Caroline et à la Floride).  $\frac{1}{2}$

6. **ANDROMEDA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 344 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4345. — Genre monotype.

**A. polifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 393 ; *Fl. Dan.* I t. 54 ; Pallas, *Fl. Ross.* I t. 1 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 606. — Europe bor., occ. et centr., Russie, Asie bor., Japon, Amérique bor. (du Labrador à la Pensylvanie).

7. **ERICA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 342 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4351. — Genre de plus de 400 esp. habitant l'Europe, la rég. Méditerr. et l'Afrique austr.

**E. carnea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 355 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 31 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1452 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1165, 1166 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 614. **GYPSOCALLIS** — D. et G. Don in *Edinburgh N. Philos. Journ.* XVII (1834) 153. — Europe centr. et centr.-or. Italie bor. et méd.  $\frac{1}{2}$

**E. Mackaii** Hooker f., *Comp. Bot. Mag.* I (1835) 158 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 665. **E. MACKAIANA** Babington, *Man. Brit. Bot.* ed. I (1843) ; *Engl. Bot.* t. 2900. — Irlande, Asturies, Castille.  $\frac{1}{2}$

— Obs. Nyman (*Consp. Fl. Eur.* 488) en fait une sous-espèce de l'**ERICA TETRALIX** Linné.

**E. vagans** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 230 ; *Engl. Bot.* I t. 3 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 667 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1164. — Angleterre mér.-occ., France occ. et mér.-occ., Espagne, Portugal.

8. **LOISELEURIA** Desvaux in *Journ. de Bot.* III (1813) 35 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4362. — Genre monotype.

**L. procumbens** Desvaux, *loc. cit.* (1813) 35 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 714. **AZALEA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 151 ; *Fl. Dan.* t. 9 ; *Engl. Bot.* t. 865 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1159 ; 1164. — Europe bor., centr. et or., Italie bor., Asie et Amérique arct. et bor.

9. **BRYANTHUS** S.-G. Gmelin, *Fl. Sibir.* IV (1769) 133 t. 57 fig. 3 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4363. — Trois esp. des parties froides ou élevées de l'Amérique bor. et occ.

**B. empetriformis** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII (1868) 368. PHYLLODOCE — D. et G. Don in *Edinb. New Phil. Journ.* XVII (1834) 160 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 713. MENZIEZIA — Smith in *Trans. Linn. Soc.* X (1811) 380 ; *Bot. Mag.* t. 3176. — Amérique bor. (rég. froides), Montagnes Rocheuses, Californie.

10. **KALMIA** Linné, *Diss. Chen.* (1751) in *Amœn. Acad.* III (1787) 13 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4366. — Genre de 6 esp. de l'Amérique bor. (de la Floride à la Californie, Cuba).

**K. latifolium** Aiton, *Hort. Kew.* ed. I, II (1789) 63 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III t. 464 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 363 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 730. **L. PALUSTRE** Linné var. **LATIFOLIUM** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 259. — Amérique arct., Canada.  $\mathfrak{h}$

11. **LEDUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 342 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4373. — Genre de 4 ou 5 esp. habitant les rég. froides de l'hémisphère bor.

**K. latifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 360 ; *Bot. Mag.* t. 173 ; Michaux, *Arbr. Forest. Amer.* III t. 5 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 729. — Amérique bor. (du Canada à la Caroline).  $\mathfrak{h}$

12. **RHODODENDRON** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 392 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4375. — Genre de 200 esp. environ habitant les mont. de l'Europe et de l'Asie, la Malaisie et l'Amérique bor.

**R. Chamæcistus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 392 ; *Bot. Mag.* t. 488 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1491 ; Regel in *Gartenflora* (1864) t. 454 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 726. **RHODOTHAMNUS** — Reichenbach in *Mesl., Gemein. Handbuch der Gewächskunde* 2<sup>e</sup> ed., II (1828) 688. — Tyrol, Autriche, Croatie, Hongrie, Transylvanie, Lombardie.  $\mathfrak{h}$

**R. ferrugineum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 392 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 255 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 65 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 724 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1158. — Pyrénées, Jura, Alpes, Apennins, Carpathes, Asie, centr.  $\mathfrak{h}$

**Rhododendron hirsutum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 392 ; *Bot. Mag.* t. 1853 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 479 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1158 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 724. — Pyrénées, Alpes de l'Europe centr., Piémont, Lombardie.  $\frac{1}{2}$

**R. punctatum** Andrews, *Bot. Repos.* I (1798) 36 ; Ventenat, *Choix Pl. Jard. Cels.* I t. 15 ; *Bot. Reg.* t. 37 ; *Bot. Mag.* t. 2285 ; De Candolle, *Prod. Regn. Veget.* VII 723. **R. PARVIFLORUM** Hort. — Amérique bor.  $\frac{1}{2}$

13. **MONESES** Salisbury ex Gray, *Arrang. Brit. Pl.* II (1821) 403 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4379. — Genre monotype.

**M. uniflora** Linné (sub **PYROLA**), *Sp. Pl.* ed. I (1753) 397 ; *Fl. Dan.* I t. 8 ; *Engl. Bot.* III t. 146 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1156. **M. GRAN-DIFLORA** Salish., *loc. cit.* II (1821) 403 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 774. — Europe bor. et centr., Amérique bor. (rég. froides), Japon.  $\frac{2}{3}$

14. **CHIMAPHILA** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 300 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4380. — Genre de 4 esp. habitant l'Europe, l'Amérique bor., le Mexique, le Japon et la Corée.

**C. maculata** Pursh, *loc. cit.* (1814) 300 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 775. **PYROLA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 396 ; *Bot. Mag.* t. 897 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 708. — Du Canada à la Caroline et au Mississipi.  $\frac{2}{3}$

**C. umbellata** Nuttall, *Gen. N. Amer. Pl.* I (1818) 274 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 775. **PYROLA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 396 ; *Fl. Dan.* VIII t. 1336 ; *Bot. Mag.* t. 778 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1156.

15. **CLETHRA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 354 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4381. — Genre de 26 espèces environ habitant l'Amérique, l'île Madère, le Japon et la Malaisie.

**C. alnifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 396 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 369 ; Loudon, *Arboret. Brit.* fig. 927 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 588. — Du Canada à la Georgie et à la Floride.

## XL. DIAPENSIACÉES

1. GALAX Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 200 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4421. — Genre monotype.

**G. aphylla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 200 ; *Bot. Mag.* t. 754 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 776. BLANDFORDIA CORDATA Andrews, *Bot. Repos.* V (1804) t. 343. G. ROTUNDIFOLIA Pursh, *Fl. Amer. Sept.* (1814) 446. Virginie, Tennessee, Caroline, Georgie. ♀

## XLI. PLOMBAGINÉES

1. ACANTHOLIMON Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 69 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4427. — Genre de 85 esp. environ habitant l'Orient (de la Grèce et de la Syrie au Thibet).

**A. Echinus** Bunge, *Gall. Acanthol.* in *Mém. Acad. Sc. St-Petersb.* XVIII (1872) n. 51 ; Boissier, *Fl. Or.* IV (1879) 840. STATICE — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 276 pr. p. ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 300. A. ANDROSA CEUM Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 73. STATICE — Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* I (1843) t. 89. — Grèce, Asie Min. ♂

**A. glumaceum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 73 et *Fl. Or.* IV 835 ; *Fl. des Serres* VII t. 677 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 66. STATICE — Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* I (1843) 162 t. 91. — Arménie russe. ♀

**A. Kotschyi** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 74 et *Fl. Or.* IV 840. STATICE — Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* I (1843) 162. — Cilicie, Cataonie. ♂

**A. venustum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 80 et *Fl. Or.* IV 831 ; Tchihatcheff, *Asie Min.* t. 37. STATICE DIANTHIFOLIA Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* I (1843) 162 (excl. syn.). — Anatolie, Cilicie, Cappadoce, Cataonie. ♂

2. **STATICE** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 252; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4428. — Genre comptant une centaine d'esp. habitant les côtes du monde entier et les déserts de la Rég. Méditerranéenne et de l'Orient.

**S. alutacea** Steven, *Enum. Pl. Taur.* in *Bull. Soc. Mosc.* XXX (1857) 367; Nymann, *Consp. Fl. Europ.* 612; Lindemann, *Fl. Cherson.* 174. — Russie mér.

**S. brassicæfolia** Webb in BOURGÉAU, *Pl. Canar. Exsicc.* n. 136; Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canar.* III 181 t. 195; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 637; *Bot. Mag.* t. 5162. — Canaries, Gomera.  $\frac{1}{2}$

**S. myriantha** Schrenk, *Enum. Pl. Nov. Song.* I (1844) 14; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 660; Ledebour, *Fl. Ross.* III 462. — Sibérie altaïque.  $\frac{1}{2}$

**S. spathulata** Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 275; *Bot. Mag.* t. 1617; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 377; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 377. — Afrique bor., Espagne (var. *EMARGINATA* Boissier).  $\frac{1}{2}$

3. **ARMERIA** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 333; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4429. — Environ 50 esp. décrites, habitant l'Europe et l'Amérique, l'Afrique bor. et l'Asie occ.

**A. alpina** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 333; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 680; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 368. *STATICE* — Hoppe in Sturm, *Deutsch. Fl.* fasc. XIII, 51; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I (1837) 595. — Espagne bor., Pyrénées, Alpes (des Alpes Marit. aux Alpes Juliennes).  $\frac{1}{2}$

**A. caespitosa** Boissier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 679; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 368. *STATICE* — Ortega in Quer, *Fl. Esp.* VI (1784) 334 t. 15 fig. 1. — Espagne centr., Portugal.  $\frac{1}{2}$

**A. Cariensis** Boissier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 677 et *Fl. Or.* IV 873. — Carie, Phrygie.  $\frac{1}{2}$

**A. Chilensis** Boissier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 681. Chili.  $\frac{1}{2}$

— — var. **curvifolia** Boissier, *loc. cit.* *A. CURVIFOLIA* Bertero in *Merc. Chil.* n. XII 563 (ex Boissier). — Avec le type.

**A. Duriei** Boissier in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 684; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 369. *A. JUNIPERIFOLIA* J. Gay in Durieu, *Pl. Astur. Exsicc.* (ex Boissier). — Espagne bor. et mér.  $\frac{1}{2}$

**A. filicaulis** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 527 t. 154; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 369. — Grenade, Murcie, Aragon.  $\frac{1}{2}$

**Armeria juncea Girard** in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, II (1844) 324 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 678 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 734. — France mér. ☿

**A. maritima Willdenow**, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 333 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 677 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 733 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1148. STATICE — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3. — Europe bor., occ. et centr. marit. ☿

**A. plantaginea Willdenow**, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 334 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 683 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1151 fig. 1 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 365. STATICE — Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 90. A. MONTANA Wallroth, *Monog. Armer.*, in *Beitr. zur Bot.* II (1844) 217. — Portugal, Espagne, France, Allemagne occ., Suisse mér., Italie bor. et centr., Dalmatie. ☿

**A. undulata Boissier** in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 685. A. MAJELLENSIS Boissier var. LEUCANTHA Boissier, *Fl. Or.* IV (1879) 873. — STATICE — Bory et Chaubard, *Nouv. Fl. Pélop.* (1838) t. 11. S. ALLIACEA Sibthorp et Smith (non Cavanilles), *Fl. Græca* (1806) t. 294. — Attique, Péloponèse, Arcadie, Abruzzes.

**A. villosa Girard** in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, II (1844) 323 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 367 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 367. — Espagne (Grenade). ☿

**A. Welwitschii Boissier** in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 676. A. LITTORALIS Boissier (non Hoffmannssegge et Link) in Welwitsch, *Fl. Lusit.* n. 49 et 68. — Portugal. ☿

4. **PLUMBAGO** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 123 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4431. — Genre d'une douzaine d'esp. habitant les rég. chaudes du monde entier, l'Europe mérid. et l'Asie centr.

**P. Larpentæ Lindley** in *Gard. Chron.* VII (1847) 732 cum icone ; Lemaire, *Fl. des Serres* IV t. 307 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIV t. 267 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 694. — Chine boréale. ☿

**P. rosea Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 315 ; *Bot. Mag.* t. 230. PLUMBAGIDIUM — Spach, *Hist. Nat. Veget. Phan.* X (1841) 339. PLUMBAGO COCCINEA Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 693. THELO — Loureiro, *Fl. Cochinch.* (ed. Willdenow) I (1793) 147. — Inde or., Java, Chine. ☿

## XLII. PRIMULACÉES

1. PRIMULA Linné, Gen. Plant. (1737) n. 112, T. Durand, Ind. Gen. n. 4435. — Genre d'environ 130 esp. bien distinctes, des rég. temp. et arct. de l'hémisphère bor. et de l'Amérique austr.-extratrop.

**P. Allionii** Loiseleur, *Not. Pl. ajout. Fl. de Fr.* (1810) 38 t. 3 fig. 1; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1101; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 510. — Alpes Marit., Piémont. ♀

**P. amoena** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 138; Lehmann, *Mon. Gen. Primul.* 39 t. III; *Bot. Mag.* t. 3252; Boissier, *Fl. Or.* III 26. — Caucase. ♀

**P. Arctotis** Kerner in *Österr. Bot. Zeitschrift* (1875) 124. — Tyrol, Grisons. ♀

— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X 227, en fait le P. AURICULA × HIRSUTA Pax f. SUBAURICULA × HIRSUTA Pax.

**P. Boveana** Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 35; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* t. 439; Boissier, *Fl. Or.* III 23. P. VERTICILLATA Hooker (non Forskahl) in *Bot. Mag.* (1828) t. 2842. — Arabie Pétrée. ♀

**P. capitata** Hooker in *Bot. Mag.* (1850) t. 4550 et 6916 bis; *Fl. des Serres* VI t. 618; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 486. — Sikkim, Bhotan. ♀

**P. Carniolica** Jacquin, *Miscell. Austr.* I (1778) 160 et *Fl. Austr. Icon.* V t. 4; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII 629. P. MULTICEPS Freyher (nomen tantum); Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 509. — Carinthie. ♀

**P. ciliata** Moretti, *Notiz. Piant. Vicent.* VIII (1813) 7; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 632. P. BALBISH Lehmann, *Primul.* (1817) 45. — Europe mér.

**P. Clusiana** Tausch in *Flora* I (1821) 364; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* IV (1776) t. 327 (sub P. INTEGRIFOLIA L.); Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1099 et 1105. P. SPECTABILIS Trattinick, var. CILIATA Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III (1857) 509. — Alpes autrichiennes. ♀

**P. commutata** Schott in *Österr. Bot. Wochenblatt* II (1852) 35; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1107. — Styrie. ♀

**P. coronata** Porta ex Dewar in *Journ. Hort. Soc. Lond.* VII (1886) 278.

— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X 232, l'indique comme P. MINIMA × SPECTABILIS.

- Primula cortusoides** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 144 ; *Bot. Mag.* t. 389 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 8 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 26. — Russie bor., Daourie, Altaï. ♀
- P. cusickiana** A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* ed. 2, pars I (1886) 399. P. ANGUSTIFOLIA Torr. var. CUSICKIANA A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* ed. I, II, pars I (1878) 393. — Orégon.
- P. denticulata** Smith, *Exot. Bot.* II (1805) 109 t. 114 ; *Bot. Mag.* t. 3959 ; *Bot. Reg.* (1842) t. 47 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 44 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 486. — Inde or. ♀
- — var. **Cashmiriana** Hooker f., *loc. cit.* III (1882) 486. P. CASHMIRIANA Munro in *Garden* (1879) 535. — Himalaya occ.
- P. elatior** Jacquin, *Miscell. Austr.* I (1778) 158 ; *Fl. Dan.* t. 434. P. VERIS Linné, var. ELATIOR Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 142. — Europe (la rég. arct. exceptée). ♀
- P. floribunda** Wallich, *Tent. Fl. Nepal.* I (1824-26) 33 ; *Bot. Mag.* t. 6712 ; Boissier, *Fl. Or.* III 24 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 495. — Afghanistan, Himalaya occ. ♀
- P. frondosa** Janka, *Pl. Nov. Turcicarum Breviar.* in *Æsterr. Bot. Zeitschrift* XXIII (1873) 204 ; Boissier, *Fl. Or.* III 30. — Thrace bor. ♀
- P. glaucescens** Moretti, *De quib. Pl. Ital.* in BrugnateLLi, *Giornale di Fisica* VII (1824) 9. P. CALYCINA Duby in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 40 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1099 et 1105. — Italie bor. ♀
- P. glutinosa** Wulfen in JACQUIN, *Fl. Austr. Icon.* V (1778) 41 t. 26 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1101 et 1108 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 510. — Alpes de l'Europe centr. ♀
- P. grandis** Trautvetter, *Pl. nov. Cauc.* in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* X (1866) 395 ; Regel in *Gartenflora* XXVIII (1879) t. 968 ; Boissier, *Fl. Or.* III 27. — Transcaucasie occ.
- P. hirsuta** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 93 ; *Bot. Mag.* t. 1922. P. DECORA Sims ; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 633. P. VILLOSA Lehmann, *Primul.* (1817) 77. — Pyrénées et Alpes.
- — var. **nivea** Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 227. P. NIVEA Hort.
- P. integrifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 144 ; Regel in *Gartenflora* (1855) t. 122 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* I t. 34 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 510 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 640. P. CANDOLLEANA Reichenbach, *Pl. Crit.* VI (1828) t. 584. — Pyrénées et Suisse centr.
- P. involuerata** Wallich, *Catal.* (1832) n. 7107 ; *Bot. Reg.* (1847) t. 31 ; Regel in *Gartenflora* (1863) t. 394 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 42 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 488. — Himalaya (de Kashmir au Sikkim), Thibet occ.



- Primula japonica** A. Gray in *Mem. Americ. Acad. Sc.* VI (1857) 400; *Bot. Mag.* t. 5916; *Illustr. Hort.* (1871) t. 69. — Nippon, Yéso. ♀
- P. Kernerii** Göbl. et Stein in *Österr. Bot. Zeitschrift* XXVIII (1878) 188.  
— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 228 considère cette primevère comme un *P. auricula* × *villosa* Pax f. *subauricula-villosa*.
- P. Kingii** Watt in *Journ. Linn. Soc. London* XX (1882) 9 t. VII; C. B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 491. — Sikkim.
- P. Kitaibeliana** Schott in *Österr. Bot. Wochenbl.* II (1852) 268; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1107. — Croatie, Serbie, Herzégovine. ♀
- P. luteola** Ruprecht, *Cauc. Prim.* in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* VI (1863) 233; Regel in *Gartenflora* (1867) t. 341; Boissier, *Fl. Or.* III 29. — Caucase or.
- P. marginata** Curtis in *Bot. Mag.* (1792) t. 191; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 270. *P. crenata* Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* II (1804) 98 fig. 3. — Alpes de l'Europe centr.-occ. ♀
- P. minima** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 143; *Bot. Reg.* VII t. 581; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 315; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1100 et 1104; Boissier, *Fl. Or.* III 31. — Alpes centr. et or., Carpathes, Bulgarie, Thrace. ♀  
— — forma *subminima* × *spectabilis* Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 232. *P. facchini* Schott, *Wilde Blendlinge Öst. Primeln* (1852) t. III; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1100, 1104 et 1105.  
— — forma *superminima* × *spectabilis* Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 232. *P. dumoulini* Stein ex Pax, *loc. cit.*  
— — var. *P. minima* × *hirsuta* Pax forma *subhirsuta* × *minima* Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 232. *P. forsteri* Stein ex Regel in *Gartenflora* (1879) 322 t. 991.
- P. muretiana** Moritzi, *Pflanz. Graubünd.* (1839) 111; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1101, 1104 et 1108. *P. dinyana* Lager in *Flora* XXII (1839) 670. — Suisse mér., Tyrol.  
— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 229 en fait un *P. integrifolia* × *viscosa*.
- P. nivalis** Pallas, *Reise Provinz. Russ. Reich.* III (1776) 339. *P. crassifolia* Lehmann, *Monog. Gen. Prim.* 91 t. 9. — Sibérie, détroit de Behring. ♀  
— — var. *purpurea* Regel in *Act. Hort. Petrop.* III (1874) 134. *P. purpurea* Royle, *Illustr. Bot. Himal.* (1839) 311 t. 77 fig. 2.; Watt in *Journ. Linn. Soc.* XX (1882) 12 t. IX.
- P. obconica** Hance in *Journ. of Bot.* (1880) 234; Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 485 (sine nomine). *P. poculiformis* Hooker f. in *Bot. Mag.* t. 6582. — Chine.
- P. Obristi** Stein in *Samenkat. d. Bresl. Gart.* (1881). — Alpes austro-or.  
— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 224, en fait un *P. auricula* × *ciliata*.

- Primula obtusifolia** Royle, *Illustr. Bot. Himal.* (1839) 311 t. 77 fig. 1 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 42 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 489. — Himalaya or. Ț.
- P. œnensis** Thomas in *Exsicc.* (anno ?) ; Pax in Engler, *Bot. Jahrb. X* (1889) 227 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1100. — Tyrol mér., Suisse or.
- P. Palinuri** Petagna, *Instit. Bot.* II (1787) 332 ; Jacquin, *Eclog. Plant* t. 43 ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 118 ; *Bot. Mag.* t. 3414. — Italie mér. Ț
- P. Parryi** A. Gray in *Amer. Journ. Science* sér. 2, XXXIV (1862) 257 ; *Bot. Mag.* t. 6185. — Montagnes Rocheuses.
- P. Pedemontana** Thomas in *Exsicc.* (anno ?) ex Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 508 ; *Bot. Mag.* t. 5794 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1098 et 1194. — Alpes suisses, mont Cenis. Ț
- P. penduliflora** A. Kerner. Espèce douteuse d'après Pax in Engler, *Bot. Jahrb. X* (1889) 235.
- P. Peyritschi** Stein (nomen tantum) ex Pax in Engler, *Bot. Jahrb. X* (1889) 229. P. AURICULA  $\times$  VISCOSA Pax, *loc. cit.*
- P. Porteri** Huter in *litt.* ex Kerner in *Æsterr. Bot. Zeitschrift* (1875) 81. — Obs. Pax en fait un P. AURICULA  $\times$  ŒNENSIS Pax f. SUBAURICULA  $\times$  ŒNENSIS Pax in Engler, *Bot. Jahrb. X* (1889) 228.
- P. rosea** Royle, *Illustr. Bot. Himal.* (1839) 311 t. 75 fig. 1 ; *Bot. Mag.* t. 6437 ; Regel in *Gartenflora* XXVIII (1879) t. 994 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 488. — Himalaya occ.
- P. Rusbyi** Greene in *Bull. Torr. Bot. Club* VIII (1881) 122. — Nouveau-Mexique, Arizona.
- P. Sibirica** Jacquin, *Miscell. Austr.* I (1778) 160 ; *Fl. Dan.* (1809) t. 188 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 43 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 14. — Sibérie. Ț
- P. Sikkimensis** Hooker in *Bot. Mag.* (1851) t. 4597 et *Fl. Brit. Ind.* III 491. — Sikkim. Ț
- P. spectabilis** Trattinick, *Ausgemalte Tafeln Archiv. Gewächsk.* IV (1814) 377 ; Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* IV (1819) 146 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1103 et 1105 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 509. — Alpes austro-or. Ț
- P. Steinii** Oribst ex Stein in *Gartenflora* (1879) 322 t. 991. P. HIRSUTA  $\times$  MINIMA Stein. — Tyrol centr.
- Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb. X* (1889) 232, en fait un P. HIRSUTA  $\times$  MINIMA Stein, forma SUPERHIRSUTA  $\times$  MINIMA Pax, *loc. cit.*
- P. Stuartii** Wallich in Roxburgh, *Fl. Ind.* (ed. Carey) II (1832) 20 ; *Bot. Mag.* t. 4356 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 490. — Himalaya.
- P. Sturii** Schott in *Verh. Zool. Bot. Gesells. Wien.* (1853) 302. P. TRUNCATA Lehmann, *Monog. Gen. Prim.* (1817) t. VIII. — Styrie.

**Primula suffrutescens** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII (1868) 371 et *Bot. of Calif.* I 468. — Californie.

**P. tyrolensis** Schott, *Sippen der Österr. Prim.* (1861) 13; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1101 et 1108. — Tyrol. ♀

**P. venusta** Host, *Fl. Austr.* I (1827) 248; Reichenbach, *Pl. Crit.* V t. 661 et *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1094; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 509.

— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 223, en fait un *P. auricula* × *carniolica* Pax.

**P. Venzoi** Huter in *Exsicc.* (1872). — Alpes de la Vénétie.

— Obs. Pax in Engler, *Bot. Jahrb.* X (1889) 230, en fait un *P. wulfeniana* × *tyrolensis* Pax.

**P. villosa** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I (1773) t. 27; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 634 et *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1097 et 1107; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 508. — Styrie. ♀

**P. viscosa** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 95 t. 5 fig. 4. *P. graveolens* Hegetschweiler et Heer, *Flora d. Schweiz* (1840) 94. *P. latifolia* La Peyrouse, *Hist. Abrég. Pyr.* (1813) 97; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII t. 636. — Pyrénées, Alpes franç. et suisses. ♀

**P. Wulfeniana** Schott, *Wilde Blendlinge Österr. Prim.* (1852) 17 t. 6; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1104 et 1105. — Autriche.

2. **KAUFMANNIA** Regel in *Act. Hort. Petrop.* III (1875) 293; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4436. — Genre monotype.

**K. Semenovi** Regel, *loc. cit.* III (1875) 293. *Cortusa* — Herder, *Pl. Semenov.* n. 694 ex Regel, *loc. cit.* — Turkestan. ♀

3. **ANDROSACE** Linné, *Sp. Plant.* ed. I (1753) 141; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 4437. — Genre comprenant une quarantaine d'esp. des rég. temp. et alpines de l'hémisphère bor.

**A. carnea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 142; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1112; Gaudin, *Fl. Helv.* II t. 1; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 456. *A. brigantiaca* Jordan et Fourreau, *Breviar. Pl. Nov.* fasc. II (1868) 105. — Pyrénées, Provence, Auvergne, Vosges, Piémont, Vaud, Tyrol.

**A. Chamæjasme** Host, *Syn. Pl. Austr.* (1797) 95; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1112; Loddiges, *Bot. Cab. t.* 232; Boissier, *Fl. Or.* IV 14. *A. villosa* Jacquin (non Linné), *Fl. Austr. Icon.* IV (1776) t. 352; A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* II part 1, 60; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 499. — Europe centr., Russie arct., Caucase, Asie centr. et bor., Amérique arct.

**Androsace Charpentieri** Heer in MORITZI, *Pflanz. Graubünd.* (1839) 113. — Suisse.

**A. ciliata** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 441 ; *Icon. Pl. Gall.* I t. 6. ARETIA — Loiseleur, *Fl. Gall.* ed. 1 (1806) 112. ANDROSACE PUBESCENS De Candolle, var. CILIATA Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 454. — Pyrénées. ♀

**A. cylindrica** De Candolle, *Fl. Fr.* éd. 3 (1805) 439. ARETIA — Loiseleur, *Fl. Gall.* ed. 1 (1806) 111. ANDROSACE FRUTESCENS La Peyrouse, *Hist. Abrég.* *Pl. Pyr.* (1813) 92. A. PUBESCENS De Candolle var. CYLINDRICA Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 454. — Pyrénées. ♀

**A. imbricata** Lamarck, *Fl. Franç.* éd. 2 (1793) 253 et *Pl. Bot. Encycl.* t. 98 fig. 4 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1113 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 455. — Espagne, Pyrénées, Dauphiné, Lombardie, Tyrol. ♀

— — var. **tomentosa** DUBY in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 47. A. TOMENTOSA Schleicher, *Pl. Phœnog. Helvet. Cent.* I (1802) ; Gaudin, *Fl. Helv.* II (1829) 109.

**A. lactea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 142 ; *Bot. Mag.* t. 981 ; Reichenbach, *Fl. Austr. Icon.* XVII t. 1111 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 456. — Jura, Alpes (du Dauphiné à la Transylvanie et à la Bosnie). ♀

**A. lactiflora** Fischer, *Cat. Hort. Gorenk.* ed. 1 (1808) 30 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 48 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 52. — Sibérie baïcalienne, Daourie.

**A. Laggeri** Huet in *Annal. Sc. Nat.* sér. 3, XIX (1853) 254 ; Regel in *Gartenflora* XXXVIII (1879) 97 t. 969. — Pyrénées. ♀

**A. lanuginosa** Wallich in ROXBURGH, *Fl. Ind.* (ed. Carey) II (1832) 15 ; *Bot. Mag.* t. 4005 ; *Annal. de Gand* 1847 t. 149 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 498. — Himalaya occ.

**A. obtusifolia** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 90 t. 46 fig. 1 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* VI t. 579 et *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1111 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 457. — Dauphiné. ♀ ?

**A. Pyrenaica** Lamarck, *Tableau encycl. trois règnes. Bot. illust.* I (1791) 432 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 455. A. DIAPENSIODES La Peyrouse, *Hist. Abrég. Pl. Pyr.* (1813) 93 et *Fl. Pyr.* I t. 3. — Pyrénées. ♀

**A. sarmentosa** Wallich in ROXBURGH, *Fl. Ind.* (ed. Carey) II (1832) 14 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* III t. 206 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 49 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 498. — Himalaya temp. et subtrop. ♀

— — var **foliosa** HOOKER f., *loc. cit.* III (1882) 498. A. FOLIOSA DUBY ex Dene. in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 142 t. 146.

**A. septentrionalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 142 ; *Bot. Mag.* t. 2021 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1110 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 17. — Scandinavie, Valais, Transylvanie, Russie, Caucase, Sibérie, Amérique arct., Californie. ☉

**Androsace villosa** Linné, *Sp. Pl.* ed I (1753) 142; Jacquin, *Coll. Bot.* I t. 12; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1112; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 455; Boissier, *Fl. Or.* IV 13. — Espagne, Europe centr. et or., Asie occ., centr. et bor. 2

— — subsp. **arachnoidea** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1881) 606. A. ARACHNOIDEA Schott, Nyman et Kotschy, *Annal. Bot.* (1854) 17. — Transylvanie.

— — var. **penicillata** NYMAN, *loc. cit.* (1881) 606. A. PENICILLATA Schott, Nyman et Kotschy, *Annal. Bot.* (1854) 18. — Dalmatie.

4. **CORTUSA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 113; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4441. — Genre comprenant 1 ou 2 esp. de l'Europe centr., de l'Asie bor. et centr. et de l'Himalaya.

**C. Matthioli** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 144; *Bot. Mag.* t. 987; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 956; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 55; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 501. — Europe centr., Asie centr. et bor.

— — subsp. **pubens** NYMAN, *Consp. Fl. Eur.* (1881) 602. C. PUBENS Schott, Nyman et Kotschy, *Annal. Bot.* (1854) 17; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1102. — Transylvanie, Roumèlie, Bukovine.

5. **SOLDANELLA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 115; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4443. — Quatre esp. de l'Europe centr.

**S. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 144; *Bot. Mag.* t. 49; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1087. S. PYROLÆFOLIA Schott, Nyman et Kotschy; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 511; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 461. — Des Pyrénées à la Bosnie et au Montenegro. 2

**S. Clusii** Gaudin, *Fl. Helv.* II (1828) 76; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 48; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 511. S. PUSILLA Baumgarten, *Enum. Stirp. Transsilv.* I (1816) 138; Regel, *Gartenflora* (1864) t. 449. — Europe centr.-or. Tyrol, Suisse, Vénétie, Lombardie. 2

**S. minima** Hoppe in STURM, *Deutschl. Fl.* V ( ) t. 20; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1087; Regel in *Gartenflora* (1864) t. 449; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 511. — Suisse, Tyrol, Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole. 2

**S. montana** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1809) 192; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 871; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1087; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 461; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 511. — Alpes centr. (de la Suisse au Montenegro). 2

6. **DODECATHEON** Linné, *Diss. Chen.* (1751) 25 in *Amœn. Acad.* III (1756) 16 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4446. — Genre de 2 ou 3 esp. de l'Amérique bor. temp. et froide et de l'Asie bor. or.

**D. integrifolium** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 123 ; *Bot. Mag.* t. 3622 ; Regel in *Gartenflora* V t. 173. — États-Unis (monts Alleghanis, sources du Missouri, Californie). ♀

— Obs. A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* part 1, 57, réunit cette espèce à la suivante.

**D. Meadia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 144 ; *Bot. Mag.* t. 12 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 99 ; A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* II part 1, 57. — Amérique bor. (du détroit de Behring à la Californie, et de la Virginie aux Montagnes Rocheuses). ♀

— — var **album** Loddiges, *Bot. Cab.* XV (1828) t. 1489.

— — var. **lanceifolium** A. Gray, *Bot. of Calif.* I (1880) 467. D. Jeffrayi Hort. ex. A. Gray, *loc. cit.*

7. **CYCLAMEN** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 116 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4447. — Genre de 12 esp. de l'Europe centr., de l'Asie occ. et de la Rég. Médit.

**C. africanum** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 75 ; *Fl. des Serres* VIII t. 841. — Afrique bor.

**C. Atkinsii** T. Moore, *Garden Comp.* I 89 cum icone ex Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 297. — Hybride.

**C. balearicum** Willkomm in *Æsterr. Bot. Zeitschrift* XXV (1875) 111. C. **VERNUM** Cambessedes, *Enum. Pl. Balear.* (1827) 299. — Iles Baléares.

**C. Coum** Miller, *Garden. Dict.* ed. VIII (1768) n. 6 ; *Bot. Mag.* t. 4 ; Regel, *Gartenflora* (1862) t. 370 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 11. — Thrace, Asie Mineure, Caucase, Syrie, Perse. — ♀

— — var. **vernum** Hort. C. **VERNUM** Sweet, *Brit. Fl. Gard.* I (1823) t. 9.

— — var. **ibericum** Boissier, *Fl. Or.* IV (1879) 11. C. **IBERICUM** Steven miss. ex Boissier, *loc. cit.* — Transcaucasie, Perse bor.


**C. græcum** Link in *Linnaea* IX (1834) 373 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 13. C. **PER-SICUM** Sibthorp et Smith (non Miller), *Fl. Græce Prodr.* I (1806-9) 128 et *Fl. Græca* III, t. 186. — Macédoine, Grèce, Crète. ♀

**C. neapolitanum** Tenore, *Prodr. Fl. Napol.* I (1811) LXVI; III 197 t. 118; *Bot. Reg.* XXIV t. 49; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 460; Boissier, *Fl. Or.* III 12. **C. HEDERÆFOLIUM** Willdenow; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1088 fig. 2. **C. CYPRIUM** Unger et Kotschy, *Ins. Cypern* 295. — Suisse et France mér., Italie, Dalmatie, Serbie, Thrace, Macédoine, Grèce, Crète, Chypre. ♀

**C. macrophyllum** Sieber in *Isis* (1823) 459. — Sainte-Hélène.

**C. repandum** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806-9) 128 et *Fl. Græcæ* II (1813) 72 t. 186; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1088 fig. 1; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 461; Boissier, *Fl. Or.* IV 12. **C. HEDERÆFOLIUM** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 196; *Bot. Mag.* t. 1001. — Europe mér. et mér.-or., Crète, Asie Mineure. ♀

**C. Rholsianum** Ascherson in *Floræ Libycæ Prodomus* ined. tab. XIII. — Cyrénaïque.



8. **LYSIMACHIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 121; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4448. — Environ 65 esp. des rég. temp. et subtrop. de l'hémisphère bor., de l'Afrique trop. et austr., de l'Amérique austr. et de l'Australie.

**L. barystachys** Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* (1831) 127; Regel, *Tent. Fl. Ussur.* 103 t. 9 fig. 1-3; Klatt, *Die Gatt. Lysim.* t. 1. — Chine bor., Japon.

**L. thyrsoiflora** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 147; *Bot. Mag.* t. 2012; Klatt, *Die Gatt. Lysim.* t. 19; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1085. **L. CAPITATA** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 135. — Europe occ., centr. et or., Sibérie, Canada, États-Unis. ♀

9. **STEIRONEMA** Rafinesque in Ann. Gen. Phys. Brux. VII (1820) 192 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4449. — 4 esp. de l'Amérique bor. ; ailleurs naturalisé.

**S. ciliata** Rafinesque, *loc. cit.* VII (1892) 192 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II part 1, 61. **LYSIMACHIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 147 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1086 ; Klatt, *Die Gatt. Lysim.* t. 13. — de l'Amérique anglaise au Nouv.-Mexique ; naturalisé en Europe. ♀

10. **TRIENTALIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 309 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4451. — Genre de 2 esp. de l'Europe centr. et bor., de l'Asie et de l'Amérique bor.

**T. Europæa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 344 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 105 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* X t. 631 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 465. — Europe bor., bor.-occ., centr. et or. ; Canada, États-Unis (jusqu'à l'Orégon et la Californie.) ♀

11. **ANAGALLIS** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 122 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4454. — Genre de 17 esp. des rég. temp. et subtrop. du monde entier.

**A. tenella** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 335 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 467 ; Cavanilles, *Icon. Pl. Rar.* t. 123 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1082 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 6. **LYSIMACHIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 148. — Europe occ., centr. et mér., Afrique bor., Crète. ♀

### XLIII. MYRSINÉES

1. **PARATHESIS** Hooker f. in Benthams et Hooker, Gen. Pl. II (1876) 645 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4469. — Genre de 6 esp. de Cuba, du Mexique, de l'Amérique centr., de la Nouvelle-Grenade et du Pérou.

**P. crenulata** Hooker f. in HEMSLEY, *Biol. Centr.-Amer.* II (1881) 291. **ARDISIA** — Ventenat, *Choix Pl. Jard. Cels* (1803) t. 5 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 120. — Haïti, Porto-Rico, Mexique. ♀



## XLIV. ÉBÉNACÉES

1. **DIOSPYROS** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 149 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4524. — Genre de 160 esp. des rég. chaudes du monde entier, de l'Asie temp. et de l'Amérique bor.

**D. Kaki** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 439 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 413 ; *Illustr. Hort.* (1871) 176 t. 78 ; Hiern, *On Ebenac.* 226 ; Clarke in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* III 535. **D. COSTATA** Carrière in *Rev. Hort.* (1870) 134 cum icone. — Inde or., Chine, Japon.  $\frac{1}{2}$

**D. Schi-Tse Bunge**, *Enum. Pl. Chin. Bor.* (1831) 42. **D. MAZELII** Thibaut et Keteleer ex Morren *Belg. Hort.* XXIV (1874) 111 ; *Rev. Hort.* (1874) 70. — Chine bor., Japon.  $\frac{1}{2}$

— Obs. C.-B. Clarke in Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* III 555), réunit cette espèce au **D. KAKI** Linné.

**D. Virginiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1057 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amer.* II t. 12 ; Watson, *Dendrol. Brit.* II t. 146 ; A. Gray, *Syn. Fl. of N.-Amer.* II part 1, 69. — États-Unis (de New-York à la Louisiane.)  $\frac{1}{2}$

## XLV. STYRACÉES

1. **SYMPLOCOS** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 747 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4527. — Genre de 165 esp. de l'Asie, de l'Australie et des rég. les plus chaudes de l'Amérique.

**S. Japonica** A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 255. **S. LUCIDA** Siebold et Zuccarini (non Walter), *Fl. Japon.* I (1870) 55 t. 24 ; Banks, *Icon. Kæmpf.* t. 56. — Japon.  $\frac{1}{2}$

## XLVI. OLEACÉES

1. **JASMINUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 7 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4534. — Plus de 130 esp. décrites, mais 100 seulement bien distinctes, habitant l'ancien monde et seulement introduites en Amérique.

**J. Azoricum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 7 ; *Bot. Mag.* t. 1889 ; *Bot. Reg.* I t. 89 ; Lowe, *Fl. of Madeira* 27. — Madère, Açores.  $\frac{1}{2}$

**Jasminum gracile** Andrews, *Bot. Repos.* II (1800) t. 127; *Bot. Reg.* VIII t. 606. — Ile Norfolk.  $\mathfrak{h}$

— Obs. Quelques auteurs réunissent cette espèce au *J. SIMPLICIFOLIUM* Forster f.

**J. grandiflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 9; *Bot. Reg.* II t. 91; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 1257; Brandis, *Ind. Forest Fl.* 313; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 603. — Himalaya bor.-occ. et subtrop., Malabar; Japon (indig. ?)  $\mathfrak{h}$

**J. odoratissimum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 7; *Bot. Mag.* t. 285; Lowe, *Fl. of Madeira* 29; *Mém. Acad. Berl.* (1790) t. 2. — Madère.  $\mathfrak{h}$

**J. revolutum** Sims in *Bot. Mag.* (1815) t. 1731; *Bot. Reg.* III t. 178; *Bot. Cab.* t. 966; Boissier, *Fl. Or.* IV 42. *J. TRIUMPHANS* Hort. ex Lavallée, *Arbor. Segrez.* (1877) 174. — Inde or.-bor., Afghanistan, Chine ?  $\mathfrak{h}$

— Obs. C.-B. Clarke in Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* III 602), réunit cette espèce au *J. HUMILE* Linné.

## 2. FORSYTHIA Vahl, Enum. Plant. I (1805) 39; T. Durand, Ind. Gen. n. 4538. — Deux esp. de la Chine et du Japon.

**F. suspensa** Vahl, *Enum. Pl.* I (1804) 39; *Bot. Mag.* t. 4995; Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* I 11 t. 3. *SYRINGA* — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 19 t. 3. *F. FORTUNI* Lindley in *Garden. Chron.* (1864) 412. — Japon (indig. ?), Chine bor.  $\mathfrak{h}$

**F. viridissima** Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* I (1846) 226 et in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 39; *Bot. Mag.* t. 4587; *Fl. des Serres* III t. 261. — Chine.  $\mathfrak{h}$

## 3. SYRINGA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 8; T. Durand, Ind. Gen. n. 4539. — Genre de 11 esp., dont 6 seulement bien distinctes, originaires de l'Europe orient. et de l'Asie temp.

**S. Emodi** Wallich, *Catal.* (1831) 2831; *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 6; Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 267 t. 65 fig. 1; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 605. — Himalaya occ. et centr., Afghanistan, Chine.  $\mathfrak{h}$

**S. Josikaea** Jacquin f. in *Flora* (1831) 57 et 399; *Bot. Mag.* t. 3278; *Bot. Reg.* XX t. 1733; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1073. — Hongrie.  $\mathfrak{h}$

**S. oblata** Lindley in *Garden. Chron.* (1859) 868. *S. CHINENSIS* Bunge, *Enum. pl. Chin. Bor.* 42, non Willdenow. — Chine.  $\mathfrak{h}$

**S. Persica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 9; *Bot. Mag.* t. 486; Loudon, *Arboret. et Frutic. Brit.* fig. 1039 et 1040; Boissier, *Fl. Or.* IV 38; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 604. — Daghestan, Caucase occ. indig. ?, Perse, Kaschmir.  $\mathfrak{h}$

4. **FRAXINUS** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 773; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4540. Plus de 30 esp. décrites, mais plusieurs ne sont que des formes, habitant les rég. temp. et subtrop. de l'hémisphère boréal.

**F. floribunda** Wallich, *Catal.* (1831) 2836; Wallich in Roxburgh, *Fl. Ind.* (ed. Carey) I (1820) 150; *Pl. Asiat. Rar.* III 47 t. 277; Brandis, *Ind. Forest Fl.* t. 37; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 604. **ORNUS** — Dietrich, *Sp. Pl.* I (1831) 249. — Himalaya temp. et subtrop., Khasia.  $\frac{1}{2}$

**F. Ornus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1057; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* I t. 9; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1072; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 473; Boissier, *Fl. Or.* IV 39. — Europe centr.-or. et mér., Asie min.  $\frac{1}{2}$

**F. Pennsylvanica** Marshall, *Arbustum Amer.* (1785) 92. **F. ALBA** Bosc in *Mém. Inst. France* II (1808) 207. — Amérique bor.  $\frac{1}{2}$

— Obs. A. Gray (*Syn. Fl. of N.-Amer.* II part 1, 75), réunit ce **FRAXINUS** au **F. PUBESCENS** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 548.

5. **FONTANESIA** Labillardière, *Icon. Pl. Syr. Rar.* I (1791) 9 t. 1; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4541. — Genre monotype.

**F. phillyræoides** Labillardière, *loc. cit.* I (1791) 9 t. 1; *Bot. Cab.* t. 1308; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* I t. 5; Boissier, *Fl. Or.* IV 38. **F. FORTUNEI** Carrière in *Rev. Hort.* sér. 4, VIII (1859) 43. — Sicile, Syrie, Asie Min.  $\frac{1}{2}$

6. **LIGUSTRUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 6; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4551. — Genre de 25 esp. de l'Europe, de l'Asie temp. et trop. et de l'Australie.

**L. Japonicum** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 17 t. 1; Miquel, *Prol. Fl. Jap.* 152. **L. GLABRUM** Hort. ex Lavallée, *Arbor. Segrez.* (1877) 172. — Japon.  $\frac{1}{2}$

— — var. **ovalifolium** MIQUEL, *loc. cit.* (1867) 152; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 313. **L. OVALIFOLIUM** Hasskarl, *Catal. Pl. Hort. Bogor.* II (1844) 119; Walpers, *Repert. Bot. Syst.* VI 462. **L. VULGARE** Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 17. **L. CALIFORNICUM** Hort. ex Koch, *Dendrol.* II (1872) 274. — Japon.  $\frac{1}{2}$

**L. Stauntoni** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 294. **L. CHINENSE** Carrière in *Rev. Hort.* (1863) 88. — Chine.  $\frac{1}{2}$

## XLVII. SALVADORACÉES

1. SALVADORA Garcin ex Linné, Gen. Plant. ed. VI (1764) 163 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4554. — Deux esp. de l'Inde or., de l'Orient, de l'Arabie, de l'Afrique bor. et trop.

**S. Persica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 122 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* III t. 81 ; Roxburgh, *Pl. Corom.* t. 26 ; Decaisne in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV t. 144 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 43 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 619. — Afrique bor. et or., Arabie, Inde.  $\mathfrak{h}$

## XLVIII. APOCYNACÉES

1. ALLAMANDA Linné, Mant. Pl. (1771) 146 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4556. — Douze esp. de l'Amérique austr. et centr.

**A. neriifolia** Hooker in *Bot. Mag.* (1851) t. 4594 ; Lemaire, *Le Jard. Fleur.* t. 177 ; *Fl. des Serres* IX t. 905. — Guyane?, Brésil?

2. ACOKANTHERA G. Don, Gen. Syst. Bot. IV (1837) 485 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4578. — Cinq esp. de l'Afrique austr. et de l'Abyssinie.

**A. venenata** G. Don, *loc. cit.* IV (1837) 485. CESTRUM — Burman f., *Fl. Capens. Prodr.* (1768) 5 ; ed. II 193. TOXICOPHLEA THUNBERGH Harvey in Hooker, *Lond. Journ. Bot.* I (1842) 24 et *Thes. Capens.* I 10 t. 16. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$

3. RHAZYA Decaisne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, IV (1825) 80 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4600. — Genre de 2 esp. de l'Asie occ., de l'Afghanistan et du Beloutchistan.

**R. Orientalis** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 386 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 47. AMSONIA — Decaisne in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde* IV (1844) 105. — Bithynie, Phrygie.  $\mathfrak{h}$

4. **VINCA** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 77 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4603. — Genre de 12 esp. habitant l'Europe, l'Asie occ., la rég. Méditerr. et la rég. trop. du monde entier.
- V. Libanotica** Zuccarini in *Abhandl. Mathem.-physik. Cl. Baierischen Akad. d. Wiss.* III (1837-43) 247 t. 8 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 46. **V. BOTTÆ** Jaubert et Spach, *Ill. Pl. Or.* t. 186. — Asie Min., Syrie, Mésopotamie, Perse bor. ♀
- V. media** Hoffmansegg et Link, *Fl. Portug.* I (1809) t. 70 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1063 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 665. **V. INTERMEDIA** Tausch in *sched. ex Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. 2 (1857) 420. **V. MAJOR** Brotero (non Linné) *Fl. Lusit.* I (1804) 280. — Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie méd., Algérie, Maroc. ♀
5. **TABERNÆMONTANA** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 76 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4612. — Genre de 150 esp. disséminées dans toute la rég. trop. et à Madagascar.
- T. coronaria** R. Brown in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, II (1811) 72 ; *Bot. Reg.* XIII t. 1064 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 477. **NERIUM** — Jacquin, *Coll. Bot.* I (1786) 138 t. 52 ; *Bot. Mag.* t. 1865. — Archipel Indien (indig. ?), Inde or. (cult.). ♀
6. **NERIUM** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 76 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4631. — Deux ou 3 esp. de la rég. Méditerr., de l'Asie subtrop. et du Japon.
- N. odorum** Solander in AITON, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 297 ; *Bot. Mag.* t. 2032 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 47 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* III 635. **N. OLEAN-  
DER ALBUM** Loddiges in *Bot. Cab.* VII (1822) t. 700. — Inde or.-bor., Afgha-  
nistan, Japon. ♀
- N. Oleander** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 209 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 248 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1064 ; *Bot. Cab.* t. 666 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 478 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 47. — Europe mérid. et mérid.-or., Afrique bor., Asie Min., Chypre, Syrie, Palestine, Mésopotamie. ♀
7. **TRACHELOSPERMUM** Lemaire, Le Jard. Fleur. I (1851) t. 61 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4653. — Six esp. de l'Inde, de l'archipel Malais et de l'Asie or.
- T. jasminoides** Lemaire, *loc. cit.* (1851) t. 61 ; *Fl. des Serres* VI t. 675 ; *Bot. Mag.* t. 4737 ; *Gartenflora* VIII t. 261. **RHYNCHOSPERMUM** — Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* I (1842) 74 cum xylogr. — Chine (Shangai). ♀

## XLIX. ASCLEPIADÉES

1. **ARAUJIA** Brotero in *Trans. Linn. Soc.* XII (1817) 62 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4729. — Quatorze esp. de l'Amérique trop. et subtrop.
- A. sericifera** Brotero in *Trans. Linn. Soc.* XII (1818) 62. A. ALBENS G. Don,  
*Gen. Syst. Bot.* IV (1837) 149 ; *Rev. Hort.* (1857) 88 cum icone. **PHYSIANTHUS**  
Graham (non Martius) in *Bot. Mag.* (1832) t. 3201. — Brésil austr. 5
2. **ASCLEPIAS** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 184 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 4742. — Genre de 60 esp. environ ; 2 esp. de  
l'Afrique austr. et trop., 1 esp. répandue dans la région trop.  
du monde entier, le restant confiné dans l'Amérique bor. et  
austr.
- A. speciosa** Torrey in *Ann. Lyc. N.-York* II (1828) 218 ; A. Gray, *Syn. Fl.*  
*of N.-Amer.* II part I 91. A. DOUGLASS Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1838) 53  
t. CXLII ; *Bot. Mag.* t. 4413 ; *Fl. des Serres* V t. 426. — États-Unis (partie  
bor.-occ.). 2
3. **CYNANCHUM** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 182 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 4779. — Genre de 100 esp. environ habitant  
les rég. chaudes et temp. du monde entier.
- C. fuscatum** Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII (1855) 17 t. 28 (sub **VINCETOXICO**) ; Boissier, *Fl. Or.* IV 55. V. **ALPINUM** Schott et Kotschy in *sched.*  
ex Boissier, *loc. cit.* IV (1879) 56. — Istrie, Dalmatie, Grèce, Thrace, Asie  
Min. 2
- C. japonicum** E. Morren et Decaisne in *Bull. Acad. Brux.* III (1836) 172 ;  
Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 319 ; *Icon. Sô Mokou Zoussetsz*  
vol. IV fol. 33. — Japon. 2
- C. purpurascens** E. Morren et Decaisne in *Bull. Acad. Brux.* III (1836)  
172 ; *Journ. Hort. Soc. Lond.* VII t. 285. — Japon. 2
- C. Tmoleum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 38 et *Fl. Or.* IV  
52 (sub **VINCETOXICO**). — Asie Min. 2

4. **EXOLOBUS** E. Fournier in Martius, Fl. Brasil. V, 14 (1885) 318; T. Durand, Ind. Gen. n. 4803. — Genre de 5 esp. du Brésil.

**E. stenolobus** E. Fournier, *loc. cit.* (1885) 319. **GONOLOBUS** — Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII (1844) 595. — Brésil (Serra de Cujaba). ‡

5. **STEPHANOTIS** Thouars, Gen. Nov. Madagascariensa in Roëmer, Collect. Bot. (1809) 203; T. Durand, Ind. Gen. n. 4837. — Genre de 14 esp. de l'Asie trop. et subtrop., de Madagascar, du Pérou et de Cuba.

**S. floribunda** A. Brongniart in *Ann. Sc. Natur.* (1837) 30; *Bot. Mag.* t. 4058; Paxton, *Mag. of Bot.* XI t. 29. — Madagascar (îles Maurice et Réunion, cult.). ‡

6. **HOYA** R. Brown in Mem. Werner. Soc. I (1809) 26; T. Durand, Ind. Gen. n. 4852. — Environ 50 esp. habitant l'Asie or., l'Australie trop. et subtrop.

**H. bella** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1850) t. 4402; *Bot. Reg.* XXXIII t. 54, Lemaire, *Le Jard. Fleur.* t. 70. — Burma.

**H. carnosa** R. Brown in *Mem. Wern. Soc.* I (1809) 27; Bentham, *Fl. Austral.* IV 346. **ASCLEPIAS** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 170; *Bot. Mag.* t. 788; Smith, *Exot. Bot.* II t. 70. — Asie trop., Australie?. ‡

**H. imperialis** Lindley in *Bot. Reg.* (1846) sub t. 68; *Bot. Mag.* t. 4397; *Annal. Soc. Hort. de Gand* V (1849) 49 t. 236; *Fl. des Serres* IV t. 393 et 394. — Malaisie.

7. **CEROPEGIA** Linné, Gen. Plant. (1737) n. 486; T. Durand, Ind. Gen. n. 4863. — Environ 56 esp. de l'Afrique trop. et austr., de l'Asie et de l'Australie trop.

**C. dichotoma** Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 13; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 645. — Canaries. ‡

**C. stapeliæformis** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 421; *Bot. Mag.* t. 3567; *Fl. des Serres* II t. 53; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 643. — Cap de Bonne-Espérance. ‡

8. **BOUCEROSIA** Wight et Arnott, *Contrib. Bot. Ind.* (1834) 34 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4872. — Genre de 12 esp. des Indes or., de l'Afrique bor., de l'Espagne et de la Sicile.

**B. europæa** Caruel, *Fl. Ital.* (1886) 725. **STAPELIA** — Gussone, *Suppl. ad Fl. Sicul. Prodr.* I (1832) 64 ; Bertoloni, *Fl. Ital.* III 4. **S. GUSSONEANA** Jacquin f. in *Bot. Reg.* XX (1835) t. 1731. **APTERANTHES** — Mikan in *N. Acta Acad. Nat. Cur.* XVII (1835) 594 t. 41 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 670. **B. MUNBYANA** Decaisne in Munby, *Fl. d'Alger.* (1847) 25. — Lampedusa, Algérie, Espagne. 4

9. **STAPELIA** Linné, *Gen. Plant.* (1737) n. 183 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4882. — Environ 70 esp. de l'Afrique austr.

**S. anguina** Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* (1806) t. 37 ; *Bot. Cab.* t. 828 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI 41 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 660. — Afrique austr. 5

**S. Bufonia** Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* (1806) t. 35, 36 et 64 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI 40 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 660. **ORBEA** — Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 40. — Afrique austr. 5

**S. ciliata** Thunberg, *Prodr. Fl. Capens.* (1794) 46 et *Fl. Capens.* ed. 1, II 168 ; ed. II 240 ; Masson, *Stap. Nov.* (1796) t. 1 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 655. **PODANTHES** — Haworth, *Syn. Pl. Succ.* (1812) 34. — Afrique austr. 5

**S. fuscata** Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* (1806) t. 46 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 657. **TROMOTRICHE** — Haworth, *Syn. Suppl. Pl. Succ. Suppl.* (1819) 10. — Afrique austr. 5

**S. geminata** Masson, *Stap. Nov.* (1796) 18 t. 25 ; Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* t. 16 ; *Bot. Mag.* t. 1326 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 300. — Afrique austr. 5

**S. marmorata** Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* (1806) t. 38 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI 40 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 660. **ORBEA** — G. Don, *Gen. Syst. of Bot.* IV (1837) 120. — Afrique austr. 5

**S. normalis** Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* (1806) t. 42 et 64 ; *Bot. Reg.* t. 755 ; Link, *Enum. Hort. Berol.* t. 256 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI 40 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 660. **S. BUFO** Auct. (non Jacquin), *Bot. Mag.* (1814) t. 1676. — Afrique austr. 5

**S. picta** G. Don, *Hort. Cantabrig.* (1796) 53 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI 41 ; *Allgem. Teutsch Gart. Mag.* VII 413 t. 42 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 661. — Afrique austr. 5



**Stapelia sororia** Masson, *Stap. Nov.* (1794) 23 t. 39 ; Jacquin, *Stap. Cult. Descr.* t. 56, 57 et 58 ; *Bot. Cab.* t. 94 ; Decaisne in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VIII 652. — Afrique austr. ‡

**S. trifida** Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* I (1876-78) 45 tab. XII fig. sup. — Afrique austr. ‡

## L. LOGANIACÉES

1. **SPIGELIA** Linné, *Gen. Pl.* (1837) n. 903 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4888. — Environ 30 esp. de l'Amérique bor. et trop.

**S. Marilandica** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 338 ; *Bot. Mag.* t. 80 ; *Bot. Cab.* t. 930 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 108. **LONICERA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 175. — Du New-Jersey au Wisconsin et au Texas. ‡

2. **BUDDLEIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 71 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4898. — Environ 70 esp. de l'Amérique et de l'Asie trop. et subtrop. et de l'Afrique austr.

**B. globosa** Hope in *Verh. Harlem.* XX, 2 (1782) 417 t. 11 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* I t. 69 ; Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* t. 83. — Pérou, Chili. ‡

**B. thyrsoides** Lamarck, *Illustr. Genr. Encycl.* I (1791) 291 et Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* I (1810) 744 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 447 **B. SALICIFOLIA** Vahl, *Symb. Bot.* III (1794) 14. — Argentine. ‡

3. **DESFONTAINEA** Ruiz et Pavon, *Prodr. Fl. Chil.* (1794) 29 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4903. — Genre de 2 esp. de l'Amérique austr.

**D. spinosa** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv.* II (1798) 47 t. 186. — **D. HOOKERI** Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII (1852) 675 ; *Bot. Mag.* t. 4781 ; Hooker, *Icon. Pl.* I t. 33. — Andes de la Colombie au Chili. ‡

## LI. GENTIANÉES

1. **ERYTHRÆA** L.-C. Richard in Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 283 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4937. — Genre de 25 esp. des rég. temp. et subtrop. de l'hémisphère bor., du Chili et de l'Australie.

**E. diffusa** Woods in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II (1836) 274 ; Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* 144 ; Hooker et Grisebach in *Ann. Nat. Hist.* I 437 t. 16 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 59 ; Le Jolis in *Ann. Sc. Nat.* (1847) t. 13 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 485. — Angleterre, France et Espagne bor.-occ., Portugal, Açores. (1) (2)

2. **SABBATIA** Adanson, *Fam. des Pl.* II (1763) 503 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4939. — Genre de 15 esp. de l'Amérique bor. et de Cuba.

**S. chloroides** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 137 ; Torrey, *Fl. State New-York* t. 84 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 115. **CHIRONIA** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 147. — États-Unis austro-or.

3. **GENTIANA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 197 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4995. — Genre de 180 esp. des rég. temp. et froides du monde entier et des montagnes de la rég. trop.

**G. acaulis** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 228 ; *Bot. Mag.* t. 52 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1053 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 491. — Montagnes de l'Europe occ., mérid., centr. et or., Asie bor. ♀

— — var. **alpina** Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* (1839) 296. **G. ACAULIS** Linné var. **PARVIFOLIA** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 492. **G. ALPINA** Villars, *Prospect. Hist. Pl. Dauph.* (1779) 22 et *Hist. Pl. Dauph.* II (1787) 526 t. 10 ; *Bot. Cab.* t. 476. — Espagne, Pyrénées, Dauphiné, Carpathes. ♀

**G. affinis** Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* (1839) 289 et Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 56 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 114 ; A. Gray, *Syn. Pl. N.-Amer.* II 122. — Montagnes Rocheuses (de la Colombie anglaise au Nouv.-Mexique.) ♀

**G. angustifolia** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 177 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 124. **G. FRIGIDA** Hænke var. **DRUMMONDII** Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX (1845) 111. — États-Unis (du New-Jersey à la Floride.) ♀

- Gentiana asclepiadea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 227 ; *Bot. Mag.* t. 1078 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1052 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 491 ; Caruel, *Fl. Ital.* VI 755 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 76. — Montagnes de l'Europe occ., mérid., centr. et or. ♀
- G. Burseri** Lapeyrouse, *Hist. Abrég. Pl. Pyr.* (1813) 132 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 489 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1055 ; Caruel, *Fl. Ital.* VI 748. G. BILOBA De Candolle, *Icon. Fl. Rar. Gall.* (1808) t. 15. — Pyrénées, Dauphiné, Alpes maritimes. ♀
- G. calycosa** Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* (1839) 292 et in Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 58 t. 146 ; Regel in *Gartenflora* (1888) t. 1270 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 121. — Montagnes Rocheuses, Californie, Orégon. ♀
- G. Fetisowi** Regel et Winkler in *Act. Hort. Petrop.* VII (1880) 548 ; Regel in *Gartenflora* (1882) t. 1069. — Turkestan. ♀
- G. frigida** Hænke in JACQUIN, *Collect. Bot.* II (1788) 13 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1050 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIII t. 54 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 111 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 120. — Europe centr.-or., Kamtchatka, États-Unis occ. ♀
- G. Frœlichii** Jan ex REICHENBACH, *Fl. Germ. Excurs.* (1832) 865 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1050 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIII t. 54 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 115. — Carniole, Carinthie. ♀
- G. gelida** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 196 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 112 ; Paxton, *Mag. of Bot.* VII t. 5 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 75. — Caucase, Asie Min. ♀
- G. intricata** Frœlich, *De Gent. Libell.* (1796) 74 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XI t. 41 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1050. — Tyrol, Vénétie, Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole. ♀
- G. Kesselringi** Regel in *Acta Hort. Petrop.* VII (1880) 548 ; Regel in *Gartenflora* (1882) t. 1087 fig. 3 et 4. — Turkestan. ♀
- G. microphylla** Grisebach in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* IX (1845) 145. — Cordillères du Pérou. ♀
- Obs. Peut-être identique au *G. SEDIFOLIA* Humboldt, Bonpland et Kunth, de l'Équateur.
- G. nivalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 229 ; *Fl. Dan.* I t. 17 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1059 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 495. — Pyrénées, montagnes de l'Europe occ. et centr., Apennins, Europe et Amérique bor. et arct. ♀
- G. Olivieri** Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* (1839) 278 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* t. 234 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 76. — Perse. ♀
- G. Oregana** Engelmann ex A. GRAY, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 1 (1878) 122. — De la Colombie anglaise à l'Orégon et à la Californie. ♀

**Gentiana Pannonica** Scopoli, *Fl. Carniol.* ed. 2, I (1772) 182 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II t. 136 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1057 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 117. — Autriche, Hongrie. ♀

**G. phlogifolia** Schott et Kotschy in *Bot. Zeit.* IX (1851) 151 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1199. — Transylvanie. ♂

**G. pumila** Jacquin, *Enum. Stirp. Vind.* (1762) 41 et 215 et *Fl. Austr. Icon.* IV t. 302 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1048. — Arragon, Pyrénées, montagnes de l'Europe occ., centr. et or., Apennins. ♀

**G. purpurea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 227 ; *Fl. Dan.* I t. 50 ; *Bot. Cab.* t. 583 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1054 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 116. — Europe hor. et centr. ♀

**G. Pyrenaica** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 55 ; *Bot. Mag.* t. 5742 ; Waldstein et Kitaibel, *Icon. Pl. Hung.* t. 207 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1050. — Pyrénées, Carpathes, Caucase. ♀

**G. Saponaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 228 ; *Bot. Mag.* t. 1039 ; *Bot. Cab.* t. 815 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 306 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 113 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 122. — Canada et États-Unis occ. ♀

**G. Sceptum** Grisebach, *Gen. et Sp. Gentian.* (1839) 293 et Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 57 t. 145 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 115 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 306 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 122. — De l'Orégon à la Colombie anglaise. ♀

**G. Walujewi** Regel et Schmalhausen in *Acta Hort. Petrop.* VI (1879) 334 ; Regel in *Gartenflora* (1884) t. 1140. — Turkestan. ♀

**G. Wislizeni** Engelman in *Trans. Acad. St-Louis* II (1863) 215 t. 7 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* II 351. — Arizona, Mexique bor. ♀

4. **SWERTIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 126 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4958. — Genre de 55 esp. habitant l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

**S. Aucheri** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, V (1844) 90 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* III t. 235. **S. PERSICA** Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX (1845) 132. — Arménie. ♀

**S. perennis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 226 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 243 ; Reichenbach, *Icon. Bot.* IX t. 837 et 838 et *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1944 ; Grisebach in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 132. — Europe, Caucase, Sibérie. ♀

5. **MENYANTHES** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 117 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4963. — Deux esp. de l'Europe, de l'Asie bor. et mont. et de l'Amérique bor.

**M. trifoliata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 145 ; *Fl. Dan.* IV t. 341 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1043 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 497 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 65. — Europe, Asie occ., centr. et bor., Amérique bor. Ț

6. **VILLARSIA** Ventenat, *Choix de Pl. Jardin Cels* (1803) t. 9 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4964. — Douze esp. de l'Afrique austr. et de l'Australie.

**V. parnassifolia** R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 457 ; Bentham, *Fl. Austral.* IV 376. **SWERTIA** — Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* I (1804) 72 t. 97. **MENYANTHES EXALTATA** Sims in *Bot. Mag.* (1807) t. 1029. — Australie. Ț

### LII. POLÉMONIACÉES

1. **PHLOX** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 148 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4967. — Environ 30 esp. de l'Amérique bor. et de l'Asie russe.

**P. amoena** Sims in *Bot. Mag.* (1810) t. 1308 ; A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VIII 251 et *Syn. Fl. N.-Amer.* II 130. — De la Virginie et du Kentucky à la Floride. Ț

**P. glaberrima** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 152 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 166 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* ser. II t. 36 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 130. — De la Virginie et de l'Ohio à la Floride. Ț

**P. ovata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 152 ; *Bot. Mag.* t. 528 ; Maund, *The Bot. Gard.* I 59 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 130. — De l'Alabama à la Pensylvanie. Ț

**P. pilosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 152 ; *Bot. Mag.* t. 1307 ; *Bot. Cab.* t. 1251 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 130. **P. ARISTATA** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 144 ; *Bot. Cab.* t. 1731. — États-Unis mérid. Ț

**P. procumbens** Lehmann, *Ind. Sem. Hort. Hamb.* (1828) 17 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* ser. II t. 7 ; *Bot. Cab.* t. 1722. — Hybride du **P. AMOENA** et du **P. SUBULATA**.

**Phlox reptans** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 145 ; Regel in *Gartenflora* (1863) t. 403 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 131. P. STOLONIFERA Sims in *Bot. Mag.* (1802) t. 563. — De la Pensylvanie au Kentucky et à la Georgie. 2

**P. subulata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 152 ; *Bot. Mag.* t. 441 ; Regel in *Gartenflora* (1883) t. 1107 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 131. P. SETACEA Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 153 ; *Bot. Mag.* t. 415. — États-Unis (part. or.). 2

2. **POLEMONIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 131 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4970. — Huit ou neuf esp. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique temp. du Mexique et du Chili.

**P. cæruleum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 162 ; *Fl. Dan.* II t. 255 ; *Engl. Bot.* t. 14 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 499 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 151. — Europe, Asie centr. et bor., Amérique bor. 2

**P. confertum** A. Gray in *Proc. Acad. Philad.* (1863) 73 ; Robinson in *The Garden* (1876) 506 cum icon ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 150. — Montagnes Rocheuses, Sierra-Nevada. 2

**P. reptans** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 230 ; *Bot. Mag.* t. 1887 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 106 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 151. — États-Unis or. et centr. 2

3. **LOESELIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 348 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4971. — Genre de 10 esp. de la Californie, du Mexique, de l'Amérique centr. et de la Colombie.

**L. coccinea** G. Don, *Gen. Syst. Bot.* IV (1837) 249 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 318. HOITZIA — Cavanilles, *Icon et Descr. Pl.* IV (1797) 44 t. 363 ; Knowles et Westcott, *Flor. Cabin.* t. 99. — Mexique.

### LIII. HYDROPHYLLACÉES

1. **HYDROPHYLLUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 124 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 4975. — Genre de 5 ou 6 esp. de l'Amérique bor.

**H. Canadense** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 208 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 97 ; *Bot. Reg.* III t. 242 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 155. — Du Canada à la Caroline et au Mississipi. 2

**H. capitatum** Douglas ex BENTHAM in *Trans. Linn. Soc.* XVII (1834) 273 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 289 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 154. — Du Territoire de Washington à l'Utah et à la Californie. 2

2. **HESPEROCHIRON** S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 281 t. 30 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4981. — Genre de 2 ou 3 esp. de l'Amérique bor.-occ.

**H. Californicus** S. Watson, *loc. cit.* (1871) 281 t. 30 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 173. **OURISIA** — Bentham, *Pl. Hartweg.* (1849) 327. — De la Californie au Territoire de Washington et à l'Utah. ♀

**H. pumilus** T.-C. Porter ex HAYDEN, *Geolog. Rep.* (1872) 768 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 173. **VILLARSIA** — Douglas ex Grisebach in Hooker ; *Fl. Bor.-Amer.* II (1838) 70 t. 157<sup>b</sup>. — Idaho, Orégon, Californie. ♀

3. **ROMANZOWIA** Chamisso ex Nees in Horæ Phys. Berolin. (1820) 71 t. 14 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 4984. — Deux esp. de l'Asie or. et de l'Amérique subarct. occ.

**R. Sitchensis** Bongard, *Obs. Veget. Ile Sitcha* in *Mém. Acad. Sc. Pétersb.* (1833) 158 t. 4 n. 118 ; Chamisso in *Linnæa* II (1819) 609 t. 4 ; Regel in *Gartenflora* (1873) t. 748 ; *Bot. Mag.* t. 6109 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 172. — De Sitcha à la Californie. ♀

#### LIV. BORAGINÉES

1. **CACCINIA** Savi, Cose Bot. (1832) 1 t. 1 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5011. — Cinq esp. de l'Orient.

**C. strigosa** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XI (1849) 134 et *Fl. Or.* IV 278. — Perse. ♀

2. **OMPHALODES** Mœnch, *Meth. Pl. Marburg.* (1794) 419 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5016. — Quinze esp. de l'Europe mérid., de l'Asie centr. temp. et or. et du Nouveau-Mexique.

**O. Luciliæ** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 41 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* III t. 366 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 267. — Grèce, Anatolie, Cilicie. ♀

**O. verna** Mœnch, *Meth. Pl. Marburg.* (1794) 420 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* VI t. 21 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1326 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 538. — Europe mérid. et or. (ailleurs souvent naturalisé). ♀

3. **CYNOGLOSSUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 100 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5019. — Genre de 68 esp. des rég. temp. et mont. du monde entier.

**C. arundanum** Cossou, *Notes sur quelq. Pl. Nouv. ou Crit.* II (1849) 41 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 507. — Espagne mérid. ☉  
— Obs. Quelques auteurs rapportent cette espèce au *C. CHEIRIFOLIUM* Linné de la rég. Méditerran. oc.

4. **PULMONARIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 104 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5046. — Quinze esp. décrites, mais seulement 5 ou 6 bien distinctes, de l'Europe et de l'Asie, surtout occ.

**P. saccharata** Miller, *Garden. Dict.* ed. VIII (1768) n. 4 ; Reichenbach, *Icon. Bot.* VI t. 505 et *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1318. — France, Espagne, Italie (ailleurs naturalisé). ♀

5. **MERTENSIA** Roth, *Catalecta Bot.* I (1797) 34 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5049. — Genre de 15 esp. de l'Europe or., de l'Asie extratrop. et de l'Amérique bor.

**M. paniculata** G. Don, *Gen. Syst. Bot.* IV (1837) 320 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 201. **PULMONARIA** — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 181 ; *Bot. Mag.* t. 2680. — Asie bor.-or, Amérique, Montagnes Rocheuses (jusqu'à l'Utah). ♀

**M. Sibirica** G. Don, *Gen. Syst. Bot.* IV (1837) 319 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 133 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 200. **PULMONARIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 135. — Sibérie, Colorado, Californie. ♀

**M. Virginica** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 88 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 200 ; Regel in *Gartenflora* (1863) t. 416. **PULMONARIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 135 ; *Bot. Mag.* t. 160. — États-Unis (partie or. et austro-or.). ♀

6. **MYOSOTIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 102 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5051. — Genre de 40 esp. environ des rég. temp. et froides de l'ancien monde et de l'Amérique bor.

**M. alpestris** Schmidt, *Fl. Boëmica I Cent.* III (1794) 26 ; *Engl. Bot.* t. 2559 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 533. **M. SYLVATICA** Hoffmann, var. **ALPESTRIS** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II (1843) 581 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 202. **M. RUPICOLA** Smith, *Engl. Bot.* (1813) t. 2539. — Montagnes de l'Europe, Asie bor., Amérique arct., Montagnes Rocheuses. ♀

**M. Azorica** H.-C. Watson in Hooker, *Bot. Mag.* (1844) t. 4122 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 108 ; Paxton, *Flow. Gard.* t. 97 ; Lemaire, *Le Jard. Fleur.* IV t. 340. — Açores. ♀



7. **LITHOSPERMUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 101 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5056. — Genre de 40 esp. du Mexique et des rég. temp. du monde entier.
- L. canescens** Lehmann, *Asperifol. Nuciferae* II (1818) 305 ; *Bot. Mag.* t. 4389 ; Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I t. 14. — Du Canada au Mexique. ♀
- L. Gastoni** Benthām in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 83 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 519. — Pyrénées occ. ♀
- L. hirtum** Lehmann, *Asperifol. Nuciferae* II (1818) 304 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 78 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 205. **ANCHUSA** — Muhlenberg, *Catal. Pl. Amer. Sept.* (1813) 19. **BATSCHIA** Gmelini Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 130. **B. CAROLINIANA** Rœmer et Schultes, *Syst. Veg.* IV (1819) 52. — États-Unis mérid. ♀
- L. oleaefolium** La Peyrouse *Abrég. Hist. Pl. Pyr. Suppl.* (1818) 28 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 81 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 518 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 500. — Pyrénées or. ♂
8. **MOLTKIA** Lehmann in Act. Nat. Scrut. Hall. II (1817) 3 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5056. — Cinq ou six esp. de l'Europe mérid. et de l'Asie occ.
- M. petraea** Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII (1856) 66 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 221. **LITHOSPERMUM** — A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 82 ; Regel in *Gartenflora* III t. 104 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1315. — Thessalie, Bosnie, Monténégro, Dalmatie. ♂
9. **ARNEBIA** Forskal, *Fl. Egypto-Arab.* (1775) 62 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5061. — Treize esp. de l'Afrique bor. et de l'Asie occ. et centr.
- A. echioides** A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 96 ; *Bot. Mag.* t. 4409 ; *Fl. des Serres* V t. 459 ; *Rev. Hort.* (1862) t. 51. **MACROTOMIA** — Boissier, *Fl. Or.* II (1879) 211. **LYCORSIS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 199. — Caucase, Arménie.
10. **ECHIUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 107 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5065. — Plus de 50 esp. décrites, mais une vingtaine seulement bien distinctes des rég. extratrop.
- E. albicans** Lagasca et Rodriguez in *Anal. Cienc. Nat.* V (1802) 269 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 485. **E. MERTENSH** Lehmann, *Asperifol. Nuciferae* II (1818) 463 ; Boissier, *Voy. Bot. Espagne* t. 125 ; Webb, *Otia Hisp.* t. 12. — Espagne. ♀

**Echium rubrum** Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* V app. (1778) 27 t. 3; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1299; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 20; Boissier, *Fl. Or.* IV 203. — Europe centr. et or., Caucase, Arménie russe. ʒ

**E. strictum** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 130; Jacquin, *Hort. Schœnbr.* I t. 35; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 17; Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canaries* III 2, 45. — Canaries. ʒ

## LV. CONVULVULACÉES

1. **IPOMOEA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 133; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5077. — Environ 450 esp. décrites, mais 350 seulement bien distinctes habitant les rég. chaudes du monde entier (l'Europe exceptée).

**I. fastigiata** Sweet, *Hort. Brit.* ed. I (1827) 288 et ed. II 372; Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 380. **I. CANDICANS** Sweet, *loc. cit.* ed. I (1827) 289. — Antilles, Brésil, Guyane, Bengal. ʒ

2. **CONVOLVULUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 134; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5082. — Genre de 160 esp. des rég. temp., subtrop. et trop. du monde entier.

**C. floridus** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 136; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 34; Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 404. **RHODORHIZA** — Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canar.* III 2 (1836) 31. — Canaries. ʒ

**C. Mauritanicus** Boissier, *Voy. Bot. Espagne* (1839-45) 418 t. 122<sup>a</sup>; *Bot. Mag.* t. 5243; Regel in *Gartenflora* XX (1861) t. 338; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (dicotyl.) 594. — Maroc, Algérie. ʒ

**C. nitidus** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 65 n. 142 et *Voy. Bot. Espagne* (1839-45) t. 122; Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 403; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 517. — Espagne. ʒ

**C. Sabatius** Viviani, *Nov. Sp. Diagn.* in *Fl. Libyc. Specim.* (1824) 67; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1337; Caruel, *Fl. Ital.* VI 806. **C. PSEUDO-SICULUS** Cavanilles var. **MULTIFLORUS** Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX (1845) 407. — Italie bor.-occ. ʒ

3. **FALKIA** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 30; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5094. — Genre de 3 ou 4 esp. de l'Afrique austr.

**F. repens** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 211; *Bot. Mag.* t. 2228; C. Morren in *Belg. Hort.* (1860) t. 3. **CONVOLVULUS FALCKIA** Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* (1794) 35. — Afrique austr. ʒ

## LVI. SOLANÉES

1. **SOLANUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 145 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5106. — Environ 950 esp. décrites, mais seulement 750 bien distinctes. — Rég. temp. et chaudes du monde entier.
- S. Jamesii** Torrey in *Ann. Lyc. New-York* II (1828) 227 ; Walpers, *Repert. Bot.* III 40 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 40 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 2, 227. — Du Colorado à l'Arizona et au Mexique. <sup>(1)</sup>
- S. pseudo-Capsicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 184 ; Lowe, *Fl. of Madeira* II 79 ; Batsch, *Anal. Fam. Plant.* t. 10 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 152 ; Sendtner in Martius, *Fl. Brasil.* X 36. — Madère, Maurice, Amérique austr.  $\frac{1}{2}$
2. **IOCHROMA** Benthams in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 20 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5123. — Quinze esp. de l'Amérique trop.-occ.
- I. grandiflora** Benthams in *Bot. Reg.* XXXI (1845) sub t. 20 ; *Bot. Mag.* t. 5301. **I. WARSCEWICZII** Regel in *Gartenflora* IV (1853) 245 t. 126 ; *Fl. des Serres* (1856) 183 t. 1163 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 491. **HABROTAMNUS CYANEUS** Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 68. — Pérou.  $\frac{1}{2}$
3. **JABOROSA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 125 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5133. — Six ou sept esp. du Mexique, de l'Amérique austr.-extratrop. et des Andes.
- J. integrifolia** Lamarek, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 189 ; *Bot. Mag.* t. 3489 ; Miers, *Illustr. South-Amer. Pl.* t. 5 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 481. — Buenos-Ayres, Pérou.  $\frac{1}{2}$
4. **MANDRAGORA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 125 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5139. — Genre de 5 esp. de la Rég. Méditerran. et du Sikkim.
- M. officinarum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 181 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1628 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 531 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 291. **ATROPA MANDRAGORA** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1771) 259. **M. VERNALIS** Bertoloni, *Comment. Mandrag.* (1835) 9 t. 1. — Espagne, Italie, Dalmatie, Grèce, Crète, Asie Médit.  $\frac{1}{2}$

5. **DATURA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 135 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5142. — Douze esp. des rég. temp. et chaudes du monde entier.
- D. arborea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 179 ; Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* t. 128 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* VII t. 1 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 543. — Mexique, Amérique austr. (du Pérou au Brésil).  $\frac{1}{2}$
6. **HYOSCYAMUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 136 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5146. — Vingt esp. décrites, mais 8 ou 9 seulement bien distinctes, de la Rég. Méditerr., des îles Canaries et de l'Asie occ. et centr.
- H. aureus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 180 ; *Bot. Mag.* t. 87 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca*, t. 230 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 549 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 296. — Europe mérid. (indig.?), Crète, Rhodes, Asie occ.  $\frac{2}{4}$
7. **CESTRUM** Linné, *Hort. Cliff.* (1737) 491 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5149. — Genre de 100 esp. bien distinctes, des rég. chaudes de l'Amérique.
- C. aurantiacum** Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 71 et XXXI t. 22 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIV t. 77 ; *Fl. des Serres* I t. 33 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 603. — Guatemala, Costa-Rica.
- C. elegans** Schlechtendal in *Linnaea* XIX (1847) 261 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 600. **HABROTHAMNUS** — Brongniart in *Fl. des Serres*, sér. 1, II (1846) t. 9 ; Walpers, *Repert. Bot.* III (1852) 122. — Mexique.  $\frac{1}{2}$
8. **NIEREMBERGIA** Ruiz et Pavon, *Prodr. Fl. Peruv.* (1794) 23 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5162. — Genre de 20 esp. du Texas, du Mexique et de l'Amérique austr. occ. et extratrop.
- N. rivularis** Miers in HOOKER, *Lond. Journ. of Bot.* V (1846) 167 et *Illustr. South-Amer. Pl.* (1850) t. 19 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1, 584. — Argentine.  $\frac{2}{4}$
9. **STREPTOSOLEN** Miers, *Illustr. S.-Amer. Pl.* (1850) t. 55 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5169. — Genre monotype.
- S. Jamesoni** Miers, *Illustr. S.-Amer. Pl.* (1850) t. 55. **BROWALLIA** — Benth in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 197. — Nouvelle-Grenade, Equateur.  $\frac{1}{2}$

10. **BRUNFELSIA** Plumier ex Linné, Hort. Cliff. (1737) 5 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5170. — Genre de 20 esp. des Indes occ. et de l'Amérique austr.

**B. Americana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 191 ; *Bot. Mag.* t. 393 ; *Bot. Cab.* t. 553 ; Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 200 ; Grisebach, *Fl. Brit. West. Ind.* 432. — Antilles.  $\dagger$

**B. eximia** Scheidweiler (sub FRANCISCEA) ex Moore et Ayres, *Gard. Mag.* Bot. I (1850) 16 et II 177 cum icone ; *Bot. Mag.* t. 4790 ; *Fl. des Serres*, X t. 1037. — Brésil.

**B. macrantha** Lemaire (sub FRANCISCEA), *Le Jard. Fleur.* III (1853) t. 249. — Brésil.

## L VII. SCROPHULARINÉES

1. **GHIESBREGHTIA** A. Gray in Proc. Amer. Acad. VIII (1873) 629 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5178. — Genre monotype.

**G. grandiflora** A. Gray, *Proc. Amer. Acad.* VIII (1873) 630. — Mexique.

2. **VERBASCUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 153 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5183. — Genre d'environ 100 esp. bien distinctes disséminées dans l'ancien monde.

**V. Olympicum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 54 et *Fl. Or.* IV 323. — Mont Olympe (Bithynie). ②

**V. Phoeniceum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 178 ; *Bot. Mag.* t. 885 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1652 ; Regel in *Gartenflora* (1864) t. 436 ; Boissier, *Fl. Or.* IV, 346. — Europe, Asie occ., Sibérie. ②

3. **CELSIA** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 321 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5184. — Genre de 30 esp. de l'Europe mér., de l'Asie occ., de l'Inde et de l'Afrique bor. et or.

**C. bugulifolia** Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V (1853) 7 t. 407 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 351. **VERBASCUM** — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* IV (1796) 226. **JANTHE** — Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 40. **TRIGUERA BACCATA** Dunal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 1 (1846) 422. — Roumérie, Bithynie.  $\mathcal{Z}$

4. **CALCEOLARIA** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 143 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5186. — Genre d'environ 120 esp. de l'Amérique occ.-trop. et extratrop. et de la Nouvelle-Zélande.

**C. fuchsiaefolia** Hort. ex *Gard. Chron.* (1881) I 269. — Origine douteuse.

5. **LINARIA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 120 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5194. — Genre de 130 esp. bien distinctes habitant les rég. extratrop. de l'hémisphère bor. et l'Amérique austr. extratrop.

**L. æquitriloba** Duby, *Bot. Gallie.* I (1828) 344 ; *Bot. Mag.* t. 2941 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 267 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 573 ; Caruel, *Fl. Ital.* VI 622. **ANTIRRHINUM** — Viviani, *Fl. Libye. Specim.* (1824) 68. — Corse, Sardaigne. ♀

**L. anticaria** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov. Hisp.* (1852) 86 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 574. — Espagne. ♀

**L. cæsia** De Candolle in CHAVANNES, *Monog. des Antirrh.* (1833) 174 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 281 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 572. **ANTIRRHINUM** — Lagasca in Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 157. — Espagne. ♀

**L. corifolia** Desfontaines, *Choix Pl. Coroll. Inst. Tournesf.* (1808) t. 22 ; *Annal. Mus. Hist. Nat. Paris* XI t. 3 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 279 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 379 (nom. rect. « **CORIDIFOLIA** »). — Asie Mineure. ♀

**L. genistifolia** Miller, *Garden. Dict.* ed. 8 (1768) 11 ; *Bot. Mag.* t. 2183 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1681 et 1686 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 275 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 377. **L. LINIFOLIA** Reichenbach, *Iconog. Bot.* V (1827) 19 t. 422. **ANTIRRHINUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 616. — Europe centr., Sibérie, Asie Mineure. ♀

**L. hepaticæfolia** Duby, *Bot. Gall.* (1828) 344 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 266 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 573. **ANTIRRHINUM** — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* XII (1816) 19. — Corse. ♀

**L. Italica** Treviranus in *N. Act. Acad. Cæs. Leop.* XIII (1826) 188 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 272 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1683 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II. 576. **L. ANGUSTIFOLIA** Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 375. — Pyrénées, Dauphiné, Italie, Autriche. ♀

**L. Macedonica** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 19 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 76. — Macédoine. ♀

- Linaria pilosa** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 584 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 267 ; Caruel, *Fl. Ital.* VI 616. ANTIRRHINUM — Jacquin, *Observ. Bot.* II (1767) 28 t. 48 ; Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 249. — Italie. 2/
- L. triornithophora** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berolin.* (1809) 639 ; *Bot. Cab.* t. 1010 ; Knowles et Westcott, *Fl. Cab.* t. 24 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 576. ANTIRRHINUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 613 ; *Bot. Mag.* t. 625. — Portugal, Espagne. 2/
- L. villosa** De Candolle in CHAVANNES, *Monog. des Antirrh.* (1833) 93 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 286 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 583 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 580. ANTIRRHINUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 852. — Espagne, France mér. 2/
6. **ANARRHINUM** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) 51 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5195. — Onze esp. de la Rég. Méditerr. et de la Nubie.
- A. laxiflorum** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 71 et *Voy. Bot. Esp.* t. 127 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 288 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 556. — Espagne. 2/
7. **ANTIRRHINUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 514 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5199. — Environ 25 esp. de l'hémisphère bor.
- A. Barrelieri** Boreau, *Grain. Jard. Bot. Angers* (1854) ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 583. **A. SICULUM** Ucria var. **ELATUM** Costa, *Catal. Pl. Catalon.* (1864) 182. — Espagne. 2/
- A. sempervirens** Lapeyrouse, *Fig. Fl. Pyren.* I (1795) 7 t. 4 et *Hist. Abrég. Pl. Pyren.* 354 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 570 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 585. — Pyrénées franç. et espagn. 2/
8. **PHYGELIUS** E. Meyer ex Bentham in Hooker, *Compan. Bot. Mag.* II (1836) 53 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5202. — Deux esp. de l'Afrique austr.
- P. Capensis** E. Meyer in Hooker, *Consp. Bot. Mag.* II (1836) 53 ; *Bot. Mag.* t. 4881 ; *Fl. des Serres* XI t. 1111-12 ; *Gartenfl.* VII t. 227. — Afrique austr. 1/
9. **SCROPHULARIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 494 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5209. — Environ 120 esp. de l'Europe, de l'Afrique bor., de l'Asie extratrop. et de l'Amérique bor.
- S. chrysantha** Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* III (1847-50) 26 t. 220 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 390. **S. VERNALIS** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 76. — Arménie turque, Transcaucasie, Ibérie. ②.

**Scrophularia cryptophila** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.*, ser. 1, XII (1853) 31 et *Fl. Or.* IV 391. — Lycie, Isaurie, Lycaonie, Galatie. ② ?

**S. heterophylla** Willdenow, *Sp. Pl.* III (1801) 274 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 310 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 408. **S. URVILLEANA** Wydler, *Monog. Scrophul.* (1828) 160 t. 2. **S. CÆSIA** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII (1830) 3 t. 604. — Iles de l'Archipel. 4

10. **PENTSTEMON** Mitchell in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. VIII (1748) app. 214 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5215. — Environ 75 esp. des États-Unis et du Mexique ; une esp. de l'Asie bor.-or.

**P. acuminatus** Douglas ex Lindley in *Bot. Reg.* XV (1829) t. 1285 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 323 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 263. **P. nitidus** Douglas ex Bentham in De Candolle, *loc. cit.* X (1846) 323. — Orégon. 4

**P. barbatus** Nuttall, *Gen. Amer. Pl.* II (1818) 53 ; Lindley in *Bot. Reg.* XXV t. 21 (var. **CARNEUS**) ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 329 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 261. **CHELONE** — Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* III (1794) 22 t. 242 ; *Bot. Reg.* II t. 116. — Mexique. 4

**P. cordifolius** Bentham, *Scrophul. Indicæ* (1835) 7 in adnot. et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 339 ; *Bot. Mag.* t. 4497 ; *Fl. des Serres* VI t. 658 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 260. — Californie. 4

**P. procerus** Douglas ex Graham in *Edinb. N. Phil. Journ.* (1829) et in *Bot. Mag.* (1829) t. 2954 ; *Gartenflora* (1863) t. 412 ; *Bot. Cab.* t. 1616 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 328. **P. CONFERTUS** Douglas var. **CÆRULEO-PURPUREUS** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VI (1862) 72 et *Syn. Fl. N.-Amer.* II 267. — États-Unis occ. (du Saskatchewan à la Californie). 4

11. **RUSSELIA** Jacquin, *Stirp. Amer.* (1763) 178 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5216. — Quatre ou cinq esp. du Mexique et de l'Amérique centr.

**R. juncea** Zuccarini in *Flora* (1832) II *Beibl.* 99 ; *Bot. Reg.* XXI t. 1773 ; Paxton, *Mag. of Bot.* IV t. 79 ; Bentham in De Candolle *Prodr. Regn. Veget.* X 332. — Mexique. 4

12. **CHÆNOSTOMA** Bentham in Hooker, *Compan. Bot. Mag.* I (1835) 374 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5233. — Environ 26 esp. de l'Afrique austr.

**C. hispidum** Bentham, in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* I (1835) 376 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 356 ; Regel in *Gartenflora* (1864) t. 448. **MANULEA** — Thunberg, *Fl. Capens.* ed. Schultes (1823) 473. — Colonie du Cap. 4



13. **MIMULUS** Linné in *Acta Soc. Upsal.* (1741) 82 n. 1029 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5239. — Genre d'environ 50 esp.  
de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie extra-  
trop. et trop. mont.

**M. radicans** Hooker f., *Fl. Nov.-Zeland.* I (1854) 148 et *Handb. New-Zeal.*  
*Fl.* (1864) 202. — Nouvelle-Zélande. ʒ

14. **MAZUS** Loureiro, *Fl. Cochinch.* II (1790) 385 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 5240. — Six esp. de l'Inde or., de l'Asie or.  
et de l'Australie.

**M. Pumilio** R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 439 ; Hooker, *Icon. Pl.*  
VI t. 567 ; Endlicher, *Icon. Gen. Pl.* t. 102 ; Bentham in De Candolle,  
*Prodr. Regn. Veget.* X 375 et *Fl. Austral.* IV 484. — Tasmanie. (1) ?

15. **DODARTIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 506 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 5241. — Genre monotypique.

**D. Orientalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 633 ; *Bot. Mag.* t. 2199 ; Jaubert  
et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V t. 410 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 424. — Caucase,  
Asie Mineure, Sibérie. ʒ

16. **TORENIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1754) n. 754 ; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 5263. — Genre de 20 esp. de l'Asie trop.  
et or., de l'Afrique trop. et de l'Amérique austr.

**T. Asiatica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 619 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.*  
(1845) t. 862 ; *Bot. Mag.* t. 4249 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 277. —  
Inde or., Tenasserim, Ceylan, Chine, Java. ʒ

**T. vagans** Roxburgh, *Catal.* (1813) et *Fl. Ind.* III 96 ; Hooker f., *Fl. Brit.*  
*Ind.* IV 277. T. RUBENS Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X  
(1846) 410. — Inde or., Chine. ʒ

17. **DIGITALIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 496 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 5282. — Genre de 18 esp. de l'Europe et de  
l'Asie occ. et centr.

**D. dubia** Rodriguez in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* III (1874) 45. — Baléares.

**D. laciniata** Lindley in *Bot. Reg.* XIV (1828) t. 1201 ; Boissier, *Voy. Bot.*  
*Esp.* t. 126 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 587. — Espagne. ʒ

**D. Mariana** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 465 t. 126 ; De Candolle,  
*Prodr. Regn. Veget.* X 451 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 590.  
— Espagne mér. ʒ

**Digitalis obscura** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 867; Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 91; *Bot. Mag.* t. 2157; Lindley, *Digit. Monogr.* t. 26; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 587. — Espagne. ♀

**D. Thapsi** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 867; Smith, *Exot. Fl.* t. 43; Lindley, *Digit. Monogr.* t. 3 et 4; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1689; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 590. — Savoie, Espagne. ♀

**D. viridiflora** Lindley, *Digit. Monogr.* (1821) 21 t. 18; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 452; Boissier, *Fl. Or.* IV 432. — Grèce, Macédoine. ♀

18. **ERINUS** Linné, *Hort. Cliffort.* (1737) 320; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5284. — Une esp. de l'Europe occ. et centr.

**E. alpinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 630; *Bot. Mag.* t. 310; *Bot. Cab.* t. 969; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1695; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 601. — Espagne, France, Suisse, Piémont. ♀

— — var. **hirsutus** Grenier et Godron, *loc. cit.* II (1850) 601; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 592. **E. HISPANICUS** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 147. — Espagne, France. ♀

19. **SYNTHYRIS** Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 454; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5289. — Sept esp. de l'Amérique bor.-occ.

**S. reniformis** Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X (1846) 454. **WULFENIA** — Douglas in Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1838) 102 t. 170; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 285; Bentham, *Scrophul. Ind.* (1835) 46 in obs. — Orégon, territoire de Washington. ♀

20. **WULFENIA** Jacquin, *Miscell. Austr.* II (1781) 60; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5290. — Quatre esp. de la Carinthie, de l'Asie occ. et de l'Himalaya.

**W. Amherstiana** Bentham, *Scrophul. Indicæ* (1835) 46 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 456; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 291. **PÆDEROTA** — Wallich, *Catal.* (1829) n. 410. — Himalaya occ., Afghanistan. ♀

**W. Carinthiaca** Jacquin, *Miscell. Austr.* II (1781) 62 t. 8 fig. 1 et *Icon. Pl. Rar.* I t. 2; *Bot. Mag.* t. 2500; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1696; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 455. — Carinthie.

**W. Orientalis** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 75 et *Fl. Or.* IV 433. — Syrie bor. ♀

21. **PÆDEROTA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 41 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5292. — Deux ou trois esp. des montagnes de l'Europe centr. et or.

**P. Ageria** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 171 ; Nees, *Gen. Fl. Germ.* V t. 39 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1697 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 437. **P. ZANNICHELLII** Brignoli in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* I (1817) 176. — Styrie, Carinthie, Tyrol, Carniole, Frioul, Istrie. ♀

**P. Bonarota** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 20 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 121 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1697 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 437. — Styrie, Carinthie, Tyrol, Carniole, Frioul, Lombardie, ? Croatie, Transylvanie. ♀

**P. Churchillii** Huter in *Exsicc. et in Œsterr. Bot. Zeitschr.* XXIII (1873) 125. **P. AGERIA** × **BONAROTA**. — Engadine, Tyrol, Vénétie. ♀

22. **VERONICA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 10 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5293. — Genre d'environ 200 esp. habitant surtout les rég. temp. et froides ; peu nombreuses dans la zone tropicale.

**V. Allionii** Villars, *Prospect. Hist. Pl. Dauph.* (1772) 20 et *Hist. Pl. Dauph.* II 8 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 591 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1705 et 1833. **V. PYRENAICA** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 73 t. 46 fig. 3. — Dauphiné, Savoie, Piémont. ♀

**V. aphylla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 11 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 476 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* XIII t. 56 ; Frœlich, *Alpenpfl. d. Schweiz.* III t. 5 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1707. — Pyrénées, Alpes, Apennins, Silésie. ♀

**V. caespitosa** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 79 et *Fl. Or.* IV 454. — Bithynie, Carie, Pisidie, Capadoce. ♀

**V. calycina** R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 475 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 477 et *Fl. Australiensis.* IV 510. — Australie, Tasmanie. ♀

**V. carnosula** Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1867) 210. — Nouvelle-Zélande. ♀

**V. cuneifolia** D. Don in *Ann. Nat. Hist.* VII (1841) 457 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 472 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 445. **V. CARIENSIS** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, IV (1844) 75. — Carie, Lycie, Isaurie. ♀

**V. epacridea** Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1867) 213. — N.-Zélande.

**V. fruticulosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 15 ; Mutel, *Fl. Franç.* t. 46 ; Frœlich, *Alpenpfl. d. Schweiz.* II t. 6 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1704, 1717 et 1833 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 592. — Espagne, Pyrénées, Jura, Alpes. ♀

- Veronica gentianoides** Vahl, *Symb. Bot.* I (1790) 1; *Bot. Mag.* t. 1002; Ventenat, *Pl. Jard. Malmais.* t. 80; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 5; Boissier, *Fl. Or.* IV 451. — Caucase, Tauride, Asie Mineure. ♀
- V. Lyallii** Hooker f., *Fl. Nov.-Zeland.* I (1854) 196 et *Handb. New-Zeal. Fl.* (1864) 215. — Nouvelle-Zélande. ♀
- V. pinguifolia** Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1864) 210. — Nouvelle-Zélande. ♀
- V. Ponæ** Gouan, *Illustr. et Observ. Bot.* I (1773) 161 fig. 1; De Candolle, *Fl. Franç.* III 469; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 595; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 598. — Sierra Nevada, Asturies, Pyrénées, Corse. ♀
- V. prostrata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 17; *Bot. Mag.* t. 3683; Dietrich, *Fl. Boruss.* IV t. 263; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 587. **V. SATURELIFOLIA** Poiteau et Turpin, *Fl. Paris.* (1808-13) t. 17. — Europe occ., centr., mér. et or. ♀
- V. repens** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 727; Loiseleur, *Fl. Gall.* I 11 t. 1; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 594; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 598. **V. TENELLA** Viviani, *Fl. Cors. Sp. Nov.* (1824) 3. — Espagne mér., Corse. ♀
- V. saxatilis** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 33; Frœlich, *Alpenpfl. d. Schweiz.* II t. 5; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1717 et 1835. **V. FRUTICULOSA** Linné var. **PILOSA** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II (1850) 593. — Europe bor., Pyrénées et montagnes de l'Europe occ., centr. et or. ♀
- V. Traversii** Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* (1867) 208. — Nouvelle-Zélande. ♀

23. **PEDICULARIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 513; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5337. — Genre de près de 200 esp. représenté en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique.

**P. dolichorrhiza** Schrenk, *Enum. Pl. Nov. Song.* in *Bull. Acad. Sc. Pétersb.* I (1842) 60; Ledebour, *Fl. Ross.* III 291; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1753; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* X 570. — Songarie. ♀

24. **TOZZIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 504; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5340. — Genre monotype.

**T. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 607; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II t. 165; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XX t. 1741; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 622. — Pyrénées, Alpes, Apennins, Europe centr.-or. ♀

## LVIII. GESNÉRIACÉES

1. **GLOXINIA** L'Héritier, *Stirp. Nov.* I (1785) 449 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5365. — Six esp. disséminées du Mexique au Brésil.

**G. glabrata** Zuccarini in *Flora* XV (1832) II *Beibl.* 99. PLECTOPOMA GLOXINIEFLORUM Hanstein in *Linnaea* XXVII (1854) 714 et 759. ACHIMENES — Forkel ex Lemaire in *Fl. des Serres* sér. 4, IV (1848) t. 318. GLOXIANA FIMBRIATA Hooker in *Bot. Mag.* (1849) t. 4430. — Mexique. ♀

2. **ACHIMENES** P. Browne, *Hist. Jamaic.* (1756) 270 t. 30 fig. 1 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5366. — Genre de 20 esp. habitant l'Amérique trop. du Mexique au Brésil.

**A. coccinea** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 465 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 535 ; Hanstein in *Linnaea* XXVII (1854) 706 et 739 (excl. var. ROSEA). CYRTODEIRA PULCHELLA L'Héritier, *Stirp. Novae* (1785) t. 71 ; *Bot. Mag.* (1797) t. 374. — Jamaïque, Mexique, Costa-Rica.

**A. lanata** Hanstein in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 434 et 443. SCHEERIA — Hanstein, *loc. cit.* XXVII (1854) 714 et 757 ; *Bot. Mag.* t. 4963. MANDIROLA — Planchon et Linden in *Illustr. Hort.* III (1856) t. 80. EUCODONIA EHRENBURGH Hanstein, *loc. cit.* XXVI (1853) t. 201. — Mexique.

**A. longiflora** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII (1838) 536 ; Hanstein in *Linnaea* XXXVII (1854) 706, 709 et 710 ; *Bot. Mag.* t. 3980. — Mexique. ♀

**A. nægelioides** Van Houtte, *Fl. des Serres* XVIII (1870) 417. EUCODONIA — Van Houtte, *Catal.* n. 109 (1865 ?) 44 et in *Fl. des Serres* XVI (1865) 1 t. 1608 et XVII (1867-68) 79 t. 1757-58. — Hybride de l'EUCODONIA EHRENBURGH et du NÆGELIA ZEBRINA.

3. **KOELLIKERIA** Regel in *Flora* XXXI (1848) 249 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5370. — Genre monotype.

**K. argyrostigma** Regel in *Flora* XXXI (1848) 250. ACHIMENES — Hooker in *Bot. Mag.* (1845) t. 4175 ; Van Houtte, *Fl. des Serres* II t. 7 ; Walpers, *Repert. Bot.* VI 400. — Amérique centr., Pérou, Brésil. ♀

4. **DICYRTA** Regel in *Flora* XXXII (1849) 181 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5371. — Deux esp. de l'Amérique centr.

**D. candida** Hanstein et Klotzsch in *Linnaea* XXVII (1854) 714 et 754. ACHIMENES — Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* III (1848) 317 cum icone. DIAS-TEMA GRACILE Regel in *Flora* XXXII (1849) 181. — Guatemala. ♀

- Dicyrta Warscewicziana** Regel in *Flora* XXXII (1849) 181; Hanstein in *Linnaea* XXVII (1854) 714. — Guatemala.
5. **ISOLOMA** Decaisne in *Revue Hort.* sér. 3, II (1848) 465 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5373. — Genre de 60 esp. disséminées du Brésil et du Pérou au Mexique.
- I. digitaliflora** Linden et André (sub *SCIADOCALYCE*) in *Illustr. Hort.* XVII (1870) 95 t. 17. — Nouvelle-Grenade.
- I. elegans** Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* II (1882) 478. MOUSSONIA — Decaisne in *Fl. des Serres* V (1849) t. 489 ; Hanstein in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 287. — Guatemala.
- I. molle** Decaisne in *Rev. Hort.* sér. 3, II (1848) 465. GESNERIA — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp.* II (1817) 317 t. 191 ; Sprengel, *Syst. Veget.* II 838 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 531. — Venezuela. ‡
6. **GESNERIA** Martius, *Nov. Gen. et Sp. Pl. Brasil.* III (1829) 27 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5377. — Genre d'environ 60 esp. habitant l'Amérique trop. mérid. (1 esp. au Mexiq.).
- G. cardinalis** Lehmann ex E. Otto in *Allg. Gartenzeit.* VI (1850) 454. *G. MACRANTHA* Hort. Berol. ex Walpers, *Annal. Bot.* II (1852) 1066 ; Hanstein in Martius, *Fl. Brasil.* VIII (1864) 373 t. 59 fig. 16. — Origine douteuse.
- G. discolor** Lindley in *Bot. Reg.* XXVII (1841) t. 63 misc. 45 ; Paxton, *Mag. of Bot.* IX t. 55 ; Hanstein in Martius, *Fl. Brasil.* VIII (1864) 365 t. 59 fig. 9. — Brésil.
- G. Leopoldi Scheidweiler** ex PLANCHON in *Fl. des Serres* sér. 1, VII (1851-52) 167 t. 704-705 ; Hanstein in Martius, *Fl. Brasil.* VIII (1864) 359 t. 59 fig. 3. — Brésil.
- G. tubiflora** Grisebach (non Cavanilles), *Symb. ad Fl. Argentinam* in *Abhandl. Gess. Wissensch. Göttingen* XXIV (1879) 263. *DOLICHODEIRA* — Hanstein in Martius, *Fl. Brasil.* VIII (1864) 384 t. 59 fig. 23. *GLOXINIA* — Hooker in *Bot. Mag.* t. 3971 ; *Bot. Reg.* XXI t. 3. — Argentine, ? Brésil.
7. **SINNINGIA** Nees in *Ann. Sc. Nat.* ser. 1, VI (1825) 296 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5379. — Seize esp. du Brésil.
- S. Carolineæ Wawra** (sub *TAPEINOTIDE*) in *Österr. Bot. Zeitschr.* XII (1862) 273 ; *Bot. Pr. Maxim. Reise* (1859-60) 72 t. 9 ; *Bot. Mag.* t. 5623 ; L. Van Houtte in *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) t. 1847-48. — Brésil.
- S. conspicua** Seemann (sub *BIGLANDULARIA*) in *Gard. Chron.* (1868) 738. *ROSANOVIA* — Regel in *Gartenflora* XXI (1872) 33 t. 712. — Brésil.
- S. multiflora** Hort. Veitch (sub *STENOCASTRA*) ex LEMAIRE, *Illustr. Hort.* XI (1864) t. 390. — Hybride du *MANDIROLA LANATA* Planchon et Linden et du *S. CONCINNA* Hooker f.

8. **PENTARIHAPHIA** Lindley in *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1110 in textu ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5381. — Environ 40 esp. des Indes occ., de l'Amérique centr. et de la Colombie.

**P. Libanensis** Hanstein in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 292. GESNERA — Ch. Morren in *Annal. Soc. Hort. de Gand* II (1846) 361 t. 84 ; Walpers, *Repert. Bot.* VI 737 ; *Bot. Mag.* t. 4380 (var.). OPHIANTHE — Hanstein in *Linnaea* XXVI (1853) 203. RHYTIDOPHYLLUM FLORIBUNDUM Lemaire in *Fl. des Serres* II (1846) 225 t. 178. — Cuba.

9. **EPISCIA** Martius, *Nov. Gen. et Sp. Pl. Brasil.* III (1829) 39 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5384. — Genre de 30 esp. habitant l'Amérique trop. des Indes occ. et de l'Amérique centr. au Brésil.

**E. Chontalensis** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1871) t. 5925. CYRTODEIRA — Seemann in *Gard. Chron.* (1867) 655 ; Van Houtte in *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 165 t. 1924. — Nicaragua.

**E. fulgida** Hooker in *Bot. Mag.* (1874) t. 6136. CYRTODEIRA — Linden in Ed. André, *Illustr. Hort.* XX (1873) 107 t. 131. — Nouvelle-Grenade.

**E. Luciani** Linden et Fournier in *Illustr. Hort.* XXIII (1876) 43 t. 236. — Nouvelle-Grenade.

**E. tessellata** Linden ex Lemaire, *Illustr. Hort.* XVI (1869) sub t. 607. — CENTROSOLENIA BULLATA Linden et André in Lem., *Illustr. Hort.* XVI (1869) t. 607. — Pérou.

10. **ALLOPECTUS** Martius, *Nov. Gen. et Sp. Pl. Brasil.* III (1829) 53 t. 223 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5386. — Trente esp. dissém. des Indes occ. et de l'Amérique centr. au Brésil.

**A. bicolor** Klotzsch ex Hanstein in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 377. — Brésil.

**A. Schlimii** Planchon et Linden in *Fl. des Serres* sér. 1 VIII (1852-53) 211 t. 827. — Nouvelle-Grenade.

**A. speciosus** Poeppig et Endlicher, *Nov. Gen. et Sp.* III (1818) 6. — Chili.

11. **COLUMNEA** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 792 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5388. — Genre de 60 esp. habitant l'Amérique trop. des Indes occ. et de l'Amérique centr. au Brésil.

**C. Schiedeana** Schlechtendal in *Linnaea* VIII (1833) 249 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 542 ; *Bot. Mag.* t. 4045 ; Hanstein in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 413. — Mexique.

12. **ÆSCHYNANTHUS** Jack in Trans. Linn. Soc. London XIV (1823) 42 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5392. — Genre de 65 esp. habitant l'Asie trop. de l'Inde aux îles Philippines.

**Æ. bracteata** Wallich, *Catal.* (1829) n. 794 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 261. C. B. Clarke, *Commel. et Cyrtandr. Beng.* t. 43 et 44 et in De Candolle, *Monog. Phan.* V 31 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 342. **Æ. PAXTONI** Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 79 cum icone. — Himalaya, Assam, Khasia, Ava.  $\frac{1}{2}$

**Æ. cordifolia** Hooker in *Bot. Mag.* (1859) t. 5131. **Æ. MINIATA** Lindley var.  $\beta$  C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V (1873) 51. — Borneo.

**Æ. Horsfieldii** R. Brown ex BENNETT, *Pl. Jav. Rarior.* (1840) 116 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 263 ; Regel in *Gartenflora* IX 232 t. 297 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 34.

**Æ. Javanica** Rollinson ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1850) t. 4503 ; Miquel, *Fl. Ind. Bat.* t. 35 fig. 1 ; *Fl. des Serres* VI t. 558 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 44. — Java, Bantam.

**Æ. Lamponga** Miquel, *Fl. Ind. Bat.* suppl. (1861) 563 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 42. **Æ. BOSCHIANUS** De Vriese in *Tidschr. Nat. Geschied.* II 341 ; *Annal. Soc. Agric. Gand* I (1845) 403 t. 39 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIII 175 cum icone. — Sumatra, Borneo.

**Æ. Lobbiana** Hooker in *Bot. Mag.* (1846) t. 4260 ; Van Houtte, *Fl. des Serres* III t. 246 ; Walpers, *Repert. Bot.* VI 520 ; Clarke in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* IV 343 et in De Candolle, *Monog. Phan.* V 44. — Java, Borneo, Malacca.

**Æ. longiflora** De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 262 ; *Bot. Mag.* t. 4328 ; *Fl. des Serres* III t. 288. C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 32. **LYSIONOTUS** — Blume, *Bijdr. Fl. Ned. Ind.* (1826) 766. — Java.

**Æ. marmorata** T. Moore in PAXTON, *The Flow. Gard.* III (1852-53) 56 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 38. **Æ. ZEBRINA** Van Houtte, *Catal.* (1851) ex Walpers, *Repert. Bot.* VI (1847) 521. — Origine douteuse.

**Æ. miniata** Lindley in *Bot. Reg.* XXXII (1846) t. 61 ; *Fl. des Serres* III t. 236 ; Walpers, *Repert. Bot.* VI 521 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 50. — Java.

**Æ. pulchra** G. Don, *Gen. Syst. Bot.* IV (1837) 656 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 262 ; *Bot. Mag.* t. 4264 ; *Fl. des Serres* III t. 497 ; C. B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 43. **TRICHOSPORUM** — Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Ind.* (1826) 764. — Java.  $\frac{1}{2}$

**Æ. ramosissima** Wallich, *Catal.* (1829) n. 799 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 260 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* t. 71 ; Clarke, *Commel. et Cyrtandr. Bengal.* t. 50 et in De Candolle, *Monog. Phan.* V 23. **TRICHOSPORUM** — D. Don in *Edinb. Phil. Journ.* VII (1822) 85. — Himalaya centr., Nepaul.



**Æschynanthus speciosa** Hooker in *Bot. Mag.* (1847) t. 4320 ; *Fl. des Serres* III t. 267 ; *Annal. Soc. Agric. Gand* III (1847) 415 t. 163 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 33. — Java, Bornéo. †

— — var. **splendida** C.-B. Clarke, *loc. cit.* V (1883) 33. **Æ. SPLENDENS** Lindley et Paxton, *The Flow. Gard.* III (1853) 169 t. 108. **Æ. SPLENDIDA** Lemaire, *Le Jard. Fleur.* III (1853) t. 255. — Hybride des **Æ. SPECIOSA** × **GRANDIFLORA**.

**Æ. tricolor** Hooker in *Bot. Mag.* (1858) t. 5031 ; *Belg. Hort.* VIII t. 60 ; *Fl. des Serres* XIII t. 1384 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 48. — Bornéo. †

13. **AGALMYLA** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Ind.* (1828) 766 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5394. — Trois esp. de Java et de Sumatra.

**A. staminea** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Ind.* (1828) 767 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 263 ; *Annal. Soc. Agric. Gand* IV (1848) t. 206 ; *Fl. des Serres* IV t. 358 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 56. **CYRTANDRA** — Vahl, *Enum. Pl.* I (1804) 105. — Java. †

14. **CHIRITA** Buchanan-Hamilton in Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 89 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5403. — Genre de 36 esp. de l'Asie trop.

**C. Moonii** Gardner in *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI (1846) 479 ; *Bot. Mag.* t. 4405 ; *Fl. des Serres* IV t. 407 et 408 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 111 et in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 356. — Ceylan.

**C. Sinensis** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) t. 59 ; *Bot. Mag.* t. 4284 ; *Fl. des Serres* I t. 23 ; Walpers, *Repert. Bot.* VI t. 522 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 130. — Hong-Kong. †

**C Zeylanica** Hooker in *Bot. Mag.* (1845) t. 4182 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIII 265 cum icone ; *Fl. des Serres* II t. 3 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 112 et in Hooker, *Fl. Brit. Ind.* IV 356. — Ceylan.

15. **STREPTOCARPUS** Lindley in *Bot. Reg.* (1828) t. 1173 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5413. — Dix-neuf esp. de l'Afrique trop. et austr. et de Madagascar.

**S. Gardeni** Hooker in *Bot. Mag.* (1855) t. 4862 ; *Fl. des Serres* XII t. 1214 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 152. **S. BIFLORA** Crocker in *Journ. Linn. Soc. London* V (1861) 66 t. 4 fig. 4-7. — Natal, colonie du Cap.

**S. polyantha** Hooker in *Bot. Mag.* (1855) t. 4850 ; *Fl. des Serres* XI t. 1168 ; Regel in *Gartenflora* VI t. 206 ; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 149. — Natal.

**Streptocarpus Rexii** Lindley in *Bot. Reg.* (1828) t. 1173; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 270; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 151. DIDYMOCARPUS — Bowie ex Hooker, *Exot. Fl.* III (1827) t. 227; *Bot. Mag.* t. 3005. — Colonie du Cap. ♀

16. **RAMONDIA** L.-C. Richard in Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 216; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5423. — Trois esp. des Pyrénées et de la Serbie.

**R. Nathaliae** Pancic et Petrovic, *Fl. Agri Nyssani* (1882) 574; Pancic, *Addit. ad Fl. Princip. Serbie* (1884) 183. — Serbie. ♀

**R. Pyrenaica** L.-C. Richard in Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 216; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 168; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 536. VERBASCUM MYCONI Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 179; *Bot. Mag.* t. 236. MYCONIA BORAGINEA La Peyrouse, *Hist. Abrég. Pl. Pyrén.* (1813) 115. CHAIXIA MYCONI La Peyrouse, *loc. cit.* suppl. (1818) 39. — Pyrénées françaises et espagnoles. ♀

**R. Serbica** Pancic, *Flora Princip. Serbie* (1874) 498; Petrovic, *Fl. Agri Nyssani* (1882) 573; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 168. — Serbie. ♀

17. **HABERLEA** Frivaldsky in Magyar. Tud. Tars. Evkon II (1835) 249 t. 1; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5424. — Genre monotype.

**H. Rhodopensis** Fridvalsky, in Magyar. Tud. Tars. Evkon II (1835) 249 t. 1; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* IX 273; Endlicher, *Icon. Gen.* t. 69; Boissier, *Fl. Or.* IV 82; *Gartenflora* (1879) 326 t. 991 fig. 2; C.-B. Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* V 170. — Balkans. ♀

18. **MITRARIA** Cavanilles, *Icon. Pl. Rar.* VI (1800) 67; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5439. — Genre monotype.

**M. coccinea** Cavanilles, *Icon. Pl. Rar.* VI (1800) 67 t. 579; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* VII 535; *Bot. Mag.* t. 4462; *Fl. des Serres* IV t. 385; *Ann. Soc. Agric. Gand* V (1849) t. 274. — Chili. ♂

## LIX. BIGNONIACÉES

1. **CATALPA** Scopoli, *Introd. ad Hist. Nat.* (1777) 170 n. 687 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5464. — Six esp. de la Chine, du Japon et de l'Amérique bor.
- C. bignonioides** Walter, *Fl. Carol.* (1788) 64. **C. SYRINGIFOLIA** Sims in *Bot. Mag.* (1808) t. 1094 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1285. — États-Unis.  $\frac{1}{2}$
- C. Bungei** C.-A. Meyer in *Bull. Acad. St-Petersb.* II (1837) 51. **C. SYRINGIFOLIA** Bunge, *Enum. Pl. Chin. bor.* 45. — Chine.  $\frac{1}{2}$
- C. speciosa** Warder ex ENGELMANN in COULTER, *Bot. Gazette* V (1880) 1. **BIGNONIA** — R. Graham in *Bot. Mag.* (1841) t. 3888 ; Paxton, *Mag. of Bot.* X (1843) 125 cum icone ; *Fl. des Serres* IX t. 907. — États-Unis.  $\frac{1}{2}$
2. **TECOMA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 139 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5474. — Genre d'environ 25 esp., habitant les rég. trop. et temp. chaudes du monde entier.
- T. capensis** G. Don, *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1117 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1672 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 296. **BIGNONIA** — Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* (1794) 105. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$
- T. filicifolia** Jackson, *Ind. Kew.* I (1893) 408 (sub **CAMPSIDIO**). **CAMPSIDIUM** — A. Van Geert, *Catal.* n. 71 (1874) ; *Fl. and Pomol.* (1874) 280. — Iles Fidji.
- T. grandiflora** Loiseleur, *Herb. de l'Amat.* V (1822?) t. 286 ; *Fl. des Serres* XI (1856) 103 t. 1124-25. **BIGNONIA** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 253 ; *Bot. Mag.* t. 1398 ; *Bot. Reg.* V t. 418. — Japon, Chine.  $\frac{1}{2}$
- T. radicans** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 139 ; *Bot. Mag.* t. 485 ; Nuttall, *North Amer. Sylva* III t. 104. **BIGNONIA** — Linné, *Sp. Pl.* (1753) 624. — États-Unis.
3. **INCARVILLEA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 138 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5486. — Trois espèces de la Chine.
- I. compacta** Maximowicz in *Bull. Acad. St-Petersb.* XXVII (1881) 521. — Chine.
- I. Olgæ** Regel in *Gartenflora* XXIX (1880) 3 t. 1001 et *Pl. Nov. Fedschenk.* in *Mém. Soc. Amat. Sc. Nat. Moscou* XXXIV (1882) 62. — Turkestan. ②

## LX. ACANTHACÉES

1. **THUNBERGIA** Retzius, *Physiogr. Sällsk. Handb.* in *Act. Lund.* I (1776) 163; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5515. — Genre de 45 esp. de l'Afrique trop. et austr., de Madagascar et des rég. chaudes de l'Asie.

**T. fragrans** Roxburgh, *Pl. Corom.* I (1795) 47 t. 67 et *Fl. Ind.* III 33; *Bot. Mag.* t. 1881 (var. *LAEVIS* Hooker f.); Nees in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 57; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 390. — Asie trop., Australie bor.  $\mathfrak{h}$

**T. laurifolia** Lindley in *Gard. Chron.* (1856) 260; *Bot. Mag.* t. 4985; *Gartenflora* XIV t. 475; Kurz, *Forest Fl.* II 240; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 392. — Péninsule Malaise, îles Andaman.

**T. lutea** T. Anderson in *Journ. Linn. Soc. London* IX (1867) 448; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 392. **HEXACENTRIS** — Lindley in *Gard. Chron.* (1854) 151. — Sikkim.  $\mathfrak{h}$

**T. Mysorensis** T. Anderson in *Journ. Linn. Soc. London* IX (1867) 448; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 393. **HEXACENTRIS** — Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* III (1845) t. 871; *Bot. Mag.* t. 4786. — Nilghirris, Mysore.  $\mathfrak{h}$

2. **RUELLIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 114; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5529. — Environ 150 esp. de l'Amérique bor. et austr. et de l'Afrique trop. et austr.

**R. formosa** Andrews, *Bot. Repos.* X (1810) t. 610; *Bot. Mag.* t. 1400. **ARRHOSTOXYLUM** — Nees in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI (1847) 215 et in Martius, *Fl. Brasil.* IX (1847) 62. — Brésil.  $\mathfrak{h}$

**R. fulgida** Andrews, *Bot. Repos.* VIII (1808) t. 527. **ARRHOSTOXYLUM** — Nees in Martius, *Fl. Brasil.* IX (1847) 59 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 212. — Vénézuëla, Nouvelle-Grenade, Argentine.  $\mathfrak{h}$

**R. lilacina** Hooker in *Bot. Mag.* (1845) t. 4147; *Bot. Reg.* XXXII t. 13 et 45. **ARRHOSTOXYLUM** — Martius, *Fl. Brasil.* (1847) 59 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 212. — Vénézuëla, Nouvelle-Grenade, Argentine.  $\mathfrak{h}$

3. **STROBILANTHES** Blume, Bijdr. Fl. Nederl. Indie (1826) 781 et 796 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5554. — Genre de 180 esp. de l'Asie trop. et subtrop. (1 esp. dans l'Afrique trop.)

**S. Sabinianus** Nees in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* III (1832) 86 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 90 ; *Bot. Reg.* t. 1238 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 210 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 458. — Népal, Khasia.  $\frac{1}{2}$

**S. sessilis** Nees in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* III (1832) 85 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 177 ; *Bot. Mag.* t. 3902 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* IV t. 1511 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 452. — Nilghirris, Travancore.

4. **ACANTHUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 521 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5561. — Environ 15 esp. de l'Europe mérid., de l'Asie et de l'Afrique trop. et subtrop. et de l'Australie.

**A. Dioscoridis** Linné, *Amæn. Acad.* IV (1759) 321 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 521. — Arménie, Mésopotamie.  $\frac{1}{2}$

**A. hirsutus** Boissier, *Diagn. Pl. Or. ser. 1*, IV (1844) 86 et *Fl. Or.* IV 521. Asie Mineure, Rhodes.  $\frac{1}{2}$

**A. mollis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 639 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII t. 610 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 521. — Europe mér. et mér.-or., Afrique bor.  $\frac{1}{2}$

**A. spinosus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 639 ; *Bot. Mag.* t. 1808 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* VII t. 611 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 522. — Dalmatie, Grèce, Macédoine, Asie Mineure.  $\frac{1}{2}$

**A. Syriacus** Boissier, *Diagn. Pl. Or. ser. 1*, XI (1849) 135 et *Fl. Or.* IV 522. — Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie.  $\frac{1}{2}$

5. **BARLERIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 346 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5565. — Genre de 85 esp. de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique trop. et de l'Australie.

**B. cristata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 636 ; *Bot. Mag.* t. 1615 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* II t. 453 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 488. — Inde subtrop.  $\frac{1}{2}$

**B. flava** Jacquin, *Eclog. Pl.* I (1811-16) 67 t. 46 ; *Bot. Reg.* III t. 191 ; *Bot. Mag.* t. 4113 ; Nees in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 224. — Amérique mér.  $\frac{1}{2}$

6. APHELANDRA R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 475 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5592. — Cinquante-six esp. de  
l'Amérique trop. et subtrop.
- A. aurantiaca** Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 12 ; *Bot. Mag.* t. 1224 ;  
*Fl. des Serres* I t. 42 ; Nees in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 298.  
— Mexique.  $\frac{1}{2}$
- A. fascinator** Linden et André in *Illustr. Hort.* XXI (1874) 42 t. 164 ; Co-  
gniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* II (1874) t. 34. — Nouvelle-Grenade.
7. GEISSOMERIA Lindley, *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1045 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5593. — Dix esp. de la Jamaïque,  
du Brésil et de la Guyanne.
- G. longiflora** Lindley in *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1045 ; Reichenbach, *Fl.*  
*Exot.* t. 211 ; Nees in Martius, *Fl. Brasil.* IX (1847) 81 et in De Candolle,  
*Prodr. Regn. Veget.* XI 288. — Brésil.  $\frac{1}{2}$
8. JUSTICIA Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 12 ; T. Durand, *Gen.*  
*Pl.* n. 5593. — Dix esp. de la Jamaïque, de la Guyanne et  
du Brésil.
- J. carnea** Lindley in *Bot. Reg.* XVII (1831) t. 1397 ; *Bot. Mag.* t. 3383.  
CYRTANTHERA MAGNIFICA Nees in Martius, *Fl. Brasil.* IX (1847) 100 t. XIV  
et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI (1847) 328 var. MINOR Nees, *loc.*  
*cit.* XI (1847) 329. — Brésil.  $\frac{1}{2}$
9. BELOPERONE Nees in Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* III (1832)  
76 et 102 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5616. — Environ 35 esp.  
de l'Amérique trop.
- B. violacea** Planchon et Linden, *Hort. Linden.* I (1859) 5 t. 3 ; *Bot. Mag.*  
t. 5344 ; Galeotti in *Journ. Hort. Prat.* II 263 t. 23. — Mexique.
10. JACOBINIA Moricand, *Pl. Nouv. Amér.* (1846) 156 t. 92 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5625. — Environ 30 esp. de l'Amé-  
rique trop. du Mexique au Brésil et à la Bolivie.
- J. sericea** Nees in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI (1847) 332. JUS-  
TICIA — Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* I (1798) 9 t. 9. — Équateur,  
Pérou.  $\frac{1}{2}$

11. **THYRSACANTHUS** Nees in Martius, Fl. Brasil. IX (1847) 93 et 97 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5636. — Genre d'environ 20 esp. de l'Amérique trop.

**T. rutilans** Planchon et Linden in *Fl. des Serres* VII (1851-52) 241 t. 732 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III 76 cum icone ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* XV (1865) 97 t. 7-8. — Colombie. ʒ

12. **DICLIPTERA** Jussieu in Ann. Mus. Paris IX (1807) 267 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5640. — Genre de 60 esp. environ des rég. trop. et subtrop. des deux hémisphères, du Japon et de l'Afrique austr.

**D. cuneata** Nees in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* III (1832) 111 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 481 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 1352 ; C.-B. Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 532. — Inde (Madras).

13. **HYPOESTES** R. Brown, Prodr. Fl. N.-Holl. (1810) 474 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5643. — Environ 20 esp. de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie trop. et de l'Afrique austr.

**H. sanguinolenta** Hooker in *Bot. Mag.* (1865) t. 5311 ; Ed. Morren, *Belg. Hort.* XV (1865) 290 t. 19. — Madagascar.

## LXI. MYOPORINÉES

1. **EREMOPHYLA** R. Brown, Prodr. Fl. N.-Holl. (1810) 518 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5648. — Quarante esp. de l'Australie.

**E. viscida** Endlicher in *Ann. Wien. Mus.* II (1838) 203 et *Nov. Stirp. Decas* VI (1839) 51 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 712 ; Bentham, *Fl. Austral.* V 26. — Australie occ. h

## LXII. SELAGINÉES

1. **HEBENSTREITIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 874 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5651. — Vingt esp. de l'Afrique austr. et trop.-or.

**H. dentata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 629 ; *Bot. Mag.* t. 483 ; Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 3. — Cap de Bonne-Espérance. ʒ

## LXIII. GLOBULARIÉES

1. GLOBULARIA Linné, Hort. Cliff. (1737) 490 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5659. — Environ 13 esp. de la Rég. Médit., (Europe, Asie et Afrique) et de l'Europe centr. et occ.
- G. spinosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 96 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 612 ; Willkomm, *Globul.* t. 1 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 383. — Espagne mér., îles Baléares. ♀

## LXIV. VERBÉNACÉES

1. LANTANA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 515 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5679. — Genre d'environ 50 esp. bien distinctes habitant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique trop. et subtrop.
- L. Camara** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 627 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 540 ; Bot. Mag. t. 96 ; Schauer in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 598 ; E. Morren, *Belg. Hort.* XVIII (1868) 147 t. 10. — Amérique trop., ailleurs naturalisé. ♂
2. LIPPIA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 870 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5680. — Environ 90 esp. habitant les rég. les plus chaudes du globe, surtout en Amérique.
- L. citriodora** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* II (1817) 269 ; Schauer in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 573. **VERBENA TRI-PHYLLA** L'Héritier, *Stirp. Novæ* I (1784) 21 t. 11. — Pérou, Chili. ♂
3. CLERODENDRON Linné, Gen. Pl. (1737) n. 517 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5712. — Environ 70 esp. habitant les rég. les plus chaudes du globe.
- C. fallax** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) sub t. 19 ; Schauer in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 166. **C. SPECIOSISSIMUS** Paxton, *Mag. of Bot.* III (1837) 217 et 271 cum icone. — Java. ♂
- C. splendens** G. Don in *Edinb. New Philos. Journ.* XI (1824) 349 ; Bot. Reg. XXVIII t. 7 ; Paxton, *Mag. of Bot.* IX 103 cum icone ; Schauer in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XI 662. — Sierra-Leone. ♂



## LXV. LABIÉES

1. LAVANDULA Linné, Gen. Pl. ed. VI (1764) n. 711 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5746. — Environ 20 esp. habitant toute la Rég. Méditerran., l'Asie occ. et l'Inde.

**L. lanata** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 72 et *Voy. Bot. Esp.* 478 t. 133 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 146 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 392. — Espagne (Grenade). ‡

2. POGOSTEMON Desfontaines in Mém. Mus. Paris II (1815) 154 t. 6 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5747. — Genre de 32 esp. habitant l'Inde, l'archipel Malais et le Japon.

**P. Patchouli** Pelletier in *Mém. Soc. Scienc. Orléans* V (1844) 6 t. VII ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 153 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 633. **P. HEYNEANUS** Bentham in Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* I (1830) 31 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* IV t. 1440. — Inde (part. occ.), Sumatra et Bornéo (cult. ?). ‡

3. ORIGANUM Linné, Gen. Pl. (1737) n. 471 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5767. — Trente esp. habitant l'Europe mérid., l'Asie extratrop., l'Afrique bor. et les îles Canaries.

**O. Dictamnus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 589 ; *Bot. Mag.* t. 298 ; Woodville et Hooker, *Medical Bot.* II t. 120 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 547. — Crète. ‡ (℥ Boissier).

**O. pulchellum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 9 et *Fl. Or.* IV 547. — Orient. ℥

4. THYMUS Linné, Gen. Pl. (1737) n. 468 pr. p. ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5766. — Plus de 100 esp. décrites, mais 40 seulement bien distinctes, habitant surtout la Rég. Méditerr. ; peu d'esp. disséminées dans le reste de l'Europe, l'Asie temp., l'Abyssinie et les îles Canaries.

**T. serpyllodes** Bory, *Fl. Sierra-Nevada* in *Annal. Gen. Sc. Phys. Bruxelles* III (1820) n. 154 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 406. **T. AUGUSTIFOLIUS** Persoon, var. **NEVADENSIS** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 159 et *Voy. Bot. Esp.* 490. — Espagne. ℥

5. **SATUREJA** Linné, *Gen. Pl.* ed. III (1764) n. 707 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5770. — Quinze esp. de la Rég. Méditerran. et de la Floride.
- S. spieigera** C. Koch in *Linnaea* XVII (1843) 295 (sub *MICROMERIA*) ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 221 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 566. — Pont infér., Colchide, Imérétie.  $\frac{1}{2}$  ?,  $\frac{1}{2}$
6. **HYSSOPUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 470 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5771. — Genre monotype, mais à formes nombreuses.
- H. officinalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 569 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 254 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1259 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 584. — Europe mér. et or., Afrique bor., Asie occ. et centr. (ailleurs naturalisé).  $\frac{1}{2}$
- — var. **angustifolius** BENTHAM in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 252. **H. ANGUSTIFOLIUS** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 38. — Tauride, Géorgie.
7. **MICROMERIA** Benth. in *Bot. Reg.* XV (1829) sub t. 1282 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5773. — Genre de 60 esp. de la Rég. Méditerran., de l'Europe et de l'Asie occ., de l'Afrique trop. et de l'Amérique bor.-occ. et austr.
- M. Croatica** Schott in *Österr. Bot. Wochenbl.* VII (1857) 93. **THYMUS** — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 130. **CALAMINTHA** — Host, *Fl. Austr.* II (1831) 132. **M. PIPERELLA** Waldstein et Kitaibel (non Allioni), *Icon. et Descr. Pl. Hung.* II (1805) 160 t. 136. — Croatie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Serbie.  $\frac{1}{2}$
- M. Douglasii** Benth., *Labi. Gen. et Sp.* (1834) 372 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 223 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 1, 359. **THYMUS** — Benth. in *Linnaea* VI (1831) 80. — États-Unis bor.-occ.  $\frac{1}{2}$
- M. Piperella** Benth., *Labi. Gen. et Sp.* (1834) 379 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 221 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 32. **THYMUS** — Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 21 t. 37. — Ligurie, Piémont.  $\frac{1}{2}$
- M. rupestris** Benth. in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 225. **SATUREJA** — Wulfen in Jacquin, *Collect. Bot.* II (1788) 130 et *Icon. Pl. Rar.* III t. 494. **CALAMINTHA** — Host, *Fl. Austr.* II (1831) 131. — Europe centr.-or. (de la Dalmatie à la Serbie.)  $\frac{1}{2}$
- M. thymoides** De Notaris, *Prosp. Fl. Ligust.* (1848) 54. Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 219 ; Parlatore, *Fl. Ital.* VI 118. **SATUREJA** — Nyman, *Syll. Fl. Europ.* (1854) 102. — Ligurie.  $\frac{1}{2}$

8. **CALAMINTHA** Moench, *Method. Fl. Marb.* (1794) 408 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5780. — Environ 40 esp. de la rég. temp. de l'hémisphère bor.
- C. Corsica** Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 231. **THYMUS** — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 133 ; Loiseleur, *Fl. Gall.* t. 9. **MELISSA MACROPHYLLA** Benth., *Labi. Gen. et Sp.* (1834) 390. — Corse, Sardaigne. ♀
9. **SALVIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 16 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5793. — Environ 450 esp. décrites des rég. temp. et chaudes des deux hémisphères.
- S. argentea** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 38 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* I t. 27 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1247 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 618 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 424. — Europe, Asie et Afrique méd. ♀
- S. Bethelli** Aug. Van Geert, *Catalog.* n. 78 (1879-80) 18.  
— Obs. Nous ne savons pas d'où cette espèce est originaire, ni si elle a été décrite.
- S. cacaliæfolia** Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII (1848) 348 ; *Bot. Mag.* t. 5274 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* XII (1862) 99 t. 8 ; Planchon in *Fl. des Serres* XXII (1878) 99 t. 2318. — Mexique austr.
- S. candelabrum** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hisp.* (1838) 72 et *Voy. Bot. Esp.* 480 t. 136 ; *Bot. Mag.* t. 5017 ; Van Houtte, *Fl. des Serres* XIII t. 1344 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 420. — Espagne (Grenade). ♂
- S. coccinea** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 88 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 343 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* I 368 ; C. Morren in *Belg. Hort.* IX t. 5 (var. **MAJOR**) ; Regel in *Gartenflora* VII t. 232 (var. **MAJOR**). — Amérique bor.-subtrop. et austr. trop.
- S. patens** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* V (1799) 33 t. 454 ; *Bot. Mag.* t. 3808 ; *Bot. Reg.* XXV t. 33 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 348. — Mexique. ♀
- S. rutilans** Carrière in *Rev. Hort.* (1873) 251 cum icone. Hab. ? ♀
- S. splendens** Sellow in Schultes, *Mant. Pl.* I (1822) 185 ; *Bot. Reg.* VIII t. 687 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1089 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 330. — Brésil. ♂
- S. triangularis** Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* (1794) 96 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 351. **S. TENUIFOLIA** Burchell in Benth., *Labi. Gen. et Sp.* (1833) 304. — Cap de Bonne-Espérance.

10. **NEPETA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 474 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5802. — Environ 130 esp. de l'hémisphère bor. (Afrique austr., introd.).

**N. macrantha** Fischer ex BENTHAM, *Labiât. Gen. et Sp.* (1834) 482 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 387. **DRACOCEPHALUM SIBIRICUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 830 ; Pallas, *Fl. Ross.* III t. 13 ; *Bot. Mag.* t. 2185. — Sibérie altaïque. ♀

**N. Nepetella** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 797 ; Allioni, *Fl. Pedem.* I 37 t. 2 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1243 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 383 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 674. — Espagne, France mér. et or., Suisse, Italie. ♀

11. **DRACOCEPHALUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 481 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5803. — Environ 30 esp. de l'Europe, de la Rég. Méditerran. et de l'Asie extratrop.

**D. Austriacum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 595 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 112 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1240 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 403 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 673. — Pyrénées, Provence, Dauphiné, Europe centr. et mér.-or., Asie occ. ♀

**D. grandiflorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 595 ; *Bot. Mag.* t. 1009 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 180 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 385 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 399. — Sibérie. ♀

**D. integrifolium** Bunge in LEDEBOUR, *Fl. Altaïca* II (1830) 387 ; Ledebour, *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 120 et *Fl. Ross.* III 386 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 400. — Sibérie alt., Daourie.

**D. Ruyschiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 595 ; Regel in *Gartenflora* (1861) t. 317 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1240 ; Benthams in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 402 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 673. **D. ARGUENSE** Fischer ex Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* II (1822) 118. — Europe bor. et mont., Caucase, Sibérie, Japon. ♀

**D. speciosum** Benthams in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* II (1831) 65 et in De Candolle *Prodr. Regn. Veget.* XII 399 ; *Bot. Mag.* t. 6281. — Himalaya (du Sikkim à Simla). ♀

12. **CEDRONELLA** Moench, *Method. Pl. Marb.* (1794) 411 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5805. — Quatre esp. des Canaries, de l'Amérique bor. et du Mexique.

**C. cana** Hooker in *Bot. Mag.* (1851) t. 4618 ; C. Morren in *Belg. Hort.* II (1852) 341 t. 58 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 218. **C. MEXICANA** Benthams, var. **CANA** A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 1 (1878) 377. — Arizona, Nouveau-Mexique, Mexique. ♀

13. **SCUTELLARIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 493 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5810. — Environ 100 esp. des rég. temp. et trop.-mont. des deux hémisphères.

**S. Mociniana** Benth., *Labiata. Gen. et Sp.* (1834) 442 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 430 ; Lemaire in *Illustr. Hort.* XV (1868) t. 362 ; *Rev. Hort.* (1872) 350 cum icone. — Mexique, Costa-Rica. ♀

**S. Orientalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 598 ; *Bot. Mag.* t. 2120 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1258 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 443 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 682. — Europe mér. et mér.-or., Asie occ., centr. et bor.-occ. ♀

**S. tuberosa** Benth., *Labiata. Gen. et Sp.* (1834) 441 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 429 ; A. Gray, *Syn. Fl. N.-Amer.* II 1, 381. — Californie.

14. **MARRUBIUM** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 473 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5821. — Trente-trois esp. de l'Europe, de l'Asie extratrop. et de l'Afrique bor.

**M. peregrinum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 582 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1224 et *Pl. Crit.* IV t. 312 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 452 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 694. **M. PANNONICUM** Reichenbach, *Fl. Excurs.* (1830-32) 325. — De la Moravie à la Russie mér., Asie Mineure, Caucase. ♀

15. **STACHYS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 435 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5829. — Plus de 200 esp. décrites, mais 170 seulement bien distinctes, des rég. froides, temp. et mont.-trop. des deux hémisphères.

**S. candida** Bory et Chaubard, *Expéd. Scient. Morée* (1832) 167 t. 19 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 473 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 742. — Péloponèse, Macédoine, Céphalonie. ♀

**S. circinnata** L'Héritier, *Stirp. Nov.* I (1784-85) 51 t. 26 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 474 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 442. — Espagne mér., Afrique bor. ♂ ♀

**S. Corsica** Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 36 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* VII 24 t. 646 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 463. — Corse, Sardaigne. ☉

**S. lanata** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I (1781-86) 11 t. 107 ; Pallas, *Fl. Ross.* III t. 9 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1216 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 463 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 718. — Caucase, Thrace, Hongrie (ailleurs natur.). ♀

**Stachys lavandulæfolia** Vahl, *Symb. Bot.* I (1790) 42 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 489 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 743. **SIDERITIS CALYCANTHA** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 393 ; Reichenbach, *Icon. Pl. Rar.* I (1823) 17 t. XV. — Caucase. ♀

**S. longifolia** Bentham, *Labiât. Gen. et Sp.* (1834) 533 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 461. **BETONICA ORIENTALIS** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 573 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 750. — Caucase, Arménie turque. ♀

**S. oblongifolia** Bentham in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* I (1830) 64 ; Bentham, *Labiât. Gen. et Sp.* 545 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 474 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* IV 676. — Bengale, Assam, Silhet. ♀

16. **LAMIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 488 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5833. — Environ 40 esp. de l'Europe, de l'Afrique bor. et de l'Asie extratrop.

**L. veronicæfolium** Bentham, *Labiât. Gen. et Sp.* (1834) 540 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 505 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 758. — Grèce, Bithynie. ♀

17. **BALLOTA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 486 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5836. — Environ 25 esp. de la Rég. Médit. ; une esp. de l'Europe et de l'Asie temp. et une de l'Afrique austr.

**B. spinosa** Link, *Handb. zu Erk. nutz. Gewächse* I (1829) 475 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 84 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1249 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 521. — Piémont, Provence. ♂

18. **PHLOMIS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 491 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 5842. — Genre d'environ 45 esp. de la Rég. Médit. et de l'Asie temp.

**P. crinita** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* III (1794) 25 t. 247 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 538 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 448. **P. BILOBA** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1800) 25 t. 127. — Espagne, Algérie ♀

**P. pratensis** Karelin et Kirilow in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* XV (1842) 426 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 544. — Monts Altaï. ♀

**P. purpurea** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 585 ; Smith, *Spicil. Bot.* t. 7 ; Rœmer, *Fl. Europ.* 7 t. 5 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 448. — Espagne, Portugal. ♂

**P. viscosa** Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 274 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 540 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 788. **P. VIRENS** De Candolle, *Cat. Hort. Monspel.* (1813) 132. — Égypte, Syrie, Asie Min. ♂

19. **EREMOSTACHYS** Bunge in Ledebour, *Fl. Altaica* II (1830) 414 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 5844. — Environ 40 esp. de l'Asie occ. et centr.

**E. sanguinea** Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V (1853-57) 13. Hab. ?

20. **TEUCRIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 467 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 5864. — Environ 100 esp. des rég. temp. et chaudes des deux hémisphères.

**T. Arduini** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 81 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 582. — Dalmatie, Bulgarie. ♀

**T. Marum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 564 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* VI t. 41 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVIII t. 1236 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 589. — Europe mér. (de l'Espagne à la Dalmatie). ♀

**T. Pseudo-Chamæpitys** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 562 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 580 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 468. — Portugal, Espagne, Provence. ♀

**T. Pyrenaicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 566 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1387 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XII 580 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* II 712 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 475. — Espagne, Pyrénées, Dauphiné. ♀

## LXVI. PLANTAGINÉES

1. **PLANTAGO** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 77 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 5867. — Genre de 200 esp. représenté dans le monde entier.

**P. monosperma** Pourret in *Act. Acad. Toul.* sér. 1, III (1783) 325 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XVII t. 1134 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 718 ; Grenier et Godron, *Fl. de France* II 730 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 353. — Pyrénées franç. et esp. ♀

**P. nivalis** Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 533 t. 156 ; Bentham in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 718 ; Jordan, *Obs. Pl. France* III t. 10 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* II 353. — Espagne (Grenade). ♀

## LXVII. NYCTAGINÉES

1. BOUGAINVILLEA Commerson ex Jussieu, Gen. Pl. (1789) 91 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5880. — Sept ou huit esp. de l'Amérique austro-trop. et subtrop.

**B. glabra** Choisy in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 2 (1849) 437. — Brésil.  $\mathfrak{h}$

**B. spectabilis** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 348 ; *Bot. Mag.* t. 4811 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XII t. 51 ; Choisy in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 2, 437. — Brésil.  $\mathfrak{h}$

## LXIII. AMARANTACÉES

1. ACHYRANTHES Linné, Gen. Pl. (1737) n. 94 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 5947. — Genre d'une douzaine d'esp. des rég. chaudes et trop. des deux hémisphères.

**A. argentea** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 545 et *Pl. Bot. Encycl.* t. 166 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* III t. 244 ; Moquin in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 2, 314. — Sicile, Sardaigne, Afrique bor., occ. et austr., Ceylan.  $\mathfrak{h}$

## LXIX. PHYTOLACCACÉES

1. RIVINA Linné, Gen. Pl. (1737) n. 86 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6048. — Cinq esp. décrites (mais peut-être formes d'une même esp.) habitant l'Amérique trop. et subtrop., ailleurs naturalisées.

**R. humilis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 121 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 81 ; *Bot. Mag.* t. 1781 ; Schnizlein, *Icon. Fam. Natur.* t. 208. — Amérique trop. et subtrop. (natur. dans l'ancien monde).  $\mathfrak{h}$

— — var. **canescens** MOQUIN in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XIII 2 (1849) 13 — Avec le type.



## LXX. POLYGONÉES

1. **ERIOGONUM** Richard in Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 246 t. 24 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6070. — Genre de 120 esp. des États-Unis et du Mexique.

**E. nudum** Douglas ex BENTHAM in *Trans. Linn. Soc.* XVII (1837) 413 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 13 ; Watson, *Bot. of Calif.* II 27. **E. auriculatum** Benth. in *Trans. Linn. Soc. London* XVII (1837) 412. — Californie.

**E. racemosum** Nuttall in *Journ. Acad. Scienc. Philad.* new ser. I (1847) 161 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 15. — Montagnes Rocheuses. ♀ ?

**E. umbellatum** Torrey in *Ann. Lyc. Nat. Hist. N.-York* II (1828) 241 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 134 t. 177 ; Benth. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 11. — Montagnes Rocheuses, Grand Lac Salé. ♀

2. **POLYGONUM** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 495 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6084. — Genre de 200 esp. environ disséminées presque dans le monde entier.

**P. affine** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 70 ; Royle, *Illustr. Himal. Pl.* 317 t. 80 fig. 3 ; *Bot. Mag.* t. 6472 ; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* V (1886) 33. — Nepal, Kumaon, Tibet. ♀

**P. vacciniifolium** Wallich, *Catal.* (1829) n. 1695 ; Royle, *Illustr. Himal. Pl.* 317 t. 80 fig. 2 ; *Bot. Mag.* t. 4622 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V (1886) 33. — Himalaya, Tibet.

3. **RHEUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 339 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6086. — Genre de 20 esp. habitant l'Himalaya et l'Asie centr. et or.

**R. nobile** Hooker f. et Thomson in HOOKER F., *Illustr. Himal. Pl.* (1855) t. 49 ; *Illustr. Hort.* XXII (1875) t. 219 ; *Fl. des Serres* XII t. 1270 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V (1886) 57. — Sikkim. ♀

**R. Ribes** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 372 ; Desfontaines in *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, II t. 49 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V t. 470 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1003. — Perse austr., Kurdistan, Palestine. ♀

4. **MUEHLENBECKIA** Meisner, *Plant. Vasc. Gen.* (1840) 316 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6090. — Quinze esp. environ habi-  
tant l'Amérique austr., extratrop. et andine, l'Australie, la  
Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique.

**M. complexa** Meisner, *Plant. Vasc. Gen.* II (1840) 227 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 147. **POLYGONUM** — A. Cunningham, *Fl. Ins. Nov. Zeland. Precursor* in *Ann. Nat. Hist. London* I (1838) 455 ; Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* I (1854) 210 et *Handb. N.-Zeal. Fl.* 236. — Nouvelle-Zélande.  $\mathfrak{h}$

## LXXI. NEPENTHACÉES

1. **NEPENTHES** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 690 ; T. Durand,  
*Ind. Gen.* n. 6123. — Genre d'une trentaine d'esp. habitant  
l'Asie et l'Australie trop., les îles Seychelles et Madagascar.

**N. bicalcarata** Hooker f. in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XVII  
(1873) 97 et in *Proceed. of the Linn. Soc. London* (1875-80) LIII ; *Garten-  
flora* XXX (1881) 152 icône. — Bornéo, Sumatra.

**N. Chelsoni** Veitch, *Catal.* (1876) 40 ; *Gartenflora* XXIV (1875) 60 et fig.  
— Hybr. des **N. DOMINI** et **HOOKERI**.

**N. distillatoria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 955 ; *Bot. Mag.* t. 2798 ;  
Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 60 ; Hooker f. in De Candolle, *Prodr. Regn.  
Veget.* XVII 93 et *Fl. Brit. Ind.* V 68. — Ceylan.  $\mathfrak{h}$

**N. gracilis** Korthals in TEMMINCK, *Verhandl. Natur. Geschied. d. Nederl.*  
(1839-42) t. 4 ; Spach, *Hist. des Veget.* (atlas) t. 144 ; Hooker f. in *Trans.  
Linn. Soc.* XXII t. 74 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 104 et  
*Fl. Brit. Ind.* V 71. — Malaisie, Singapore, Sumatra, Bornéo.  $\mathfrak{h}$

**N. Hookeriana** Veitch, *Catal.* (1874) 42 ; *Illustr. Hort.* sér. 6, I (1894)  
142 fig. 29.

**N. Mastersiana** Veitch, *Catal.* (1886) 88 cum icône ; *Gardeners'Chron.*  
XVI (1881) 748 fig. 148 et XXI (1884) 249 fig. 48. — Hybride des **N. SAN-  
GUINEA** et **KHASIANA**.

**N. phyllamphora** Willdenow, *Sp. Pl.* IV 2 (1806) 874 ; *Bot. Mag.* t. 2629 ;  
*Gartenflora* XXX (1881) 374 icône ; Miquel, *Ill. Fl. Insul. Archip.* III t. 2  
et V t. 6 ; Hooker f. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 97 et *Fl.  
Brit. Ind.* V 69 ; Beccari, *Malesia* III (1886) 11. — Malacca, archipel Malais,  
Nouvelle-Guinée, Chine austr.  $\mathfrak{h}$

- Nepenthes Rafflesiana** Jack in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* I (1835) 270 ; *Bot. Mag.* t. 4285 ; *Fl. des Serres* III t. 213 et 214 ; *Belg. Hort.* V t. 13 ; *Gartenflora* XXIII (1874) 211 cum icone ; Hooker f. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 96 et *Fl. Brit. Ind.* V 69 ; Beccari, *Malesia* III (1886) 10. N. HOOKERI Alphonse, *Promen. dans Paris* cum icone (ex Hooker f., *loc. cit.*). — Singapore, Sumatra, Bornéo.
- N. Ratcliffiana** Veitch, *Catal.* (1882) ; *Gardeners'Chron.* (1882) I 178 fig. 28. — Hybride des N. PHYLLAMPHORA et HOOKERI.
- N. robusta** Williams, *Catal.* (1880) ; *Gardeners'Chron.* (1880) II 40 fig. 11. — Hybr. des N. HOOKERI et PHYLLAMPHORA.
- N. Teysmanniana** Miquel, *Fl. Ind. Batav.* I 1 (1855) 1073 et *Journ. Bot. Inde Neerl.* I (1861) t. 1 ; Hooker f. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 104. N. LEVIS Ed. Morren in *Belg. Hort.* II (1852) 234 t. 40. — Sumatra, Bornéo. f

## LXXII. ARISTOLOCHIÉES

1. **ASARUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 385 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6131. — Treize esp. de l'Europe, de l'Asie temp. et de l'Amérique bor.
- A. Canadense** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 442 ; Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 279 ; *Bot. Mag.* t. 2769 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 889 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 1, 423. — Canada, États-Unis. 2
- A. caudatum** Lindley in *Bot. Reg.* XVII (1831) sub t. 1399 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 102. A. HOOKERI Fielding in Fielding et Gardner, *Sert. Pl.* (1844) t. 32 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 424. — Californie. 2
- A. Lemmonii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 294 et *Bot. of Calif.* II 102. — Californie. 2
- A. Virginicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 442 ; Sweet, *Brit. Fl. Gard.* I t. 18 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 426. — Virginie, Caroline. 2
2. **ARISTOLOCHIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 693 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6135. — Genre de 200 esp. disséminées dans les rég. temp. et chaudes du monde entier.
- A. Brasiliensis** Martius et Zuccarini, *Nov. Gen. et Sp. Pl. Brasil.* I (1824) 77 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 471. A. ORNITHOCEPHALA Hooker in *Bot. Mag.* (1844) t. 4120. — Brésil. f

**Aristolochia elegans** Masters in *Gard. Chron.* (1885) II 301; *The Garden* XXIX t. 549. — Brésil.

**A. gigas** Lindley in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) misc. 51 t. 60; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 472. — Brésil.  $\frac{1}{2}$

**A. Maurorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1363; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 492; Boissier, *Fl. Or.* IV 1080. A. AUCHERI Jaubert et Spach, *Ill. Pl. Or.* III (1843) t. 99. — Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie, Perse.  $\frac{1}{2}$

**A. ridicula** N.-E. Brown in *Gard. Chron.* (1886) II 360 t. 73. — Brésil.

**A. rotunda** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 962; Nees, *Pl. Officin.* t. 145; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 64; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 671; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 487; Boissier, *Fl. Or.* IV 1077. — Europe mér., Afrique bor., Asie Mineure.  $\frac{1}{2}$

**A. Serpentaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 961; Jacquin, *Hort. Schænbr.* III t. 385; Nees, *Pl. Officin.* t. 143; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 433; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 445. — États-Unis (bassin de l'Atlantique).  $\frac{1}{2}$

**A. Siphon** L'Héritier, *Stirp. Novæ* (1784-85) 13 t. 7<sup>b</sup>; *Bot. Mag.* t. 534; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* IV t. 10; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV, I 435. SIPHISA — Klotzsch in *Monatsbericht K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* (1859) 602. — États-Unis (du Kentucky à la Georgie).  $\frac{1}{2}$

**A. tricaudata** Duchartre in *Illustr. Hort.* XII (1865) misc. 49 et XIII (1866) t. 523; *Bot. Mag.* t. 6067. — Mexique austr.

### LXXIII. PIPÉRACÉES

1. SAURURUS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 307; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6137. — Deux esp. de l'Amérique bor. et de l'Asie or.

**S. cernuus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 341; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 276; Schnizlein, *Icon. Fam. Natur.* t. 82; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 238; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 446. — Du Canada à la Louisiane.  $\frac{1}{2}$

**S. Loureiri** Decaisne in *Annal. Sc. Natur.* sér. 3, III (1845) 102; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 239. — Chine, Japon.

2. **PIPER** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 832 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6141. — Plus de 650 esp. décrites, habitant les régions chaudes du monde entier.

**P. argyrophyllum** Miquel, *Syst. Piperac.* (1843) 330 et *Illustr. Piperac.* (1844) t. 56 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* t. 1941 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 364 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 93. — Deccan, Ceylan.  $\frac{1}{2}$

**P. maculatum** Blume in *Verhandl. d. Bot. Genootsch.* XI (1826) 199 fig. 20 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 347. — Java.  $\frac{1}{2}$

**P. nigrum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 28 ; *Bot. Mag.* t. 3139 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* VI t. 1934 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 365 bis ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 90. — Ceylan, Bornéo, Luçon, Sumatra, Java (ailleurs natur.).  $\frac{1}{2}$

**P. peltatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 30 ; Descourtilz, *Fl. Médic. Antilles* IV t. 236 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 332. — Des Antilles et du Costa-Rica au Pérou.  $\frac{1}{2}$

**P. velutinum** Kunth in HUMBOLDT et BONPLAND, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 32 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 316. — Mexique, Pérou.  $\frac{1}{2}$

3. **PEPEROMIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Prodr.* (1794) 8 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6145. — Genre de 400 esp. environ des rég. chaudes du monde entier.

**P. amplexifolia** A. Dietrich, *Syn. Pl.* I (1839) 145 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 426. **PIPER** — Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 38. — Jamaïque.  $\frac{1}{2}$

**P. arifolia** Miquel, *Syst. Piperac.* (1843) 72 et *Illustr. Piperac.* t. 4 ; Endlicher, *Fl. Brasil.* 11 t. 2 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 400. — Brésil.  $\odot$

**P. blanda** Kunth in HUMBOLDT et BONPLAND, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 67 t. 13 ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 27 ; Endlicher, *Fl. Brasil.* 11 t. 2 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 458. **PIPER** — Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1876) t. 218. — Amérique trop. (du Mexique au Vénézuéla).  $\odot$

**P. magnoliæfolia** C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I (1869) 427. **PIPER** — Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786) t. 213 ; Jardine, *Ann. of Nat. Hist.* II 11 t. 14. — Antilles, Mexique, Costa-Rica, Vénézuéla, Guyane.  $\frac{1}{2}$

**P. nummularifolia** Kunth in HUMBOLDT et BONPLAND, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 66 ; De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 420. — Du Mexique et des Antilles à l'Equateur et au Brésil.  $\textcircled{1}$

- Peperomia obtusifolia** C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I (1869) 429. PIPER — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 42. P. CUNEIFOLIUM Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786) t. 214. — Antilles, Vénézuéla. ☉
- var. **clusiæfolia** C. DE CANDOLLE, *loc. cit.* XVI, I (1869) 429. PIPER CLUSIÆFOLIUM Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786) t. 212. — Cette var. n'a été observée que dans les serres.
- P. pereskiaefolia** Kunth, *Syn. Pl. Æquinoct.* I (1822) 220 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 453. PIPER — Jacquin, *Collect. Bot.* IV (1790) 128 et *Icon. Pl. Rar.* II t. 219. P. RUBRICAULE Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 39. — Vénézuéla, Pérou, Brésil. h
- P. pulchella** A. Dietrich, *Syn. Pl.* I (1839) 177 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 462. PEPEROMIA VERTICILLATA Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 43. — Jamaïque, Cuba, îles Sandwich.
- P. reflexa** A. Dietrich, *Syn. Pl.* I (1839) 180 ; Miquel, *Syst. Piperac.* 169 et in Martius, *Fl. Brasil.* IV, I 17 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* VI t. 1933 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 452 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 99. — Rég. trop. et subtrop. du monde entier. ☉
- var. **valantoides** C. DE CANDOLLE, *loc. cit.* XVI, I (1869) 452. P. VALANTOIDES Miquel, *Syst. Piperac.* (1843) 174 et in *Linnea* XX 126 t. 1. PEPEROMIA QUADRIFOLIA Vellozo, *Fl. Flumin.* (1790) t. 61. — Australie, Brésil.
- P. Riedeliana** Regel, *Catal. Hort. Petrop.* (1858) 35 et in *Gartenflora* (1859) 229 t. 265 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I 423. — Brésil. (4)

## LXXIV. LAURINÉES

1. **LINDERA** Thunberg, *Diss. Nov. Gen.* III (1783) 64 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6212. — Environ 60 esp. de l'Asie trop. et or. et de l'Amérique bor.
- L. Benzoin** Meisner in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XVI, I (1864) 244. LAURUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 370 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 110 ; Barton, *Veget. Mater. Medic. Unit. Stat.* t. 33 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 447. — Du Canada à la Floride. h

## LXXV. PROTÉACÉES

1. **MACADAMIA** F. Mueller in *Trans. Phil. Inst. Victoria* II (1857) 72 cum icone ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6247. — Une ou deux esp. de l'Australie or.
- M. ternifolia** F. Mueller in *Trans. Philos. Inst. Victoria* II (1857) 72 cum icone ; Benthams, *Fl. Austral.* V 406. HELICIA — F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* II (1860) 91 et VI 191. — Nouvelle-Galles du Sud, Queensland. h

2. GREVILLEA R. Brown in Trans. Linn. Soc. X (1810) 167 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6255. — Genre de plus de 160 esp. de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie.

**G. robusta** A. Cunningham in R. BROWN, *Proteac. Nov.* (1830) 24 ; *Bot. Mag.* t. 3184 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 381 ; Bentham, *Fl. Austral.* V 459. — Nouvelle-Galles du Sud, Queensland.  $\frac{1}{2}$

3. HAKEA Schrader, Sert. Hannov. I 3 (1797) 27 t. 17 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6257. — Genre de 100 esp. de l'Australie.

**H. suaveolens** R. Brown in Trans. Linn. Soc. X (1810) 182 et *Prodr. Fl. N. Holl.* 383 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 403 ; Bentham, *Fl. Austral.* V 531. **H. PECTINATA** Colla in *Mem. Accad. Torin.* XXXI (1827) 320 t. 11. — Australie occ.  $\frac{1}{2}$

## LXXVI. THYMELÆACÉES

1. PIMELEA Banks in Gærtner, De Fruct. et Sem. I (1788) 186 t. 39 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6269. — Genre de 76 esp. de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

**P. ferruginea** Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* I (1804) 10 t. 5 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI 10. **P. DECUSSATA** R. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 360 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1283 ; Sweet, *Fl. Austral.* t. 8 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 502. — Australie occ.  $\frac{1}{2}$

2. DAPHNE Linné, Gen. Pl. (1737) n. 311 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6271. — Environ 80 esp. habitant l'Europe et l'Asie temp. et subtrop.

**D. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 356 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 66 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI 14 t. 553 ; *Gartenflora* (1863) t. 409 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 532. — Rég. Méditerran., Himalaya.  $\frac{1}{2}$

**D. Altaica** Pallas, *Fl. Ross.* I (1784) 53 t. 35 ; *Bot. Mag.* t. 1875 ; *Gartenflora* (1863) t. 409 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 548 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 531. — Sibérie altaïque.  $\frac{1}{2}$

**D. Blagayana** Freyer in *Flora* XXI (1838) 176 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 555 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 537 ; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 534. — Carniole.  $\frac{1}{2}$

- Daphne Cneorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 357; *Bot. Mag.* t. 343; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 554; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* I t. 10; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 532. — Europe mérid., centr. et or. (de l'Espagne à la Russie mérid.-or.).  $\frac{1}{2}$
- D. Mezereum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 356; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* I t. 8; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 55; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 530. — Europe, Asie bor.  $\frac{1}{2}$
- D. odora** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 159; Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV t. 351; *Bot. Mag.* t. 1587; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1927; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 537, — Japon.  $\frac{1}{2}$
- D. petraea** Leybold in *Flora XXXVI* (1853) 81 et XXXVIII (1855) 346 cum icone; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 533. **D. RUPESTRIS** Facchini ex Nyman, *Syll. Fl. Eur.* suppl. (1865) 57. — Tyrol mérid.  $\frac{1}{2}$
- D. sericea** Vahl, *Symb. Bot.* I (1790) 28; Desfontaines, *Choix de Pl.* 15 t. 9; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 535; Boissier, *Fl. Or.* IV 1048. **D. COLLINA** Smith, *Spicil. Bot.* II (1792) t. 18; *Bot. Mag.* t. 428. — Italie mérid., Crète, Asie Mineure.  $\frac{1}{2}$
- D. striata** Trattinick, *Archiv. d. Gewächsk.* I (1812) 120 t. 133; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 554; Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 533. — Alpes de l'Europe mérid.  $\frac{1}{2}$
3. **THYMELEA** Endlicher, *Gen. Pl.*, suppl. IV (1847) 65; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6274. — Genre de 20 esp. environ habitant la Rég. Méditerr., l'Europe centr., l'Asie centr. et occ. et les îles Canaries.
- T. nivalis** Meisner in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV (1857) 536. **PASSERINA** — Ramond in *Bull. Soc. Philom. Paris* (1800) n. 41 t. 9; Gärtner, *De Fruct. et Sem.* t. 215. **T. TINCTORIA** Endlicher, var. Lange, *Pugill. Fl. Hisp.* (1860-65) 103; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 300. — Pyrénées françaises et espagnoles.  $\frac{1}{2}$

## LXXVII. ELÆAGNÉES

1. **ELÆAGNUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 84; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6311. — Environ 30 esp. décrites, mais 12 seulement bien distinctes habitant l'Europe mér., l'Asie temp. et trop., l'Australie et l'Amérique bor.
- E. angustifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 121; *Bot. Reg.* XIV t. 1156; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 26; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 549. **E. HORTENSIS** Marschall Bieberstein, var. Schlechtendal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV (1857) 609; Boissier, *Fl. Or.* IV 1056. — Europe mérid., Asie centr., occ. et or.  $\frac{1}{2}$



**Elæagnus longipes** A. Gray in *Mem. Amer. Acad.* new ser. VI (1858-59) 405 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 408. — Japon.  $\mathfrak{h}$

**E. multiflora** Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 67 ; Schlechtendal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 614. E. EDULIS Siebold ex E. Mayer in *Rev. Hort.* (1878) 18 ; Lavallée, *Arboret. Segrez.* 9. — Japon.  $\mathfrak{h}$

2. **SHEPHERDIA** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 240 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6313. — Trois esp. de l'Amérique bor.

**S. argentea** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 240 et *North Amer. Sylva* I t. 35 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II t. 478 ; Schlechtendal in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XIV 608. — Amérique bor. (du Saskatchewan au Missouri).  $\mathfrak{h}$

## LXXVIII. EUPHORBIACÉES

1. **EUPHORBIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 429 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6370. — Plus de 635 esp. habitant les rég. temp. et trop. du monde entier.

**E. Abyssinica** J.-F. Gmelin, *Syst. Nat.* II (1767) 759 ; A. Richard, *Tent. Fl. Abyss.* II 239 ; Bruce, *Travels Abyss.* XIII 78 t. 10 et 11 (nom. vern. Kol-Quall) ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 84. E. GRANDIS Lemaire in *Illustr. Hort.* IV (1837) miscell. 401. — Abyssinie.  $\mathfrak{h}$

**E. Apios** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 457 ; Sieber, *Reise Insel Kreta* II 321 t. 9 ; Boissier, *Icon. Euphorb.* t. 78 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 126 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1103. — Grèce, Crète, Chios, Asie Mineure, Syrie.  $\mathfrak{z}$

**E. articulata** N.-J. Anderssen in *Vet. Akad. Handb. Stockh.* (1853) 236 et *Svenska Freg. Eugen. Resa Jord.* t. 12 ; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 17. — Iles Galapagos.  $\mathfrak{h}$

**E. Boivini** Boissier in DE CANDOLLE, *Prod. Regn. Veget.* XV 2 (1862) 77. — Madagascar (Sainte-Marie, Nossibé).  $\mathfrak{h}$

**E. cereiformis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 451 ; Burmann, *Rar. Pl. Afr. Decas* t. 9 ; Boissier, *Icon. Euphorb.* t. 58 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 88. E. ENNEAGONA Haworth, *Miscell. Natur.* (1803) 184. — Afrique austr.  $\mathfrak{h}$

— — var. **echinata** SALM-DYCK mss. ex Boissier, *loc. cit.* XV 2 (1862) 88. E. ECHINATA Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* (1831) 342. — Avec le type.

**Euphorbia Chamæbuxus** Bernard in Grenier et Godron, *Prosp. Fl. de France* (1846) 8 et *Fl. de Fr.* III 84; Boissier, *Icon. Euphorb.* t. 82 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 132; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 495. E. PYRENAICA Jordan, *Obs. Pl. France* III (1846) 237 t. 11. — Pyrénées, Aragon. ♀

**E. cuneata** Vahl, *Symb. Bot.* II (1791) 53; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V t. 464; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 97. — Arabie. ♀

**E. elegans** Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 794; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 19; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 246. E. PLATYLEPIS Decaisne in Jacquemont, *Voy. dans l'Inde, Bot.* IV (1844) 156 t. 157. — Deccan, Malwa, Berar, Concan. ☉

**E. fulgens** Karwinski ex Otto et Dietrich in *Allgem. Gartenzeit.* II (1834) 26; Maund, *The Botan.* II t. 100; Paxton, *Mag. of Bot.* IV t. 31; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 68. E. JACQUINIFLORA Hooker in *Bot. Mag.* (1839) t. 3673. — Mexique. ♀

**E. globosa** Sims in *Bot. Mag.* (1824) t. 2624; A. De Candolle, *Pl. Jard. Bot. Genève*, 7<sup>e</sup> notice, 24 t. 5; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 87. DACTYLANTHES — Haworth in *Philos. Mag.* (1823) 382. — Colonie du Cap. ♀

**E. grandidens** Haworth in *Philos. Mag.* (1825) 33; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 82. — Colonie du Cap. ♀

**E. hiberna** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 462; *Engl. Bot.* XIX t. 1337; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 137; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 122. E. HIBERNICA Spreng., *Syst. Veget.* III (1826) 800; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 80. — Irlande, Angleterre, France occ., Espagne bor. ♀

**E. imbricata** Vahl, *Symb. Bot.* II (1791) 54; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 149; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* III 500. — Portugal, Espagne, Baléares. ♀

**E. Kotschyana** Fenzl, *Pugill. Pl. Nov. Syr.* (1842) 17 et *Illustr. Pl. Nov.* 20; Boissier, *Icon. Euphorb.* t. 116 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 171; Boissier, *Fl. Or.* IV 1132. — Cilicie, Pisidie, Lycie. ♀

**E. Lathyris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 457; *Engl. Bot.* t. 2255; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 143; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 99. — Angleterre, Europe mérid.-occ. et centr.-occ., Corse, Sardaigne (ailleurs natur.). ☉

**E. mammillaris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 451; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 88. TITHYMALUS AIZOIDES, etc. Commelyn, *Præ-lud.* t. 9. — Colonie du Cap. ♀

**E. meloformis** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, II (1789) 135; Andrews, *Bot. Repos.* t. 617; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 436; De Candolle, *Pl. Grasses* t. 139; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 87. — Colonie du Cap. ♀

- Euphorbia Myrsinites** Linné, *Sp. Pl.* ed I (1753) 461; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* V t. 471; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 148; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 173 et *Fl. Or.* IV 1134. — Europe Méditerr. centr. et or., Asie Mineure, Chypre, ? Tauride. ♀
- E. Ornithopus** Jacquin, *Fragm. Bot.* (1809) 76 t. 120; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 87. — Colonie du Cap. ♂
- E. ovata** E. Meyer in DRÈGE, *Zwei Pflanzengeogr. Dokum.* (1844) 184; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 167. — Colonie du Cap. ♀
- E. pilulifera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 454; Rumph, *Herbar. Amboin.* VI t. 23; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III t. 478; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 21; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 250. **E. CAPITATA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 422; Descourtilz, *Fl. Médic. Antill.* III t. 227. — Asie, Afrique, Amérique et Australie trop. et subtrop. (1)
- E. polygona** Haworth, *Miscell. Natur.* (1803) 184; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1334; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 88. — Colonie du Cap. ♂
- E. Regis-Jubæ** Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canar.* III (1836) 250; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 109. — Canaries. ♂
- E. resinifera** Berg in BERG et SCHMIDT, *Darst. Officin. Gewächse* IV (1863) in textu ad t. 34 d. fig. m-x; Cosson in *Bull. Soc. Bot. Belg.* X 5-12; Ball, *Spicil. Fl. Maroc.* 601. — Maroc. ♀
- E. serpens** Humboldt. Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* II (1817) 41; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 29; A. Gray, *Man. Bot. N.-Unit. Stat.* ed. VI 453. — États-Unis mérid., Mexique, Bolivie. (1)
- E. splendens** Bojer ex Hooker in *Bot. Mag.* (1829) t. 2902; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1713; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 241; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 79. — Madagascar (cult. à Maurice, dans l'Inde, etc.). ♂
- E. stapelioides** Boissier, *Cent. Euphorb.* (1860) 26 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 91. — Colonie du Cap. ♀
- E. triflora** Schott, Nyman et Kotschy, *Analecta Bot.* (1854) 63; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 165. — Dalmatie, Croatie. ♀
- E. trigona** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 36 et *Fl. Ind.* II 468; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* V t. 1863; Boissier in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 82; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 256. — Deccan, îles Andaman et Moluques. ♂

2. **BUXUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 712 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6388. — Genre de 20 esp. habitant l'hémisphère bor., l'Afrique trop., les Indes occ. et Madagascar.

**B. Balearica** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1786) 511 ; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 337 ; Loudon, *Encyclop. of Plants* 704 t. 1378-79 ; Baillon, *Monog. Buxac.* 62 ; Mueller Arg. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 1, 18. **B. SEMPERVIRENS** Linné, var. **GIGANTEA** Loiseleur in Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. II (1801) 82 t. 23. — Baléares.  $\frac{1}{2}$

**B. Fortunei** Carrière in *Rev. Hort.* (1870-71) 519. — Chine.  $\frac{1}{2}$

**B. longifolia** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XII (1853) 107 et *Fl. Or.* IV 1144 ; Baillon, *Monog. Buxac.* 63 ; Mueller Arg. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 1, 18. — Syrie bor.  $\frac{1}{2}$

3. **PACHYSANDRA** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 177 t. 45 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6389. — Deux esp. de l'Amérique bor. et du Japon.

**P. procumbens** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 178 t. 45 ; *Bot. Mag.* t. 1964 ; *Bot. Reg.* I t. 33 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 910 ; Mueller Arg. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 1, 22. — Monts Alleghanis, Kentucky, Caroline, ? Guadeloupe.  $\frac{1}{2}$

4. **PHYLLANTHUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 708 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6404. — Environ 500 esp. habitant les rég. chaudes du monde entier.

**P. latifolius** Swartz, *Fl. Ind. Occ.* II (1800) 1100 ; Lamarck, *Fl. Bot. Encycl.* t. 855 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 35 ; Mueller Arg. in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 431. **XYLOPHYLLA** — Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 221 ; *Bot. Mag.* t. 1021. — Jamaïque.  $\frac{1}{2}$

5. **CROTON** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 720 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6460. — Genre de plus de 530 esp. habitant les rég. chaudes du monde entier (l'Europe et l'Asie extratrop. exceptées.).

**C. robustum** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal* XVIII 2 (1873) 242 et *Forest. Fl.* II 372 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 377. **GEISELERIA ROBUSTA** Hort. — Du Pégu au Ténasserin.  $\frac{1}{2}$

6. **DALECHAMPIA** Linné, Hort. Cliff. (1737) 485 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6555. — Genre de 60 esp. des régions chaudes du monde entier.

**D. Roezliana** Mueller Arg. in DE CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2 (1866) 1233. — Mexique.

— — var. **canescens** MUELLER ARG., *loc. cit.* XV 2 (1866) 1233. — Avec le type.

## LXXIX. URTICACÉES

1. **ZELKOVA** Spach in Ann. Sc. Nat. sér. 2, XV (1841) 356 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6586. — Quatre esp. habitant la Rég. Caucasienne, l'île de Crète, la Chine et le Japon.

**Z. crenata** Spach in Ann. Sc. Nat., sér. 2, XV (1841) 358 et *Hist. des Veget.* XI 118 (var.  $\beta$  excl.) ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1159 ; Planchon in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 166. **PLANERA** — Desfontaines, « *Cat. Hort. Paris.* » ex Planchon. P. RICHARDI Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 248 ; Dunal in *Bull. Soc. Centr. Agric.* (1841) 299 cum icone. **RHAMNUS CARPINIFOLIUS** Pallas, *Fl. Ross.* II (1788) 24 t. 10. — Rég. Caucas., Perse. ‡

2. **CELTIS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 841 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6588. — Plus de 70 esp. décrites, mais 50 seulement bien distinctes habitant les rég. temp. et trop. du monde entier.

**C. australis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1043 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 667 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 169 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1156. **C. ASPERA** Loddiges ex G. Don in Loudon, *Hort. Brit.* (1830) 413. — Europe mérid., Asie temp., Inde. ‡

**C. Davidiana** Carrière in *Rev. Hort.* (1868) 309 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 179. — Chine. ‡

3. **MACLURA** Nuttall, Gen. of N.-Amer. Pl. II (1818) 233 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6610. — Genre monotype.

**M. aurantiaca** Nuttall, Gen. N.-Amer. Pl. II (1818) 234 et *North-Amer. Sylva* I 126 t. 37 et 38 ; Seringe, *Descr. et Cult. des Muriers* 232 t. 27 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 227. — Arkansas, Louisiane. ‡

4. **DORSTENIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 840 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6619. — Genre de 45 esp. de l'Amérique et de l'Afrique trop. et de l'Inde.

**D. Barteri** Bureau in De CANDOLLE, *Prodr. Regn. Veget.* XVII (1873) 272. — Fernando-Po. ♀

**D. Brasiliensis** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 317 ; Nees, *Pl. Officin.* t. 99 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 263. — Brésil, Montevideo. ♀

**D. Contrajerva** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 121 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III t. 614 ; Descourtilz, *Fl. Médic. Antilles* III t. 207 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII 260. — Mexique, Antilles, Amérique centr., Pérou. ♀

— — var. **Houstoni** BUREAU, *loc. cit.* XVII (1873) 259. **D. HOUSTONI** Linné, *Sp. Pl.* ed. 2 (1762) 176. — Du Mexique au Pérou.

— — var. **maculata** BUREAU, *loc. cit.* XVII (1873) 260. **D. MACULATA** Lemaire in *Illustr. Hort.* X (1863) t. 362. — Mexique.

**D. urceolata** Schott in *Flora* (1821) 197 ; Bureau in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVII (1873) 266. — Brésil. ♀

— — var. **latifolia** BUREAU, *loc. cit.* XVII (1873) 266. **D. CAULESCENS** Vellozo, *Fl. Flumin.* I (1821) t. 141 ; Fielding et Gardner, *Sert. Pl.* t. 13. — Avec le type.

5. **FICUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 776 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6621. — Genre de plus de 650 esp. des rég. trop. et subtrop. du monde entier.

**F. elastica** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III 541 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* II t. 663 ; Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 59 ; King, *Ficus* t. 45 et 54 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 508. — Sikkim, Khasia, Burmah, Perak, Archipel Malais. ♂

**F. heterophylla** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 442 ; Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II 499 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* II t. 659 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 518. **F. REPENS** Rottler in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift.* IV (1803) 208. Inde or. (du Gange à Perak et à Ceylan), îles Malaises. ♂

**F. pumila** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1060 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* I 435. **F. MINIMA** Hort. ex *Gard. Chron.* (1880) II 716. — Japon, Chine. ♂

6. **PILEA** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 4 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6661*. — Genre de 175 esp. de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique trop.

**P. microphylla** Liebm. in *Danske Vidensk. Selsk. 5 Række Naturv. og Mathem. Afhandl.* II (1831) 296 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 153 ; Weddell in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 1, 105. **PARIETARIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1492. **PARIETARIA MUSCOSA** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 4. — Amérique trop. (des Antilles au Pérou et au Brésil). (1) (2)

7. **PELLIONIA** Gaudichaud in Freycinet, *Voy. Bonite, Bot.* (1826) 409 t. 119 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6664*. — Dix-huit esp. de l'Asie trop. et or. et des îles du Pacifique.

**P. Davauana** N.-E. Browne in *Gard. Chron.* (1880) II 262 et in *Illustr. Hort.* XXIX (1882) 189 t. 472 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 560. **ELATOSTEMA GIBBOSA** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal* XLIII 2 (1873) 104. **BEGONIA** — Carrière in *Rev. Hort.* (1880) 290 cum icone. — Pegu, Perak, Cochinchine.

## LXXX. PLATANÉES

1. **PLATANUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. II (1742) n. 877 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6692*. — Six esp. des rég. temp. et sub-trop. de l'hémisphère bor.

**P. Occidentalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 999 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* III t. 3 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 2 ; Watson, *Dendrol. Brit.* t. 100 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 159. — Du Canada à la Floride. ‡

**P. Orientalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 999 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, II t. 1 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* III t. 3 ; Pallas, *Fl. Ross.* t. 51 ; Watson, *Dendrol. Brit.* t. 101 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 159 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1161 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 594. — De la Perse bor. à l'Italie mér. ‡

## LXXXI. JUGLANDÉES

1. *CARYA* Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 220 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6695. — Douze esp. de l'Amérique bor. proprement dite et du Mexique.

**C. sulcata** Nuttall, *Gen. N.-Amer. Pl.* II (1818) 221 ; C. De Candolle in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XVIII 36 fig. 5 et 52 et *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 139 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 468. *JUGLANS LACINIOSA* Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* I (1810) 199 t. 8. — De la Pensylvanie au Kentucky et à l'Illinois. *h*

2. *JUGLANS* Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 727 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6696. — Huit ou neuf esp. habitant la Jamaïque et les rég. temp. et subtrop. de l'hémisphère bor.

**J. nigra** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 997 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 191 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* I t. 1 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, IV t. 48 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 137. — Du Massachussets à la Floride et au Texas. *h*

3. *PTEROCARYA* Kunth in *Annal. Sc. Nat.* sér. 1, II (1824) 345 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6697. — Quatre esp. de l'Asie temp. (du Caucase au Japon).

**P. fraxinifolia** Spach, *Hist. des Veget.* II (1834) 180 ; De Candolle in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XIII 35 fig. 7, 19, 20 et 47-49 et *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 139 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1160. *P. CAUCASICA* C.-A. Meyer, *Verz. Pfl. Cauc.* (1831) 134. *JUGLANS FRAXINIFOLIA* Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* IV (1797) 502. — Caucase, Perse bor. *h*

## LXXXII. MYRICACÉES

1. *MYRICA* Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 746 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6760. — Genre de 40 esp. environ des rég. temp. et chaudes du monde entier (l'Australie exceptée).

**M. cerifera** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1453 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 809 ; Bigelow, *Amer. Medic. Bot.* t. 43 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 322 ; C. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 148. — Du lac Erié à la Floride et à la Louisiane. *h*



## LXXXIII. CUPULIFÈRES

1. **BETULA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 715 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6702. — Trente-cinq esp. de l'Europe, de l'Asie bor. et centr. et de l'Amérique bor.
- B. alba** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 982 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, III t. 50 ; Spach, *Hist. des Végét.* t. 91 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XII t. 623 ; Regel in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 162 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1181. — Europe, Caucase, Asie Min., Sibérie, Japon.  $\mathfrak{h}$
- B. papyracea** Dryander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 337 ; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 464 ; Michaux, *Hist. Arbr. Forest. Amér.* t. 1 ; Watson, *Dendrol. Brit.* II t. 152. **B. ALBA** Linné, subsp. **PAPYRIFERA** Regel in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 166. **B. GRANDIS** Schrader, *Ind. Sem. Hort. Gott.* (1833) 2. — Du Canada à la Pensylvanie et au Wisconsin.  $\mathfrak{h}$
2. **ALNUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 714 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6703. — Genre de 15 esp. environ de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor. et des Andes de l'Amérique austr. (Afrique austr. indig. ?)
- A. firma** Siebold et Zuccarini in *Abhandl. Baier. Acad. Wiss.* IV (1843) 230 ; Regel, *Monog. Betul.* 84 t. 15 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 183. — Japon.  $\mathfrak{h}$
- A. fruticosa** Ruprecht, *Fl. Samoied. Cisural.* (1846) 53 n. 249 ; C.-A. Meyer, *Beitr. z. Pflanzenk. d. Russ. Reichs* V n. 88. **ALNASTER** — Ledebour, *Fl. Ross.* III (1846-51) 655. **BETULA TRISTIS** Wormskiold ex Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* II (1822) 401. — Russie centr. et bor., Asie bor. et arct., Amérique arct.  $\mathfrak{h}$
3. **QUERCUS** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 726 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6708. — Environ 300 esp. de l'Europe et de l'Asie, de l'Amérique bor., des montagnes de l'Amérique centr. et de la Colombie.
- Q. coccinea** Wangenheim, *Anfl. Nordamerikan. Holz.* (1787) 44 fig. 9 ; Michaux, *Chênes de l'Amér.* t. 31 et 32 et *Hist. Arbr. Forest. Amér.* II t. 23 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 61. **Q. RUBRA** Linné var.  $\alpha$  LINNÉ, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1412. **Q. AMBIGUA** Michaux, *loc. cit.* II (1812) t. 24. — De la Nouv.-Écosse et du Massachussets à la Floride et au Texas.  $\mathfrak{h}$

**Quercus Ilex** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 995; Watson, *Dendrol. Brit.* II t. 90; Kotschy, *Die Eichen* t. 38; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XXI t. 642; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 38; Boissier, *Fl. Or.* IV 1167. — France occ., Europe, Asie et Afrique médit.  $\frac{1}{2}$

## LXXXIV. SALICINÉES

1. **SALIX** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 742; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6712. — Genre de 160 esp. environ, répandu dans le monde entier (l'Australie, l'archipel Malais et les îles du Pacifique exceptés).

**S. arbuscula** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1018; Ledebour, *Fl. Ross.* III 622; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 2, 756; Forbes, *Salic. Woburn.* t. 55-59 et 138; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 561; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XV 2, 242; Boissier, *Fl. Or.* IV 1192. — Europe bor. et mont., Sibérie, Caucase, Songarie, Groënland.  $\frac{1}{2}$

— — var. **erecta** ANDERSSON, *loc. cit.* XVI 2 (1868) 247. **S. WALDSTEINIANA** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 679. — Avec le type.

**S. Doniana** Smith, *Engl. Fl.* IV (1828) 213; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 2, 755; *Engl. Bot.* t. 2599; Forbes, *Salic. Woburn.* t. 85; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 315. **S. PURPUREA**  $\times$  **REPENS** Wimmer in *Bot. Zeit.* (1845) 435. — Écosse, Schleswig, Allemagne, Galicie.  $\frac{1}{2}$

**S. intermedia** Host, *Salix* (1828) 17 t. 56, 57; Kerner, *Weid. Oestr.* 224; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 304. **S. GRANDIFOLIA**  $\times$  **INCANA** Wimmer, *Salic. Europ.* (1866) 151. — Tyrol, Autriche infér., Carniole.  $\frac{1}{2}$

**S. Japonica** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 24 et *Icon. Fl. Jap.* t. 31; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 668; A. Gray in Parry, *Japan. Exped.* II 319. **S. BABYLONICA** Linné, var. — ANDERSSON in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 213. — Japon.  $\frac{1}{2}$

**S. Lapponum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1019; Ledebour, *Fl. Ross.* II 617; Eder, *Fl. Danica* VI t. 1058; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 572; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 276. — Europe bor., Monts Dore, Alpes, Sudètes.

**S. phylicifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1016; *Engl. Bot.* t. 1958; Ledebour, *Fl. Ross.* III 611; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 2, 751; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 242. **S. WEIGELIANA** Willdenow, *Sp. Pl.* IV 2 (1806) 678; Forbes, *Salic. Woburn.* t. 57. — Europe bor., montagnes de l'Europe occ., centr. et or.  $\frac{1}{2}$

**Salix Pontederana Schleicher**, *Cat. Salic. Helv.* (1807) 1 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 587 ; Buser apud Magnier, *Serinia* 328. **S. PONTEDERANA** Schleicher, subsp. **GRENIERIANA** Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 311. **S. CAPREA**  $\times$  **PURPUREA** Wimmer, *Fl. von Schles.* ed. 3 (1857) 196 et *Salic. Europ.* 161. — Suisse, France or., Silésie, Autriche infér., Tyrol, Allemagne.  $\mathfrak{h}$

**S. Pyrenaica Gouan**, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) 77 ; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 696 ; Trautvetter in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* VIII t. 4 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 141 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 231 ; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 282. — Pyrénées.  $\mathfrak{h}$

**S. reticulata Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1018 ; *Engl. Bot.* t. 1908 ; Duhamel, *Tr. des Arbr. et Arbust.* ed. 2, III t. 32 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 557 ; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 301. — Europe bor., Pyrénées, Alpes, Carpathes, Amérique bor.  $\mathfrak{h}$

**S. retusa Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1445 ; Host, *Salix* t. 103 ; Forbes, *Salic. Woburn.* t. 139 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 558 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 142 ; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 293. — Alpes, Pyrénées, Carpathes.  $\mathfrak{h}$

— — var. **serpyllifolia** ANDERSSON, *loc. cit.* XVI 2 (1868) 294. **S. SERPYLLIFOLIA** Scopoli, *Fl. Carniol.* (1772) 255 t. 61. **S. RETUSA** Linné, var.  $\beta$  Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II (1867) 571. — Alpes.

**S. Smithiana Willdenow**, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 1008 ; Andersson in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 267. — Hybride des **S. CAPREA** et **VIMINALIS**.  $\mathfrak{h}$

— — var. **acuminata** ANDERSSON, *loc. cit.* XVI 2 (1868) 268. **S. ACUMINATA** Smith, *Fl. Brit.* III (1804) 1063 ; Ledebour, *Fl. Ross.* III 606 ; Forbes, *Salic. Woburn.* t. 121. **S. DASYCLADOS** Wimmer in *Flora XXXII* (1849) 35 et *Fl. von Schlesien* (1857) 191. — Angleterre, France, Allemagne.  $\mathfrak{h}$

— — var. **sericans** ANDERSSON, *loc. cit.* XVI 2 (1868) 267. **S. SERICANS** Tausch ex Kerner, *Weid. Oestr.* (1860) 216. **S. SMITHIANA** Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 2, 746. **S. CAPREA**  $\times$  **VIMINALIS** Wimmer, *Salic. Europ.* (1866) 173. — Suède bor., Europe centr.  $\mathfrak{h}$

— — var. **velutina** ANDERSSON, *loc. cit.* XVI 2 (1868) 268. **S. HOLOSERICA** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 208 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 579 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II 748. **S. CINEREA**  $\times$  **VIMINALIS** Wimmer, *pr. p. loc. cit.* — Angleterre, Hollande, Allemagne, Russie.  $\mathfrak{h}$

2. **POPULUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 755 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6713. — Genre de 18 esp. de l'Europe, de l'Asie centr. et bor. et de l'Amérique bor.

**P. angulata Aiton**, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 407 ; Wesmael in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 328. **P. MONILIFERA** Aiton, *loc. cit.* III (1789) 406. A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI, 487. — De la Nouvelle-Angleterre à la Floride ; à l'ouest aux montagnes Rocheuses.  $\mathfrak{h}$

**Populus Canadensis Michaux**, *Fl. Bor.-Amer.* III (1803) t. 11 ; Spach, *Hist. des Veget.* II 390 ; Wesmael in de Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 329 P. BOLLEANA Hort. — Du Saskatchewan au Nouveau-Mexique.  $\mathfrak{h}$

## LXXXV. EMPÉTRACÉES

1. **EMPETRUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 775 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6715. — Genre monotype.

**E. nigrum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1022 ; *Fl. Dan.* VI t. 918 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* V t. 158 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. 3, 542 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 74 ; A. De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 1, 25 ; Boissier, *Fl. Or.* IV 1145. — Europe arct., bor., occ. et centr., Espagne, Italie centr., Sibérie, Japon, Amérique arct. et bor.  $\mathfrak{h}$

## LXXXVI. HYDROCHARIDÉES

1. **VALLISNERIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 741 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6722. — Genre monotype à formes nombreuses.

**V. spiralis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1015 ; Spach, *Hist. des Veget.* XII (1846) 5 t. 111 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 60 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 8 ; Boissier, *Fl. Or.* V 3 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 660. — Régions chaudes du monde entier.  $\mathcal{Z}$

## LXXXVII. ORCHIDÉES

1. **PLEUROTHALLIS** Rob. Brown in Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 5 (1813) 211 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6743. — Genre de 425 esp. de l'Amérique trop. des Antilles et du Mexique au Brésil.

**P. circumplexa** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. n. 27 et *Fol. Orchid.* n. 65. **P. MESOPHYLLA** A. Richard et Galeotti in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, III (1845) 16. — Mexique austr., Guatemala.  $\mathcal{Z}$

**P. hypnicola** Lindley in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) misc. 75 et *Fol. Orch.* (Pleuroth.) (1859) n. 142. **P. MINUTALIS** Lindley, *Fol. Orch.* (Pleuroth.) (1859) n. 250. **P. CRASSIFOLIA** Reichenbach f., *Xenia Orch.* I (1858) 174 t. 60. — Brésil, Mexique.  $\mathcal{Z}$

**Pleurothallis octomerioides** Lindley in Hooker, *Compan. Bot. Mag.* II (1836) 354 et *Fol. Orchid.* n. 101. P. CONGESTA A. Richard et Galeotti in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3 III (1845) 17. — Mexique. 2

**P. plumosa** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) misc. 78 et *Fol. Orchid.* n. 157. P. MINAX Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 24. — Trinité, Vénézuéla, Costa-Rica. 2

**P. prolifera** Lindley in *Bot. Reg.* XV (1829) t. 1298 ; *Bot. Mag.* t. 3261 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1908. — Brésil. 2

**P. pulchella** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 12 et *Fol. Orch.* n. 21. STELIS — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 291 t. 90. — Pérou, Équateur. 2

**P. saurocephala** Loddiges, *Bot. Cab.* XVI (1829) t. 1571 ; *Bot. Mag.* t. 3030 ; *Bot. Reg.* XXIII t. 1968 ; Lindley, *Sel. Orch. Pl.* n. 161. — Brésil. 2

**P. semipellucida** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 823 ; Lindley, *Fol. Orchid.* n. 27. — Vénézuéla. 2

**P. tridentata** Klotsch in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* (1840) n. 37 ; Lindley, *Fol. Orchid.* n. 179. — Vénézuéla. 2

**P. velaticaulis** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 824 ; Lindley, *Fol. Orchid.* n. 173. — Vénézuéla. 2

**P. velatipes** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 828 ; Lindley, *Fol. Orchid.* n. 20. — Colombie. 2

2. **PHYSOSIPHON** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1835) sub t. 1797 in textu ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6745. — Genre de 4 esp. de l'Amérique trop. s'étendant du Mexique au Brésil.

**P. Loddigesii** Lindley in *Bot. Reg.* (1835) sub t. 1797 in textu ; *Bot. Mag.* t. 4869 ; Hooker, *Icon. Pl.* VI t. 508. STELIS TUBATA Knowles et Westcott in Loddiges, *Bot. Cab.* XVII (1830) t. 1601. — Mexique. 2

3. **LEPANTHES** Swartz in K. Vetensk. Acad. Nya Handl. Stockh. XXI (1799) 249 t. 8 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6745. — Genre d'environ 50 esp. bien distinctes habitant les Indes occ., le Mexique et les Andes de l'Amérique centr. et austr.

**L. Calodictyon** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1861) t. 5259. — Pérou. 2

**L. Loddigesiana** Reichenbach f., *Xenia Orch.* I (1858) 145. L. TRIDENTATA Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1762 (non Swartz). — Jamaïque. 2

4. **RESTREPIA** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 366 t. 94 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6747.  
— Genre d'environ 20 esp. habitant l'Amérique trop. du Mexique au Brésil.

**R. antennifera** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I XVI (1869) 367 t. 94 ; *Bot. Mag.* t. 6288 ; *Lindenia* t. 36 ; *Illustr. Hort.* t. 601. — Amérique centr., Colombie, Vénézuéla. ♀

— — var. **fusca**

**R. elegans** Karsten, *Ausw. Neu. und Schön. Gew. Venezuela's* (1848) 8 t. 2 ; *Fl. des Serres* VII 743 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Restrep.) n. 2 ; *Bot. Mag.* t. 5966. — Guatemala, Colombie, Vénézuéla. ♀

**R. Falkenbergii** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* ser. 2, XIII (1880) 232. — Colombie. ♀

**R. muscifera** Reichenbach f. in LINDLEY, *Fol. Orch.* (Restrep.) (1859) n. 7. **PLEUROTHALLIS** — Lindley in *Bot. Reg.* (1842) misc. 74. **R. LEOPARDINA** Hort. — Guatemala. ♀

**R. ophiocephala** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 88 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 203. **PLEUROTHALLIS** — Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 48. **R. PEDUNCULARIS** Hooker, *Journ. of Bot.* III (1841) 308 t. 9. — Mexique, Guatemala. ♀

5. **MASDEVALLIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Prodr.* (1794) 122 t. 27 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6749. — Genre d'environ 125 esp. disséminées du Mexique au Pérou.

**M. amabilis** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 116 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 193 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. — Pérou bor. ♀

— — var. **lineata** LINDEN et ANDRÉ in *Illustr. Hort.* XXIII (1875) 24. t. 196. — Pérou.

**M. anchorifera** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1884) I 577. — Costa-Rica. ♀

**M. Arminii** Linden et Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 283 et in *Gard. Chron.* (1871) 1421 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 189 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Colombie. ♀

**M. attenuata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1871) 834 ; *Bot. Mag.* t. 6273. Costa-Rica, Colombie, Pérou. ♀

**M. Barlaeana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) I 170. — Pérou. ♀

- Masdevallia bella** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) I 725 et XIII (1880) I 756 fig. 131 et 132; *Flor. Mag.* new ser. (1881) I t. 433; *Belgique Hort.* XXXIV (1884) 57 t. 3; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. — Colombie. 2
- M. Bonplandi** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 69 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 191. M. UNIFLORA Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 361 t. 89 (non Ruiz et Pavon). — Équateur, Colombie.
- M. Bruchmulleri** Linden, *Catal.* (1873) n. 90; *Gard. Chron.* (1881) II 236; Ed. Morren in *Fl. des Serres* XIX (1873) 178. — Origine douteuse. 2  
— Obs. Cette espèce ne semble pas avoir été décrite.
- M. caloptera** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* new ser. (1874) I 338; (1874) II 322; (1875) II 290; (1878) I 104. — Pérou bor.
- M. calura** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 230. — Colombie. 2
- M. campyloglossa** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) II 588; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 27. — Patrie?. 2
- M. Carderi** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1783) I 784 et (1884) I 741 cum icone; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 27; *Bot. Mag.* (1890) t. 7125; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Cordillère de la Colombie occid. 2
- M. caudata** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 193; Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 23 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 189; *Gard. Chron.* (1875) I 170; Karsten, *Fl. Columb.* II t. 453; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V (1889) 28; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Colombie. 2  
— — var. **Shuttleworthii** REICHENBACH f. in *Gard. Chron.* (1889) I 240; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 28 cum icone. M. SHUTTLEWORTHII Reichenbach f., *loc. cit.* (1875) 170; *Bot. Mag.* t. 6372; *Orchid. Alb.* I t. 5; Sander, *Reichenbachia* I t. 43. — Colombie.
- M. Chestertoni** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 532; *Bot. Mag.* t. 6977; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. — Colombie. 2
- M. Chimæra** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 463 et (1875) 40 fig. 5 et *Linnaea* XLI (1877) 8; *Bot. Mag.* t. 6152; Reichenbach f., *Xenia Orch.* II (1874) 195 t. 185; *Orchid. Alb.* V t. 103; *Rev. Hort.* (1881) 130 cum icone; *Gartenflora* (1889) 617 t. 1311; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 30; Woolward, *Genus Masdev.* pars V (1893) ic. — Colombie. 2
- M. civilis** Reichenbach f. et Warscewicz in *Bonplandia* II (1854) 115 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 191; *Bot. Mag.* t. 5476; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Pérou. 2
- M. coccinea** Linden ex LINDLEY, *Orchid. Linden.* (1846) 5; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 197 t. 74 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 192; *Gartenflora* (1876) t. 879; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 33; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. M. LINDENI Ed. André in *Illustr. Hort.* (1870) 226 t. 42; *Flor. Mag.* n. ser. I t. 28; Jennings, *Orchids* t. 17; *Bot. Mag.* t. 5990. — Colombie. 2

- Masdevallia coccinea** var. **Harryana** VEITCH, *Man. Orchid. Pl.* V (1889) 34. M. HARRYANA Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1871) 1421; *Flor. Mag.* (1871) t. 555; *Belg. Hort.* (1873) t. 21; *Fl. des Serres* XXI t. 2250. M. LINDENI Hooker in *Bot. Mag.* (1872) t. 5990. M. LINDENI Ed. André var. HARRYANA Ed. André in *Illustr. Hort.* (1873) 167 t. 142. — Colombie. ♀
- M. coriacea** Lindley in *Annal. of Nat. Hist.* XV (1845) 257; Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 4; Karsten, *Fl. Columb.* II t. 153; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Colombie. ♀
- M. corniculata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) I 72; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Colombie. ♀
- M. cucullata** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 4; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. M. CUPREA Linden, *Catal.* (1871) ex Morren in *Belg. Hort.* (1873) 356. — Colombie.
- M. Davisii** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) II 710 et (1876) I 366 et *Xenia Orch.* III (1878) 3 t. 203; *Bot. Mag.* t. 6190; *Orchid. Alb.* II t. 76; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1891) ic. — Pérou. ♀
- M. elephanticeps** Reichenbach f. et Warscewicz in REICHENBACH f., *Xenia Orchid.* I (1854) 6 t. 3 et in *Bonplandia* II 116; *Fl. des Serres* X t. 997; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 40 — Colombie. ♀
- M. Ephippium** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1873) 390 et *Xenia Orchid.* II (1874) 213 t. 195; *Bot. Mag.* t. 6208; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 41 cum icone; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. M. TROCHILUS Linden et André in *Illustr. Hort.* (1874) 136 t. 180; *Flor. Mag.* (1881) t. 443. — Équateur, Colombie?, Amérique centr. ♀
- M. erythrochæte** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 392; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 42. — Amérique centr. ♀
- M. Estradæ** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 435; *Bot. Mag.* t. 6171; Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXV 317 cum icone; Godefroy, *L'Orchidoph.* I (1881) 345 cum icone; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 42. — Colombie. ♀
- M. floribunda** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) 72 misc. 112; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) II 616; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 43; Woolward, *Genus Masdev.* pars IV (1893) ic. M. MYRIOSIGMA Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1873) 361 t. 23. — Mexique. ♀
- M. Gaskelliana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 294; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 44. — Patrie?. ♀
- M. gemmata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 295; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 44. M. TRICHETE Reichenbach f., *loc. cit.* (1883) II 360. — Patrie?. ♀
- M. gibberosa** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) 8. — Colombie. ♀



**Masdevallia Hendersoni** Henderson, *Catal. ex Gard. Chron.* (1881) II 305.

— Obs. Hemsley dit dans le *Gard. Chron.* (*loc. cit.*) qu'il n'a pas su trouver de description de cette espèce.

**M. Houtteana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) II 98 ; *Fl. des Serres* XX (1874) 87 t. 2106 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 45 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars V (1893) ic. *M. PSITTACINA* Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) I 817. — Colombie ?, Vénézuéla. Ț

**M. hypodiscus** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) II 234. — Patrie ?. Ț

**M. inflata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1881) II 716. *M. CORNICULATA* Reichenbach f. var. Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V (1889) 37 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Colombie. Ț

**M. infracta** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 193 ; Ed. Morren, *Belg. Hort.* (1873) 357 t. 22 ; *Fl. des Serres* (1880) 43 t. 2389 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 47 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. (sub *M. CORNICULATA*). — Brésil (Sierra des Orgues). Ț

**M. ionocharis** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1875) II 388 ; *Bot. Mag.* t. 6262 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 48. — Pérou. Ț

**M. lata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) I 653. — Amérique centr. Ț

**M. Lehmanni** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) II 38. — Équateur. Ț

**M. leontoglossa** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 69 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 191 ; *Gard. Chron.* (1881) I 234, (1881) II 336, (1885) II 429 fig. 92 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 49 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Pérou, Colombie. Ț

**M. ludibunda** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 179 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 50. — Colombie. Ț

— Obs. Miss Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) fait rentrer cette espèce comme variété de *M. ESTRADÆ* Reichenbach f.

**M. maculata** Klotzsch et Karsten in Otto et Dietrich, *Allg. Gartenz.* XV (1847) 330 ; *Fl. des Serres* (1875) t. 2150 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* I 774 et VI 190 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 51 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Vénézuéla, Colombie. Ț

**M. marginella** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 38. — Patrie ?. Ț

**M. melanopus** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 338, (1874) II 322 et (1875) I 336 nomen tantum ; Woolward, *Genus Masdev.* pars IV (1893) ic. *M. POLYSTICTA* Hooker f. (non Reichenbach f.) in *Bot. Mag.* (1877) t. 6258. — Amérique austro-occid. Ț

**M. melanoxantha** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 283, in Walpers, *Annal. Bot.* VI 192 et in *Gard. Chron.* (1875) II 580. — Colombie. Ț

- Masdevallia nidifica** Reichenbach f., *Otia Bot. Hamburg.* I (1878) 18 et in *Gard. Chron.* (1879) II 436 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars V (1893) ic. — Andes occid. de l'Amérique austr. ♀
- M. nycterina** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) 1238 et (1874) 639 cum icône ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXIII 359 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 55 ; *Flor. Mag.* new ser. t. 150. *M. CHIMERA* Linden et André (non Reichenbach) in *Illustr. Hort.* XX (1873) 25 t. 117 et 118 ; De Puydt, *Les Orchidées* t. 22. — Colombie. ♀
- M. ochthodes** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 70 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 195. — Colombie. ♀
- M. pachyantha** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1884) I 174 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 56. — Colombie. ♀
- M. Parlatoreana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) I 172 et (1889) I 748. *M. SPLENDIDA* Reichenbach f. var. — Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V (1889) 73. — Pérou. ♀
- M. Peristeria** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 500 et (1881) II 336 ; *Bot. Mag.* t. 6159 ; *Fl. des Serres* XXII t. 2346 ; *Illustr. Hort.* XXV 152 t. 327 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 57 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. — Colombie. ♀
- M. platyglossa** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 552 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 57. — Amérique trop. ♀
- M. polysticta** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 338 (nomen nudum), (1874) II 290, (1875) I 40 et 656 fig. 134 ; *Bot. Mag.* t. 6368 ; *Illustr. Hort.* (1875) 41 t. 199 ; *Gartenflora* (1876) 164 t. 869 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 58 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Pérou bor. ♀
- M. porcelliceptis** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 10. — Colombie. ♀
- M. punctata** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1888) II 323 et (1891) I 338 ; *Bot. Mag.* t. 7165. — Nouvelle-Grenade. ♀
- M. radiosa** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) I 684 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 59. — Colombie. ♀
- M. Reichenbachiana** Endres in *Gard. Chron.* (1875) II 257, (1879) I 559 et (1881) II 336 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 60 ; *Lindenia* VI 23 t. 250 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Costa-Rica. ♀
- M. rosea** Lindley in *Ann. of Nat. Hist.* XV (1845) 257 ; Reichenbach in Walpers, *Annal. Bot.* VI 192 et in *Gard. Chron.* (1880) I 551, 648 et 681 fig. 117 et 118, (1881) II 337 fig. 6 et (1882) I 628 et 644 fig. 101 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 60 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. — Pérou, Équateur, Colombie. ♀
- M. Schlimii** Linden inss. ex LINDLEY, *Orchid. Linden.* (1846) 5 ; Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 23 et 283 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 194 ; *Bot. Mag.* 6740 ; *Gard. Chron.* (1883) I 532 fig. 80 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 61 ; Woolward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Vénézuéla, Colombie. ♀

**Masdevallia spectrum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1875) I 429. — Patrie ? 2

**M. swertiaefolia** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1880) II 390. — Colombie. 2

**M. Tovarensis** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 818 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 492 ; *Bot. Mag.* t. 5505 ; *Illustr. Hort.* (1879) 469 t. 363 ; De Puydt, *Les Orchidées* 287 t. 24 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 63 ; Woodward, *Genus Masdev.* pars II (1891) ic. — Vénézuéla, Colombie. 2

**M. triangularis** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 5 ; Reichenbach f. in *Bonplandia* II 23 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 488 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 65 ; Woodward, *Genus Masdev.* pars III (1892) ic. — Vénézuéla. 2

**M. triaristella** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) II 226 et 559 cum icone ; *Bot. Mag.* t. 6268 ; Pfitzer in Engler et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* (Orchid.) II, Abt. VI 438, fig. 436 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* 66. — Costa-Rica. 2

**M. tridactylites** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) I 784 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 66. — Guatemala. 2

**M. Troglodytes** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXVII (1877) 97 t. 5 ; *Gard. Chron.* (1877) II 300 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 67. — Colombie. 2

**M. Veitchiana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1868) 844 et 4338 ; *Bot. Mag.* t. 5739 ; *Fl. des Serres* XVII (1868) t. 1804 ; *Lindenia* II 97 t. 95 ; *Flor. Mag.* IX t. 481 ; Warner, *Select. Orchid. Pl.* ser. 2, I t. 33 ; De Puydt, *Les Orchidées*, 289 t. 25 ; Woodward, *Genus Masdev.* pars I (1890) ic. ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 67. — Pérou. 2

**M. Vespertilio** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1873) 390 et in *Gard. Chron.* (1877) I 272 et (1880) I 742 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 71. — Colombie. 2

**M. xanthina** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1880) I 681. M. ESTRADÉ Reichenbach f. var. — Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V (1889) 42 ; Woodward, *Genus Masdev.* pars IV (1893) ic. — Colombie ? 2

**M. xanthodactyla** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) II 552. — Patrie ? 2

6. **ARPOPHYLLUM** La Llave et Lexarsa, *Nov. Veget. Descr.* II (1825) 49 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6750. — Genre d'environ 6 esp. de la Jamaïque, du Mexique et de l'Amérique centr.

**A. cardinale** Linden et Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 282, in Walpers, *Annal. Bot.* VI 448 et in *Pescatorea* t. 45 ; Warner, *Select. Orchid. Pl.* I t. 39. — Colombie. 2

**A. giganteum** Hartweg ex LINDLEY in *Ann. of Nat. Hist.* IV (1840) 384 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 448 ; Warner, *Select. Orchid. Pl.* I t. 39 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 77 ; Baillon, *Dict. de Bot.* (pl. colorée avec la partie IV). — Mexique austr., Guatemala. 2

**Arpophyllum spicatum** La Llave et Lexarsa, *Novar. Veget. Descr.* II (1825) 49 ; *Bot. Mag.* t. 6022 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 78. A. SQUARROSUM Hort. Donat ex Lubbers, *Catal. Pl. S. Donato* (1880) 15. — Mexique, Jamaïque, Guatemala. ♀

7. **OCTOMERIA** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 211 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6751. — Dix esp. du Brésil, de la Guyane, de l'Amérique centr. et des Antilles.

**O. graminifolia** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 211 ; *Bot. Mag.* t. 2764. — Indes occid. ♀

**O. Loddigesii** Lindley in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II (1836) 354. O. GRAMINIFOLIA Loddiges (non R. Brown) in *Bot. Cab.* (1832) t. 1891. — Indes occid. ♀

8. **MICROSTYLIS** Nuttall, *Gen. of N. Amer. Pl.* II (1818) 196 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6754. — Environ 50 esp. habitant l'Europe, l'Asie, l'Amérique bor. et austr.

**M. chlorophrys** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1881) I 266 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXIV 341. — Bornéo. ♀

**M. cylindrostachya** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 207 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 689 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXIV 383. DIENIA — Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1934 et *Gen. and Sp. Orch.* 22. — Himalaya temp. (de Simla à Sikkim), Inde centr. ♀

**M. Lowii** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXXIV (1884) 283 t. 14. — Bornéo. ♀

**M. metallica** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) II 750 ; *Bot. Mag.* t. 6668 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1884) 283 t. 14 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXIV 341. — Bornéo. ♀

**M. monophyllos** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 19 ; Eder, *Fl. Danica* IX t. 1525 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* I t. 14 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 1525 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXIV 318. OPHRYS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 947. MALAXIS — Swartz, *Fl. Ind. Occ.* (1806) 1043. — Europe bor. et centr., Asie bor.-or., Amérique bor. ♀

**M. Wallichii** Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1938 et *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 20 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXIV 337 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 686. — Himalaya temp. et subtemp., Khasia, Travancore, îles Andaman, Cambodge. ♀

9. **LIPARIS** L. C. Richard, *De Orchid. Europ. Annot.* in *Mém. Mus. Paris* IV (1817) 52 t. 5 fig. 10 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6756. — Genre d'environ 120 esp. habitant les régions temp. et chaudes du monde entier.

**Liparis elata** Lindley in *Bot. Reg.* XIV (1828) t. 1175 et *Gen. and Sp. Orch.* 27; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1558; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXII 259. — Amérique trop. (des Indes occid. au Brésil). ♀

**L. liliifolia** Richard in *Mém. Mus. Paris* IV (1817) 521. MALAXIS — Swartz in *Act. Acad. Holm.* (1800) 235; *Bot. Mag.* t. 2004; Redouté, *Liliacées* VIII t. 437. OPHRYS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 946; Andrews, *Bot. Reposit.* I t. 65; *Bot. Mag.* t. 2001. — Canada, États-Unis. ♀

**L. Læselii** Richard in *Mém. Mus. Paris.* IV (1817) 52 t. 5 fig. 10; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXII 272. MALAXIS — Swartz in *Act. Acad. Holm.* (1800) 235. OPHRYS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 947; *Engl. Bot.* t. 1488; Dietrich, *Fl. Boruss.* I t. 15; Baxter, *Brit. Phan. Bot.* VI t. 414. — Europe bor., occid. et centr. ♀

**L. longipes** Lindley in Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* I (1830) 31 t. 35; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 40; Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XXII 293; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 703. L. PENDULA Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 180. — Inde, Ceylan, Hong-Kong, Java, Samoa, îles Fidji. ♀

— — var. **spathulata** RIDLEY, *loc. cit.* XXII (1886) 294. L. SPATHULATA Lindley in *Bot. Reg.* (1842) misc. 189. — Inde. ♀

**L. reflexa** Lindley in *Bot. Reg.* (1825) t. 882 in textu; Reichenbach f., *Beitr. Bot. Pflanzenk.* 46; Bentham, *Fl. Austral.* VI 272. L. FOLIOSA Lindley in *Bot. Reg.* XI (1825) t. 882; *Bot. Mag.* t. 2700; *Bot. Cab.* t. 1558. — Australie. ♀

10. **PLATYCLINIS** Bentham in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 295; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6758. — Genre d'environ 8 esp. des Indes or. et de l'archipel Malais.

**P. Cobbiana** Hemsley in *Gard. Chron.* (1881) II 656; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 80. DENDROCHILUM — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1880) II 748. — Philippines. ♀

**P. filiformis** Bentham in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 295; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 80. DENDROCHILUM — Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 113; Regel in *Gartenflora* XXXIII 33 t. 604; *Illustr. Hort.* (1878) t. 323. — Manille. ♀

**P. glumacea** Bentham in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 295; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* V 81. DENDROCHILUM — Lindley in *Bot. Reg.* (1841) misc. 23; *Bot. Mag.* t. 4853. — Philippines. ♀

**P. latifolia** Hemsley in *Gard. Chron.* (1881) II 656. DENDROCHILUM — Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. 56. — Manille. ♀

**P. longifolia** Hemsley in *Gard. Chron.* (1881) II 656. DENDROCHILUM — Reichenbach f. in *Bonplandia* IV (1856) 329. — Patrie? ♀

**Platyclinis uncata** Rolfe in *Gard. Chron.* (1889) I 74. *DENDROCHILUM* — Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 222. — Iles Malaises, Philippines. ♀

11. **CALYPSO** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806-7) t. 89 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6759. — Genre monotype.

**C. borealis** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806-7) 89 ; *Bot. Mag.* t. 2763 ;  
Hooker, *Exot. Fl.* I t. 12. *CYPRIPEDIUM BULBOSUM* Linné, *Sp. Plant.* ed. I  
(1753) 951 ; Smith, *Spicil. Bot.* t. 11. — Europe, Asie et Amérique bor. ♀

12. **APLECTRUM** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 197 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6760. — Genre monotype.

**A. hyemale** Torrey, *Comp. Fl. north et middle Stat.* (1826) 322 et *Fl. of  
Stat. of N.-York* II (1843) 270 t. 127 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 536 ;  
A. Gray, *Man. Bot.* ed. VI (1890) 500. — États-Unis or. ♀

13. **TIPULARIA**, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 195 ; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 6762. — Deux esp. de l'Amérique bor.  
et de l'Himalaya.

**T. discolor** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* II (1818) 195 ; Lindley, *Gen.  
and Sp. Orch.* 252 ; A. Gray, *Man. Bot.* ed. VI (1890) 499. — États-Unis. ♀

14. **DENDROBIUM** Swartz in K. Vet. Acad. Stockh. Nya Handl.  
XXI (1800) 244 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6765. — Genre  
d'environ 350 esp. habitant les parties les plus chaudes de  
l'Asie (jusqu'au Japon), les îles du Pacifique et l'Australie.

**D. aggregatum** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III (1832)  
477 ; *Bot. Mag.* t. 3643 ; *Bot. Reg.* t. 1695 ; Ch. Morren, *Annal. de Gand*  
V (1849) t. 263 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 749. *D. JENKINSH* Wallich ex  
Lindley in *Bot. Reg.* XXV (1839) t. 37 ; Warner, *Select. Orchid. Pl.* II  
t. 28. — Chine, Inde or. (Assam, Arracan, Martaban, Tenasserim, Perak). ♀

**D. Ainsworthii** T. Moore in *Gard. Chron.* (1874) I 443 et (1877) II 166 fig.  
30-32 ; *Flor. Mag.* new ser. t. 126 ; Williams, *Orchid. Alb.* I t. 20 (var. ro-  
seum) ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 86. Hybride de *D. AUREUM* × *NOBILE*.

**D. barbatulum** Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 2013 et *Gen. and  
Sp. Orch.* 84 ; *Bot. Mag.* t. 5918 ; Lindley et Paxton, *Flow. Gard.* II t. 113  
fig. 285 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 21 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 719.  
Inde or. (Deccan). ♀

**Dendrobium binoculare** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 785 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* III 23 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 747. — Inde or. (Pegu). 2

**D. Brymerianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1875) II 323 ; *Bot. Mag.* t. 6383 ; *Flor. Mag.* ser. 2 t. 459 ; *Lindenia* IV t. 183 ; *Gartenflora* (1883) t. 371 et (1887) t. 548 ; Godefroy-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1881) t. 148 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 745. — Burma. 2

**D. Bullenianum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* XX (1862) 214. — Philippines. 2

**D. Calceolaria** Carey in Hooker, *Exot. Fl.* III (1827) t. 184 ; De Puydt, *Les Orchidées*, t. 15 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 744. **D. MOSCHATUM** Wallich, var. Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III (1888) 62. **D. CALCEOLUS** Hort. — Burma inf., Moulmein. 2

**D. capillipes** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1867) 997 et *Xenia Orchid.* II 164 t. 169 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 26 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 751. — Burma. 2

**D. chrysanthum** Wallich, *Catal.* (1829) n. 2012 ; Lindley in *Bot. Cab.* XV (1829) t. 1299 ; Regel in *Gartenflora* (1864) t. 446 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 28 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 747. **D. PAXTONI** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 56 ; *Fl. des Serres* VII t. 725. — Himalaya, Khasia. 2

**D. chrysotoxum** Lindley in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 19 et XXXIII t. 36 ; *Bot. Mag.* t. 5053 ; *Illustr. Hort.* (1858) t. 164 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 305 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 29 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 750. — Arracan, Burma. 2

— — var. **suavissimum** VEITCH, *Man. Orchid. Pl.* III (1888) 30. **D. SUAVIS-SIMUM** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) 406 et *Xenia Orchid.* III 2 t. 202 ; *The Garden* XIII (1878) t. 116 ; Warner, *Orchid. Alb.* I t. 13. — Avec le type.

**D. ciliatum** Parish ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1864) t. 5430 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 30 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 719. — Tenasserim, Arracan. 2

**D. clavatum** Wallich, *Catal.* (1829) n. 2004 ; Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* II 408 fig. 189 et in *Bot. Reg.* (1836) t. 1828 ; *Bot. Mag.* t. 6993 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 293 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 746. — Himalaya trop., Khasia. 2

**D. cretaceum** Lindley in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 62 ; *Bot. Mag.* t. 4686 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* IV t. 344 ; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) t. 818 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 33 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 736. — Moulmein, Khasia, Assam, Travancore, Archipel Indien. 2

**D. crystallinum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1868) 572 et *Xenia Orchid.* II 210 t. 193 ; *Bot. Mag.* t. 6319 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 34 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 739. — Sikkim, Arracan, Tenasserim. 2

- Dendrobium cucumerinum** Mac Leay ex Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1842) misc. 58 et XXX (1843) t. 37; *Bot. Mag.* t. 4619; Lemaire, *Jard. Fleur.* IV t. 358; C. Morren, *Belg. Hort.* II 390 fig. 64; Fitzgerald, *Austral. Orchids* I, VI t. 3. — Australie. 2
- D. Dearei** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 361; Williams, *Orchid. Alb.* III t. 120; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 37. — Philippines. 2
- D. Devonianum** Paxton, *Mag. of Bot.* VII (1840) 169 cum icone; *Bot. Mag.* t. 4429; *Fl. des Serres* t. 647; *Illustr. Hort.* (1857) t. 145; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 11; Warner, *Select. Orchid. Pl.* II t. 11; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 38 cum icone; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 743. — Inde or.-bor., Assam (Siam, Chine austr.?). 2
- D. dixanthum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1865) 674; *Bot. Mag.* t. 5364; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 39; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 746. — Moulmein. 2
- D. Draconis** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* XX (1862) 214 et *Xenia Orchid.* II 130 t. 146; Williams, *Orchid. Alb.* III t. 103; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 39; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 722. **D. Eburneum** Reichenbach f. ex Bateman in *Bot. Mag.* (1864) t. 5459; *Rev. Hort.* (1883) 332 cum icone. — Moulmein, Siam, Cochinchine. 2
- D. Falconeri** Hooker in *Bot. Mag.* (1856) t. 4944; *Fl. des Serres* t. 1197; *Flor. Mag.* t. 226; Linden et Rodigas, *Lindenia* I t. 4; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 40; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 742. — Inde or. (Bhotan, Assam, Khasia, Munnipore, Burma). 2
- D. Farmeri** Paxton, *Mag. of Bot.* XV (1849) t. 241; *Bot. Mag.* t. 4659; Linden, *Pescatorea* I t. 4; *Fl. des Serres* VII t. 741; Lemaire, *Jard. Fleur.* IV t. 307; Jennings, *Orchids* t. 21; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 41 cum icone; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* V 750. — Himalaya or., Assam, Burma. 2
- D. Findleyanum** Parish et Reichenbach f. in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1874) 149; *Bot. Mag.* t. 6138; Williams, *Orchid. Alb.* II t. 92; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 43; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 742. — Burma et montagnes entre le Burma et Siam. 2
- Dendrobium floribundum** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 34; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* V 751. — Nepal. 2
- D. formosum** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III 485; *Bot. Reg.* (1839) t. 64; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* 34 t. 39; Paxton, *Mag. of Bot.* VI 49; Williams, *Orchid. Alb.* VII t. 308; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 44 cum icone; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 721. — Inde or. (Himalaya trop., Assam, Khasia, Tenasserim, îles Andaman). 2
- D. furcatum** Reinwardt ex Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 13. — Célèbes. 2
- D. fuscatum** Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1858) 8; *Bot. Mag.* t. 6226; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 746; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 45. — Sikim. 2



- Dendrobium Gibsonii** Lindley in Paxton, *Mag. of Bot.* V (1838) 169 et *Flow. Gard.* II 133 fig. 204 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 47 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI, 293 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 746. D. FUSCATUM Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 8 ; *Bot. Mag.* (1876) t. 6226. — Sikkim, Assam, Khasia, Burma. ♀
- D. gracilicaule** F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austral.* I (1859) 179. D. BRISBANENSE Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 299. — Queensland, Nouvelle-Galles du Sud. ♀
- D. gratiosissimum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* XXIII (1865) 99 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* III 47 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 743. D. BULLERIANUM Bateman in *Bot. Mag.* (1867) t. 5652. D. BOXALLII Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 315 et *Xenia Orchid.* II 212 t. 194 ; *Flor. Mag.* (1874) t. 114 ; *The Garden* IX 336 ; Jennings, *Orchids* t. 19. — Moulmein. ♀
- D. Harveyanum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 624 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 48 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 747. — Himalaya trop., Khasia. ♀
- D. heterocarpum** Wallich apud LINDLEY, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 78 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II 84 t. 196 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4708 ; *Fl. des Serres* VIII t. 842 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 737. D. AUREUM Lindley, *loc. cit.* (1831) 77 ; Wight, *Icor. Pl. Ind. Or.* V t. 1646 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 49 cum icone. — Inde or., Ceylan, Philippines. ♀
- D. infundibulum** Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 16 ; *Bot. Mag.* (1864) t. 5446 ; *The Garden* XXII (1882) t. 368 ; *Illustr. Hort.* XXI (1874) 88 t. 172 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 50 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 721. — Tenasserim (? Siam). ♀
- — var. **Jamesianum** VEITCH, *Man. Orchid. Pl.* III (1888) 50. D. JAMESIANUM Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 554 ; *Orchid Alb.* V t. 221 ; Godefroy, *L'Orchidophile* (1886) 189 cum icone. — Avec le type.
- D. Kingianum** Bidwill ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1844) misc. 11 et (1845) t. 61 ; *Bot. Mag.* (1850) t. 4527 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XII 97 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 52. — Queensland. ♀
- D. lituiflorum** Lindley in *Gard. Chron.* (1856) 372 ; *Bot. Mag.* (1873) t. 6050 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* II t. 3 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* III 36 t. 214 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 54 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 740. — Assam, Burma, Rangoon. ♀
- D. Lowii** Lindley in *Gard. Chron.* (1861) 1046 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5303 ; *Fl. des Serres* XXIII (1880) 57 t. 2395 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* III 56. — Bornéo. ♀
- D. Macraei** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 75 et in *Journ. Linn. Soc.* III 6 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 714. D. NODOSUM Dalzell in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1852) 292 ; *Bot. Mag.* (1864) t. 5470 ; *Fl. des Serres* XV t. 1542. D. FLABELLUM Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) t. 118 fig. 6 et 7. — Java, Inde or. (Himalaya, Khasia, Concan, Nilghiris, Ceylan). ♀

**Dendrobium macrophyllum** A. Richard in d'URVILLE, *Voy. Astrolabe* (1833) 22 t. 9; Linden, *Pescatorea* I t. 40; Warner, *Select Orchid. Pl.* t. 26. — Java, Nouvelle-Guinée. Ț

**D. macrostachyum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 78; *Bot. Reg.* XXII t. 1875; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* V t. 1647; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 286; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 735. — Travancore, Ceylan. Ț

**D. moschatum** Wallich in Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 34 et *Pl. Asiat. Rar.* II 83 t. 195; *Bot. Mag.* (1870) t. 3837; Paxton, *Mag. of Bot.* II t. 241; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 61. — Inde. Ț

Obs. Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* V 744) réunit ce DENDROBIUM au D. CALCEOLARIA Carey.

**D. nobile** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 79 et *Sert. Orchid.* t. 3; Paxton, *Mag. of Bot.* VII t. 7; *Orchid Alb.* t. 214; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 63 cum icone; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 740. — Inde or. (Himalaya or., Khasia), Chine. Ț

**D. Parishii** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1863) 237 et *Xenia Orchid.* II 140 t. 152; *Bot. Mag.* (1865) t. 5488; Jennings, *Orchids* t. 39; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 68; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 740. — Inde or. (Burma, Tenasserim). Ț

**D. pendulum** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III 484; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 741. D. WARDIANUM Warner, *Select Orchid. Pl.* I (1862-63) t. 19; *Illustr. Hort.* XXIV t. 277; Sander, *Reichenbachia* I t. 9; Jennings, *Orchids* t. 2. — Chittagong, Arracan, Siam. Ț

**D. Pierardi** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III 482; Hooker, *Exot. Fl.* t. 9; *Bot. Mag.* (1825) t. 2584; *Bot. Reg.* (1835) t. 1756; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 69; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 738. — Inde or. (régions au nord et au nord-est de la baie du Bengale), Tenasserim. Ț

— — var. **latifolium** VAN HOUTTE, *Fl. des Serres* VIII (1852-53) t. 955; Loddiges, *Bot. Cab.* VIII t. 750. — Avec le type.

**D. plicatile** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 10. — Manille. Ț

**D. primulinum** Lindley in *Gard. Chron.* (1838) 400; Regel in *Gartenflora* (1861) t. 326; *Orchid Alb.* VI t. 286; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 70 cum icone; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 735. D. NOBILE Lindley, var. PALLIDIFLORUM Hooker in *Bot. Mag.* (1857) t. 5003. — Népaul, Sikkim. Ț

**D. pulchellum** Loddiges in *Bot. Cab.* (1833) t. 1935; *Bot. Mag.* (1858) t. 5037; Maund, *The Botan.* I t. 5. D. LODDIGESII Rolfe in *Gard. Chron.* (1887) II 155. — Patrie? Rolfe (*loc. cit.*) le croit originaire de la Chine. Ț

**D. Roxburghii** Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 4. — Inde or. Ț  
Obs. Cette espèce semble omise dans l'excellente *Fl. Brit. India* du Dr Hooker.

- Dendrobium secundum** Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1996; *Bot. Reg.* t. 1291; *Bot. Mag.* (1850) t. 4552; De Vriese, *Illustr. Orchid. Ind. Or.* t. 6; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 269; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 73; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 730. — Java, îles du détroit de Malacca et de la Sonde, Borneo, Cochinchine, Inde (Martaban, Tenasserim, Penang). 2
- D. senile** Parish ex REICHENBACH f. in *Gard. Chron.* (1865) 434; *Bot. Mag.* (1865) t. 5520; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II 143 t. 153; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 74; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 751. — Moulmein. 2
- D. speciosum** Smith, *Exot. Bot.* I (1805) 17; *Bot. Mag.* (1831) t. 3074; *Bot. Reg.* t. 1610; Bentham, *Fl. Austral.* VI 279; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 74. — Australie or. 2
- — var. **Hillii** F. MUELLER, *Fragm. Phyt. Austral.* IV (1864) 175; *Gard. Chron.* (1877) 112 cum icone et 179. D. HILLII Hooker in *Bot. Mag.* (1861) t. 5061; *Orchid Alb.* V t. 19; Veitch, *loc. cit.* III 74 cum icone. — Queensland. 2
- D. stuppeosum** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 62 et (1844) misc. 52. D. SPHEGIDOGLOSSUM Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 88 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 290; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 737. — Khasia, Tenasserim. 2
- D. superbum** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 282; *Orchid Alb.* I t. 42; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 77. D. MACROPHYLLUM Lindley (non A. Richard) in *Bot. Reg.* (1839) misc. 36. — Manille. 2
- D. teretifolium** R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 333; *Bot. Mag.* t. 4711; Endlicher, *Icon. Gen. Pl.* t. 99; Bentham, *Fl. Austral.* VI 285; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 79. — Nouvelle-Galles du Sud, Queensland. 2
- D. tetragonum** A. Cunningham in LINDLEY, *Bot. Reg.* (1839) misc. 33; *Bot. Mag.* (1853) t. 5956; Bentham, *Fl. Austral.* VI 279; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 80. — Australie bor. 2
- D. tortile** Lindley in *Gard. Chron.* (1847) 797 cum icone; *Bot. Mag.* (1849) t. 4477; De Puydt, *Les Orchidées* 54 cum icone; Reichenbach in Walpers, *Annal. Bot.* VI 284; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 84; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 744. — Inde or. (du Chittagong et du Burma au Tenasserim). 2
- D. undulatum** R. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 322; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 298; Bentham, *Fl. Austral.* VI 278. D. DISCOLOR Lindley in *Bot. Reg.* (1841) t. 52. — Java, Queensland. 2
- 15. BULBOPHYLLUM** Thouars, *Orch. îles d'Afrique* (1822) 3 et icon. t. 93-97; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6767. — Environ 95 esp. habitant l'Asie, l'Afrique trop., l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique australe.
- B. Beccarii** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) I 41 et (1880) 326 et 525; *Bot. Mag.* (1881) t. 6567; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 95. — Borneo. 2

**Bulbophyllum Careyanum** Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 752 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4166 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 760. ANISOPETALUM — Hooker, *Exot. Fl.* (1825) t. 149. — Himalaya trop. (à l'est du Nepaul), Khasia. ♀

**B. Dearei** Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III (1888) 96. SARCOPODIUM — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 108 fig. 17. — Philippines. ♀

**B. galeatum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 57. — Afrique trop. ♀

**B. Javanicum** Miquel, *Fl. Ind. Bat.* III (1859) 650. — Java. ♀

**B. Lobbii** Lindley in *Bot. Reg.* (1847) t. 29 in textu ; *Bot. Mag.* (1850) t. 4532 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 245 et in Saunders *Re-fug. Bot.* t. 116 (var. SIAMENSE) ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 753. SARCOPODIUM — Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* I (1850-52) 1 fig. 98 ; — Tenasserim, Siam, Java. ♀

— var. **Henshallii** HENFREY in Moore et Ayres, *Gard. Mag. of Bot.* III 269 cum icône (sub BULBOPHYLLO) ; Lemaire, *Jard. Fleur.* II (1852) t. 183.

**B. macranthum** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) 39 t. 13 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 245 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 753. SARCOPODIUM — Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* I (1850-52) 155. — Tenasserim, Singapore. ♀

**B. Nilgherrense** Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* V (1851) t. 1650 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5050 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 256 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 761. — Nilghiris, Malabar. ♀

**B. Shepherdii** F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* III (1862) 46 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI 288 ; Fitzgerald, *Austral. Orchids* I, V t. 10. DENDROBIUM — F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* I (1859) 190. — Nouvelle-Galles du Sud. ♀

16. **MEGACLINIUM** Lindley in *Bot. Reg.* XII (1826) t. 989 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6769. — Quinze espèces habitant l'Afrique trop. et austr. sub trop.

**M. Melleri** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1871) sub t. 5936 ; T. Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 16. BULBOPHYLLUM — Reichenbach f. in *Flora* (1878) 78. — Bassin du Zambèze. ♀

17. **DENDROCHILUM**, Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indië* (1825) 398 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6775. — Genre de 15 espèces environ, de Malacca et des îles Malaises.

**D. Arachnites** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) I 526. — Philippines. ♀

18. **CIRRHOPE TALUM** Lindley in *Bot. Reg.* (1824) t. 832 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6769. — Genre de 30 espèces de l'Inde, la Chine, l'archipel Malais, l'Australie et les îles Mascareignes.

**C. elegans** Teyssmann et Binnendijk in *Tijdschr. Ned. Ind.* XXIV (1862) 310 ; *Gard. Chron.* (1882) II 172. — Archipel Malais. ♀

**C. nutans** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 71 ; *Bot. Mag.* (1849) t. 4418. — Manille. ♀

**C. ornatissimum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 424 ; *Orchid Alb.* t. 369 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 101 ; Hooker, f., *Fl. Brit. Ind.* V 773. — Sikkim, Assam. ♀

**C. Thouarsii** Lindley in *Bot. Reg.* (1824) sub t. 832 et *Gen. and Sp. Orchid.* (1831) 53 ; *Bot. Reg.* XXIV (1838) t. 11 ; *Bot. Mag.* (1846) t. 4237 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 102 cum icone. **C. UMBELLATUM** Hooker et Arnott, *Bot. Beech. Voy.* (1844) 71 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 15. — Îles Maurice, Réunion, Madagascar, Java, Philippines, O-Taïti. ♀

19. **COELIA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 36 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6780. — Cinq espèces habitant les Antilles, le Mexique et l'Amérique centr.

**C. Baueriana** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 36 ; Bauer, *Ill. Orchid. Pl.* t. 3 ; *Bot. Reg.* XXVIII (1844) t. 36 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* (1864) 629. — Cuba, Jamaïque, Mexique austr. ♀

**C. macrostachya** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1842) 92 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4712 ; *Bot. Reg.* (1842) sub t. 36 ; *Fl. des Serres* IX (1853-54) t. 900. — Mexique austr. ♀

20. **ERIA** Lindley in *Bot. Reg.* (1825) t. 904 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6781. — Quatre-vingt-cinq espèces environ habitant l'Asie trop. et subtrop., de l'Inde à la Nouvelle-Guinée.

**E. alba** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 67 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II t. 197 ; Hooker f., *Icon. Pl.* XIX (1889) t. 1845 et *Fl. Brit. Ind.* V 795. — Himalaya subtrop. (du Kumaon au Sikkim). ♀

**E. barbata** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1861) 270 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 803. **TAINIA** — Lindley in *Gard. Chron.* (1857) 63. — Inde or. (Khasia). ♀

**E. convallarioides** Lindley in WALLICH, *Catal.* (1829) n. 1975 et *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 70 ; *Bot. Reg.* XXVII t. 62 ; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II t. 159 (var. **MAJOR**) ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 276 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 791. — Inde or. (Himalaya trop., Kumaon, Naga Hills, Tenasserim). ♀

**Eria densiflora** Loddiges, *Catal. Orchid.* ex LINDLEY in LOUDON, *Hort. Brit.* suppl. II (1839) 633. — Patrie ? Ț

Obs. Loddiges disait cette espèce originaire de l'Inde ; le Dr Hooker n'en fait pas mention.

**E. rosea** Lindley in *Bot. Reg.* XII (1826) t. 978 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1817. — Chine. Ț

**E. stellata** Lindley in *Bot. Reg.* XI (1825) t. 901 ; *Bot. Mag.* (1837) t. 3605.  
OCTOMERIA — Sprengel, *Syst. Veget.* IV 2 (1827) 310. — Java. Ț

21. **SPATHOGLOTTIS** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indië* (1825) 400 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6784. — Environ 10 espèces de l'Asie trop. et subtrop. et de l'Australie.

**S. Fortunei** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) 31 t. 49 ; Bentham, *Fl. Hongkong.* 355. PACHYSTOMA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 464. — Hong-Kong. Ț

Obs. Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 814 réunit ce SPATHOGLOTTIS au **S. PUBESCENS** Lindley, de l'Inde.

22. **ACANTHOPHIPPIUM** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indië* (1825) 543 t. 47 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6785. — Trois ou quatre espèces de l'Inde et de l'archipel Malais.

**A. Javanicum** Blume, *Bijdr. Fl. Ned. Ind.* (1825) 354 et *Fl. Javæ (Orchid.)* t. 49 ; *Bot. Reg.* XXXII t. 47 ; *Bot. Mag.* (1850) t. 4492 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 35. — Java. Ț

23. **PHAIUS** Loureiro, *Fl. Cochinch. II* (1790) 529 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6786. — Genre de 15 espèces environ, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie trop. et subtrop.

**P. albus** Lindley in WALLICH, *Catal.* (1831) n. 3749 et *Pl. Asiat. Rar.* II (1831) t. 198 ; *Bot. Reg.* XXIV t. 33 ; *Bot. Mag.* (1843) t. 3991 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 818. THUNIA — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 764 ; *Revue Hortic.* (1874) t. 450. P. MARSHALLIANUS Reichenbach f. in *Linnaea* XLI (1877) 65 ; *Gartenflora* XXXI (1882) t. 1098. — Himalaya trop., Khasia, Arracan, Burma, Concan. Ț

— — var. **Bensoniæ** HOOKER F., *Fl. Brit. Ind.* VI (1890) 818. THUNIA BENSONLE Hooker f. in *Bot. Mag.* (1868) t. 5694 ; Jennings, *Orchids* t. 35.

**P. grandifolius** Loureiro, *Fl. Cochinch. II* (1790) 529 ; *Bot. Mag.* (1817) t. 1924 ; *Fl. des Serres* VII t. 738. — Chine. Ț

**Phajus maculatus Lindley** in WALLICH, *Catal.* (1831) n. 3748 et in *Bot. Mag.* (1842) t. 3960 ; *Bot. Cab.* t. 1803 ; Blume, *Fl. Javæ (Orchid.)* t. 5 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 817. **BLETIA WOODFORDII** Hooker in *Bot. Mag.* (1826) t. 2719. — Himalaya trop., Khasia, Chine, Japon. Ț

**P. Tankervillei Blume** in *Mus. Bot. Lugd.-Bat.* II (1856) 177 et *Coll. Orchid. Archip. Ind.* 2. **LIMODORUM INCARVILLEI** PERSOON, *Syn. Pl.* II (1807) 520. **L. TANKERVILLE** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 302. **BLETIA** — R. BROWN in Aiton, *loc. cit.* ed. 2, V (1813) 205. — Java. Ț

**P. Wallichii Lindley** in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* II (1831) 46 t. 158 ; Paxton, *Mag. of Bot.* VI t. 193 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 459 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 816. — Inde or. (Sikkim, Assam, Silhet, Burma, Tenasserim, Ceylan?), îles Malaises. Ț

24. **BLETIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Prodr.* (1794) 119 t. 26 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6787. — Environ 20 espèces habitant l'Amérique trop., la Chine et le Japon.

**B. hyacinthina R. Brown** in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 206 ; Reichenbach, *Fl. Exot.* t. 118 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1968 ; Blume, *Fl. Javæ (Orchid.)* t. 6. **CYMBIDIUM** — Smith, *Exot. Fl.* I (1805) t. 60 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1492. — Chine, Japon. Ț

**B. Sherrattiana Bateman** in *Bot. Mag.* (1867) t. 5646. — Nouvelle-Grenade. Ț

**B. verecunda R. Brown** in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 206. **CYMBIDIUM** — Swartz in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* VI (1799) 75. **GYAS** — Salisbury in *Trans. Hort. Soc. Lond.* I (1812) 299. — Mexique austr., Guatemala, Nicaragua, Antilles. Ț

25. **CHYSIS** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) t. 1937 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6788. — Six ou huit espèces de l'Amérique trop. (du Mexique à la Colombie).

**C. aurea Lindley** in *Bot. Reg.* XXIII (1837) t. 1937 ; *Bot. Mag.* (1837) t. 3617 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 471. — Du Mexique à la Colombie. Ț

**C. bractescens Lindley** in *Bot. Reg.* (1840) misc. 131 et XXVII (1841) t. 23 ; *Bot. Mag.* (1860) t. 5186 ; *Fl. des Serres* VII t. 675 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 472. — Mexique. Ț

**C. lævis Lindley** in *Bot. Reg.* (1840) misc. 130 ; *Illustr. Hort.* X (1863) t. 365 ; Bateman, *Orchid. Mexic. and Guatem.* t. 31 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* ser. 2, I t. 14. — Mexique. Ț

26. **EARINA** Lindley in *Bot. Reg.* (1834) sub t. 1699 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6793. — Six espèces habitant la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique.

**E. suaveolens** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 61. — Patrie ?

Obs. Cette espèce est dite originaire de la Nouvelle-Zélande, mais le Dr Hooker n'en fait pas mention dans sa flore de ce pays.

27. **CRYPTOCHILUS** Wallich, *Tent. Fl. Nepal.* (1822) 36 t. 36 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6798. — Deux espèces de l'Inde.

**C. sanguinea** Wallich, *Tent. Fl. Nepal.* (1822) 36 t. 36 ; *Bot. Reg.* XXIV t. 23 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* V t. 1757 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 461 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 827. — Nepaul, Sikkim, Khasia, Naga Hills. ♀

28. **TRICHOSMA** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) t. 21 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6799. — Genre monotype.

**T. suavis** Lindley in *Bot. Reg.* (1841) misc. 83 et (1842) t. 21 ; *Orchid Alb.* III t. 114 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 827. **ERIA** — Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 52. **E. coronaria** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) I 235 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 271. — Sikkim, Khasia. ♀

29. **COELOGYNE** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) sub t. 33 ; T. Durand., *Ind. Gen.* n. 6860. — Genre d'environ 60 esp. bien distinctes habitant l'Inde or., l'archipel Malais et la Chine austr.

**C. barbata** Lindley in GRIFFITH, *Itinerary Notes* II (1848) 72 et *Icon. Pl. Asiat.* t. 290 et 291 ; *Orchid Alb.* III t. 143 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 32 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 229 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 839. — Inde or. (Khasia, Naga Hills, (Munnipore ?), Bhotan). ♀

**C. breviscapa** Lindley, *Fol. Orchid. (Cælog.)* 4 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 225 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 833. **C. angustifolia** Wallich, *Icon. Pl. Ind. Or.* V (1852) 5 t. 1641. — Ceylan, Nilghiris. ♀

**C. cristata** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) sub t. 33 ; *Bot. Reg.* XXVII t. 29 ; Linden, *Pescatorea* I t. 25 ; *Gartenflora* VIII t. 245 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 163 t. 1807 ; *Orchid Alb.* t. 34 ; Jennings, *Orchids* t. 7 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 829 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 34 cum icone. — Inde or.-bor. (Himalaya temp., Silhet). ♀



**Cœlogyne elata** Lindley in WALLICH, *Catal.* (1829) n. 1959; Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* III t. 218; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 37; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 838. — Inde or.-bor. (Himalaya trop., du Garwhal au Bhotan, Burma). 2

**C. flaccida** Lindley in WALLICH, *Catal.* (1829) n. 1961 et *Gen. and Sp. Orch.* 40; *Bot. Mag.* (1857) t. 5001; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 230; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 38; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 829. — Inde or. (Himalaya sub trop., Tenasserim). 2

**C. fuliginosa** Loddiges mss. ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1849) t. 4440; Lindley, *Fol. Orchid. (Cœlog.)* 12; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 7; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 39; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 836. — Moulmein?, Java. 2

**C. fuscescens** Lindley in WALLICH, *Catal.* (1829) n. 1962; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 41 et *Fol. Orchid. (Cœlog.)* 11; *Bot. Mag.* (1865) t. 5494; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 231; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 40; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 833. — Inde or. (Himalaya trop., Khasia). 2

**C. Gardneriana** Lindley in WALLICH, *Pl. Asiat. Rar.* I (1830) 33 t. 38; Lindley, *Gen. and Sp. Orchid.* 41 et *Fol. Orchid. (Cœlog.)* 1; Paxton, *Mag. of Bot.* VI t. 73; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 222; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 41; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 828. — Inde or. (Himalaya sub trop., Khasia). 2

**C. graminifolia** Parish et Reichenbach f. in *Trans. Linn. Soc. Lond.* XXX (1874) 146; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 831. — Assam, Tenasserim. 2

**C. humilis** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) 37 et *Gen. and Sp. Orch.* 43; *Bot. Mag.* t. 5674; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* III 55; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 840. PLEIONE — Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 37; Paxton, *Flow. Gard.* t. 51. EPIDENDRUM — Smith, *Exot. Bot.* II (1805) t. 98. — Inde or. (Himalaya temp. au Nepaul), Sikkim, Munnipore. 2

**C. Lagenaria** Lindley, *Fol. Orchid. (Cœlog.)* 15; *Bot. Mag.* (1863) t. 5370; *Fl. des Serres* t. 2386; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 56; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 841. PLEIONE — Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* II t. 39 fig. 2; De Puydt, *Les Orchidées* t. 36. — Inde (localité inconnue). 2

**C. longifolia** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 42. CHELONANTHERA — Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Ind.* (1825) 385 t. 51. — Java. 2

**C. Massangeana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) 684 et (1882) I 369; *Bot. Mag.* (1887) t. 6979; *Flor. Mag.* n. ser. t. 373; *Orchid Alb.* I t. 29; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 43; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 830. — Patrie?

Obs. Cette espèce, dite de l'Assam, est plus probablement d'origine malaise.

**C. Mayeriana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) II 134. — Hab.? 2

**C. nitida** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) 33 et *Gen. and Sp. Orch.* 40; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 837. CYMBIDIUM — Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 et *Fl. Ind.* III 459. CŒLOGYNE OCELLATA Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1953 pr. p.; *Bot. Mag.* (1839) t. 3767; *Flor. Mag.* n. ser. t. 365; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 228; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 44. — Inde or. (Himalaya or.-temp., Khasia). 2

**Cœlogyne Parishii** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1862) t. 5323 et *Fl. Brit. Ind.* V 837; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 48. — Moulmein. ♀

**C. præcox** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) 37 et *Fol. Orchid. (Cœlog.)* 16; *Bot. Mag.* (1850) t. 4496; Paxton, *Mag. of Bot.* XIV t. 7; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 840. **PLEIONE** — Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 37. **P. BIRMANICA** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 840. — Inde or. (Himalaya temp., Khasia, Tenasserim). ♀

**C. Reichenbachiana** T. Moore in *Gard. Chron.* (1868) 1210; *Bot. Mag.* (1869) t. 5753; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 59; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 841. — Inde or. (Arracan). ♀

**C. Schilleriana** Reichenbach f. in *Berl. Allgem. Gartenzeit.* (1858) 189 et *Xenia Orchid.* II t. 134; *Bot. Mag.* (1858) t. 5072; *Fl. des Serres* XXII (1877) 61 t. 2302; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* VI 49; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 834. — Moulmein. ♀

**C. speciosa** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 39; *Bot. Mag.* (1855) t. 4889; De Vriese, *Illustr. Orch. Indes Néerl.* I t. 11; Blume, *Bijdr. Fl. Ned. Ind.* 384 t. 51; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 334. **CHELONANTHERA** — Lindley in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 21. — Java, Pérak. ♀

**C. uniflora** Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1966; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 42. **PANISEA** — Lindley, *Fol. Orchid. (Panisea)* (1854) n. 2; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 240. **EPIDENDRUM** (sp.) Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 313 fig. 1. — Himalaya trop., Khasia, Tenasserim. ♀

30. **PHOLIDOTA** Lindley in Hooker, *Exot. Fl.* II (1825) t. 138; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6802. — Genre d'environ 20 esp. de l'Inde, de l'Archipel Malais et de la Chine austr.

**P. conchoidea** Lindley in *Bot. Reg.* XXVI (1840) misc. 198. **CÆLOGYNE** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 237. — Manille. ♀

**P. imbricata** Lindley in Hooker, *Exot. Fl.* II (1825) t. 138; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 36 et in *Bot. Reg.* (1829) t. 1213 et (1835) t. 1777; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1934; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 846. **CYMBIDIUM** — Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 460. **CÆLOGYNE** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1861) 238. — Inde or., Ceylan, îles Andaman. ♀

31. **CALANTHE** R. Brown in *Bot. Reg.* (1821) sub t. 573; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6803. — Genre d'environ 40 espèces habitant la rég. trop. de l'ancien et du nouveau monde, l'Afrique austro-or. et le Japon.

**C. discolor** Lindley, *Sert. Orchid.* (1837) sub t. 9 et in *Bot. Reg.* XXVI (1840) t. 55; Maximowicz, *Mélang. Biol.* VIII 641; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 25. — Japon. ♀

- Calanthe Masuca Lindley**, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 249 et in *Bot. Reg.* XXX (1844) t. 37; *Bot. Mag.* (1850) t. 4541; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 62; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 915; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 850. **BLETIA** — D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 30. — Inde or. (Himalaya trop., Deccan), Java.
- C. Regnieri Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1883) I 274; *The Garden XXIV* (1883) 46 t. 397; *Lindenia* II t. 91; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 140. — Cochinchine. ♀
- var. **Stevensiana** NOB. C. STEVENSIANA Regnier ex Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 274 in nota; *Belg. Hort.* XXXIV (1884) 26. — Cochinchine. ♀
- C. Sanderiana Hort.** ex WILLIAMS, *Catal.* (1889) 21 et *Orch. Grow. Man.* ed. VII 140; *Rev. Hort.* (1889) 191. — Cochinchine. ♀
- C. striata R. Brown** in *Bot. Reg.* (1821) sub t. 573 in nota; Maximowicz, *Mélang. Biol.* VIII 641; Miquel, *Prolus. Jap.* 136; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* II 24. — Japon, ? Java. ♀
- var. **Sieboldi** MAXIMOWICZ, *Mélang. Biol.* VIII (1872) 641. G. SIEBOLDI Decaisne in *Rev. Hort.* (1855) 381 t. 20; *Gartenflora* (1869) t. 635. — Avec le type.
- C. Veitchii Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1859) 1016; *Bot. Mag.* (1863) t. 5375; *Gartenflora* (1873) t. 751; *Orchid Alb.* I t. 31; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 141. — Hybride du C. VESTITA × LIMATODES ROSEA.
- C. veratrifolia R. Brown** ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1821) sub t. 573 et (1823) t. 720; *Bot. Mag.* (1825) t. 2615; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 958; Fitzgerald, *Austral. Orchids* I, IV t. 4; Bentham, *Fl. Austral.* VI 482; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 851. **LIMODORUM** — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 122. — Deccan, Ceylan, îles Malaises, Australie. ♀
- C. vestita Lindley** in WALLICH, *Catal.* (1832) n. 7345 et *Gen. and Sp. Orch.* 250; *Bot. Mag.* (1852) t. 4671; *Fl. des Serres* VIII t. 816; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* V t. 1751-52; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 852. **PREPTANTHE** — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1853) 493 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 460. — Inde (Tavoy, Moulmein). ♀
- C. Williamsii Moore**, *Belg. Hort.* XXXIV (1884) 24; *Orchid Alb.* III t. 134; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 144. — Cochinchine. ♀
32. **HEXISEA** Lindley in Hooker, *Journ. of Bot.* I (1834) 7; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6812. — Genre de 3 ou 4 esp. de l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).
- H. bidentata Lindley** in HOOKER, *Journ. of Bot.* I (1834) 8; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 470; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 219. — Nicaragua, Panama, Colombie. ♀

33. **ISOCHILUS** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 209; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6819. — Genre de 4 ou 5 esp. de l'Amérique trop. (des Indes occ. et du Mexique au Brésil).

**I. linearis** R. Brown in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 209; *Bot. Reg.* IX t. 745; Loddiges, *Bot. Cab.* XIV t. 1341; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 447. **EPIDENDRUM** — Jacquin, *Select. Stirp. Amer.* (1780) t. 131; Andrews, *Bot. Repos.* VII (1806) t. 445. **CYMBIDIUM** — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 97. — Des Antilles et du Mexique au Brésil et au Venezuela. ♀

34. **PONERA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 113; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6820. — Genre d'une douzaine d'espèces du Mexique et de l'Amérique centr.

**P. graminifolia** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 17; Reichenbach f., in Walpers, *Annal. Bot.* VI 450. **NEMACONIA** — Knowles et Westcott, *Flor. Cab.* II (1838) 127. — Mexique austr. ♀

**P. violacea** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 22 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 453. **SCAPHYLOTTIS** — Lindley in *Bot. Reg.* XII (1836) t. 1901; *Bot. Mag.* (1844) t. 4071. — Guyane (Demerara). ♀

35. **HARTWEGIA** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1970; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6822. — Deux espèces du Mexique et de l'Amérique centr.

**H. purpurea** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1970; Reichenbach f. in Saunders, *Refug. Bot.* t. 94 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 445. — Mexique austr., Guatemala. ♀

36. **EPIDENDRUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 1016 pr. p.; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6823. — Genre d'environ 400 esp. habitant l'Amérique subtrop. et trop. (de la Floride à la Plata).

**E. advenum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 1194. — Brésil. ♀

**E. amabile** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 219 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 332; Linden in *Illustr. Hort.* XXVIII (1881) 96; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 225. — Mexique. ♀

**E. anceps** Jacquin, *Select. Stirp. Amer.* (1763) 224 t. 138; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 225. **E. fuscatum** Smith, *Spicil. Bot.* (1792) 21 t. 23; Swartz in *Nov. Act. Acad. Upsal.* VI (1799) 69; *Bot. Mag.* (1828) t. 2844; *Bot. Reg.* (1815) t. 67; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 385. — Amérique trop. (des Indes occ. et du Mexique au Brésil). ♀

- Epidendrum arachnoglossum** Reichenbach f. ex ANDRÉ in *Rev. Hort.* (1882) 554 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VI 85. — Colombie. ♀
- E. aurantiacum** Bateman in *Bot. Reg.* (1838) misc. 8 et *Orch. of Mexic. and Guatem.* t. 12 ; *Gartenflora* V t. 158 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 311. — Mexique, Guatemala. ♀
- E. auritum** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. 4 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 13 ; Reichenbach f. in Saunders, *Refug. Bot.* II t. 87 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 323. — Mexique, Guatemala, Costa-Rica, Guyane. ♀
- E. Candollei** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 55 ; A. De Candolle, *Pl. Rar. Jard. Genève* (8<sup>e</sup> notice) 15 t. 3 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 227 ; Jennings, *Orchids* t. 21 ; *Orchid Alb.* IV t. 157. E. CEPIFORME Hooker in *Bot. Mag.* (1839) t. 3765. — Mexique austr. ♀
- E. ciliare** Jacquin, *Select. Stirp. Amer.* (1780) 224 t. 179 ; *Bot. Mag.* (1799) t. 463 ; *Bot. Reg.* X t. 784 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 347. — Antilles, Mexique, Amérique centr. et austr.-trop. ♀
- E. cochleatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1331 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 572 ; Loddiges, *Bot. Cab.* I t. 22 ; Reichenbach f., *Fl. Exot.* II t. 96 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 359. — Du Mexique et des Antilles au Venezuela. ♀
- E. crassifolium** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 107 ; *Bot. Mag.* (1837) t. 3543. — Brésil. ♀
- E. ellipticum** R. Graham in HOOKER, *Exot. Fl.* III (1827) t. 207 et in *Edinb. New Phil. Journ.* I (1826) 121 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XIII t. 1276. Brésil. ♀
- E. equitans** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 44 et *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 237 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 397 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 53. — Mexique austr., Nicaragua. ♀
- E. falcatum** Lindley in *Ann. of Nat. Hist.* IV (1840) 382 et *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 91 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 348 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 36. — Mexique. ♀
- E. fragrans** Swartz, *Prodr. Veget. Ind. Occ.* (1788) 123 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 122 ; *Bot. Mag.* (1814) t. 1669 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 1039 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 357 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 615. E. ÆMULUM Lindley in *Bot. Reg.* XXII (1835) t. 1898. — Des Antilles et du Guatemala à l'Équateur et au Brésil.
- E. fucatum** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 15 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 330. E. SAGREANUM A. Richard, *Fl. Cub. Phanerog.* II (1845-55) 235 t. 75. — Cuba. ♀
- E. Hanburii** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) misc. 46 et *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 77 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 344 ; *Gartenflora* (1863) t. 398. — Mexique austr. ♀
- E. Lindbergii** Reichenbach f., *Otia Bot. Hamb.* II (1881) 91. — Brésil. ♀

- Epidendrum nemorale** Lindley in Hooker, *Journ. of Bot.* III (1841) 82 et *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 60. **E. verrucosum** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) t. 31 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III t. 253 ; *Bot. Mag.* (1851) t. 4606 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* t. 13 (var. MAJUS). — Mexique austr. ʒ
- E. nutans** Swartz, *Prodr. Veget. Ind. Occ.* (1788) 211 ; *Bot. Reg.* I (1815) t. 11 ; Loddiges, *Bot. Cab.* VII (1822) t. 645 ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 650 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 376. — Indes occ. ʒ
- E. odoratissimum** Lindley in *Bot. Reg.* (1831) t. 1415 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 330. **MACRADENIA LUTESCENS** Loddiges (non R. Brown), *Bot. Cab.* XVI (1829) t. 1556. **ENCYCLIA PATENS** Hooker in *Bot. Mag.* (1830) t. 3013. — Brésil. ʒ
- E. pallidiflorum** Hooker in *Bot. Mag.* (1830) t. 2980 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 180 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 378 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VI 109. — Saint-Domingue. ʒ
- E. Parkinsonianum** Hooker in *Bot. Mag.* (1840) t. 3778 ; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) I 724. **E. ALOIFOLIUM** Bateman, *Orchid. of Mexic. and Guatem.* (1840) t. 25 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 236. — Mexique. ʒ
- E. pentotis** Reichenbach f. in *Linnaea* XLI (1877) 81. — Brésil. ʒ
- E. polyanthum** Lindley, *Gen. and Sp. Orchid.* (1831) 106 et *Fl. Orchid.* (Epidendr.) n. 187 (excl. var.  $\beta$ ) ; Saunders, *Refug. Bot.* II t. 112 ; Bateman, *Orch. Mex. and Guatem.* t. 34. **E. FUNIFERUM** Ch. Morten in *Annal. de Gand* IV (1848) 211 t. 198. — Du Mexique austr. au Venezuela et au Brésil.
- E. prismatocarpum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* X (1852) 729 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5336 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 322 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 34 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* I t. 9. — Panama. ʒ
- E. pseudepidendrum** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1856) 160 t. 53 ; in Walpers, *Annal. Bot.* VI 414 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 39 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 238. **PSEUDEPIDENDRUM SPECTABILE** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 733 et *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 107. — Panama. ʒ
- E. raniferum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 109 ; *Bot. Reg.* (1842) t. 42 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 372 ; *Belg. Hort.* (1882) 340. — Mexique austr. ʒ
- E. Schomburgkii** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 15 et XXIV t. 53 ; Paxton, *Mag. of Bot.* X t. 121 ; Maund, *The Botan.* IV t. 165 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 389 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VI 116. — Guyane anglaise. ʒ
- E. selligerum** Bateman ex Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 40 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Epidendr.) n. 26 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 327. — Mexique austr., Guatemala. ʒ
- E. Sophronitis** Lindley et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1857) 655 ; *Bot. Mag.* (1877) t. 6314 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II 161 t. 167. — Equateur. ʒ

37. **CATTLEYA** Lindley in *Bot. Reg.* (1824) t. 33 et 37 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6825. — Genre de 20 esp. environ, à variétés nombreuses, habitant l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).

**C. Aelandiæ** Lindley in *Bot. Reg.* XXVI (1840) t. 48 ; *Bot. Mag.* (1867) t. 5639 ; *Fl. des Serres* VII 83 t. 674 ; Paxton, *Mag. of Bot.* IX t. 1 ; *Orchid Alb.* II t. 69 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 151. — Brésil. 2

**C. bicolor** Lindley in *Bot. Reg.* (1836) sub t. 1919 et *Sert. Orchid.* (1838) t. 5 fig. 1 ; *Bot. Mag.* (1856) t. 4909 ; *Lindenia* VII t. 292 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 153. — Brésil. 2

**C. Bowringiana** Veitch ex O'BRIEN in *Gard. Chron.* (1885) II 683 ; *Orchid Alb.* VI (1888) t. 323 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* II 31 cum icone. — Honduras angl. 2

**C. citrina** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) sub t. 37 et in *Bot. Reg.* XXX t. 5 ; *Bot. Mag.* (1839) t. 3742 ; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) t. 1689 ; *Gartenflora* t. 931 ; Linden, *Pescatorea* I t. 9. EPIDENDRUM — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1862) 31 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 317. SOBRALLA — La Llave et Lexarsa, *Nov. Veget. Descr.* (1825) 21. — Mexique austr. 2

**C. dolosa** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 224 in synonym. ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 184 t. 12 ; de Puydt, *Les Orchidées* 23 fig. 26 ; *Gard. Chron.* (1876) I 430 fig. 78 et 79 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 160 cum icone. — Brésil. 2

**C. Dowiana** Bateman in *Gard. Chron.* (1866) 922 ; *Bot. Mag.* (1867) t. 5618 ; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) 185 t. 1709 ; *Illustr. Hort.* XIV (1867) t. 525 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1869) 193 t. 13-14 ; *The Garden* XXI t. 322 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* II t. 27 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 160. — Costa-Rica. 2

**C. Forbesii** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) sub t. 37 ; *Bot. Mag.* (1833) t. 3265 ; *Bot. Reg.* XI (1826) t. 953 ; *Fl. des Serres* III t. 199. — Brésil. 2

**C. guttata** Lindley in *Bot. Reg.* XVII (1831) t. 1406 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XVIII (1831) t. 1715 ; Ch. Morren in *Annal. de Gand* (1848) t. 175 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 37 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 165. C. ELATIOR Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 117. — Brésil. 2

— var. **Leopoldi** LINDLEY et REICHENBACH F. in *Pescatorea* (1860) t. 43 ; C. LEOPOLDI Verschaffelt et Lemaire in *Illustr. Hort.* I (1854) 68 et II (1855) t. 69 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 209 t. 1871-72 ; *Orchid Alb.* I t. 16.

— — var. **Prinzii** REICHENBACH F. in *Bonplandia* IV (1856) 327. EPIDENDRUM ELATIUS Reichenbach f., var. PRINZII Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1862) 33 et 173 t. 172 I. C. AMETHYSTOGLOSSA Warner, *Select Orchid. Pl.* I (1862) t. 2 ; *Xenia Orchid.* II (1874) 173. — Brésil. 2

- Cattleya intermedia** **Graham** ex **Hooker** in *Bot. Mag.* (1828) t. 2851; *Bot. Reg.* (1836) t. 1919; Reichenbach f., *Fl. Exot.* I t. 64; *Lindenia* III t. 133; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 39. **EPIDENDRUM** — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1862) 34. — Brésil. ♀
- C. labiata** **Lindley**, *Collect. Bot.* (1821) t. 33 et *Bot. Reg.* XXII t. 1859; *Bot. Mag.* (1843) t. 3998; **Hooker**, *Exot. Fl.* t. 157. **EPIDENDRUM** — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1862) 29 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 313 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 51. — Du Mexique austr. au Venezuela et au Brésil. ♀
- — var. **Eldorado** **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 17. **C. ELDERADO** Linden in *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 13 t. 1826; De Puydt, *Les Orchidées* t. 8. **C. WALLISH** Linden in *Gard. Chron.* (1882) I 557. — Brésil. ♀
- — var. **Gaskelliana** **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 18. **C. GASKELLIANA** Sander in *Gard. Chron.* (1883) I 243 et 310; **Williams**, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 163. — Brésil. ♀
- — var. **Luddemanniana** **Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1883) I 243; **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II 19. **C. LUDDEMANNIANA** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) 29. **C. DAWSONI** **Warner**, *Select Orchid. Pl.* I (1862-65) t. 16. **C. MOSSIE AUTUMNALIS** **Hort.** — Brésil. ♀
- — var. **Mendelii** **Sander**, *Reichenbachia* I (1886) t. 15; **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II 21. **C. MENDELI** **Hort.** ex *Gard. Chron.* (1883) II 404; *Lindenia* I t. 55; *Orchid Alb.* I t. 3 (var. **GRANDIFLORA**); *The Garden* XX (1881) t. 304. — Brésil. ♀
- — var. **Mossie** **Lindley** in *Bot. Reg.* XXVI (1840) t. 58; **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II 24. **C. MOSSIE** **Hooker** in *Bot. Mag.* (1838) t. 3669; **Warner**, *Select Orchid. Pl.* III t. 16; *Orchid Alb.* VI t. 246 et VII t. 289. — Brésil. ♀
- — subvar. **candida** **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 22. **C. LABIATA** **Lindley**, var. — **Van Houtte**, *Fl. des Serres* VII (1851) t. 661. **C. WAGENERI** **Reichenbach f.** in *Bonplandia* II (1854) 21 et *Xenia Orchid.* I (1858) 28 t. 15.
- — subvar. **superba** **T. Moore** in *Gard. Chron.* (1864) 554. **C. MOSSIE** **Hooker**, var. — **Linden** in *Illustr. Hort.* XXVIII (1881) 80.
- — var. **Trianae** **Duchartre** in *Journ. Soc. Hort. Paris* (1860) 369 t. 369; **Reichenbach f.**, *Xenia Orchid.* II 30; **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II 24. **C. TRIANA** **Linden** et **Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* (1860) 74 et in **C. Koch**, *Wochenschrift* III (1860) 67; **Karsten**, *Fl. Columb.* I t. 49; *Orchid Alb.* I t. 45. **C. QUADRICOLOR** **Lindley** in **Paxton**, *Flow. Gard.* I (1850) 6 et in *Gard. Chron.* (1864) 269; *Bot. Mag.* (1865) t. 5504; *Illustr. Hort.* XIV (1867) t. 514. **C. BOGOTENSIS** **Linden** ex **Ch. Morren** in *Belg. Hort.* XV (1863) 102. **C. CHO-COENSIS** **Ed. André** in *Illustr. Hort.* XVII (1870) 37 t. 120. — Brésil. ♀
- — var. **Warneri** **O'Brien** in *Gard. Chron.* (1883) II 372 fig. 57; **Veitch**, *Man. Orch. Pl.* II 27. **C. WARNERI** **T. Moore** ex **Warner**, *Select Orchid. Pl.* I (1862-65) t. 8; *Flor. Magaz.* (1871) t. 516. — Brésil. ♀



- Cattleya labiata** var. **Warszewiczii** REICHENBACH f., in *Gard. Chron.* (1883) I 243 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 28. C. WARSCEWICZII Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 112 et *Xenia Orchid.* I 78 t. 31 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* t. 4 (var. DELICATA) ; *Flor. Mag.* t. 8 (var. DELICATA). C. GIGAS Linden et André in *Illustr. Hort.* XX (1873) 70 et XXI (1874) t. 178 ; *The Garden XXI* (1882) t. 337 ; *Flor. Mag.* ser. 2 t. 144 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* III t. 7. C. IMPERIALIS O'Brien in *Gard. Chron.* (1883) II 404. C. SANDERIANA Hort. Low. ex *Gard. Chron.* (1882) II 151. C. GIGAS SANDERIANA Hort. ex *Gard. Chron.* (1883) II 401 fig. 62. — Avec le type.
- C. Lawrenceana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1885) I 338 et 375 cum icône ; Sander, *Reichenbachia* I t. 12 ; *Orchid Alb.* VII t. 342 ; *Lindenia* I t. 44 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 41. C. MOSSLÆ Schomburgk, *Fanna et Fl. Brit. Guiana* (1848) 1068. — Guyane anglaise. ♀
- C. Loddigesii** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 37 ; Hooker, *Exot. Fl.* III t. 186 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 42. EPIDENDRUM VIOLACEUM Loddiges, *Bot. Cab.* IV (1819) t. 337. C. OVATA et MARITIMA Lindley in *Bot. Reg.* (1838) sub t. 1919. — Brésil. ♀
- — var. **Harrisoniana** ROLFE in *Gard. Chron.* (1889) I 746. C. HARRISONIANA Bateman in Lindley, *Bot. Reg.* (1836) sub t. 1919 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 167. C. HARRISONIÆ Paxton, *Mag. of Bot.* IV (1838) 247. C. HARRISONII Hort. ex Duchartre in *Journ. Soc. Hort. Fr.* (1857) 725 t. 7. — Brésil. ♀
- C. luteola** Lindley in *Gard. Chron.* (1853) 774 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5032 ; *Fl. des Serres* t. 2479 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I t. 83 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 43. EPIDENDRUM — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 28. — Brésil et rég. supér. de l'Amazone. ♀
- C. Schilleriana** Reichenbach f. ex C. KOCH in *Berl. Allgem. Gartenzeit.* (1857) 335 ; *Fl. des Serres* XXII (1877) 29 t. 2286 ; *Bot. Mag.* (1859) t. 5150 (var. CONCOLOR) ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 45. EPIDENDRUM — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 34, 36 t. 111. C. REGNELLI Warner, *Select Orchid. Pl.* II (1865-75) t. 22. — Brésil. ♀
- C. Skinneri** Bateman, *Orch. Mexic. and Guatem.* (1837-43) t. 13 ; *Bot. Mag.* (1846) t. 4270 et 4916 (var. PARVIFLORA) ; Paxton, *Mag. of Bot.* XI 193 cum icône ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 45. EPIDENDRUM HÜGELIANUM Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1862) 29. — Mexique austr., Amérique centr. ♀
- C. velutina** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1870) 140, 1373 et (1872) 1259 fig. 288-289 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 192 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 87. C. WALKERIANA × SCHILLERIANA Warner et Williams, *Orchid. Alb.* II (1882) t. 26. — Brésil. ♀
- C. Walkeriana** Gardner in HOOKER, *London Journ. of Bot.* II (1843) 662 ; *Bot. Reg.* (1847) t. 42 ; *Belg. Hort.* (1880) t. 17 ; Linden, *Pescatorea* I t. 41 ; *Orchid Alb.* IV t. 154 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 193 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 50. — Brésil. ♀

- Cattleya Walkeriana** var. **nobilior** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 50. C. NOBILIOR Reichenbach f. in *Illustr. Hort.* (1883) 73 t. 485; *Gard. Chron.* (1883) I 728 fig. 120; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 181. — Brésil. ʒ
- — var. **Schröderiana** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 50. C. SCHRÖDERIANA Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 102 Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 185. — Brésil. ʒ

38. **TETRAMICRA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 119 (gen. emend.); T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6827. — Genre d'environ 6 esp. de l'Amérique trop. (des Indes occ. et du Mexique au Brésil).

- T. bicolor** Veitch, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 99. LEPTOTES — Lindley in *Bot. Reg.* XIX (1833) t. 1625; *Bot. Mag.* (1839) t. 3734; Irmisch, *Orchid.* t. 6; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 454. — Brésil. ʒ
- T. serrulata** Lindley (sub LEPTOTIDE), *Sert. Orchid.* (1837) t. 11; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 455. — Brésil. ʒ

39. **BRASSAVOLA** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 216; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6828. — Genre de 20 espèces de l'Amérique trop. (des Indes occ. et du Mexique au Brésil).

- B. acaulis** Lindley in PAXTON, *Flow. Gard.* II (1851-52) 152 fig. 216; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 278 cum ic. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 435 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 41; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 126. — Amérique centr. ʒ
- B. filifolia** Linden in *Illustr. Hort.* XXVIII (1881) 64. — Colombie. ʒ
- B. fragrans** Lemaire in *Le Jard. Fleur.* III (1853) misc. 78 cum icone et *Illustr. Hort.* V (1858) t. 180. — Brésil (Sainte-Catherine). ʒ
- B. lineata** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 4734; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 127. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 436, *Xenia Orchid.* II 64 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 40. — Costa-Rica, Guatemala. ʒ
- B. subulifolia** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 115. B. NODOSA Hooker (non Lindley) in *Bot. Mag.* (1833) t. 3229. — Jamaïque. ʒ
- B. venosa** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 20 t. 39; *Bot. Mag.* (1843) t. 4021; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 128. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 437 et *Xenia Orch.* II 65. — Honduras, Guatemala. ʒ

40. **LÆLIA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 115 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6829. — Genre de 20 esp. de l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).

**L. albida** Bateman ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1839) misc. 2 t. 54 ; *Bot. Mag.* (1842) t. 3957 ; *Orchid. Alb.* III t. 138 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 55. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 428 et *Xenia Orchid.* II 57. — Mexique. 2

**L. anceps** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1751 ; *Bot. Mag.* (1840) t. 3804 ; *Orchid. Alb.* II t. 75 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 56. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 418 et *Xenia Orchid.* II 47. — Mexique austr. 2

**L. autumnalis** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1831) 115 ; *Bot. Mag.* (1840) t. 3817 ; *Bot. Reg.* XXV t. 27 ; Bateman, *Orchid. of Mex. and Guatem.* t. 9 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 61. BLETIA — La Llave et Lexarsa, *Nov. Veget. Descr.* II (1825) 19 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 427 et *Xenia Orchid.* II 56. — Mexique austr. 2

**L. cinnabarina** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 28 ; *Bot. Mag.* (1847) t. 4302 ; Paxton, *Mag. of Bot.* VII (1840) t. 193 ; *Gartenflora* (1867) t. 559 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 68. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 430 et *Xenia Orchid.* II (1874) 64. — Brésil. 2

**L. Digbyana** Benthams mss. ex HEMSLEY, *Biol. Centr.-Amer.* III (1882) 246 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 65. BRASSAVOLA — Lindley in *Bot. Reg.* XXXII (1846) t. 53 ; *Bot. Mag.* (1849) t. 4474 ; *Fl. des Serres* III t. 237. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 422. — Honduras. 2

**L. Dominicana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) II 332 ; *Fl. Mag. ser.* 2 t. 325 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 454 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 95. — Hybride du CATTLEYA DOWIANA  $\times$  ? L. ELEGANS.

**L. Dormaniana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1880) I 168 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 65. — Brésil. 2

**L. elegans** Reichenbach f. in OTTO et DIETRICH, *Allgem. Gartenz.* (1855) 242 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* 6 t. 12 ; De Puydt, *Les Orchidées* t. 21 ; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* II 66. CATTLEYA — Ch. Morren in *Ann. de Gand* IV (1848) 93 tab. 185 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4700 ; Linden, *Pescatorea* t. 23. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 427 et *Xenia Orchid.* II (1874) 55. — Brésil. 2

— — var. **Schilleriana** VEITCH, *Man. Orchid. Pl.* II (1887) 16. L. SCHILLERIANA Reichenbach f. in OTTO et Dietrich, *Berl. Allgem. Gartenzeit.* (1855) 322. 2

— — var. **St-lazneriana** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 67. L. STELZNERIANA Reichenbach f. in *Hamb. Gartenz.* (1860) 282 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 267 t. 1494-95.

**Laelia flava** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 142 et (1842) t. 62; Veitch, *Man. Orchid. Pl.* II 69. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 431. — Brésil (Minas Geræs). Ț

**L. furfuracea** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) t. 26 et (1842) sub t. 62; *Bot. Mag.* (1840) t. 3810; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 70. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 428 et *Xenia Orchid.* II 56. — Mexique austr. Ț

**L. glauca** Benthām mss. ex HEMSLEY, *Biol. Centr.-Amer.* III (1882) 246; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 70. BRASSAVOLA — Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 47 et XXVI (1840) t. 44; *Bot. Mag.* t. 4033; Bateman, *Orchid. of Mex. and Guatem.* t. 16. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 423 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 88. — Mexique austr., Guatemala. Ț

**L. harpophylla** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) 542; *Orchid Alb.* III t. 117; *Flor. Mag.* ser. 2 (1879) t. 372; *The Garden* XXIV (1883) t. 400; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 72. — Brésil. Ț

**L. Lindleyana** Veitch, *Man. Orchid. Pl.* II (1887) 73. BLETIA — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1865) 65 t. 133. CATTLEYA — Reichenbach f. ex C. Koch in *Berl. Allgem. Gartenzeit.* (1857) 118; *Bot. Mag.* (1864) t. 5449. — Brésil (Bahia). Ț

**L. majalis** Lindley in *Bot. Reg.* (1839) misc. 35 et (1844) t. 30; *Bot. Mag.* (1867) t. 5667; Bateman, *Orchid. of Mex. and Guatem.* t. 23; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 75. BLETIA GRANDIFLORA La Llave et Lexarsa, *Nov. Veget. Descr.* II (1825) 17; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II 55. — Mexique. Ț

**L. monophylla** N. E. Brown in *Gard. Chron.* (1882) II 782; *Bot. Mag.* (1883) t. 6683; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 76. TRIGONIDIUM — Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* (1864) 629. — Jamaïque. Ț

**L. peduncularis** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) misc. 9 et XXXI (1845) t. 69; *Bot. Mag.* (1844) t. 4099; *Orchid Alb.* IV t. 173. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 426 et *Xenia Orchid.* II 54. — Mexique, Guatemala. Ț

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* II 82) réunit cette espèce au **L. RUBESCENS** Lindley.

**L. Perrinii** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) t. 62; *Orchid Alb.* II t. 60; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 77. CATTLEYA — Lindley, *loc. cit.* (1838) t. 2. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 421 et *Xenia Orchid.* II (1874) 49. — Brésil (Sierra des Orgues). Ț

**L. pumila** Reichenbach f. in VAN HOUTTE, *Fl. des Serres* IX (1853) 102 et *Xenia Orchid.* II t. 115; *Bot. Mag.* (1865) t. 5498; Warner, *Select Orch. Pl.* II (1865-75) t. 32; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 78. CATTLEYA — Hooker in *Bot. Mag.* (1839) t. 3656; *Bot. Reg.* (1844) t. 5. C. MARGINATA Paxton, *Mag. of Bot.* X (1843) 265. — Brésil. Ț

**Laelia pumila** var. **præstans** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 79. L. PRÆSTANS Reichenbach f. in *Berl. Allgem. Gartenzeit.* (1857) 336 et *Xenia Orchid.*, II t. 114; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) t. 1900. L. PUMILA Reichenbach f.; var. — VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) t. 79. — Brésil. ʒ

**L. purpurata** Lindley in PAXTON, *Flow. Gard.* III (1852-53) t. 96; Linden, *Pescatorea* I t. 37; *Illustr. Hort.* III (1856) t. 83; *Fl. des Serres* XI (1856) 133 t. 1138-39; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 80. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 423 et *Xenia Orchid.* II (1874) 52. Brésil. ʒ

**L. rubescens** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 20 t. 41; *Bot. Mag.* (1856) t. 4905; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 269 t. 742. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 425 et *Xenia Orchid.* II 53. — Nicaragua, ? Mexique. ʒ

**L. superbiens** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 46 t. 41; *Bot. Mag.* (1864) t. 4090; *Fl. des Serres* XI (1856) 209 t. 1178-79; Bateman, *Orchid. of Mexic. and Guatem.* t. 38; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 81. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 418 et *Xenia Orchid.* II (1871) 52. — Brésil, Guatemala. ʒ

**L. xanthina** Lindley in HOOKER, *Bot. Mag.* (1859) t. 5144; *Fl. des Serres* XXIII (1880) t. 2418; *Orchid. Alb.* I t. 23; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 83. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 425 et *Xenia Orchid.* II (1874) 51. — Brésil. ʒ

41. **SCHOMBURGKIA** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 10 et 13; T. Durand, *Ind. Gen.* t. 6830. — Genre de 13 esp. de l'Amérique trop.

**S. crispa** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 10; *Bot. Reg.* XXX (1844) t. 23; *Bot. Mag.* (1839) t. 3729 (var. EMARGINATA) Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 101. BLETIA CRISPINA Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 419 et *Xenia Orchid.* II (1874) 49. — Guyane anglaise. ʒ

**S. rosea** Linden, *Herb.* n° 1664 apud Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) sub t. 53 in textu; Linden, *Pescatorea* t. 32. BLETIA ROSEA Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 420. — Colombie. ʒ

**S. tibicinis** Bateman in LINDLEY, *Bot. Reg.* (1838) 8 et *Orchid. of Mexic. and Guatem.* t. 30; *Bot. Mag.* t. 4476 (var. GRANDIFLORA); *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 30; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 103. BLETIA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 429 et *Xenia Orchid.* II 58. — Mexique, Amérique centr. ʒ

**S. undulata** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) misc. 21 et XXXI (1845) t. 53, Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 21; Linden, *Pescatorea* I t. 32; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 104. BLETIA — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 49. — Vénézuéla. ʒ

42. **SOPHRONITIS** Lindley in *Bot. Reg.* (1827) t. 1129 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6831. — Genre de 4 ou 5 esp. du Brésil.

**S. cernua** Lindley in *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1129 ; Paxton, *Flow. Gard.* III 10 fig. 236 ; *Bot. Mag.* (1838) t. 3677 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 466 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 103. — Brésil. ʒ

**S. coccinea** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 463 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 7 t. 1716. **CATTLEYA** — Lindley in *Bot. Reg.* XXII (1836) sub t. 1919. — Brésil. ʒ

**S. grandiflora** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 5 ; *Bot. Mag.* (1839) t. 3709 ; Paxton, *Mag. of Bot.* IX t. 1943 ; Warner, *Select Orch. Pl.* III t. 3. **S. MILITARIS** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 463. — Brésil. ʒ

— — var. **purpurea** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* II (1887) 106. **S. PURPUREA** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) I 462. — Brésil. ʒ

**S. violacea** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 18 ; Paxton, *Flow. Gard.* III 11 fig. 238 ; *Bot. Mag.* (1886) t. 6880 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 107 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1862) 466. — Brésil. ʒ

43. **EULOPHIA** R. Brown ex Lindley in *Bot. Reg.* (1823) t. 686 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6832. — Genre d'une soixantaine d'esp. habitant l'Afrique trop. et austr. et l'Asie et l'Australie trop. ; il y a, en outre, une espèce au Mexique et une au Brésil.

**E. megistophylla** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1885) I 787 et in *Flora* LXVIII (1885) 379 ; T. Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 23. — Comores. ʒ

**E. pulchra** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 182 ; S. Moore in Baker, *Fl. of Maurît.* 360 ; T. Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 24. **LIODORUM** — Thouars, *Orch. îles Afr.* (1822) t. 43 et 44. — Maurice, Réunion, Comores. ʒ

44. **LISSOCHILUS** R. Brown in Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 31 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6833. — Genre de 32 esp. de l'Afrique trop. et austr.

**L. streptopetalus** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 191 et in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II 204 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 669 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 31. **EULOPHIA** — Lindley in *Bot. Reg.* XII (1821) t. 1002 ; *Bot. Mag.* (1839) t. 2931. — Colonie du Cap. ʒ

45. **GALEANDRA** Lindley in Bauer, *Illustr. Orch. Pl. Gen.* (1832?) t. 8 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6834. — Genre de 6 espèces de l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).

**G. Devoniana** Schomburgh ex LINDLEY, *Sert. Orchid.* (1840) t. 37 ; *Bot. Mag.* (1851) t. 4610 ; *Illustr. Hort.* XXI (1874) t. 176 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III t. 195 ; Warner, *Select Orch. Pl.* t. 17 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 649. — Nouvelle-Grenade, bassin de l'Amazonie.

— — var. **Delphina** LINDEN et RODIGAS in *Lindenia* II (1886) 67 t. 80.

**G. minax** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 786. — Hab. ?

46. **CYMBIDIUM** Swartz in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* VI (1799) 70 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6835. — Genre d'environ 30 espèces des rég. trop. et subtrop. de l'Ancien Monde.

**C. aloifolium** Swartz in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* VI (1799) 73 ; *Bot. Mag.* (1797) t. 387 ; Loddiges, *Bot. Cab.* t. 967 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 624 (excl. syn. *Icon. Wight*) ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 10. — Inde, îles Andaman, ? Chine. ♀

**C. cyperifolium** Wallich, *Catal.* (1832) n. 7353 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 163 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 13. — Himalaya subtrop., Khasia, Munnipore. ♀

**C. Devonianum** Paxton, *Mag. of Bot.* X (1843) 97 cum ic. ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 625 ; *Orchid Alb.* IV t. 170 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 10 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 18. — Sikkim, Khasia. ♀

**C. eburneum** Lindley in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 67 ; *Bot. Mag.* (1859) t. 5126 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XV (1849) t. 145 ; *Gard. Chron.* (1882) I 497 fig. 75 ; Warner, *Select Orch. Pl.* t. 21 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 11 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 14. — Népal, Sikkim, Khasia. ♀

**C. giganteum** Wallich, *Catal.* (1832) n. 7355 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4844 ; Lindley, *Sert. Orchid.* t. 4 ; Paxton, *Mag. of Bot.* V 241 cum icône ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 12. *IRIDORCHIS* — Blume, *Orch. Archip. Ind.* I (1858) 90 t. 26 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 17. — Himalaya trop., Khasia. ♀

**C. grandiflorum** Griffith, *Notul. ad Pl. Asiat.* III (1851) 342 et *Icon. Pl. Asiat.* III (1851) t. 321 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 12 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 18. **C. HOOKERIANUM** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1866) 7 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5574. — Népal, Sikkim, Bhotan. ♀

**C. Lowianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) I 332 et 405 fig. 56 ; *Flor. Mag.* new ser. t. 353 ; De Puydt, *Les Orchidées* t. 85 fig. 189 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 19. **C. GIGANTEUM** Wallich, var. ? **LOWIANUM** Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI (1890) 13. — Burma. ♀

**Cymbidium madidum** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1840) misc. 9 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 624 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 20. C. ALBUC. FLORUM F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* I (1859) 188 ; Benth, *Fl. Austral.* VI 303. — Australie bor. 2

**C. Mastersii** Griffith mss. ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1845) t. 50 ; *Lindenia* V t. 222. CYPERORCHIS — Benth, in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 318 ; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* VI 14. C. AFFINE Williams (non Griffith), *Orchid. Alb.* III (1884) t. 140. — Khasia, Sikkim, Assam, Munnipore. 2

**C. pendulum** Swartz in *Nov. Act. Acad. Sc. Upsal.* VI (1799) 73 ; *Bot. Mag.* (1839) t. 5710 (var. ATROPURPUREUM) ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 624 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 21. EPIDENDRUM — Roxburgh, *Coromandel Pl.* I t. 44. — Inde. 2

Obs. Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* VI 10) réunit cette espèce au C. ALOIFOLIUM Swartz.

**C. Sinense** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 111. EPIDENDRUM — Andrews, *Bot. Repos.* III (1802) t. 216 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 888. — Chine. 2

**C. tigrinum** Parish ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1864) t. 5457 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 9 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 22. — Tenasserim, Burma. 2

47. GRAMMANGIS Reichenbach f. in Otto, Hamburg. Allgem. Gartenzeitung XVI (1860) 520 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6837. — Deux espèces habitant Madagascar et peut-être aussi Java.

**G. Ellisii** Reichenbach f. in Otto, Hamb. Gartenzeit. XVI (1860) 520 et *Xenia Orchid.* II (1874) 17 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 30. GRAMMATOPHYLLUM — Lindley ex Hooker in *Bot. Mag.* (1860) t. 5179 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 257. t. 1488-89 ; Williams, *Orchid Alb.* IV t. 147. — Madagascar. 2

48. GRAMMATOPHYLLUM Blume, Bijdr. Fl. Nederl. Ind. (1825) 377 t. 20 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6841. — Genre de 3 ou 4 espèces habitant la péninsule et l'archipel Malais (1 esp. à Madagascar).

**G. multiflorum** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 46 ; Blume, *Rumphia* t. 191 ; Paxton, *Flow. Gard.* (1850-52) t. 69 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* IV t. 235 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 629 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 32. — Philippines. 2



49. **DIPODIUM** R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 330 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6842. — Genre de 6 espèces de la péninsule et de l'archipel Malais.

**D. punctatum** R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 331 ; *Bot. Reg.* (1818) t. 1980 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 647 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI 301 ; Fitzgerald, *Austral. Orchids* I 7 t. 4. — Australie. 2

50. **POLYSTACHYA** Hooker, *Exot. Fl.* (1825) t. 103 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6845. — Genre de 40 espèces environ de l'Asie et de l'Afrique trop. (1 esp. dans l'Amérique trop.).

**P. pubescens** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 643 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5586 ; *Lindenia* IV t. 170 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 36. **EPIPHORA** — Lindley in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II (1836) 201 ; Sonder in *Linnaea* XIX (1847) 71. — Du Cap à Delagoa-Bay. 2

51. **CYRTOPODIUM** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 216 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6847. — Genre de 20 espèces environ habitant l'Asie, l'Afrique, l'Amérique trop. et Madagascar.

**C. Andersoni** R. Brown in AITON, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 216 ; *Bot. Mag.* (1816) t. 1800 ; *Bot. Reg.* (1841) t. 8 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 667 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 37. **CYMBIDIUM** — Andrews, *Bot. Repos.* (1812) t. 651. — Amérique trop. 2

52. **GOVENIA** Lindley in Loddiges, *Bot. Cab.* XVIII (1831) t. 1709 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6849. — Genre d'environ 15 espèces de l'Amérique trop. (du Mexique et des Indes occ. au Brésil).

**G. deliciosa** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 836 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 557 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 250. — Mexique austr. 2

**G. fasciata** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. 70 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 558. — Vénézuéla, Pérou. 2

53. **ZYGOPETALUM** Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2748 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6851. — Genre d'environ 50 esp.  
bien distinctes de l'Amérique trop. (des Indes occ. et du  
Mexique au Brésil).
- Z. aromaticum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 668 ; *Xenia Orchid.* I  
t. 73 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 27. WARSCEWICZELLA — Reichenbach f.  
in hort. ex ipso in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 654 ; Williams, *Orch.*  
*Grow. Man.* ed. VII 756. — Panama. ♀
- Z. brachypetalum** Lindley ex REICHENBACH f. in Walpers, *Annal. Bot.*  
VI (1863) 660 ; Regel in *Gartenflora* (1888) t. 1277 (var. *STENOPETALUM* Regel) ;  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 43. — Brésil. ♀
- Z. Burkei** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 684 ; Williams, *Orchid*  
*Alb.* III t. 142 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 759 ; Veitch, *Man.*  
*Orch. Pl.* IX 44. — Guyane anglaise. ♀
- Z. Burtii** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 543 ; Hemsley,  
*Biol. Centr.-Amer.* III 251 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 44. BATEMANIA —  
Endres et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 1099 ; *Bot. Mag.* (1872)  
t. 6003 ; *Gartenflora* (1883) t. 1114. — Costa-Rica, Colombie. ♀
- Z. cerinum** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 651 et in *Beitr.*  
*Orch. Centr.-Amer.* 26 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* 251 ; Veitch, *Man.*  
*Orch. Pl.* II 47. HUNTLEYA — Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* III (1852-53)  
62 fig. 253. PESCATOREA — Reichenbach f. *Xenia Orchid.* I (1858) 184 t. 65.  
— Panama. ♀
- Z. discolor** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 665 et *Beitr.*  
*Orch. Centr.-Amer.* 27, 48 et 75 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 50. WARREA  
— Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 265 ; *Bot. Mag.* (1855)  
t. 4830. WARSCEWICZELLA — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 636. —  
Costa-Rica. ♀
- Z. gramineum** Lindley, *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 5 ; Reichenbach f. in  
Walpers, *Annal. Bot.* VI 657 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 51. KEFERSTEINIA  
— Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 633 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5046 ; *Illustr.*  
*Hort.* XXIX (1882) 52. — Vénézuéla. ♀
- Z. Lalindei** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) II 33 ; Veitch, *Man.*  
*Orch. Pl.* IX 54. BOLLEA — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) II 33 ;  
*Bot. Mag.* (1877) t. 6331. — Nouvelle-Grenade. ♀
- Z. Mackaili** Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2748 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XVII  
(1830) t. 1664 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 187 ; Reichenbach f. in Wal-  
pers, *Annal. Bot.* VI 661 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 56. EULOPHIA MACKAIL-  
IANA Lindley in *Bot. Reg.* (1831) t. 1433. — Brésil. ♀
- — var. **crinitum** LINDLEY, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 187 ; *Bot. Mag.*  
(1833) t. 3402 ; Veitch, *loc. cit.* II 56. Z. CRINITUM Loddiges, *Bot. Cab.* XVII  
(1830) t. 1687 ; *Orchid Alb.* IX t. 410 ; *The Garden* (1892) t. 870. — Brésil.

**Zygopetalum marginatum** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 654 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 58. WARREA — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 636. WARSCEWICZELLA — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1858) 61 t. 23 ; Linden, *Pescatorea* t. 6. WARREA QUADRATA Lindley in *Gard. Chron.* (1853) 647 ; *Bot. Mag.* (1854) t. 4766. — Amérique centr. Ț

**Z. maxillare** Loddiges, *Bot. Cab.* XVIII (1831) t. 1776 ; *Bot. Mag.* (1838) t. 3686 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 660 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 59. — Brésil. Ț

— — var. **Gautieri** REGEL in *Gartenflora* XIX (1870) 67 t. 644 ; Veitch, *loc. cit.* IX 60. Z. GAUTIERI Ch. Lemaire in *Illustr. Hort.* XIV (1867) t. 533 ; *Orchid Alb.* I t. 28 ; *Lindenia* VI 284. — Brésil. Ț

**Z. Murrayanum** Gardner ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1838) t. 3674 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 660. — Brésil. Ț

**Z. Rollissonii** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 659. MAXILLARIA — Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1986 et (1833) t. 46. WARSCEWICZELLA — Lindley in *Bot. Reg.* XXIV (1843) 13. — Brésil. Ț

**Z. rostratum** Hooker in *Bot. Mag.* (1828) t. 2849 ; *Lindenia* II t. 68 ; *Orchid Alb.* II t. 78 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 61. ZYGOSEPAUM — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 666. — Demerara. Ț

**Z. stapelioides** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 658 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 62. MAXILLARIA — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 146 ; *Bot. Mag.* (1841) t. 3877. WARSCEWICZELLA — Lindley in *Bot. Reg.* XXV (1839) t. 17. PROMENEA — Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 13. KEFERSTEINIA — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) t. 25. — Brésil (Sierra des Orgues). Ț

**Z. velatum** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 655. WARSCEWICZELLA — Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) 60 fig. 1 et in *Bot. Zeit.* (1865) 99 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5582 ; *Belg. Hort.* XXVIII (1878) t. 10 fig. 4. — Nouvelle-Grenade. Ț

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* IX 58) réunit cette espèce au Z. MARGINATUM Reichenbach f.

**Z. violaceum** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 650. HUNTELEYA — Lindley, *Sert. Orchid.* (1837-42) t. 26 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) t. 678. BOLLEA — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* X (1852) 668. — Guyane angl. Ț

**Z. Wendlandi** Reichenbach f., *Beitr. Orchid. Centr.-Amer.* (1866) 74 ; *Gard. Chron.* (1879) II 138 ; *Gartenflora* (1888) t. 1267 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 63. WARSCEWICZELLA — Reichenbach f. in *litt.* ex Williams, *Orchid. Alb.* III (1884) t. 126. — Costa-Rica. Ț

54. **ERIOPSIS** Lindley in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) sub t. 18 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6856. — Genre de 3 ou 4 espèces  
de la Colombie, de la Guyane et du Brésil bor.

**E. rutidobulbon** Hooker in *Bot. Mag.* (1840) t. 4437 ; Ch. Morren in *Annal. de Gand* V (1849) t. 252 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 662 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 72. — Nouvelle-Grenade.

55. **LYCOMORMIUM** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 833 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6858. — Deux ou trois espèces de  
la Colombie et de l'Amérique centrale.

**L. cerinum** Benthham in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 321 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 250. **PERISTERIA** — Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) t. 1933 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 607 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 127. — Amérique centr. ♀

56. **BIFRENARIA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 152 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6860. — Genre d'une dizaine d'es-  
pèces de la Colombie, de la Guyane et du Brésil.

**B. atropurpurea** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 152 et in *Bot. Reg.* XXV (1843) misc. 67 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 547 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 75. **MAXILLARIA** — Loddiges in *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1877. — Brésil. ♀

**B. aurantiaca** Lindley in *Bot. Reg.* XXII (1836) t. 1875 ; *Bot. Mag.* (1837) t. 3597 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 550 et *Xenia Orchid.* I t. 94 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 76. — Guyane angl. ♀

**B. Harrisoniæ** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 217 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 547 ; *Lindenia* V t. 239 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 76. **MAXILLARIA** — Lindley in *Bot. Reg.* XI (1825) t. 897 ; *Bot. Mag.* (1829) t. 2927. **LYCASTE** — Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VI (1885) 378. — Amérique centr. ♀

**B. racemosa** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 52. **MAXILLARIA** — Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2789 ; Loddiges in *Bot. Cab.* XIV (1828) t. 1318. — Brésil. ♀

**B. vitellina** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 52 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 549 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 78. **MAXILLARIA** — Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 116 et (1839) t. 12. — Brésil. ♀

57. **LYCASTE** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 14 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6866. — Genre de 25 espèces envi-  
ron de l'Amérique trop. (des Indes occ. et du Mexique au  
Pérou).

**L. aromatica** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 16 et (1836) t. 1871 ;  
Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 600 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX  
84. **COLAX** — Sprengel, *Syst. Veget.* IV Cur. Post. (1827) 307. **MAXILARIA** —  
Graham ex Hooker, *Exot. Fl.* III (1827) t. 219. — Mexique. ♀

**L. Barringtoniæ** Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 43 ; Reichen-  
bach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 606. **MAXILLARIA** — Loddiges, *Bot. Cab.*  
XIX (1832) t. 1824. — Costa-Rica. ♀

**L. candida** Lindley in PAXTON, *The Flow. Gard.* II (1852) 37 fig. 151 et  
152 ; Reichenbach f., *Beitr. Orchid. Centr.-Amer.* (1866) 29 t. 5 ; Veitch,  
*Man. Orch. Pl.* II 85. **L. BREVISPATHA** Klotzsch in *Berl. Allg. Gartenzeit.*  
(1851) 217 ; *Gartenflora* VI t. 202. — Costa-Rica. ♀

**L. Cobbiana** Reichenbach f., *Beitr. Orchid. Centr.-Amer.* (1866) t. 5 ;  
Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VI 376 et ed. VII 472. — Guatemala. ♀

**L. costata** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 15 ; *Gartenflora* (1884)  
t. 1441 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 605 ; *Orchid Alb.* VIII  
t. 384 ; *Lindenia* V t. 220 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 86. **MAXILLARIA** —  
Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 93. — Pérou. ♀

**L. cristata** Lindley (sub **MAXILLARIA**) in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1811. **PA-**  
**PHINIA** — Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) 14 ; *Fl. des Serres* IV (1848)  
t. 335 ; *Bot. Mag.* (1855) t. 4836 ; *Orchid Alb.* I t. 34 ; Veitch, *Man. Orch.*  
*Pl.* IX 80. — Trinité, Guyane. ♀

**L. cruenta** Lindley in PAXTON, *The Flow. Gard.* I (1850) 126 ; Reichen-  
bach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 601 ; *Orchid Alb.* VIII t. 375 ; Veitch,  
*Man. Orch. Pl.* IX 87. **MAXILLARIA** — Lindley, *Bot. Reg.* XXVIII (1842) t. 13.  
Mexique austr. ♀

**L. Deppei** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 15 ; Reichenbach f. in  
Walpers, *Annal. Bot.* VI 602 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 87. **MAXILLARIA**  
— Loddiges, *Bot. Cab.* XVII (1830) t. 1612 ; *Bot. Mag.* (1835) t. 3395. —  
Mexique austr. ♀

**L. gigantea** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 15 et (1845) t. 34 et  
in Bentham, *Pl. Hartweg.* (1845) 153 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5616 ; *Illustr.*  
*Hort.* XXIX (1882) 52 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 604 ;  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 89. — Nouvelle-Grenade. ♀

**L. lanipes** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 15 ; Reichenbach f. in  
Walpers, *Annal. Bot.* VI 606 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 89. **L. MESOCH-**  
**LENA** Reichenbach f. et Warscewicz in *Bonplandia* II (1854) 98. **L. COBBIANA**  
*Hort.* (non Reichenbach f.). — Équateur. ♀

- Lycaste macrobullon** Reichenbach f. in WALP., *Annal. Bot.* I (1849) 782 et VI 601; Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* I (1851) 426; Linden in *Illustr. Hort.* XXIX (1882) 52; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 91. MAXILLARIA — Hooker in *Bot. Mag.* (1846) t. 4228. — Nouvelle-Grenade. ♀
- L. plana** Lindley in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) misc. 85 et (1843) t. 35; *Orchid Alb.* V t. 230; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 92. **L. MACROPHYLLA** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 14; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 602 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 28. MAXILLARIA — Pæppig et Endlicher, *Nov. Gen. et Sp.* I (1835) t. 64; Ch. Morren, *Annal. de Gand* IV (1848) t. 221. — Panama, Colombie, Pérou, Bolivie. ♀
- L. tetragona** Lindley in *Bot. Reg.* XXVI (1843) misc. 49; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 602; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 95. MAXILLARIA — Lindley in *Bot. Reg.* (1831) t. 1428; *Bot. Mag.* (1832) t. 3146. — Mexique. ♀
- L. viridis** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 548. COLAX — Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 50. MAXILLARIA — Lindley in *Bot. Reg.* XVIII (1832) t. 1510. — Brésil austr. ♀
- L. xytriophora** Linden et Reichenbach f. in SAUNDERS, *Refug. Bot.* II (1872) t. 131 et in *Gard. Chron.* (1874) II 494; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 255; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 96. — Costa-Rica, Équateur, Pérou. ♀
58. **ANGULOA** Ruiz et Pavon, *Prodr. Fl. Peruv. et Chil.* (1794) 118 t. 26; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6867. — Trois espèces des Andes de la Colombie et du Pérou.
- A. Clowesii** Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 26 et t. 63; Linden, *Pescatorea* I (1860) t. 17; *Bot. Mag.* (1847) t. 4313 (var.); Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* I 784 et VI 599; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 99. — Vénézuéla, Nouvelle-Grenade. ♀
- A. Ruckeri** Lindley in *Bot. Reg.* XXXII (1846) t. 41; *Bot. Mag.* (1835) t. 3384; *Gartenflora* III t. 106; *Illustr. Hort.* XXVIII (1881) 64; Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 15 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 600; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 99. — Vénézuéla. ♀
- A. uniflora** Ruiz et Pavon, *Syst. Veget. Fl. Peruv. et Chil.* (1798) 228 et *Prodr. Fl. Peruv.* t. 26; *Bot. Mag.* (1854) t. 4807; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 599; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 101; *Gartenflora* XXXII (1883) t. 1137. **A. VIRGINALIS** Hort. ex *Gard. Chron.* (1851) 392. — Pérou, Nouvelle-Grenade. ♀
59. **GONGORA** Ruiz et Pavon, *Prodr. Fl. Peruv. et Chil.* (1794) 117 t. 25; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6869. — Genre de 22 espèces de l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).
- G. armeniaea** Reichenbach f. in *Xenia Orchid.* I (1858) 52 et in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 593. ACROPERA — Lindley in Lindley et Paxton, *The Flow. Gard.* I (1850-51) 94 fig. 66 et III (1853) t. 154; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 77. **A. CORNUTA** Klotzsch in Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeit.* XX (1852) 186; *Bot. Mag.* (1865) t. 5501. — Nicaragua. ♀

**Gongora atropurpurea** Hooker, *Exot. Fl.* III (1827) t. 178 ; *Bot. Mag.* (1833) t. 3220 ; Maund, *The Botan.* III t. 108 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 596. — Trinité. ʒ

**G. galeata** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1858) 51 et in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1863) 591. MAXILLARIA — Lindley in Loddiges, *Bot. Cab.* XVII (1834) t. 1645 ; A. De Candolle, *g<sup>e</sup> Notice Pl. Jard. Genève* t. 2. — Mexique austr. ʒ

— — var. **Batemani** NOB. ACROPERA BATEMANI Lindley ex Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) I 322. — Nicaragua.

— — var. **Loddigesii** NOB. ACROPERA LODDIGESII Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 172 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5563. — Mexique.

— — var. **pallida** NOB. ACROPERA PALLIDA Hort. ex Heynhold, *Nomencl. Bot.* II (1840) 8. — Mexique.

**G. quinquenervis** Ruiz et Pavon, *Syst. Veget. Fl. Peruv. et Chil.* (1798) 227 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* I 783 et VI 595. **G. maculata** Lindley in *Bot. Reg.* XIX (1833) t. 1616 et XXXIII (1847) 17 ; *Bot. Mag.* (1838) t. 3687. **G. odoratissima** Ch. Lemaire in *Fl. des Serres* III (1847) t. 229. — La Guayra. ʒ

**G. truncata** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 42 et XXXI (1845) t. 56 ; Spae in *Annal. de Gand* IV (1858) t. 205 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 592 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 256. — Mexique. ʒ

60. **STANHOPEA** Frost in *Bot. Mag.* (1829) sub t. 2948 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6871. — Genre de 20 espèces habitant l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).

**S. Bucephalus** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 157 et in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 24 ; *Bot. Mag.* (1861) t. 5278 ; Regel in *Gartenflora* XXIII (1874) 35 t. 785 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 256. **S. grandiflora** Reichenbach f. (non Lindley) in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 587 ; Maund, *The Botan.* IV t. 176. **EPIDENDRUM** — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Pl. Equinoct.* I (1808) 94 t. 27. **ANGLOA** — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp.* I (1815) 345 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 111. — Mexique, Panama, Pérou. ʒ

**S. Devoniensis** Lindley, *Sert. Orchid.* (1839) t. 1 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 17 t. 974 ; De Puydt, *Les Orchidées* 323 t. 42 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 586 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 112. — Guatemala. ʒ

**S. eburnea** Lindley in *Bot. Reg.* XVIII (1832) t. 1329 et *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 19 ; *Bot. Mag.* (1834) t. 3359 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 584 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 113. **CERATOCHILUS GRANDIFLORUS** Loddiges, *Bot. Cab.* XV (1828) t. 1414. — Brésil, Guyane, Vénézuëla, ? Amérique centr. ʒ

- Stanhopea gibbosa** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 1254 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 257 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 721. — Amérique centr. 2
- S. graveolens** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 125 (1845) t. 65 ; et *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 8 ; *Fl. des Serres* II (1846) 139 t. 1 et 2 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 589 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 114. — Pérou, ? Guatemala. 2
- S. inodora** Loddiges ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1845) t. 65 et *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 2 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 588 et *Xenia Orchid.* II 157 t. 165. — Mexique. 2
- S. insignis** Frost in *Bot. Mag.* (1829) t. 2948-49 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XX t. 1985 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 157 et in *Bot. Reg.* XXII (1836) t. 1837 ; Reichenbach, *Xenia Orchid.* I 118 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 585 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 115. — Brésil, Pérou. 2
- S. Martiana** Lindley in *Bot. Reg.* XXVI (1840) misc. 109 et XXIX (1843) t. 44 (var. BICOLOR) ; Bateman, *Orchid. of Mexic. and Guatem.* t. 27 ; *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2112-13 ; De Puydt, *Les Orchidées* fig. 149 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 586 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 115. **S. VELATA** Ch. Morren in *Annal. de Gand* III (1847) t. 153. — Mexique austr. 2
- S. oculata** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 158 ; *Bot. Reg.* (1835) t. 1805 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5300 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 120 ; *Lindenia* VI t. 256 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 116. **CERATOCYLUS** — Loddiges in *Bot. Cab.* XVIII (1831) t. 1764. — Mexique, ? Brésil. 2
- — var. **guttulata** REICHENBACH f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 587. **S. GUTTULATA** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 118 ; *Gard. Chron.* (1848) 439 cum icône ; Lemaire, *Le Jard. Fleur.* III (1853) t. 309 et 310. — Patrie inconnue.
- S. Ruckeri** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) sub t. 44 et *Fol. Orch.* (Stanhop.) n. 7 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 589 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 258. — Nicaragua. 2
- S. saccata** Bateman, *Orchid. Mexic. and Guatem.* (1837) t. 15 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 15 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 258 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 258. — Mexique, ? Guatemala. 2
- S. tigrina** Bateman, *Orchid. Mexic. and Guatem.* (1837) t. 7 ; Lindley in *Bot. Reg.* (1839) t. 1 et *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 11 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4197 ; *Fl. des Serres* VII t. 713 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 120 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 118. — Mexique austr. 2
- S. Wardii** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 20 et *Fol. Orchid.* (Stanhop.) n. 6 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5289 ; Knowles et Westcott, *The Floral Cab.* II t. 90 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 588 et *Xenia Orchid.* I 122. **S. AUREA** Loddiges in *Bot. Reg.* (1841) misc. 31. — Guatemala, Panama, Colombie, Vénézuëla. 2



61. HOULLETIA A. Brongniart in *Annal. Sc. Natur. sér. 2*, XV (1841) 37 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6872*. — Genre de 6 esp. habitant le Nicaragua, le Costa-Rica, la Colombie, le Vénézuéla et le Brésil.

**H. Brocklehurstiana** Lindley in *Bot. Reg.* XXVII (1841) misc. 47 et *Sert. Orchid.* (1841 ?) t. 42 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4072 ; Regel in *Gartenflora* VII (1858) t. 229 ; Linden, *Pescatorea* I t. 36 ; *Lindenia* V t. 214 ; *Orch. Alb.* VIII t. 337 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 121 cum icone. — Brésil. 2

**H. odoratissima** Linden in LINDLEY et PAXTON, *The Flow. Gard.* III (1852-53) 172 et *Pescatorea* I t. 3 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 616 ; *Lindenia* VII t. 324 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 123. — Colombie. 2

**H. Wallisii** Linden et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 611. H. CHRY-SANTHA Linden et André in *Illustr. Hort.* XVIII (1871) 138 t. 71 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VI 343 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 123. — Colombie. 2

62. PERISTERIA Hooker in *Bot. Mag.* (1831) t. 3116 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6873*. — Deux ou trois esp. des Andes de la Colombie.

**P. elata** Hooker in *Bot. Mag.* (1831) t. 3116 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 160 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 607 ; Jennings, *Orchids* t. 44 ; *Orch. Alb.* VII t. 327 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 128. — Panama. 2

**P. Ehippium** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 198. — Amérique austr.-occ. 2

63. ACINETA Lindley, *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 67 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 6874*. — Genre de 10 esp. de l'Amérique trop. (du Mexique à la Colombie).

**A. Barkeri** Lindley, *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 68 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIV t. 147 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 611 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 130. PERISTERIA — Bateman, *Orchid. of Mexic. and Guatemala.* (1837) t. 8 ; *Bot. Mag.* (1846) t. 4203. — Amérique centr. 2

**A. erythroxantha** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 92 et *Xenia Orchid.* I t. 70. — Patrie ?

**A. Humboldtii** Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 68 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) t. 992-93 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 132. PERISTERIA — Lindley in *Bot. Reg.* (1843) t. 18. A. FULVA Klotzsch in Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeit.* (1852) 146 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4156. — Colombie, Vénézuéla, Pérou. 2

63. **MAXILLARIA** Ruiz et Pavon, Fl. Chil. et Peruv. Prodr. (1794) 116 t. 25 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6885. — Genre d'environ 120 espèces habitant l'Amérique trop. des Antilles et du Mexique au Brésil.

**M. Arachnitis** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1880) I 394 ; Regel in *Gartenflora* (1881) 27. — Colombie. ♀

**M. callichroma** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 46 ; *Lindenia* VIII t. 377 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 509. — Vénézuéla. ♀

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* IX 161) réunit cette espèce au **M. SELLIGERA** Lindley.

**M. chlorantha** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub t. 1986 ; Reichenbach f. in *Bonplandia* II 280 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 522. — Guyane. ♀

**M. leontoglossa** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 67 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 509 ; *Illustr. Hort.* (1882) 68. — Colombie. ♀

**M. lepidota** Lindley in *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, XV (1845) 383 ; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) I 168 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 156 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 511. — Colombie, Équateur. ♀

**M. luteo-alba** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 20 ; *Orchid Alb.* III t. 106 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 512 cum icone ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 157. — Colombie. ♀

— — var. **Turneri** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* IX (1893) 157. **M. TURNERI** Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII (1894) 514. — Amérique austr. ♀

**M. nigrescens** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 20 ; *Illustr. Hort.* (1882) 68 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 157 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 512. — Amérique centr., Colombie, Vénézuéla. ♀

**M. ochroleuca** Loddiges, *Bot. Cab.* XX (1833) t. 1904 ; Beer, *Beitr. Morph. und Biol. d. Orchid.* (1863) t. 6 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1880) 328 t. 18. — Brésil. ♀

**M. picta** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1832) t. 3154 ; Lindley in *Bot. Reg.* (1836) t. 1802 et *Gen. and Sp. Orch.* 146 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 158. — Brésil. ♀

**M. præstans** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1885) I 566 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 159 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 512. — Guatemala. ♀

**M. punctata** Loddiges, *Bot. Cab.* XX (1833) t. 1914 ; *Gard. Chron.* (1887) II 787 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 160. — Brésil. ♀

**M. tenuifolia** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub t. 1986 et XXV (1839) t. 8 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 513. — Mexique austr., Costa-Rica. ♀

**Maxillaria variabilis** Bateman in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub t. 1986 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 536 et *Beitr. Orch. Centr.-Amer.* 49. M. HENCHMANNI Hooker f. in *Bot. Mag.* (1838) t. 3614. M. ANGUSTIFOLIA Hooker f., *Icon. Pl.* III (1841) t. 348. — Mexique austr., Guatemala, Costa-Rica. ♀

**M. venusta** Linden et Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 280 ; Linden, *Pescatorea* I t. 38 ; *Bot. Mag.* 5296 ; *Orchid Alb.* XI t. 492 et *Orch. Grow. Man.* ed. VII 514. — Andes de Colombie. ♀

64. **ORNITHIDIUM** Salisbury in *Trans. Hort. Soc. Lond.* I (1812) 293 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6888. — Genre de 20 espèces environ de l'Amérique trop. (des Antilles et du Mexique au Brésil).

**O. densum** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1854) 217. MAXILLARIA — Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1836) t. 1804 ; Reichenbach f. in Saunders, *Refig. Bot.* II t. 105. — Mexique. ♀

65. **TRICHOCENTRUM** Poeppig et Endlicher, *Nov. Gen. et Sp.* Pl. II (1838) 11 t. 115 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6893. — Huit espèces de l'Amérique trop. (de l'Amérique centr. au Brésil).

**T. albo-purpureum** Linden et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1866) 219 cum icone ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5688 ; De Puydt, *Les Orchidées* 233 fig. 231-32 ; *Orchid Alb.* V t. 204. — Brésil bor. ♀

66. **RODRIGUEZIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Chil. et Peruv. Prodr.* (1794) 115 t. 25 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6894. — Environ 30 espèces habitant l'Amérique centr. et austr. trop.

**R. Granatensis** Reichenbach f. in *Bonplandia* IV (1856) 213. BURLINGTONIA — Lindley, *Orchid. Lindenianae* (1846) 24. — Colombie. ♀

67. **TRICHOPILIA** Lindley, *Introd. Nat. Syst.*, ed. II (1836) 446 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6897. — Genre de 16 espèces environ habitant l'Amérique trop., surtout le Mexique, l'Amérique centr. et la Colombie.

**T. albida** Wendland in *Allgem. Gartenzeit.* (1851) 362 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5035 ; Reichenbach f. in *Bonplandia* II 15 ; Regel in *Gartenflora* III (1854) 43 t. 78. — Vénézuéla. ♀

- Trichopilia crispa** Lindley in *Gard. Chron.* (1857) 342; Bateman, *Second Cent. Orch. Pl.* t. 115; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 734 cum icone. T. COCCINEA Lindley, var. — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1874) 92; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 178. T. GLOXINIEFLORA Klotzsch. — Amérique centr. 2
- T. fragrans** Reichenbach f. in OTTO, *Hamb. Gartenzeit.* (1858) 229. PILUMNA — Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 74; *Bot. Mag.* (1858) t. 5034; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 677. — Colombie. 2
- — var. **nobilis** LINDEN et ANDRÉ in *Illustr. Hort.* XIX (1892) 96 t. 94. PILUMNA NOBILIS Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1848) 843; *Orchid Alb.* III t. 128; *Lindenia* II t. 59; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 678 cum icone. — Colombie, Pérou. 2
- T. Galeottiana** A. Richard in *Annal. Sc. Nat.* sér. 3, III (1841) 26; Reichenbach f., *Xenia Orch.* II 103 et in *Gard. Chron.* (1865) 770; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 181. T. PICTA Lemaire in *Illustr. Hort.* VI (1859) t. 225. T. TURIALVÆ Bateman in *Bot. Mag.* (1865) t. 5550 et *Second Cent. Orch. Pl.* t. 162. — Mexique; Costa-Rica. 2
- T. hymenantha** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 90 et *Xenia Orchid.* I (1854) 15 t. 7 fig. 1-11 et II 98; *Bot. Mag.* (1872) t. 5949; Williams, *Orchid Alb.* X t. 479; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 182. — Nouvelle-Grenade. 2
- T. laxa** Reichenbach f. in OTTO, *Hamb. Gartenzeit.* (1858) 229 et *Xenia Orch.* II 100; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1874) 101; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 182. PILUMNA — Lindley in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 73 et (1846) t. 57; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 677. — Colombie. 2
- T. marginata** Henfrey in *Gard. Mag.* (July 1851) cum icone; Reichenbach f., *Xenia Orch.* II 102; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 183. T. COCCINEA Hooker in *Bot. Mag.* (1855) t. 4837; *Fl. des Serres* XIV (1859) t. 1490. T. CRISPA Lindley, var. — Van Houtte in *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) t. 1925-26; Warner, *Select. Orch. Pl.* I t. 5; De Puydt, *Les Orchidées* t. 43. — Panama. 2
- — var. **lepida** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* IX (1893) 183. T. LEPIDA Veitch ex Williams, *Orchid Alb.* V (1886) t. 197; *Flor. Mag.* new ser. t. 98. — Panama. 2
- T. suavis** Lindley in PAXTON, *Flow. Gard.* I (1851) 44 et 53 t. 11; *Bot. Mag.* (1854) t. 4634; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) 29 t. 761; Lemaire, *Le Jard. Fleur.* III (1853) t. 377; Reichenbach f., *Xenia Orch.* II 103; Warner, *Select. Orch. Pl.* III t. 8; De Puydt, *Les Orchidées* t. 44; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 185. — Costa-Rica, Colombie. 2
- T. tortilis** Lindley in *Bot. Reg.* XXII (1836) t. 1863; *Bot. Mag.* (1839) t. 3739; Reichenbach f., *Xenia Orch.* II 101; Knowles et Westcott, *Flor. Cab.* III t. 101; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1874) 91; *Orchid Alb.* VIII t. 349; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 186. — Mexique austr., Guatemala. 2

68. **HELCIA** Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) misc. 17 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6898. — Genre de 1 ou 3 ? espèces de l'Équateur.

**H. sanguinolenta** Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) misc. 17 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 275 cum icone ; Ch. Lemaire, *Jard. Fleur.* II (1852) 74 cum icone ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 682 ; *Illustr. Hort.* XVII (1870) 160 t. 31. **TRICHOPILIA** — Reichenbach f., *Xenia Orch.* II (1865) 106 t. 131 ; *Bot. Mag.* (1892) t. 7281. — Équateur. ♀

69. **ASPASIA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 139 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6900. — Environ 6 espèces de l'Amérique trop. (de l'Amérique centr. au Brésil).

**A. lunata** Lindley in *Bot. Reg.* XXII (1836) sub t. 1907 ; Reichenbach, *Xenia Orch.* I t. 34 ; Paxton, *Flow. Gard.* I 108 fig. 74 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 116. **ODONTOGLOSSUM** — Reichenbach f., *Xenia Orch.* I (1855) 82 t. 34. — Brésil. ♀

— — var. **superba** HORT. ex WILLIAMS, *loc. cit.* ed. VII (1894) 116. — Brésil.

70. **COCHLIODA** Lindley, *Fol. Orchid.* (1853) ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6901. — Six espèces des Andes de l'Amérique austr.

**C. rosea** Benthām in *Journ. Linn. Soc. Lond.* XVIII (1881) 327 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 188. **ODONTOGLOSSUM** — Lindley in Benthām, *Plant. Hartweg.* (1844) 151 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 65 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 6084 ; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 22 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 843 ; *Illustr. Hort.* XVIII (1871) 116 t. 66. **MESOSPINIDIUM** — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 393 sub **M. vulcanico**. — Pérou. ♀

**C. sanguinea** Benthām in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 560 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 188. **MESOSPINIDIUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 858 ; *Bot. Mag.* (1867) t. 5627. — Équateur. ♀

**C. vulcanica** Benthām in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 560 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IX 189. **MESOSPINIDIUM** — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 393 ; *Bot. Mag.* (1872) t. 6001 ; *Lindenia* IV t. 154. — Équateur. ♀

71. **ODONTOGLOSSUM** Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. et Sp. Pl. I (1815) 350 t. 85 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6906. — Genre d'environ 80 espèces habitant les Andes du Mexique à la Bolivie.

**O. Andersonianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1868) 599 ; *Flor. Mag.* new ser. (1872) t. 45 ; *Orchid Alb.* I t. 35 ; *Gartenflora* (1890) t. 1326 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 539. **O. CRISPUM** Lindley, var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* I (1887) 25. — Hybride nat. (**O. CRISPUM**  $\times$  **GLORIOSUM**.)

**O. bictoniense** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) t. 66 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 28 ; *Fl. des Serres* XV (1862) 3 t. 1502 ; *Illustr. Hort.* XII (1865) t. 449 (var. **SPLENDENS**) ; Bateman, *Monog. Odontogl.* t. 18. **CYRTOCHILUM** — Bateman, *Orchid. Mex. et Guat.* (1837) t. 6. **ZYGOPETALUM AFRICANUM** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1840) t. 3812. — Guatemala, Mexique. 2

— — var. **album** Ed. André in *Illustr. Hort.* XIX (1872) 32 t. 91. — Mexique mérid.

**O. blandum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1870) 1342 ; Bateman, *Monog. Odontogl.* t. 28 ; *Orchid Alb.* V t. 229 ; *Reichenbachia* I t. 24 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 44 cum icone ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 542. — Colombie. 2

**O. cariniferum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* X (1852) 638 et in *Gard. Chron.* (1870) 560 ; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 10 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 15 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 15. **O. HASTILABIUM** Lindley, var. **FUSCATUM** in *Bot. Mag.* (1856) t. 4919. — Panama. 2

**O. citrosmum** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) misc. 60 et (1843) t. 3 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 59 ; *Fl. des Serres* VI (1851) 307 t. 633 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* I t. 90 ; De Puydt, *Les Orchidées*, 297 t. 29 ; Warner, *Select Orch. Pl.* I t. 28 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 48 cum icone. — Mexique, Guatemala. 2

**O. constrictum** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. 17 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 2 ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5736 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 547. — Vénézuéla. 2

— — var. **Sanderianum** Veitch, *Man. Orch. Pl.* I (1887) 20. **O. SANDERIANUM** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1881) II 524. — Mexique, Nicaragua. 2

**O. cordatum** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 50 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 12 ; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 26 ; *Illustr. Hort.* XXVI (1879) 122 t. 355 ; *Bot. Mag.* (1855) t. 4878 (var. **MACULATUM**) ; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 25 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 22. — Mexique, Guatemala, Colombie. 2

**O. coronarium** Lindley, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 60 ; Linden, *Pescatorea* t. 46 ; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 27 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* III t. 4 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 22. — Colombie. 2

- Odontoglossum crispum** Lindley in *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, XV (1845) 256 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 57; *Bot. Mag.* (1868) t. 5691 (var. TRIANE MOORE); *Reichenbachia* I (1886) t. 1; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 24; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 550. O. ALEXANDRÆ Bateman in *Gard. Chron.* (1864) 1083 et in *Proc. Hort. Soc. Lond.* (1864) 186; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 14 et 19; *Orchid Alb.* I t. 47. — Colombie. ♀
- O. cristatum** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1844) 152 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 53; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1868) 1014; *Illustr. Hort.* XVII (1870) t. 21. (var. ARGUS Reichenbach f.); Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 30. — Équateur, Pérou. ♀
- O. distans** Reichenbach f. in *Linnœa* XXII (1849) 848 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 837. — Vénézuéla. ♀
- O. Edwardi** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) II 74 et (1880) I 72; *Bot. Mag.* (1884) t. 6771; *Reichenbachia* I t. 26; *Orchid Alb.* X t. 465; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 33. — Équateur. ♀
- O. Egertoni** Lindley in *Bot. Reg.* (1845) misc. 50 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 64; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 848; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 275. — Guatemala. ♀
- O. Ehrenbergii** Klotzsch in LINK, KLOTZSCH et OTTO, *Icon. Pl. Hort. Berol.* (1841) 38 t. 16; Lindley et Paxton, *Flow. Gard.* III (1853) fig. 247; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) 263 t. 846; *Illustr. Hort.* I (1854) t. 30. O. ROSSI Lindley, var. — Veitch, *Man. Orchid. Pl.* I (1887) 65. — Mexique. ♀
- O. gloriosum** Linden et Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 278 et in *Gard. Chron.* (1865) 578 cum icone; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 12; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII, 563. — Colombie, Vénézuéla. ♀
- O. grande** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 47 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 9; Bateman, *Orchid. of Mex. and Guatem.* (1843) t. 24 et *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 8; *Bot. Mag.* (1842) t. 3955; *Gartenflora* (1859) t. 270; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 33 cum icone. — Guatemala, Costa-Rica. ♀
- O. Hallii** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1992 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 35; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1856) t. 63; *Illustr. Hort.* (1873) t. 58; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 21; *Bot. Mag.* (1866) t. 6237; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 35. — Colombie, Équateur, Pérou. ♀
- O. hastilabium** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 16 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 51; *Bot. Mag.* (1846) t. 4272; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 11; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 7; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 38. — Colombie. ♀
- O. Harryanum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1886) II 486; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 36; *Orchid Alb.* VIII t. 366; *Lindenia* III t. 142; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 566. — Patrie ?
- O. Humeanum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) I 170; *Reichenbachia* II t. 82; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII, 569. A. ROSSI Lindley, var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* I (1887) 65. — Mexique. ♀

- Odontoglossum Karwinskii Reichenbach f.** in *Bonplandia* III (1855) 214 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 842. CYRTOCHILUM — Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub t. 1992. MILTONIA — Paxton, *Mag. of Bot.* XVI (1850) 162. — Mexique. ♀
- O. Kramerii Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1868) 98; *Bot. Mag.* (1869) t. 5778; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 24; *Fl. des Serres* XXIII (1880) 285 t. 2469; *Orchid Alb.* I t. 40; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 41. — Costa-Rica. ♀
- O. læve Lindley** in *Bot. Reg.* (1844) t. 39 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 53; *Bot. Mag.* (1876) t. 6265; *Illustr. Hort.* VI (1859) t. 213; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 16; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 41; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 571. — Mexique, Guatemala. ♀
- O. Lindenii Lindley**, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 46; *Flor. Magaz.* new ser. (1878) t. 333; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 42; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 573. — Colombie. ♀
- O. Londesboroughianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1876) II 1876; *Flor. Magaz.* new ser. (1877) t. 246; *Orchid Alb.* II t. 82; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 44; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 573. — Mexique. ♀
- O. luteo-purpureum Lindley**, *Orchid. Linden.* (1846) 16 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 7; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 17; *Orchid Alb.* VI t. 254; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 45; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 574. — Colombie. ♀
- O. macrospilum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1885) II 70; Godefroy, *L'Orchidophile* (1885) 133 fig. 9; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 576. — Hybride nat. ?
- O. maculatum La Llave et Lexarsa**, *Novar. Veget. Descr.* II (1825) 35; Lindley in *Bot. Reg.* (1840) t. 30 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 11; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 28; *Gartenflora* (1877) t. 913; *Bot. Mag.* (1879) t. 6455; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 20; *Orchid Alb.* II t. 52; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 49. — Mexique. ♀
- O. nævium Lindley** in Paxton, *Flow. Gard.* I (1850-51) t. 98 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 3; *Fl. des Serres* VI (1850) t. 594; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 13; *Gartenflora* (1874) t. 791; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 9; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 51. — Colombie, Vénézuéla, ? Guyane. ♀
- O. nebulosum Lindley**, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 25; *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 21; *Illustr. Hort.* XIV (1867) 94 cum icone; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 1; De Puydt, *Les Orchidées* fig. 213; Veitch, *Man. Orch. Pl.* II 52. — Mexique. ♀
- O. Nevadense Reichenbach f.** in *Illustr. Hort.* XVII (1870) 243 t. 45 et *Xenia Orchid.* II (1874) 206 t. 191 et in *Gard. Chron.* (1881) I 436 et (1881) II 436; *Lindenia* I t. 3; *Orchid Alb.* III t. 131; Veitch, *Man. Orch. Pl.* 154; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 580. — Colombie. ♀



**Odontoglossum Ærstedii Reichenbach f.** in *Bonplandia* III (1855) 214 et *Xenia Orchid.* I 189 t. 68 ; *Bot. Mag.* (1885) t. 6820 ; *The Garden* XXVI (1884) t. 454 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 57 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 581 cum icone. — Costa-Rica. ʒ

**O. Pescatorei Linden** ex LINDLEY et PAXTON, *Flow. Gard.* III (1852-53) 83 t. 90 ; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 1 ; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) 23 t. 1624 ; *Gartenflora* (1875) t. 835 ; *Orchid Alb.* IV t. 175 ; *Bot. Mag.* (1885) t. 6820 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 58 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 582. — Colombie. ʒ

**O. polyxanthum Reichenbach f.** in *Flor. Magaz.* new ser. (1881) t. 453 et in *Gard. Chron.* (1881) II 460 cum icone ; Warner, *Select Orch. Pl.* III t. 37 ; *Orchid Alb.* VI t. 258 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 62 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 587. — Andes de l'Équateur. ʒ

**O. prænitens Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1875) I 524 ; *Bot. Mag.* (1876) t. 6229 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 62 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 587. — Colombie. ʒ

**O. pulchellum Bateman** in LINDLEY, *Bot. Reg.* (1844) t. 48 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4104 ; Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 13 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 588. — Mexique austr., Guatemala, Costa-Rica, Panama. ʒ

**O. ramosissimum Lindley**, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 47 ; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1875) I 396 ; *Lindenla* I t. 17 ; *Reichenbachia* ser. 2, I t. 41 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 63 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 588. O. ANGUSTATUM Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 26. — Colombie, Vénézuéla, Pérou. ʒ

**O. Reichenheimii Linden** et **Reichenbach f.** in *Bonplandia* III (1855) 214 ; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 19 ; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 15. A. LÈVE Lindley, var. — Moore ex Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII (1894) 572. — Mexique austr. ; ? Guatemala. ʒ

**O. Rossii Lindley**, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 25 et in *Bot. Reg.* (1839) t. 4 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 20 ; *Fl. des Serres* XX (1874) 95 t. 2110 (var. MAJUS Hort.) ; Warner, *Select Orch. Pl.* III t. 15 ; *The Garden* XXVIII (1885) t. 507 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 65 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 589 cum icone. — Mexique. ʒ

Obs. Hemsley (*Biol. Centr. Amer.* III 274) pense que c'est cette espèce que La Llave et Lexarsa ont décrite en 1825 sous le nom d'O. APTERUM.

**O. rubescens Lindley** in *Journ. Hort. Soc. London* V (1850) 35 et *Fol. Orchid.* (Odontogl.) (1852) n. 27 ; *Lindenla* I t. 26. O. ROSSII Lindley, var. — Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII (1894) 590. — Mexique, Nicaragua. ʒ

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* I 65) réunit cet ODONTOGLOSSUM au précédent.

**O. Schillerianum Reichenbach f.** in *Bonplandia* II (1854) 12 et *Xenia Orchid.* I 58 t. 22 ; *Lindenla* II t. 82 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 591. — Vénézuéla. ʒ

**Odontoglossum Schlieperianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1865) 1082 et *Xenia Orchid.* II 127 t. 143; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 77 cum icône; De Puydt, *Les Orchidées* fig. 155; *Gartenflora* (1869) t. 605; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 66; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 591. — Costa-Rica, ? Mexique. ♀

**O. tripudians Reichenbach f. et Warscewicz** in *Bonplandia* II (1854) 100 et in *Gard. Chron.* (1871) 938; *Bot. Mag.* (1873) t. 6029; *Floral Magaz.* new ser. t. 208; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 67; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 592. — Colombie. ♀

**O. triumphans Reichenbach f.** in *Bonplandia* II (1854) 99; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 46; *Illustr. Hort.* XVI (1869) t. 609; De Puydt, *Les Orchidées* t. 30; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 23; *Orchid Alb.* II t. 58; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 68; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 593. — Colombie. ♀

**O. Uro-Skinneri Lindley** in *Gard. Chron.* (1859) 708 et 724; Bateman, *Monog. of Odontogl.* (1874) t. 2; Warner, *Select Orch. Pl.* III t. 17; Veitch, *Man. Orch. Pl.* I 69; *Orchid Alb.* IX t. 417; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 593. — Guatemala. ♀

**O. vexillarium Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1867) 901 et (1872) 627 cum icône; *Bot. Mag.* (1873) t. 6037; *Illustr. Hort.* XX (1873) 10 t. 113; *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2058; De Puydt, *Les Orchidées* (1880) fig. 212. — Colombie. ♀

**O. Warnerianum Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* XXII (1864) 297 et in *Gard. Chron.* (1865) 579; *Illustr. Hort.* XII (1865) 47 cum icône; Bateman, *Monog. of Odontogl.* t. 13; De Puydt, *Les Orchidées* fig. 131; Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 20; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 595. **O. Rossi Lindley** var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* (1887) 65. — Mexique, Guatemala. ♀

72. **ONCIDIUM Swartz** in *K. Vetensk. Akad. Nya Handl. Stockh.* XXI (1800) 239; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6907. — Environ 250 espèces décrites habitant l'Amérique trop. et subtrop. des Antilles et des États-Unis mérid. à l'Argentine et à la Plata.

**O. abortivum Reichenbach f.** in *Linnaea* XXII (1849) 847 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 810. — Vénézuéla. ♀

**O. alcicorne Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1872) 969. — Colombie. ♀

**O. altissimum Swartz** in *K. Vetensk. Akad. Nya Handh. Stockh.* XXI (1800) 240; *Bot. Mag.* (1830) t. 2990; *Bot. Reg.* (1836) t. 1851; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 7; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 150. **EPIDENDRUM** — Jacquin, *Select. Stirp. Amer. Hist.* (1780) t. 141. — Antilles, Guatemala, Guyane. ♀

- Oncidium ampliatus Lindley**, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 202 et in *Bot. Reg.* (1835) t. 1699; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 90; *Reichenbachia* II t. 70; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 8; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 599. — Amérique centr., Colombie. ♀
- — var. **majus** VAN HOUTTE, *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2140-41; *Reichenbachia* II t. 70; Williams, *loc. cit.* ed. VII 599. — Costa-Rica, Nicaragua. ♀
- O. anomalum Reichenbach f.** in *Linnaea* XXII (1849) 845; Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 267 cum icon. — Colombie. ♀
- O. ansiferum Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* (1852) 696 et *Xenia Orchid.* I t. 98; *Gard. Chron.* (1879) II 42. — Panama. ♀
- O. barbatum Lindley**, *Collect. Bot.* (1821-25) t. 27 et *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 200; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 47 et in *Bot. Reg.* XXIV (1838) t. 48; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 11; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 600. — Guatemala, Brésil, ♀
- O. caesium Reichenbach f.** in *Gartenflora* (1854) 75 t. 80 et *Xenia Orchid.* I t. 36 fig. 2; Lindley in *Gard. Chron.* (1854) 219 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 159; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 16. — Patrie ?
- O. Cavendishianum Bateman**, *Orchid. of Mexic. and Guatem.* (1840) t. 3; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 134; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 20. **O. pachyphyllum** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1841) t. 3807; Godefroy, *L'Orchidophile* (1888) 241. — Guatemala. — ♀
- O. crispum Loddiges**, *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1854; *Bot. Mag.* (1836) t. 3499; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 197; *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 161 et in *Bot. Reg.* (1837) t. 1920; *Fl. des Serres* XXI (1875) t. 2147-48; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 27; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 606. — Brésil. ♀
- O. cucullatum Lindley**, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 21 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 69; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) t. 835; Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 317; *Belg. Hort.* (1869) 337 t. 19; *Illustr. Hort.* XXV (1878) 27 t. 305; *Lindenia* II t. 81; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 29. — Colombie, Équateur, Pérou. ♀
- O. curtum Lindley** in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 68 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 36; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 33; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 607. — Brésil. ♀
- O. divaricatum Lindley** in *Bot. Reg.* (1827) t. 1050 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 119; Loddiges, *Bot. Cab.* XIII t. 1212; Reichenbach f., *Fl. Exot.* t. 95; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 34; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 608. — Brésil. ♀
- O. exasperatum Reichenbach f.** ex LINDEN in *Illustr. Hort.* XXIX (1882) 99; Linden et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1871) 1129. — Colombie. ♀

- Oncidium excavatum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 25 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 85; Paxton, *Flow. Gard.* I t. 21; *Bot. Mag.* (1862) t. 5293; *Lindenia* V t. 221; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 35. — Colombie, Pérou, ? Honduras. 2
- var. **aurosum** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 742. O. AUROSUM Reichenbach f. et Warszewicz in *Bonplandia* II (1854) 108; *Illustr. Hort.* XVII (1870) 178 t. 34; *Lindenia* V t. 221. — Équateur, Pérou. 2
- O. flexuosum** Loddiges in *Bot. Mag.* (1821) t. 2203 et in *Bot. Cab.* V (1822) t. 424; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 199 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 81; Godefroy, *L'Orchidophile* (1888) 15 cum icone; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 38. — Brésil. 2
- O. Forbesii** Hooker in *Bot. Mag.* (1839) t. 3705; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 60; *Orchid Alb.* III t. 104; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) I 524 fig. 71 et 72 var.; *Lindenia* IV t. 164; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 38. — Brésil. 2
- O. Harrisonianum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 202 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 120; *Bot. Reg.* (1833) t. 1569; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 42; *Revue Hort. Belg.* (1892) 253 t. 22; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 612. O. PALLIDUM Lindley in *Bot. Reg.* (1840) misc. 108. — Brésil. 2
- O. Hartwegii** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1844) 151 et in Paxton, *Flow. Gard.* II t. 133; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 280 cum icone. — Pérou, Équateur. 2
- O. hastiferum** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 102 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 703. — Pérou. 2
- O. lians** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 124 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 122; *Gartenflora* (1888) t. 1250; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 44. — Brésil. 2
- O. incurvum** Barker in LINDLEY, *Bot. Reg.* (1840) misc. n. 174 et (1845) t. 64 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 72; *Bot. Mag.* (1854) t. 4824; Bateman, *Orch. Mex. and Guat.* t. 22; *Illustr. Hort.* II (1855) t. 49; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 45. O. ALBO-VIOLEACEUM A. Richard et Galeotti in *Ann. Sc. Nat.* sér. 3, III (1845) 27. — Mexique. 2
- O. Jonesianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 781; *The Garden* XXXI (1887) 148 cum icone; *Gartenflora* (1888) 249 t. 1272; *Reichenbachia* I t. 21; *Lindenia* II t. 72; *Orchid Alb.* IV t. 183; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 46; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 614 cum icone. — Paraguay. 2
- O. Kramerianum** Reichenbach f. in OTTO et DIETRICH, *Allg. Gartenzeit.* XXIII (1855) 9 et *Xenia Orchid.* I (1855) 80 t. 33; *Fl. des Serres* XIX (1873) 41 t. 1956-57; *Belg. Hort.* XXIV (1874) 258 t. 11; De Puydt, *Les Orchidées* t. 31; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 615; *Lindenia* VI t. 246. O. PAPILIO Lindley var. — Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) (1855) n. 197. — Équateur. 2

**Oncidium Lanceanum** Lindley in *Trans. Hort. Soc. Lond.* new ser. II (1842) 100 t. 7 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 133 ; *Bot. Reg.* (1836) t. 1887 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 37 t. 1842-43 ; Knowles et Westcott, *Floral Cabinet* t. 79 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 49 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 626. — Guyane hollandaise. ♀

**O. Lemonianum** Lindley in *Bot. Reg.* XXI (1836) t. 1789. O. GUIBERTIANUM Richard in Ramon de la Sagra, *Hist. polit. y natur. Cuba* II (1843-53) 244 t. 84. — Cuba. ♀

**O. Limminghei** Ed. Morren ex LINDLEY, *Fol. Orchid.* (Oncid.) (1855) n. 133 ; *Belg. Hort.* VI (1856) 353 t. 33 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 15 t. 1827 ; *Lindenia* I t. 20 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 53 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 629. — Vénézuéla. ♀

**O. macropetalum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 48 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 725. — Brésil. ♀

**O. maculatum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) sub t. 28 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 133 ; Knowles et Westcott, *Flor. Cab.* II t. 57 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 622. CYRTOCHILUM — Lindley in *Bot. Reg.* XXIV (1838) misc. 39 t. 44 et *Sert. Orchid.* t. 25 ; *Bot. Mag.* (1841) t. 3880. — Mexique, Guatemala. ♀

**O. maizæfolium** Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) n. 78 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 803. — Colombie, Vénézuéla. ♀

**O. nigratum** Lindley in PAXTON, *Flow. Gard.* I (1850-51) 78 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 105 ; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) I 790 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 65 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 624. — Guyane. ♀

**O. ornithopodum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) II 200 ; Regel in *Gartenflora* XXIX (1880) 57. — Patrie ?

**O. ornithorynchum** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 345 t. 80 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 204 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 189 ; *Bot. Reg.* (1840) t. 10 ; *Bot. Mag.* (1841) t. 3912 ; Bateman, *Orchid. of Mexic. and Guat.* t. 4 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 625. — Mexique, Guatemala, Pérou. ♀

**O. Papilio** Lindley in *Bot. Reg.* (1825) sub t. 910 ; *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 203 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 197 ; *Bot. Mag.* (1828) t. 2795 ; Lodiges, *Bot. Cab.* XI t. 1086 ; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 165 t. 920-22 ; *Orchid Alb.* VI t. 279 (var. MAJUS) ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 67 cum icone. — Antilles, Colombie, Vénézuéla, Équateur. ♀

**O. Phalænopsis** Linden et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 416 ; *Illustr. Hort.* XVII (1870) 15 t. 3 ; *Orchid Alb.* t. II 96 ; *Lindenia* III t. 123 ; *The Garden* (1892) 492 t. 859 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 627. O. CUCULLATUM Lindley var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII (1892) 30. — Équateur, ? Pérou. ♀

- Oncidium phymatochilum** Lindley in *Gard. Chron.* (1848) 139 cum icone et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 191 ; Paxton, *Flow. Gard.* I (1850-51) 78 t. 48 ; *Bot. Mag.* (1860) t. 5214 ; Linden, *Pescatorea* (1860) t. 35 ; *Fl. des Serres* XXIII (1880) 273 t. 2465 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 69. — Patrie : ? Mexique ou Brésil. ♀
- O. pulvinatum** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 115 et (1839) t. 42 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 118 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 219 cum icone ; Paxton, *Flow. Gard.* II fig. 126 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 72 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 628. — Brésil. ♀
- O. reflexum** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1920 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 158 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 93 t. 36 fig. 1 ; Maund, *The Botan.* III t. 116 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 74 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 629. — Mexique austr. ♀
- O. refractum** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 12 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 707. — Colombie. ♀
- O. Reichenbachii** Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) (1855) n. 172 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 802. — Colombie. ♀
- O. rupestre** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1844) 151 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 52 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 807 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 629. O. SKINNERI Lindley in *Gard. Chron.* (1855) 629. — Équateur, Pérou ; ? Amérique centr. ♀
- O. sessile** Lindley in PAXTON, *Flow. Gard.* I (1850-51) 101 t. 21 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 174 ; *Orchid Alb.* V t. 228 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 78 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 630. — Vénézuëla, Colombie. ♀
- O. sphacelatum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1841) sub t. 48 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 151 ; *Bot. Reg.* (1842) t. 30 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 79 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 631. — Mexique, Guatemala, ? Honduras. ♀
- O. sphegiferum** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. 23 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 117 ; Paxton, *Flow. Gard.* II fig. 124 ; Rolfe in *Gard. Chron.* (1888) I 716 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 80. — Brésil. ♀
- O. stelligerum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) 1398 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 285 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 632. — Patrie : ? Mexique.
- O. stipitatum** Lindley in BENTHAM, *Voy. Bot. Sulphur* (1846) 172 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 40 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 719 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 286. O. LACERUM Lindley in *Bot. Reg.* (1846) t. 27. — Panama. ♀
- O. stramineum** Bateman ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1838) misc. 39 (1840) t. 14 et *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 123 ; *Bot. Mag.* (1876) t. 6254 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 80. — Mexique austr. ♀

- Oncidium superbiens** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 843 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 705; *Bot. Mag.* (1872) t. 5980; *Orchid Alb.* VI t. 276; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 81. — Colombie. 2
- O. tetrapetalum** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 112; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 198; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 717; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 286. O. TRICOLOR Hooker in *Bot. Mag.* (1844) t. 4130. — Mexique. 2
- O. tigrinum** La Llave et Lexarsa, *Nov. Veget. Descr.* II (*Orchid. Opusc.*) (1825) 36; *Illustr. Hort.* XXII (1875) 155 t. 221; *Orchid Alb.* III t. 137; *Reichenbachia* II t. 88; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 84; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 633. O. BARKERI Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 48; *Illustr. Hort.* I (1854) t. 2. O. UNGUICULATUM Lindley in *Journ. Hort. Soc. London* I (1846) 303; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 220 cum icone. — Mexique austr. 2
- — var. **splendidum** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1871) t. 5878; De Puydt, *Les Orchidées* t. 33; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 84 cum icone. O. SPLENDIDUM A. Richard ex Duchartre in *Journ. Soc. Imp. Hort. Paris* VIII (1862) 50; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 11 t. 1825; *Orchid Alb.* VIII t. 373; *Reichenbachia* II t. 78; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 631. — Guatemala. 2
- O. tricuspidatum** Reichenbach f., *Beitr. z. Orchideenk. Centr.-Amer.* (1866) 72; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 286. — Costa-Rica. 2
- O. triquetrum** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 216; *Bot. Mag.* (1835) t. 3393; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 634. — Jamaïque. 2
- O. undulatum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1837-42) sub t. 48; *Orchid Alb.* VIII t. 368; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 634. CYRTOCHILUM — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) t. 84. — Mexique. 2
- O. virgulatum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1876) II 452; Regel in *Gartenflora* XXVI (1877) 246. — Équateur. 2
- O. Warscewiczii** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* X (1852) 693; *Gard. Chron.* (1857) 84 cum icone; *Lindenia* II t. 88; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 635. — Colombie. 2
- O. Wentworthianum** Bateman in *Bot. Reg.* (1840) misc. n. 194 et *Orchid. of Mexic. and Guat.* t. 39; Lindley, *Fol. Orchid.* (Oncid.) n. 195; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 219 cum icone; Paxton, *Flow. Gard.* II fig. 127. — Guatemala. 2
- O. zebrinum** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 12 et in *Gard. Chron.* (1872) 1355 fig. 304; *Illustr. Hort.* XXIV (1877) 58 t. 274; *Bot. Mag.* (1874) t. 6138; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 636. ODONTOGLOSSUM — Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1849) 849; Lindley, *Fol. Orchid.* (Odontogl.) n. 40. — Colombie, Vénézuéla. 2

73. **MILTONIA** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub t. 1976 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6909. — Genre d'une douzaine  
d'espèces du Pérou, de la Colombie et surtout du Brésil.

**M. anceps** Lindley, *Fol. Orchid.* (Miltonia) (1853) n. 7 ; Reichenbach f.,  
*Xenia Orchid.* I (1858) 56 t. 21 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5572 ; Veitch, *Man.*  
*Orch. Pl.* VIII 98. ODONTOGLOSSUM — Klotzsch in Otto et Dietrich, *Allg.*  
*Gartenzeit.* XIX (1851) 250. ONCIDIUM — Reichenbach f. in Walpers, *Annal.*  
*Bot.* VI (1863) 758. — Brésil. ♀

**M. candida** Lindley in *Bot. Reg.* XXIV (1833) misc. 29 et *Fol. Orchid.*  
(Miltonia) n. 9 ; *Sert. Orchid.* t. 21 ; *Bot. Mag.* (1872) t. 3973 (var. FLA-  
VESCENS Hooker) ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 518. ONCIDIUM —  
Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 763. — Brésil. ♀

**M. Clowesii** Lindley, *Sert. Orchid.* (1839) t. 34 et *Fol. Orchid.* (Miltonia)  
n. 3 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4109 ; Regel in *Gartenflora* V (1856) t. 160 ;  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 100 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 518.  
ODONTOGLOSSUM — Lindley in *Bot. Reg.* XXV (1839) misc. 153. ONCIDIUM —  
Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 760. — Brésil. ♀

**M. cuneata** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) misc. n. 28 ; (1845) t. 8 et *Fol. Or-*  
*chid.* (Miltonia) n. 8 ; *Illustr. Hort.* (1860) t. 237 ; *Orchid Alb.* I t. 46 ;  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 100. MILTONIA SPECIOSA Klotzsch in Otto et Die-  
trich, *Allg. Gartenzeit.* XXIII (1855) 129. ONCIDIUM — Reichenbach f. in  
Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 761. — Brésil. ♀

**M. Phalaenopsis** Nicholson, *Dict. Gard.* II (1886) 369 cum icone ; Veitch,  
*Man. Orch. Pl.* VIII 102 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 521. ODON-  
TOGLOSSUM — Linden et Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 278 ; Linden,  
*Pescatorea* t. 44 ; Warner, *Select Orchid. Pl.* I t. 30 ; Bateman, *Monog.*  
*of Odontogl.* t. 3 ; *Lindenia* VII t. 334. — Colombie. ♀

**M. Regnellii** Reichenbach f. in *Linnaea* XXII (1848) 851 et *Xenia Orchid.*  
I t. 47 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Miltonia) n. 5 ; *Bot. Mag.* (1864) t. 5436 ;  
De Puydt, *Les Orchidées* t. 26 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 103. ONCI-  
DIUM — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 760. M. CEREOLA  
Ch. Lemaire in *Illustr. Hort.* XII (1865) t. 446. — Brésil. ♀

**M. Roezlii** Nicholson, *Dict. Gard.* II (1886) 369 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.*  
VIII 104 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 522 cum icone. ODONTOGLOS-  
SUM — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) 1303 cum icone et *Xenia*  
*Orchid.* II 191 t. 182 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 6085 ; Bateman, *Monog. of Odon-*  
*tochl.* t. 30 ; *Orchid Alb.* II t. 64 ; *Reichenbachia* II t. 69 ; *Lindenia* I t. 78.  
— Colombie. ♀

**M. Russelliana** Lindley, *Sert. Orchid.* (1840) sub t. 48 et *Fol. Orchid.*  
(Miltonia) n. 4 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 106. ONCIDIUM — Lindley in  
*Bot. Reg.* (1836) t. 1830 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 761.  
— Brésil. ♀



**Miltonia spectabilis** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1976 et t. 1992 et *Fol. Orchid.* (Miltonia) n. 1; *Bot. Mag.* (1846) t. 4206; *Illustr. Hort.* VI t. 216; *The Garden XXXI* (1887) t. 593; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 108; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 522. **ONCIDIUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 759. — Brésil. ♀

— — var. **Moreliana** HENFREY, *Gard. Mag. Bot.* III 41 cum icone; *Fl. des Serres X* (1854-55) 105 t. 1008; *Lindenia* III t. 105; *Orchid Alb.* VIII t. 364. **M. MORELIANA** Hort. ex Lindley, *Fol. Orchid.* (Miltonia) n. 1; Warner, *Select. Orch. Pl.* I t. 32; Jennings, *Orchids* t. 37. — Brésil.

74. **BRASSIA** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 215; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6910. — Genre de 20 espèces environ habitant l'Amérique trop. (des Antilles et du Mexique au Brésil).

**B. brachiata** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1839) 94 et in *Fol. Orchid.* (Brassia) n. 3; *Bot. Reg.* (1847) t. 22; Linden, *Pescatorea* t. 31; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 121. **ONCIDIUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 768. — Amérique centr. ♀

**B. cinnabarina** Linden ex LINDLEY, *Fol. Orchid.* (Brassia) (1853) n. 6; *Illustr. Hort.* XXIX (1882) 64. — Colombie. ♀

Obs. Bentham (in Bentham et Hooker, *Gen. Pl.* III 567) considère cette espèce comme identique à l'**ADA AURANTIACA**.

**B. Lawrenceana** Lindley in *Bot. Reg.* (1841) misc. 2 t. 18 et *Fol. Orchid.* (Brassia) n. 3; Moore, *Illustr. Orch. Pl.* (Brassia) t. 1; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 124; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 130. **ONCIDIUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1863) 766. — Brésil. ♀

75. **GOMESA** Rob. Brown in *Bot. Mag.* (1815) t. 1748; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6915. — Six espèces du Brésil.

**G. planifolia** Klotzsch ex REICHENBACH F. in *Bot. Zeit.* X (1852) 772. RODRIGUEZIA — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 195; *Bot. Mag.* (1836) t. 3504. **ODONTOGLOSSUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 853. — Brésil. ♀

76. **ADA** Lindley, *Fol. Orchid.* (Ada) (1853) n. 1; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6919. — Genre monotype.

**A. aurantiaca** Lindley, *Fol. Orchid.* (Ada) (1853) n. 1; *Bot. Mag.* (1864) t. 5435; *Orchid Alb.* II t. 53; *Lindenia* V t. 235; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 130 cum icone; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 78. **MESOSPIDIUM** — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 857. — Colombie. ♀

77. **TRIGONIDIUM** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) sub tab. 1923 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6921. — Genre de 7 ou 8 espèces habitant l'Amérique trop. (de l'Amérique centr. au Brésil).

**T. obtusum** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) t. 1923 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 503. — Guyane anglaise. ♀

78. **IONOPSIS** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 348 t. 83 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6922. — Environ 10 espèces de l'Amérique trop. (des Antilles et du Mexique au Brésil).

**I. paniculata** Lindley in *Bot. Reg.* (1836) sub t. 1904 et *Fol. Orchid.* (Ionopsis) n. 9 ; *Bot. Mag.* (1865) t. 5541 ; *Lindenia* III t. 114 (var. *MAXIMA*) ; *Fl. des Serres* XXII (1877) 143 t. 2333 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 132 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 423 cum icone. — Brésil. ♀

**I. utricularioides** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 39<sup>a</sup> et *Gen. and Sp. Orch.* 194 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Ionopsis) n. 5 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 132 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 424. **I. TENERA** Lindley in *Bot. Reg.* (1836) t. 1904. — Jamaïque. ♀

79. **ORNITHOCEPHALUS** Hooker, *Exot. Fl.* II (1825) t. 127 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6924. — Environ 20 espèces de l'Amérique trop. (du Mexique au Brésil).

**O. grandiflorus** Lindley in *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, IV (1840) 383 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 493 ; *Belg. Hort.* (1884) 89 cum icone ; *Orchid. Alb.* X t. 472 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VIII 134 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 639. — Brésil. ♀

**O. myrticola** Lindley in *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, IV (1840) 383 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 493. — Brésil. ♀

80. **LOCKHARTIA** Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2715 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6930. — Genre de 16 espèces de l'Amérique trop. (des Antilles et du Mexique au Brésil).

**L. elegans** Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2715 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 820 et *Xenia Orchid.* I 100. **FERNANDEZIA** — Loddiges, *Bot. Cab.* XIII (1827) t. 1214. — Trinité, du Mexique au Vénézuëla et au Brésil. ♀

**L. verrucosa** Reichenbach f. in *Hamb. Gartenzeit.* XV (1859) 53 et in Saunders, *Refug. Bot.* II t. 76. **FERNANDEZIA ROBUSTA** Bateman in *Bot. Mag.* (1866) t. 5592. — Brésil, Pérou. ♀

81. **LUISIA** Gaudichaud in Freycinet, Bot. Voy. Uranie et La Physicienne (1826) 426 t. 37 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6933.  
— Genre de 10 espèces environ, de l'Inde et de l'Asie or. trop. et subtrop.

**L. brachystachys** Blume, *Rumphia* IV (1838) 50 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 204 t. 78 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Luisia) n. 3 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 23. **MESOCLASTES** — Lindley in Wallich, *Catal.* (1829) n. 1994 et *Gen. and Sp. Orch.* (1830) 43. — Himalaya trop. occ., Silhet, Khasia, Bengale, Tenasserim. 2

**L. Psyche** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* XXI (1863) 98 et in *Gard. Chron.* (1865) 342 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5558 ; Bateman, *Second Cent. Orch. Pl.* t. 174 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 24 ; *Gard. Chron.* (1893) II 32 fig. 9 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 471. — Tenasserim, ? Khasia. 2

82. **STAUROPSIS** Reichenbach f. in Hamb. Gartenzeit. (1860) 117 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6935. — Huit espèces de l'Archipel Malais.

**S. fasciata** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 572 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 2. **TRICHOGLOTTIS** — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 699 ; *Orchid Alb.* V t. 208 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 732 cum icone. — Patrie ? (Asie trop. or., Williams).

83. **PHALLENOPSIS** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825) 294 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6937. — Environ 15 espèces de l'Archipel Malais et des parties orientales de l'Inde.

**P. amabilis** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825) 294 t. 44 et *Rumphia* IV t. 194 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 213 ; Veich, *Man. Orch. Pl.* VII 22. **EPIDENDRUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 953. **P. GRANDIFLORA** Lindley in *Gard. Chron.* (1848) 39 cum icone ; *Bot. Mag.* (1860) t. 5184 ; De Puydt, *Les Orchidées* t. 34. — Java, Amboine, Célèbes, Borneo, Nouvelle-Guinée. 2

Obs. Quelques auteurs séparent les **P. AMABILIS** Lindley et **GRANDIFLORA** Lindley et rapportent à ce dernier le **P. AMABILIS** Blume.

**P. antennifera** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1879) I 398 et (1882) II 520 ; Rolfe in *Gard. Chron.* (1886) II 276 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 662. — Borneo. 2

Obs. Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* VI 31) réunit cette espèce à la suivante.

**P. Esmeralda** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1874) II 582 ; *Flor. Magaz.* t. 358 ; *Rev. Hort.* (1877) t. 107 ; *Orchid Alb.* VII t. 321 ; Godefroy, *L'Orchidophile* (1881) t. 9 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* t. 21 VI 31 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 663. — Burmah, Cochinchine. 2

- Phalenopsis Lowii Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* XX (1862) 214, in *Gard. Chron.* (1862) 979 et *Xenia Orchid.* II t. 151; *Bot. Mag.* (1862) t. 5351; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 143 t. 1910; Warner, *Select Orch. Pl.* ser. II t. 15; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 30; *Lindenia* VI t. 272; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 667. — Tenasserim. ♀
- P. Lueddemanniana Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* XXIII (1865) 146; *Bot. Mag.* (1866) t. 5523; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) 53 t. 1636; *Lindenia* II t. 94 et VIII t. 366; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 30; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 668. — Philippines. ♀
- P. Mannii Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1871) 902 et (1876) I 503; Rolfe in *Gard. Chron.* (1886) II 276; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 30; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 668. — Assam. ♀
- P. Schilleriana Reichenbach f.** in *Hamb. Gartenzeit.* XVI (1860) 115 et in *Gard. Chron.* (1860) 246 et (1875) II 169 fig. 34; *Xenia Orchid.* II t. 101; *Bot. Mag.* (1865) t. 5539; *Fl. des Serres* XV (1862-65) 115 t. 1559-60; *Lindenia* V t. 227; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 37; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 671 cum icone. — Philippines.
- P. speciosa Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1881) I 562 et (1882) II 744 fig. 130-32; *Orchid Alb.* IV t. 158; *Reichenbachia* II t. 57; *Lindenia* VI t. 288; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 30; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 38; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 671. — Iles Andaman. ♀
- P. Stuartiana Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1881) II 722, 748 et 752 fig. 149; *Bot. Mag.* (1882) t. 6622; *Orchid Alb.* V t. 237; *Reichenbachia* I t. 42; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 39; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 672. — Philippines. ♀
- P. Sumatrana Korthals et Reichenbach f.** in *Hamb. Gartenzeit.* XVI (1860) 115; *Bot. Mag.* (1865) t. 5527; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) 65 t. 1644; *Lindenia* II t. 52; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 40; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 673. — Sumatra, Palembang. ♀
- P. tetraspis Reichenbach f.**, *Xenia Orchid.* II (1870) 146 et in *Gard. Chron.* (1881) I 562; *The Garden* (1882) 119; *Belg. Hort.* (1883) 349; Rolfe in *Gard. Chron.* (1886) II 277; *Bot. Mag.* (1893) t. 7321; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 30. — Iles Andaman, Sumatra. ♀
- P. violacea Teysmann et Binnendijk** in *Batav. Nat. Tijdschr.* XXIV (1862) 320; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1878) II 234 et (1881) II 145 fig. 32 et 187; *Flor. Magaz.* new ser. t. 342; *Orchid Alb.* IV t. 182; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 29; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 675. STAURITIS — Reichenbach f. in *Hamb. Gartenzeit.* (1862) 34. — Perak, Singapore, Sumatra. ♀
- — var. **Schröderiana** REICHENBACH f. in *Gard. Chron.* (1882) II 680; *Illustr. Hort.* XXXIII (1885) t. 576; Williams, *loc. cit.* ed. VII, 675. — Archipel Malais.

84. **DORITIS** Lindley, *Gen. and Spec. Orch.* (1833) 178 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6938. — Huit espèces de l'Inde et  
de l'Archipel Malais.

**D. Wightii** Benth in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 574 ; Hoo-  
ker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 32. **PHALÉNOPSIS** — Reichenbach f. in *Bot. Zeit.*  
(1862) 214. **AERIDES LATIFOLIUM** Thwaites, *Enum. Pl. Zeyl.* (1864) 429. —  
Inde (de Ceylan à l'Himalaya or.) 2

85. **SARCOCHILUS** Rob. Brown, *Prod. Fl. N.-Holl.* (1810)  
332 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6940. — Genre comptant  
environ 30 espèces habitant l'Asie et l'Australie trop.

**S. Berkeleyi** Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI (1890) 37 ; *Orchid Alb.* X t. 436 ;  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 57 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 704.  
**THRIXSPERMUM** — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) I 557. — Iles Ni-  
cobar. 2

**S. Calceolus** Lindley in *Bot. Reg.* XXXII (1846) t. 19 ; Reichenbach f. in  
Walpers, *Annal. Bot.* VI 501. — Manille. 2

**S. Hartmanni** F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austral.* VIII (1874) 248 ;  
*Bot. Mag.* (1888) t. 7010 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 59. **THRIXSPERMUM** —  
Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) I 716. — Queensland. 2

86. **TRICHOGLOTTIS** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825)  
339 pr. p. ; T. Durand. *Ind. Gen. n.* 6941. — Genre de 5  
ou 8 ? espèces de l'Archipel Malais.

**T. cochlearis** Reichenbach f., (ubi?) ex *Journ. of Hort.* XII (1886) 194 fig.  
34 et XXVI (1893) 233 fig. 47 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 732.  
— Sumatra. 2

87. **AËRIDES** Loureiro, *Fl. Cochinch.* II (1790) 525 ; T. Durand,  
*Ind. Gen. n.* 6943. — Vingt-cinq espèces environ, bien dis-  
tinctes, habitant l'Inde, l'Archipel Malais, la Chine et le Japon.

**A. crassifolium** Parish et Reichenbach f. in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1874)  
145 ; Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) I 590 et 633 et (1877) II 492  
fig. 96 ; Warner, *Select Orch. Pl.* ser. III t. 12 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.*  
VI 46 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 82 cum icone. — Tenasse-  
rim. 2

**Aërides crispum Lindley** in WALLICH, *Catal.* (1832) n. 7319 et *Gen. and Sp. Orch.* 239; Lindley in *Bot. Reg.* (1841) t. 55 et in *Gard. Chron.* (1842) 711 cum icône; *Bot. Mag.* (1849) t. 4427; *Fl. des Serres* V (1849) t. 438; *Orchid Alb.* VII t. 293 (var.); Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 45; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 733. A. LINDLEYANUM Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* (1851) t. 1677 bis; Lindley in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 41. — Inde (du Concan à Travancore). 2

**A. falcatum Lindley** in PAXTON, *Flow. Gard.* II (1851) 142; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 220 t. 92 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 897; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 46; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 734. A. LAR-PENTÆ Hort. ex Reichenbach f. in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* XXIV (1856) 219; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 897. — Inde (Tenasserim). 2

**A. Fieldingii Loddiges** ex ED. MORREN in *Belg. Hort.* (1876) 286 t. 10; Jennings, *Orchids* t. 20; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 45; *Orchid Alb.* VIII t. 309; *Lindenia* III t. 97; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 85. A. WILLIAMSI Warner, *Select Orch. Pl.* ser. I (1862) t. 21. — Sikkim, Assam. 2

**A. Houlettianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1872) 1194 et *Xenia Orchid.* III t. 204; Warner, *Select Orch. Pl.* III t. 39; *Lindenia* III t. 103; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 85. A. FALCATUM Lindley, var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII (1891) 68. — Cochinchine. 2

**A. Japonicum Reichenbach f.** in *Hamb. Gartenzeit.* XIX (1863) 210; *Bot. Mag.* (1869) t. 5798; *Illustr. Hort.* XXIX (1882) 139 t. 461. ORCHIS FALCATA Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 26; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 85. — Japon. 2

**A. Lawrenciæ Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1883) II 460; *The Garden* XXXV (1885) 485 cum icône; *Orchid Alb.* VI t. 270; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 71 et 72 cum icône; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 86. — Mindanao. 2

**A. Leeaanum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1881) I 656; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 73; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 86. Hab. ? (Inde, Williams). 2

**A. maculosum Lindley** in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 58 et in *Gard. Chron.* (1845) 691; Paxton, *Mag. of Bot.* XII t. 49; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 897; Linden, *Pescatorea* I t. 33; *Lindenia* I t. 11; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 45; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 87. — Inde (de Concan à Travancore). 2

**A. mitratum Reichenbach f.** in *Bot. Zeit.* XXII (1864) 445 et in *Gard. Chron.* (1887) I 834; *Bot. Mag.* (1868) t. 5728; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 44; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 74. — Moulmein. 2

**Aërides multiflorum Roxburgh**, *Corom. Pl.* III (1819) 68 t. 271 et *Fl. Ind.* III 473 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 897 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 44 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 74. A. AFFINE Wallich, *Catal.* (1832) n. 7316 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 239 et *Sert. Orch.* t. 15 ; *Bot. Mag.* (1843) t. 4049 ; Warner, *Select Orch. Pl.* ser. I t. 21 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 82. A. ROSEUM Loddiges ex Paxton, *Flow. Gard.* (1850-52) t. 60 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* II t. 200. A. LOBBII Hort. ex *Illustr. Hort.* XV (1868) t. 559. — Himalaya trop., Khasia, Tenasserim. ♀

**A. odoratum Loureiro**, *Fl. Cochinch.* II (1790) 525 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 239 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4139 ; Paxton, *Flow. Gard.* II t. 443 ; Maund, *The Botanist* IV t. 180 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 47 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 89. A. CORNUTUM Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 63 ; Lindley in *Bot. Reg.* (1832) t. 1485. — Inde, Cochinchine, Chine austr., Java. ♀

**A. Ortgiesianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1885) I 501 et *Xenia Orchid.* III t. 252 fig. 1-7 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 89. — Patrie ?

**A. pachyphyllum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1880) I 231 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 48 in obs. ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 89. — Burmah. ♀

**A. quinquevulnera Lindley**, *Sert. Orchid.* (1830) t. 30 ; Paxton, *Mag. of Bot.* VIII (1841) 241 ; Jennings, *Orchids* t. 30 ; *Lindenia* IV t. 150 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 77 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 89. — Philippines. ♀

**A. Rohanianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1884) I 206 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 90. — Asie or. ♀

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* VII 78) réunit cet AERIDES à l'A. SUAVISSIMUM Lindley.

**A. Sanderianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1884) I 134 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 91. — Asie trop.-or. ♀

Obs. Veitch (*Man. Orch. Pl.* VII 72) en fait une sous-variété de l'A. LAWRENCE Reichenbach f.

**A. suavisimum Lindley** in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 264 ; Paxton, *Flow. Gard.* t. 66 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* II t. 213 ; *Lindenia* VII t. 307 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 79 cum icone ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 47 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 91. A. NOBILE Warner, *Select Orch. Pl.* ser. 1 (1862) t. 41 ; *Gartenflora* (1870) t. 641. — Malacca. ♀

— — var. **Ballantinianum** Hooker f. in *Fl. Brit. Ind.* VI (1890) 47 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 78. A. BALLANTINIANUM Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1885) II 198 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 82. — Avec le type.

**A. Thibautianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1866) 100 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 92. SACCOLABIUM HUTTONII Hooker in *Bot. Mag.* (1867) t. 5681. AERIDES — Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII (1892) 70. — Java. ♀

**Aërides virens** Lindley in *Bot. Reg.* (1843) misc. n. 48 et (1844) t. 41 ; Paxton, *Mag. of Bot.* XIV 197 cum icône ; *Orchid Alb.* IV t. 160 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 81 cum icône ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 92. — Java. 2

88. **RENANTHERA** Loureiro, *Fl. Cochinch.* II (1793) 636 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6944. — Cinq espèces habitant l'Asie trop. et l'Archipel Malais.

**R. coccinea** Loureiro, *Fl. Cochinch.* II (1793) 637 ; Lindley in *Bot. Reg.* (1828) t. 1131 et *Gen. and Sp. Orch.* 217 ; *Bot. Mag.* (1830) t. 2997-98 ; Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 37 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 48 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 82. — Iles Moscos, Cochinchine. 2

**R. matutina** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 218 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1855) 90 t. 35 ; Miquel, *Fl. Ind. Bat.* III 698 ; Linden, *Pescatorea* t. 12 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 85. **AERIDES** — Wildenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 131. — Java. 2

89. **VANDA** R. Brown in *Bot. Reg.* (1820) t. 506 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6945. — Genre de 20 espèces de l'Inde et de l'archipel Malais (une espèce en Australie).

**V. alpina** Lindley, *Fol. Orchid.* (Vanda) (1853) n. 25 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 870 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 53 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 88. **LUSIA** — Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. 101. — Khasia. 2

**V. Amesiana** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1887) I 764 et (1889) I 233 ; *Orchid Alb.* VII (1887) t. 296 ; *Journ. of Hort.* XVIII (1889) 103 fig. 18 ; *Bot. Mag.* (1890) t. 7139 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 739. — Cambodge. 2

**V. Bensonii** Bateman in *Bot. Mag.* (1866) t. 5611 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II 138 et in *Gard. Chron.* (1867) 180 cum xylogr. ; *Fl. des Serres* XXII (1878) 173 t. 2329 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 51 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 89 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 740. — Birmanie, Rangoon. 2

**V. cœrulea** Griffith ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 30 et *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 18 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 8 t. 5 ; Jennings, *Orchids* t. 34 ; *Orchid Alb.* VI t. 282 ; *Reichenbachia* II t. 57 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 51 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 90 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 740. — Inde (Khasia). 2

**V. cœrulescens** Griffith, *Notul. Pl. Asiat.* (1851) 352 ; Lindley, *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 19 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5834 ; *Orchid Alb.* I t. 48 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 50 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 92 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 741 cum xylogr. — Burmah. 2



- Vanda cristata** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 216 et *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 23 ; *Bot. Reg.* (1842) t. 48 ; *Bot. Mag.* (1847) t. 4304 ; *Orchid Alb.* VII t. 290 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 53 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 94 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 742. V. STRIATA Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 137 t. 150. — Himalaya trop. (de Kumaon à Bhotan). 2
- V. Denisoniana** Benson et Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 528 ; *Bot. Mag.* (1869) t. 5811 ; *Illustr. Hort.* XIX (1872) 272 t. 105 ; *Lindenia* I t. 21 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 51 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 94 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 742. — Burmah. 2
- V. insignis** Blume, *Rumphia* IV (1838) 49 t. 192 fig. 2 ; *Bot. Mag.* (1869) t. 5759 ; Warner, *Select Orch. Pl.* I t. 3 ; *Orchid Alb.* IV t. 172 ; *Lindenia* VIII t. 355 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 97 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 744. — Archipel Malais, Timor. 2
- V. lamellata** Lindley in *Bot. Reg.* (1838) misc. n. 125 et *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 20. — Iles Philippines. 2
- var. **Boxallii** REICHENBACH F. in *Gard. Chron.* (1880) I 743 et (1881) I 87 cum xylogr. ; *Bot. Mag.* (1877) t. 6328 ; *The Garden* XIX (1881) t. 287 ; *Orchid Alb.* VIII t. 338 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 100 ; *Lindenia* I t. 32. — Luçon. 2
- V. Parishii** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1867) 138 ; *Orchid Alb.* I t. 15 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 51 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VI 51 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 746. — Moulmein. 2
- V. Roxburghii** R. Brown in *Bot. Reg.* (1820) t. 506 ; *Bot. Mag.* (1821) t. 2445 ; *Fl. des Serres* II (1846) 21 t. 11 ; *Orchid Alb.* II t. 59 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 52 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 102 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII, 749. CYMBIDIUM TESSELLOIDES Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 463. VANDA — Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 864. — Bengale, Bombay, Ceylan. 2
- V. suavis** Lindley in *Gard. Chron.* (1848) 351 et *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 9 ; *Bot. Mag.* (1860) t. 5174 ; *Fl. des Serres* XV (1862-65) 197 t. 1604-05 (var. HRUBYANA) ; *Orchid Alb.* IV t. 180 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 747 cum xylogr. V. TRICOLOR Lindley var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII (1891) 106. — Java. 2
- V. teres** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 217 et *Fol. Orchid.* (Vanda) n. 16 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4114 ; *Bot. Reg.* (1836) t. 1809 ; *Reichenbachia* I t. 27 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 49 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 104 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII, 749. DENDROBIUM — Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 485. — Inde bor.-or., Assam, Burmah. 2
- V. tricolor** Lindley in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 59 et in Paxton, *Flow. Gard.* II t. 42 ; *Bot. Mag.* (1849) t. 4432 ; *Fl. des Serres* VI (1850) t. 641 ; *Orchid Alb.* II t. 77 ; *Lindenia* IV t. 167 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 106 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 750. — Java. 2

90. **SACCOLABIUM** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Ind.* (1825) 292 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6946. — Genre de 20 espèces en-  
viron de l'Inde et de l'archipel Malais.

**S. ampullaceum** Lindley, *Sert. Orchid.* (1838) t. 17 ; *Bot. Mag.* (1866)  
t. 5595 ; *Orchid Alb.* IV t. 191 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 64 ; Veitch,  
*Man. Orch. Pl.* VII 114 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 698 cum  
xylogr. **AERIDES** — Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 476. — Himalaya trop.,  
Silhet, Munnipore, Burmah, Tenasserim. ♀

**S. curvifolium** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 222 ; *Illustr. Hort.*  
XII (1866) t. 493 ; De Puydt, *Les Orchidées* t. 38 ; *Orchid Alb.* III t. 107 ;  
Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 65 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 113 ; Wil-  
liams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 700. — Assam, Burmah, Java. ♀

**S. giganteum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 221 ; *Bot. Mag.* (1867)  
t. 5635 ; *Orchid Alb.* II t. 56 ; *Reichenbachia* I t. 22 ; Veitch, *Man. Orch.*  
*Pl.* VII 114. **VANDA DENSIFLORA** Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* (1851) sub  
t. 42 et *Fol. Orchid.* (*Vanda*) n. 22 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 89  
t. 1765 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 53. — Inde (Pegu, Rangoon). ♀

— — var. **illustre** REICHENBACH f. in *Gard. Chron.* (1884) I 44 ; *Lindenia* II  
t. 83 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 701. — Avec le type.

**S. violaceum** Lindley ex WARNER, *Select Orch. Pl.* I (1862-65) t. 14 ; De  
Puydt, *Les Orchidées* t. 39 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 703.  
**VANDA** — Lindley in *Bot. Reg.* XXVII (1841) misc. 32 et (1847) t. 30.  
**RHYNCHOSTYLIS** — Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 93. — Iles Philip-  
pines et Pulo-Copang. ♀

91. **ACAMPE** Lindley, *Fol. Orchid.* (*Acampe*) (1853) n. 4 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6948. — Genre de 9 espèces de  
l'Inde, de la Chine austr. et de l'Afrique austro.-or.

**A. multiflora** Lindley, *Fol. Orchid.* (*Acampe*) (1853) n. 4 ; Reichenbach f.  
in Walpers, *Annal. Bot.* VI 872. **VANDA** — Lindley, *Collect. Bot.* (1821)  
t. 38. — Chine austr. ♀

Obs. Hooker f. rapporte avec doute cette espèce au **SACCOLABIUM LONGI-  
FOLIUM** Hooker f.

92. **SARCANTHUS** Lindley, *Collect. Bot.* (1821) t. 39<sup>b</sup> ; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 6949. — Genre de 15 espèces de l'Inde,  
de la Chine austr. et de l'archipel Malais.

**S. oxyphyllus** Wallich ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1840) misc. 58 ; Reichen-  
bach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 892 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 70.  
**ANGRÆCUM PUGIONIFORME** Klotzsch in *Ind. Sem. Hort. Berol.* app. (1851) 12.  
— Tenasserim. ♀

**Sarcanthus paniculatus** Lindley in BAUER et LINDLEY, *Illustr. Orch. Pl.* (1830) t. 9 et *Gen. and Sp. Orch.* 233. AERIDES — Ker in *Bot. Reg.* III (1817) t. 220. VANDA ROXBURGHII Rob. BROWN in *Bot. Reg.* VI (1820) sub t. 506. — Chine. 2

**S. teretifolius** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 234 ; *Bot. Mag.* (1837) t. 3571 ; *Belg. Hort.* (1860) 129 t. 9 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 891. — Chine. 2

**S. tricolor** Reichenbach f. in *Bonplandia* III (1855) 219. S. RACEMIFER Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 891. — Hab. ?

**S. Williamsonii** Reichenbach f. in *Hamb. Gartenzeit.* (1865) 333 et in *Gard. Chron.* (1865) 674 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 67. — Tenasserim, îles Andaman. 2

93. **CLEISOSTOMA** Blume, *Bijdr. Fl. Nederl. Indie* (1825) 362 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6950. — Genre de 15 espèces de l'Inde, de l'archipel Malais et de l'Australie trop.

**C. lanatum** Lindley in *Journ. Hort. Soc. Lond.* IV (1849) 164 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 889. SACCOLABIUM — Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI (1890) 60. — Tenasserim. 2

**C. maculosum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 227 ; Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI 888 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 71. C. GALEATUM Thwaites, *Enum. Pl. Zeyl.* (1861) 305. — Ceylan. 2

**C. striatum** Reichenbach f. (sub ECHIOGLOSSO) in *Gard. Chron.* (1879) II 390 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 76 in nota. — Sikkim. 2

94. **ANGRÆCUM** Bory, *Voy. îles mers Afrique I* (1804) 359 t. 49 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 6956. — Genre d'environ 25 espèces de l'Afrique trop. et austr., des îles Mascareignes, de la Chine et du Japon.

**A. articulatum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1872) 73 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc. London* XXI (1885) 485 ; *Reichenbachia* II t. 55 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 122 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 40 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 96. — Madagascar. 2

**A. citratum** Thouars, *Orch. îles Afric.* (1822) t. 61 ; *Bot. Mag.* (1867) t. 5624 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc. London* XXI (1885) 481 ; *Illustr. Hort.* (1866) t. 592 ; *Lindenia* V t. 238 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 125 cum xylogr. ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 41. — Madagascar. 2

**Angræcum eburneum Bory**, *Voy. îles mers Afriq.* I (1804) 359 t. 19 ; *Orchid. Alb.* I t. 41 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc. London* XXI (1885) 480 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 41. LIMODORUM — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 125. — Madagascar, Comores, Seychelles, Réunion, Nyika, ? Kilima-N'djaro. ♀

— — var. **virens** HOOKER f. in *Bot. Mag.* (1860) t. 5174 ; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 42. A. VIRENS Lindley in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 19 ; Paxton, *Flow. Gard.* I 25 fig. 9 et 10.

**A. falcatum Lindley**, *Gen. and Sp. Orch.* (1832) 237 in nota ; Bentham in *Journ. Linn. Soc. London* XVIII (1881) 336 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 128. ORCHIS — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 26. LIMODORUM — Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* VI (1799) 79 ; *Bot. Reg.* (1818) t. 283 ; *Bot. Mag.* (1819) t. 2097. (CEEOCLADES — Lindley, *loc. cit.* (1832) 237. — Japon. ♀

**A. Leonis Veitch**, *Man. Orch. Pl.* VII (1891) 134 cum xylogr. ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 44. AERANTHUS — Reichenbach f. in *Flora* (1885) 380 et in *Gard. Chron.* (1885) I 726 et (1886) I 108 et 114 ; *Orchid. Alb.* V t. 213. — Comores. ♀

**A. modestum Hooker** f. in *Bot. Mag.* (1838) t. 6693 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc. London* XXI (1885) 482 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 135 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 6693 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 44. A. SANDERIANUM Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1888) I 168 ; *Rev. Hort.* (1888) 516. — Madagascar, Comores. ♀

**A. Scottianum Reichenbach** f. in *Gard. Chron.* (1878) II 556 et *Xenia Orchid.* III pars 4, 75 t. 235 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 6763 ; *L'Orchidophile* (1886) 387 cum icône ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 137 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 46. Comores. ♀

**A. sesquipedale Thouars**, *Orch. îles Afriq.* (1822) t. 66 et 67 ; *Bot. Mag.* (1859) t. 5113 ; *Gartenflora* (1872) t. 744 ; *Lindenia* IV t. 175 ; *Reichenbachia* IV t. 175 ; Ridley in *Journ. Linn. Soc. London* XXI (1885) 475 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 46. AERANTHUS — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1833) 244. MACROPLECTRUM — Pfitzer in Engler et Prantl, *Natürl. Pflanzenf.* (Orchid.) (1888) 214. — Madagascar, Zanzibar. ♀

**A. superbum Thouars**, *Orch. îles Afriq.* (1822) t. 62-64 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 245 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 46. A. EBURNEUM Lindley (non Thouars) in *Bot. Reg.* XVIII (1832) t. 1522 et in Paxton, *Mag. of Bot.* XXI (1849) 90 ; *Bot. Mag.* (1854) t. 4761. — Nossibé. ♀

95. **LISTROSTACHYS** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 930 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6957. — Genre d'une dizaine d'es-  
pèces de l'Afrique trop. et austr.

**L. arcuata** Reichenbach f. in WALPERS, *Annal. Bot.* VI (1864) 907 ; Du-  
rand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 48. **ANGRÆCUM** — Lindley in Hooker,  
*Comp. Bot. Mag.* II (1836) 204 et 205 cum xylogr. ; Harvey, *Thes. Capens.* II  
5 t. 107 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XIX (1882) 338 ; Veitch, *Man.*  
*Orch. Pl.* VII 48. — Kameroun, Bas-Niger, Natal, colonie du Cap. Ț

**L. pertusa** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* VI (1852) 930 ; Durand et Schinz,  
*Consp. Fl. Afric.* V 49. **ANGRÆCUM** — Lindley in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II  
(1836) 205 et in *Journ. Linn. Soc. London* VI (1862) 135 ; *Bot. Mag.* (1853)  
t. 4752 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* VII 136. — Bas-Niger. Ț

96. **MYSTACIDIUM** Lindley in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II  
(1836) 205 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6961. — Environ  
20 espèces de l'Afrique trop. et austr.

**M. distichum** Pfitzer in ENGLER et PRANTL, *Natürl. Pflanzenf.* (Orchid.)  
(1888) 216 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 52. **ANGRÆCUM** — Lin-  
dley in *Bot. Reg.* XXI (1835) t. 1781 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4445. **ÆRANTHUS**  
— Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.* VI (1864) 901. — Sierra-Leone,  
île du Prince, Bas-Niger. Ț

97. **DENDROPHYLAX** Reichenbach f. in Walpers, *Annal. Bot.*  
VI (1864) 903 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6962. — Cinq es-  
pèces des Indes Occidentales.

**D. funalis** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1884) 585. **EPIDEN-**  
**DRUM** — Swartz, *Prodr. Veget. Ind. Occ.* (1788) 126. **ANGRÆCUM** — Lindley  
in *Gard. Chron.* (1846) 135 et in *Bot. Mag.* (1847) t. 4295 ; *Bot. Reg.* XXIII  
(1837) t. 1950. — Jamaïque. Ț

98. **NOTYLIA** Lindley in *Bot. Reg.* XI (1825) sub t. 930 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 6966. — Genre de 20 espèces en-  
viron de l'Amérique trop.

**N. bicolor** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1842) 93 ; *Bot. Mag.* (1866)  
t. 5609 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 536. — Guatemala. Ț

99. **VANILLA** Swartz in Act. Acad. Upsal. VI (1799) 66 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6974. — Genre d'une vingtaine d'espèces habitant les régions trop. du monde entier.

**V. aromatica** Swartz in Act. Acad. Upsal. VI (1799) 66 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 434 ; Descourtils, *Fl. Antill.* VII t. 479 ; Nees, *Pl. Medic.* t. 74 et 75 ; Spach, *Hist. des Végét.* t. 118 ; De Puydt, *Les Orchidées* 11 fig. 17. **EPIDENDRUM VANILLA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 952 pr. p. — Brésil, ? Antilles. 24

**V. planifolia** Andrews, *Bot. Repos.* VIII (1808) t. 538 ; Blume, *Rumphia* I 197 t. 67 ; Salisbury, *Parad. Londin.* t. 82 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 638 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 754. — Indes occ. ; du Mexique au Pérou.

100. **SOBRALIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Prodr.* (1794) 120 t. 26 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6975. — Genre de 40 espèces habitant les Andes, du Mexique au Pérou, et la Guyane.

**S. macrantha** Lindley, *Sert. Orchid.* (1839) sub t. 29 ; *Bot. Mag.* (1849) t. 4446 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 69 t. 669 ; Bateman, *Orchid. Mexic. and Guatem.* t. 37 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 713 cum xylogr. — Mexique, Guatemala, Nicaragua. 24

— — var. **splendens** Hort. ex Williams, *loc. cit.* ed. VII (1894) 714.

101. **LISTERA** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 201 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6991. — Dix espèces de l'Europe, de l'Asie temp. et mont., et de l'Amérique bor.

**L. convallarioides** Nuttall, *Gen. of N. Amer. Pl.* II (1818) 191 ; Hooker, *Fl. Bor. Amer.* II 204 t. 205 ; Barton, *Veget. Mater. Unit. Stat.* II t. 39 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 456 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 501. **EPIPACTIS** — Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1800) 232. — Canada, Montagnes Rocheuses. 24

**L. cordata** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 201 ; Loddiges, *Bot. Cab.* VI t. 532 ; Curtis, *Fl. Londin.* IV t. 143 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 456 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 480 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 501. **OPHRYS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 946. — Europe bor. et centr. mont., Italie mont., Russie centr., Amérique bor. 24

102. **SPIRANTHES** L.-C. Richard in Mém. Muséum Paris IV (1818) 50 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 6992. — Genre d'environ 80 espèces habitant les régions temp. et trop. du monde entier.

**S. cernua** L. C. Richard, *Orchid. Europ.* (1817) 37 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 202 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 467 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 502. **OPHRYS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 946. **NEOTTIA** — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 75. **S. ROMANZOWIANA** Chamisso in *Linnaea* III (1828) 27. — Irlande, Amérique bor. (du Canada à la Louisiane). 2

**S. graminea** Lindley in BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1840) 25 et *Gen. and Sp. Orch.* 466 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 301. — Mexique austr. 2

**S. Richardi** Nob. **STENORHYNCHUS SPECIOSUS** Richard, *Orchid. Europ.* (1818) 37 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 477. **NEOTTIA SPECIOSA** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III (1786-93) t. 600 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1374 ; Hooker, *Exot. Fl.* (1823) t. 3 et 4. **IBIDIUM** — Salisbury in *Trans. Hort. Soc. London* I (1812) 291. — Amérique trop., surtout dans les Antilles. 2

**S. speciosa** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 475. **SARCOGLOTTIS** — Presl, *Reliq. Henk.* I (1830) 96 t. 15. — Pérou. 2

103. **HÆMARIA** Lindley, *Orch. Sceletos* (1826) 9 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7004. — Genre de 4 esp. habitant la Chine, la Cochinchine et l'Archipel Malais.

**H. discolor** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 490 ; Miquel, *Choix Pl. Jard. Buitenz.* t. 40 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 101 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 419. **GOODYERA** — Ker in *Bot. Reg.* IV (1818) t. 271 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1818) t. 143 ; *Bot. Mag.* (1819) t. 2075. — Péninsule Malaise, Penang, Hong-Kong. 2

— var. **Denisoniana** REICHENBACH f. ex *Illustr. Hort.* (1872) 321 ; Williams, *loc. cit.* ed. VII 419 cum xylogr. **ANGECTOCHILUS DAVSONIANUS** S. Low ex Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1868) 1038 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 21 t. 1830.

104. **DOSSINIA** Ch. Morren in *Annal. Soc. Agric. Gand* IV (1848) 171 t. 193 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7005. — Genre monotype.

**D. marmorata** Ch. Morren in *Annal. Soc. Agric. Gand* IV (1848) 171 t. 193 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* XIII (1862) 7 t. 1-2 ; Blume, *Orch. Archip. Ind.* t. 48 ; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* t. 96. **ANGECTOCHILUS LOWII** Hort. ex Loudon, *Encycl. Pl.* suppl. II (1844) 1492. — Borneo. 2

105. **GOODYERA** R. Brown, in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, V (1813) 197 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7008. — Genre de 25 espèces habitant l'Europe bor. et mont., l'Asie temp. et trop., les îles Madère et Mascareignes et la Nouvelle-Calédonie.

**G. Menziesii** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 402 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 504. **SPIRANTHES DECIPIENS** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 203 t. 204. — Amérique bor. (partie occ.) ♀

**G. pubescens** Rob. Brown in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, V (1813) 198 ; *Bot. Mag.* (1825) t. 2540 ; Lindley, *Collect. Bot.* t. 25 et *Gen. and Sp. Orch.* 492 ; *Fl. des Serres* XV (1862-65) 107 t. 1555 ; A. Gray, *Man. Bot. Unit. Stat.* ed. VI 503 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 411 cum xylogr. **NEOTTIA** — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 76. — Amérique bor. ♀

106. **THELYMITRA** Forster, Charact. Gen. Pl. Maris austr. (1776) 97 t. 49 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7020. — Genre de 20 espèces de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie et de l'archipel Malais.

**T. ixioides** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1800) 213 t. 3 ; Smith, *Exot. Bot.* t. 29 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 522 ; Hooker, *Fl. Tasman.* II t. 103 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI 319. — Australie. ♀

**T. longifolia** Forster in J. R. et G. FORSTER, *Char. Genr. Pl. Ins. Maris Austral.* (1776) 98 t. 49 ; Hooker f., *Handb. N. Zeal. Fl.* 270 ; Fitzgerald, *Austral. Orchids* I part 6 (1880) t. 2. **T. FORSTERI** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1800) 228 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 520. — Nouvelle-Zélande. ♀

107. **PTEROSTYLIS** Rob. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holland. (1810) 323 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7028. — Genre de 35 espèces environ de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle Calédonie.

**P. Baptistii** Fitzgerald, *Austral. Orchids* I part 1 (1875) t. 2 ; *Bot. Mag.* (1878) t. 6351. — Nouvelle-Galles du Sud. ♀



108. **ARETHUSA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 1014 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7041. — Genre de 3 espèces de  
l'Amérique bor., du Guatemala et du Japon.

**A. bulbosa** Linné *Sp. Pl.* ed. I (1753) 950 ; *Bot. Mag.* (1821) t. 2204 ;  
Loddiges, *Bot. Cab.* (1816) t. 1170 ; Hooker, *Exot. Fl.* III (1827) t. 170 ;  
Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 426 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* 504.  
— Du Canada et de la Nouvelle-Écosse à la Louisiane. 2

109. **CALOPOGON** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V  
(1813) 204 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7042. — Trois espèces  
de l'Amérique bor.

**C. pulchellus** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 204 ; Lod-  
diges, *Bot. Cab.* (1819) t. 340, Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1825) t. 115 ;  
Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 424 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 171 t. 1036 ;  
A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 504. **CYMBIDIUM** — Swartz in *Nov.*  
*Act. Soc. Sc. Upsal.* VI (1799) 73. — Du Canada et de la Nouvelle-Écosse  
à la Louisiane et au Texas. 2

110. **POGONIA** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 65 ; T. Durand, *Ind.*  
*Gen.* n. 7043. — Genre de 30 espèces de l'Asie, l'Afrique  
et l'Amérique trop. et de l'Asie temp.

**P. rosea** Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III (1884) 304. **CLEISTES** —  
Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 410 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.*  
636. — Amérique trop. (du Panama au Pérou), Trinité. 2

111. **EPIPACTIS** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V  
(1813) 201 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7054. — Genre  
d'environ 10 esp. habitant l'Europe, l'Asie et l'Amérique  
bor., temp. et mont.

**E. Royleana** Lindley in ROYLE, *Illustr. Bot. Himal. Mount.* (1839) 368 ;  
Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 461 et in *Journ. of Proc. Linn. Soc. London*  
I (1837) 174 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 126. **CEPHALANTHERA** — Regel  
in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879) 490 ; Boissier, *Fl. Or.* V 85. — Himalaya  
temp., ? Turkestan (Samarcande). 2

112. ORCHIS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 681 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7055. — Genre d'environ 80 espèces habitant l'Europe, l'Asie temp., l'Afrique et l'Amérique bor., et les îles Canaries.

**O. foliosa** Solander mss. ex R. T. LOWE, *Prim. Faun. et Fl. Mader.* in *Transact. Cambridge Philos. Soc.* IV (1831) 13 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 264 et *Sert. Orchid.* t. 44 ; *Bot. Reg.* (1834) t. 1701 ; *Bot. Mag.* (1838) t. 5074 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 61. — Madère. ♀

**O. longibracteata** Bivona, *Sicul. Pl. Centur.* I (1806) 57 t. 4 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 272 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 62. BARLIA — Parlatore, *Fl. Ital.* III (1858) 447. ACERAS — Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII (1851) 3 t. 119 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 282. O. ROBERTIANA Loiseleur, *Fl. Gall.* ed. 2, II (1828) 266 t. 21. — Europe mér., Canaries, Algérie, Cyrénaïque, Crète. ♀

**O. papilionacea** Linné, *Syst. Nat.* ed. X (1759) 1242 ; *Bot. Reg.* (1817) 1155 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 284 ; Boissier, *Fl. Or.* V 60 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 63. O. RUBRA Loiseleur, *Fl. Gall.* II (1807) 266 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* I t. 183. — Europe et Asie Méditerr., Maroc, Algérie. ♀

**O. spectabilis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 943 ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 69 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1817) t. 78 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1824) t. 65 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 267 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 506. HABENARIA — Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 689. — Du Canada à la Caroline. ♀

113. SERAPIAS Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 683 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7056. — Genre de 4 ou 5 espèces habitant la région Méditerr. et les îles Açores.

**S. cordigera** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1315 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 440 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5868 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 276 ; Boissier, *Fl. Or.* V 54 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 64. — Europe et Asie Méditerr., Açores, Maroc, Algérie. ♀

**S. Lingua** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 950 ; Hooker, *Exot. Fl.* (1823) t. 41 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 280 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5868 ; Boissier, *Fl. Or.* V 53 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 64. — Europe et Asie Méditerr., Maroc, Algérie. ♀

114. OPHRYS Linné, Gen. Pl. (1737) n. 686 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7058. — Genre de 30 espèces environ de l'Europe, de l'Asie occ. et de l'Afrique bor.

**O. atrata** Lindley in *Bot. Reg.* (1835) t. 1807 ; Reichenbach f., *Fl. Germ. Excurs.* I 129 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 376 ; Parlatore, *Fl. Ital.* III 533 ; Boissier, *Fl. Or.* V 78. **O. ARANIFERA** Hudson var. — Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII (1851) 91. — Italie, Sicile, Grèce, Macédoine, Crète. 2

**O. tenthredinifera** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 67 ; *Bot. Mag.* (1817) t. 1930 ; *Bot. Reg.* (1817) t. 205 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 376 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 463 et 517 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 302 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 67. — Europe, Asie et Afrique Méditer. 2

115. HERMINIUM Linné, Gen. Pl. (1737) n. 684 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7059. — Genre de 6 espèces de l'Europe et de l'Asie temp. mont.

**H. Monorchis** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 191 ; Dietrich, *Fl. Boruss.* I t. 9 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 305 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 445. OPHRYS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 947. **H. CLANDESTINUM** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III (1855) 299. — Europe, Caucase, Sibérie. 2

116. HABENARIA Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 44 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7066. — Genre de 450 espèces environ habitant les rég. temp. et chaudes du monde entier.

**H. ciliaris** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 194 ; *Bot. Mag.* (1814) t. 1668 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1830) t. 1326 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 509. PLATANThERA — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1835) 292 ; Hooker f., *Fl. Bor.-Amer.* II 199. ORCHIS — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 585 ; Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II 156. — Du Canada à la Floride et au Texas. 2

**H. conopsea** Benthham in *Journ. Linn. Soc. London* XVIII (1880) 354. ORCHIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 942 ; *Fl. Dan.* (1765) t. 224 ; *Engl. Bot.* (1791) t. 10. GYNADENIA — R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 191 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 273 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 298 ; Boissier, *Fl. Or.* V 81. — Europe, Sibérie. 2

**H. elegans** Bolander, *Catal. Pl. San Franç.* 29. PLATANThERA — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1835) 285 ; Hooker f., *Fl. Bor.-Amer.* II 196 — Canada, États-Unis bor.-occ. 2

**Habenaria gracilis** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XII (1877) 276.  
 PLATANThERA — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1835) 288 ; Hooker f., *Fl. Bor.-Amer.* II 198. — Canada, États-Unis bor.-occ. ʒ

**H. Hookeriana** Torrey ex A. Gray in *Ann. Lyc. N. York.* III (1836) 229 ;  
 A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 508. PLATANThERA HOOKERI Lindley,  
*Gen. and Sp. Orch.* (1835) 286. H. HOOKERI Torrey ex Lindley, *loc. cit.*  
 H. ORBICULATA Hooker f. (non Torrey), *Exot. Fl.* II (1825) t. 145. — Du  
 Canada à la Virginie et à l'Iowa. ʒ

**H. hyperborea** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 193 ;  
 A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 507. PLATANThERA — Lindley,  
*Gen. and Sp. Orch.* (1835) 287. ORCHIS — Linné, *Mant. Pl.* (1767) 121 ;  
 Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 432 et 433. — Du Canada et à l'Iowa  
 et à l'Illinois. ʒ

417. SATYRIUM Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.*  
 XXI (1800) 214 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7072. — Genre  
 d'environ 60 esp. de l'Afrique austr. et trop., des îles Mas-  
 careignes et de l'Inde.

**S. acuminatum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 339 ; Sonder in *Lin-  
 naea* XIX (1847) 86 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 193 ;  
 Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 92. — Colonie du Cap. ʒ

**S. carneum** Rob. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 193 ; *Bot.  
 Mag.* (1813) t. 1512 ; *Fl. des Serres* IX (1848) t. 329 ; Bolus, *Orch. Cape  
 Penins.* 120 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 94. ORCHIS — Dryander  
 in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 294. — Colonie du Cap. ʒ

**S. coriifolium** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXII (1800)  
 216 ; *Bot. Mag.* (1820) t. 2172 ; *Bot. Reg.* (1823) t. 703 ; Bolus, *Orch. Cape  
 Penins.* 124 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 94. DIPLECTHRUM —  
 Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 509. — Colonie du Cap. ʒ

**S. eriostomum** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 342 ; Sonder in *Lin-  
 naea* XIX (1847) 88 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 194 ;  
 Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 94. S. LYDENBURGENSE Reichen-  
 bach f. in *Flora* (1881) 328. — Colonie du Cap. ʒ

**S. maculatum** Burchell ex Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 337 ; Son-  
 der in *Linnaea* XIX (1847) 84 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV  
 (1889) 193 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 97. — Colonie du Cap. ʒ

**S. membranaceum** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI  
 (1800) 210 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 335 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc.  
 London* XXV (1889) 193 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 97. DIPLEC-  
 THRUM — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 509. — Colonie du Cap. ʒ

118. *DISA* Bergius, Descr. Pl. Cap. Bonæ Spei (1767) 348 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 7074. — Genre d'environ 60 esp.  
de l'Afrique trop. et austr. et des îles Mascareignes.

**D. aconitoides** Sonder in *Linnæa* XIX (1847) 91 ; Harvey, *Thes. Capens.* 26 t. 41 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 198 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 99. — Colonie du Cap ; Natal. 2

**D. chrysostachya** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 211 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 211 ; Sonder in *Linnæa* XIX (1847) 90 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 196 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 101. — Colonie du Cap. 2

**D. cornuta** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 210 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 349 ; Sonder in *Linnæa* XIX (1847) 90 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4091 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 197 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 101. ORCHIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. 2 (1763) 1330. SATYRIUM — Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* I (1794) 5. — Colonie du Cap. 2

**D. crassicornis** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 348 ; Sonder in *Linnæa* XIX (1847) 90 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 198 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 101. *D. MEGACERAS* Hooker f. in *Bot. Mag.* (1880) t. 6529. — Colonie du Cap, Natal. 2

**D. ferruginea** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 210 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 355 ; Harvey in Hooker, *Icon. Pl.* (1840) t. 214 (fig. c et d erron.) ; Bolus, *Orch. Cape Penins.* 172 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 103. SATYRIUM — Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* I (1794) 5. — Colonie du Cap. 2

**D. lacera** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 212 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 354 ; Sonder in *Linnæa* XIX (1847) 97 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 202 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 103. — Colonie du Cap. 2

**D. polygonoides** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 349 ; *Bot. Mag.* (1880) t. 6532 ; Peters, *Reise nach Mossamb.* 512 ; N. E. Brown in *Gard. Chron.* (1885) II 232 ; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 198 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 106. — Colonie du Cap, Natal, Lourenço-Marques, pays des Zoulous. 2

**D. porrecta** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 211 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 352 et in Hooker, *Lond. Journ. of Bot.* I (1842) 15 ; Bolus, *Orch. Cape Penins.* 173 et in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 175 et 204 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 106. — Colonie du Cap. 2

**D. racemosa** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 406 ; Bolus, *Orch. Cape Penins.* 155 et in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 199 ; *Bot. Mag.* (1880) t. 7021 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 107. SATYRIUM SECUNDUM Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* I (1794) 4. — Colonie du Cap. 2

**Disa sagittalis** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 212; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 350; Sonder in *Linnaea* XIX (1847) 93; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 200; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 107; *Bot. Mag.* t. 7403. ORCHIS — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 399. SATYRIUM — Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* I (1794) 5. — Colonie du Cap. Ț

**D. spathulata** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 213; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 353; Bauer, *Illustr. Orch. Pl.* t. 14; Harvey, *Thes. Capens.* I 51 t. 86; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 203; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 108. — Colonie du Cap. Ț

**D. tripetaloides** N. E. Brown in *Gard. Chron.* (1889) I 360; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 109. ORCHIS — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 398. D. VENOSA Lindley (non Swartz), *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 351. — Colonie du Cap, Natal. Ț

**D. uniflora** Bergius, *Descr. Pl. Cap. Bon. Spei* (1767) 348 t. 4 fig. 7; N. E. Brown in *Gard. Chron.* (1885) II 232; Bolus, *Orch. Cape Penins.* 147; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 109. D. GRANDIFLORA Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 406; *Bot. Reg.* (1825) t. 926; *Bot. Mag.* (1844) t. 4073; *Reichenbachia* I 38 t. 15; *Lindenia* VII t. 308. SATYRIUM — Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* I (1794) 4. — Colonie du Cap. Ț

1419. **MONADENIA** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 356; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7077.* — Genre de 10 esp. de l'Afrique austr.

**M. bracteata** Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V (1892) 111. DISA — Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 211; *Bot. Reg.* IV t. 324; Bolus, *Orch. Cape Penins.* 154 et in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 196. — Colonie du Cap. Ț

**M. brevicornis** Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1838) 357; Sonder in *Linnaea* XIX (1847) 101; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V III. DISA — Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 190. — Colonie du Cap, Natal. Ț

1420. **DISPERIS** Swartz in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 218; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7085.* — Genre de 25 esp. de l'Afrique trop. et austr., des îles Mascareignes et de l'Inde.

**D. Fanniniæ** Harvey, *Thes. Capens.* II (1863) 46 t. 171; N. E. Brown in *Gard. Chron.* (1885) II 232; Bolus in *Journ. Linn. Soc. London* XXV (1889) 206; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 119. — Colonie du Cap, Orange, Natal, Transvaal. Ț

**121. CYPRIPEDIUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) 687 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7088 — Genre de 40 espèces environ, habitant l'Europe, l'Asie temp. et trop., et l'Amérique bor. jusqu'au Mexique.

**C. acaule** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 303 ; *Bot. Mag.* (1792) t. 192 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* III t. 729 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 511. **C. HUMILE** Salisbury in *Trans. Linn. Soc.* I (1793) 79 t. 3 fig. 4 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 530. — Amérique bor. (du Canada à la Caroline.) 2

**C. Argus** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1873) 608 ; *Bot. Mag.* (1875) t. 6175 ; *Reichenbachia* II t. 83 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 230. **PAPHIOPEDILUM** — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Luçon, 2

**C. arietinum** R. Brown in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 222 ; *Bot. Mag.* (1813) t. 1569 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XIII (1827) t. 1240 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 510 ; Franchet in Morot, *Journ. de Bot.* VIII (1894) 252. — Chine occ., Canada, États-Unis bor. 2

**C. barbatum** Lindley in *Bot. Reg.* (1841) misc. 53 et (1842) t. 17 ; *Bot. Mag.* (1846) t. 4234 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 91 t. 1879 (var. **GRANDIFLORUM**) ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 13 cum xylogr. **PAPHIOPEDILUM** — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Penang, Malacca, Siam. 2

— — var. **Crossii** Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 12. **CYPRIPEDIUM CROSSII** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XV (1865) 226 cum icone. **C. BARBATUM** Lindley var. **WARNERIANUM** Warner, *Select Orch. Pl.* III (1870) t. 11. **C. ORBUM** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1887) II 778. — Inde. 2

**C. bellatulum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1888) I 648 et (1888) II 747 fig. 99 ; *Lindenia* II t. 149 ; *Rev. Hort.* (1889) 201 t. 53 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 235. **PAPHIOPEDILUM** — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Hab. ?

**C. Calceolus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 951 ; *Engl. Bot.* (1790) t. 1 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 496 ; *Fl. des Serres* XV (1862-63) 121 t. 1563 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 266 ; W. Barbey, *Cyp. Calc. X macranth.* (1891) tab. col. fig. 1-3. **CYPRIPEDIUM** — Ascherson, *Fl. Prov. Brandenb.* ed. I (1864) 700. **CALCEOLUS MARIANUS** Crantz, *Stirp. Austr.* ed. 2, VI (1769) 454. **CYPRIPEDIUM** — Rouy in Morot, *Journ. de Bot.* VIII (1894) 58. — Europe, Sibérie, Daourie, ile Sacchalin. 2

**C. Californicum** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII (1868) 389 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II (1880) 138 et 484. — Californie. 2

**C. candidum** Mühlenberg ex Willdenow *Sp. Pl.* IV (1805) 142 ; Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* 526 ; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 271 t. 262 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 510 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 316. — Canada, États-Unis bor. 2

**Cypripedium ciliolare** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1882) II 488; *Illustr. Hort.* (1884) t. 530; Godefroy, *Les Cypriped.* part. I cum icone; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 244. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Iles Philippines. ♀

**C. conchiferum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1881) I 330. — Hybride du *C. PEARCEI* × *C. RÆZLII*. ♀

**C. concolor** Parish mss. ex HOOKER F. in *Bot. Mag.* (1865) t. 5513; Bateman, *Second Cent. Orch. Pl.* t. 153; *Illustr. Hort.* (1865) t. 444; *Fl. des Serres* (1877) t. 2321; *Orchid Alb.* VII t. 302; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 17 cum icone; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 246. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Moulmein, Cambodge, Tonkin. ♀

— — var. **Regnieri** REICHENBACH F. in *Gard. Chron.* (1886) I 362; *L'Orchidophile* (1886) 226; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 18; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 746. — Cambodge. ♀

**C. Dayanum** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* XX (1862) 214 et *Xenia Orchid.* I t. 201; *Fl. des Serres* XV (1862-63) 55 t. 1527; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 21. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Bornéo. ♀

**C. Drurii** Beddome, *Icon. Pl. Ind. Or.* (1874) 23 t. 112; *Illustr. Hort.* (1877) 9 t. 265; *Lindenia* I t. 6; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 23 cum xylogr.; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 254. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Travancore. ♀

**C. Elliottianum** J. O'Brien in *Gard. Chron.* (1888) II 501; *Lindenia* IV t. 186; *Orchid Alb.* IX t. 397; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 23; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 256. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Iles Philippines. ♀

**C. Godefroyæ** Godefroy-Lebœuf in *L'Orchidophile* (1883) 830 cum xylogr. et (1884) 362 cum icone; *Orchid Alb.* IV t. 177; *Bot. Mag.* (1886) t. 6876; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 27 cum icone; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 261 cum icone. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Cochinchine, Singapore. ♀

**C. Harrisianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 108; *Fl. des Serres* XXII (1877) 33 t. 2289-90; *Florist and Pomol.* (1871) 56 cum icone. — Hybride de *C. BARBATUM* × *C. VILLOSUM*.

**C. Haynaldianum** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 222 et III 33 t. 212; *Bot. Mag.* (1877) t. 6296; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 28; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 264. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Iles Philippines. ♀



**Cypripedium Hookeræ Reichenbach f.** ex HOOKER F. in *Bot. Mag.* (1863) t. 5362; Bateman, *Second Cent. Orch. Pl.* t. 123; *Fl. des Serres* XV (1862-63) 125 t. 1565; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 131 cum icone; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 265. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Bornéo, Sarawak. ♀

— var. **Bullenianum** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 32. C. BULLENIANUM Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1863) 99 et in *Gard. Chron.* (1881) I 563. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Bornéo. ♀

**C. insigne Wallich** ex LINDLEY, *Collect. Bot.* (1821-24) t. 32; *Bot. Mag.* (1864) t. 3412; *Orchid Alb.* IV t. 55; Hooker f., *Exot. Fl.* t. 34; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 32; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 267 cum icone. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Inde (Silhet, Khasia). ♀

**C. Japonicum Thunberg**, *Fl. Jap.* (1784) 30 et *Icon. Fl. Jap.* I t. 1; Blume, *Orch. Archip. Ind.* I t. 59; *Fl. des Serres* XX (1874) 35 t. 2064-65; Franchet in Morot, *Journ. de Bot.* VIII (1894) 254. — Japon, Chine occ. ♀

**C. Javanicum Reinwardt** ex BLUME, *Catal. Gew. Buitenz.* (1823) 98; *Fl. des Serres* VII (1851) t. 703; Blume, *Orch. Archip. Ind.* 167 t. 58; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 35. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Java. ♀

— var. **virens** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 35. C. VIRENS Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1863) 128 et *Xenia Orchid.* II 154 t. 162. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Bornéo. ♀

**C. Lawrenceanum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1878) II 748; *Bot. Mag.* (1879) t. 6432; *Orchid Alb.* I t. 22; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 36 cum xylogr.; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 274. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Bornéo. ♀

**C. Lowei Lindley** in *Gard. Chron.* (1847) 765; *Fl. des Serres* IV (1848) t. 375; *Orchid Alb.* IX t. 428; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 38; *Gard. Chron.* (1890) II 729 fig. 114; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 277. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Bornéo. ♀

**C. macranthos Swartz** in *Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 251; *Bot. Mag.* (1829) t. 2938; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* XIII t. 498; *Gartenflora* (1863) t. 409; W. Barbey, *Cyp. Calc.* × *macranth.* (1891) tab. col. fig. 7-9; Franchet in Morot, *Journ. de Bot.* VIII (1894) 232. — Russie centr. et mérid., Asie bor. et or., Himalaya. ♀

**C. montanum Douglas** ex LINDLEY, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 528; S. Watson, *Bot. of Calif.* II (1880) 138. C. OCCIDENTALE S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XI (1876) 147. — États-Unis mérid.-occ. ♀

**C. nigratum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1882) II 102. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Bornéo. ♀

- Cypripedium niveum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 1038 ; *Bot. Mag.* (1871) t. 5922 ; *Reichenbachia* I 75 t. 37 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 38 cum xylogr. ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 286. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Iles Langkavi et Tambilan ; Siam. ♀
- C. parviflorum** Salisbury in *Trans. Linn. Soc. London* I (1794) 77 t. 2 ; *Bot. Mag.* (1830) t. 3024 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* I t. 80 ; *L'Orchidophile* (1887) 175 cum icone ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 511 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII (1894) 317. — Canada, États-Unis. ♀
- C. Philippinense** Reichenbach f. in *Bonplandia* X (1862) 335 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 42 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 290. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. **C. LAEVIGATUM** Bateman in *Bot. Mag.* (1865) t. 5508 et *Second Cent. Orch. Pl.* t. 101 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 83 t. 1760-61. — Iles Philippines. ♀
- — var. **Rœbbelenii** Nob. **C. RÖEBBELENI** (RÖEBELENI) Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1883) II 684. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Iles Philippines. ♀
- C. pubescens** Willdenow, *Hort. Bot. Berol.* I (1809) 13 ; *Bot. Mag.* (1806) t. 911 ; Loddiges, *Bot. Cab.* IX (1824) t. 895 ; *L'Orchidophile* (1887) 175 cum icone ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 511 ; *The Garden* XLII (1892) 386 t. 881 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 317. — Canada, États-Unis. ♀
- C. purpuratum** Lindley in *Bot. Reg.* XXIII (1837) t. 1991 ; *Bot. Mag.* (1856) t. 4901 ; *Fl. des Serres* XI (1856) 173 t. 1158 ; *Rev. Hort. Belg.* (1886) 193 cum icone ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 45 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 294. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Hong-Kong. ♀
- C. Rothschildianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1888) I 457 et 554 ; *Bot. Mag.* (1890) t. 7102 ; *Reichenbachia* II t. 21 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 45 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 296 cum icone. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. **C. NEO-GUINEENSE** Linden in *Gard. Chron.* (1888) I 505 in adnot. — Nouvelle-Guinée. ♀
- C. Sanderianum** Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1886) I 554 ; *Reichenbachia* I t. 3 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 46 cum xylogr. ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 297. PAPHIO-PEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Archipel Malais. ♀
- C. selligerum** Reichenbach f. ex VEITCH, *Catal.* (1878) 13 cum icone et in *Gard. Chron.* (1880) I 780 fig. 135 ; *Orchid Alb.* VI t. 255 ; *Lindenia* I t. 22 (var. MAJUS Veitch). — Hybride des **C. BARBATUM** × **C. PHILIPPINENSE**.
- C. spectabile** Salisbury in *Trans. Linn. Soc.* I (1791) 78 ; *Bot. Reg.* (1834) t. 1666 ; *Rev. Hort. Belge* (1879) 241 cum icone ; *L'Orchidophile* (1887) 175 cum icone ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 511 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 317 cum xylogr. — États-Unis, Canada. ♀

**Cypripedium Spicerianum Reichenbach f.** in *Gard. Chron.* (1880) I 40-41 fig. 7, 363 et *Xenia Orchid.* III t. 231; *Bot. Mag.* (1880) t. 6490; *Orchid. Alb.* III t. 419; *Belg. Hort.* (1883) 289 t. 18; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 46 cum xylogr.; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 172. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Patrie ? (Assam ?)

**C. Stonei Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1862) t. 5349; *Orchid. Alb.* I t. 8; Jennings, *Orchids* t. 12; *Lindenia* VI t. 281; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 48 cum xylogr. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Bornéo. ♀

**C. superbians Reichenbach f.** in *Bonplandia* III (1855) 227 et *Xenia Orchid.* II 9 t. 103; Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 12; *Fl. des Serres* XIX (1873) 145 t. 1996; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 81 cum icone; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 173. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. C. VEITCHIANUM Lemaire in *Illustr. Hort.* XII (1865) t. 429; *Rev. Hort.* (1870-71) 595 t. 78-79. — Péninsule Malaise. ♀

**C. venustum Wallich** ex SIMS in *Bot. Mag.* (1820) t. 2129; *Bot. Reg.* (1824) t. 788; Reichenbach f., *Fl. Exot.* t. 100; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 53; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 173; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 309. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Inde (Sikkim, Silhet, Assam). ♀

— — var. **pardinum** HORT. ex *Gard. Chron.* (1887) I 382 fig. 76. C. PARDINUM Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1869) 554; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 53; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 289 et 310. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 40. — Assam. ♀

**C. villosum Lindley** in *Gard. Chron.* (1854) 135; Linden, *Pescatorea* t. 48; *Lindenia* III t. 132; Warner, *Select. Orch. Pl.* II t. 30; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 54 cum xylogr.; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 171; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 311. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Moulmein, Tongu. ♀

— — var. **Boxallii** VEITCH, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 54. C. BOXALLII Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1877) I 367 et (1877) II 776; *Illustr. Hort.* XXVI (1879) 74 t. 345; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 236. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Tongu, Burmah. ♀

122. **SELENIPEDIUM** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) 3 t. 2, 27, 44, 62 et 181; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7089. — Genre d'une douzaine d'espèces habitant l'Amérique trop., centr. et austr.

**S. Boissierianum Reichenbach f.**, *Xenia Orchid.* I (1854) 3 et 176 t. 62; *L'Orchidophile* (1888) 48 cum icone. CYPRIPEDIUM — Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 116; *Journ. of Hort.* XVI (1887) 91 fig. 14; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 57. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. S. RETICULATUM Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 223. — Pérou. ♀

- Selenipedium caricinum** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) 3 et in *Bonplandia* II 116; *Bot. Mag.* (1863) t. 3466; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 59 cum xylogr.; Cogniaux in *Fl. Brasil.* III 4 (1893) 42; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 239. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Bolivie, Pérou. ♀
- S. caudatum** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 116; Linden, *Pescatorea* t. 24. CYPRIPEDIUM — Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 531; *Fl. des Serres* VI (1850) 99 t. 566; Hooker f., *Icon. Pl.* VII t. 658 et 659; Warner, *Select Orch. Pl.* II t. 1; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 60 cum xylogr. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Pérou, Équateur. ♀
- — var. **Lindenii** BENTHAM in *Journ. Linn. Soc. London* XVIII (1881) 360. UROPEDIUM LINDENII Lindley, *Orchid. Linden.* (1846) 28; Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I 32 t. 45; Linden, *Pescatorea* t. 2. CYPRIPEDIUM — Van Houtte in *Fl. des Serres* XVIII (1870) 155. C. CAUDATUM Lindley, var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 60. — Nouvelle-Grenade. ♀
- — var. **roseum** L. LINDEN in *Illustr. Hort.* XXIII (1886) 77 t. 596. CYPRIPEDIUM CAUDATUM Lindley, var. — Delchevalerie in *Rev. Hort.* (1867) 133; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 241 cum icône. C. WARSCEWICZIANUM Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1852) 692. SELENIPEDIUM — Reichenbach f. in *Bonplandia* (1854) 116. PAPHIOPEDILUM WARSCEWICZII Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 42. — Amérique centr. (Chiriqui). ♀
- — var. **Wallisii** NOB. C. CAUDATUM Lindley, var. — Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV (1889) 61. SELENIPEDIUM WALLISII Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1874) 189 t. 191. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 42. — Équateur. ♀
- S. Lindleyanum** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* I (1854) 3 et in *Bonplandia* II (1854) 116. CYPRIPEDIUM — Schomburgk ex Lindley, *Gen. and Sp. Orch.* (1840) 531 et *Verz. Fl. Brit. Guiana* 1069; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 64; Cogniaux in *Fl. Brasil.* III 4 (1893) 43 t. 1 fig. 2; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 277. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Guyane anglaise. ♀
- S. longifolium** Reichenbach f., *Xenia Orchid.* II (1854) 3 et in *Gard. Chron.* (1867) 1206; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 65. CYPRIPEDIUM — Warscewicz et Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* X (1852) 690; *Bot. Mag.* (1869) t. 5970; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 277. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 41. — Panama (Chiriqui), Costa-Rica. ♀
- — var. **Roezlii** NOB. CYPRIPEDIUM ROEZH; Regel in *Gartenflora* XXII (1873) 97 t. 754; *Bot. Mag.* (1876) t. 6217; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 296. SELENIPEDIUM — Reichenbach f. in *Gartenflora* XX (1871) 164. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 42.
- S. Schlimii** Reichenbach f. in *Bonplandia* II (1854) 277. CYPRIPEDIUM — Linden ex Reichenbach f., *loc. cit.* II (1854) 278 in synonym. et *Xenia Orchid.* I t. 54; *Bot. Mag.* (1866) t. 3614; Linden, *Pescatorea* t. 34; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 298. PAPHIOPEDILUM — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 42. — Nouvelle-Grenade. ♀

- Selenipedium vittatum** Reichenbach f. in *Illustr. Hort.* XXIII (1876) 37 t. 238 ; Cogniaux in *Fl. Brasil.* III 4 (1893) 11 t. 1 fig. 1. **CYPRIPEDIUM** — Vellozo, *Fl. Flumin.* IX (1827) t. 62 et text. (ed. Netto) 373 ; Veitch, *Man. Orch. Pl.* IV 89 ; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. VII 313. **PAPHIOPEDILUM** — Pfitzer in Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1894) 42. **CYPRIPEDIUM BINOTI** Hort. ex *Illustr. Hort.* XXXIV (1887) 19 ; *L'Orchidophile* (1890) 111 cum icone. — Brésil. 2/
- — var. **breve** COGNIAUX in *Fl. Brasil.* III 4 (1893) 12. **CYPRIPEDIUM VITTATUM** Vellozo var. — Reichenbach f. in *Gard. Chron.* (1881) I 636. — Var. cultivée dans les serres (Cogniaux), originaire du Brésil (Reichenbach f.). 2/

## CXXXVIII. ZINGIBÉRACÉES

1. **MANTISIA** Sims in *Bot. Mag.* (1810) t. 1320 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7114. — Genre monotype.

**M. saltatoria** Sims in *Bot. Mag.* (1810) t. 1320 ; Horaninow, *Prodr. Scitam.* 19 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 200. **GLOBBA PURPUREA** Andrews, *Bot. Repos.* X (1810) t. 615. — Chittagong. 2/

2. **KÆMPFERIA** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 827 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7119. — Genre de 18 espèces de l'Asie et de l'Afrique trop.

**K. Kirkii** K. Schumann in ENGLER, *Bot. Jahrb.* XV (1892) 426 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 124. **CIENKOVSKIA** — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1872) t. 5991 ; *Illustr. Hort.* (1888) 129 t. 495. — Zanzibar ; pays des Djur. 2/

**K. Roscoeana** Wallich in *Bot. Reg.* (1829) t. 1212 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5600 ; Horaninow, *Prodr. Marant.* 21 ; *Illustr. Hort.* XIII (1866) t. 497 ; *Belg. Hort.* XVII (1867) 4 cum xylogr. ; *Fl. des Serres* XIX (1873) 117 t. 1997 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 220. — Burmah. 2/

3. **HEDYCHIUM** Kœnig in Retzius, *Observ. Bot.* III (1783) 73 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7121. — Genre de 25 espèces de l'Asie trop.

**H. coronarium** Kœnig in RETZIUS, *Observ. Bot.* III (1783) 78 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 708 ; Redouté, *Liliacées* VIII t. 436 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1821) t. 507 ; Baker in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 227. — Inde, Malaisie. 2/

4. **ALPINIA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 828 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7134. — Genre de 45 espèces de l'Asie trop. et sub-trop., de l'Australie et des îles du Pacifique.

**A. vittata** Hort. in Bull, *Catal.* (1873) 4 cum icone ; *The Garden* IV (1873) 25 cum icone ; Regel in *Gartenflora* (1874) 146 cum icone ; *Rev. Hort. Belg* III (1877) 5 fig. 1. — Iles de la mer du Sud. 2

5. **MARANTA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 826 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7138. — Genre d'environ 15 espèces de l'Amérique trop. (ailleurs naturalisé).

**M. applicata** Ch. Morren in *Belg. Hort.* (1874) 228 et (1875) 273 t. 18 ; Regel in *Gartenflora* (1879) 297. — Brésil. 2

**M. leuconeura** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXIV (1874) 323 et XXV (1875) 172 t. 9 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 151. — Brésil. 2

— — var. **Kerchoviana** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXIX (1879) 77 t. 5 ; *Illustr. Hort.* (1879) 106 t. 353 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 151. **M. KERCHOWIANA** Ed. Morren, *loc. cit.* XXIV (1874) 320 et XXV (1875) 172 t. 9. — Brésil. 2

6. **STROMANTHE** Sonder in Hamb. Gart. Zeit. V (1849) 225 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7139. — Six espèces du Brésil.

**S. sanguinea** Sonder in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* V (1837) 225 et Walpers, *Annal. Bot.* III (1852) 606 ; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) 97 t. 785 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 154 t. 41. **PHRYNIUM** — Hooker, *Bot. Mag.* t. 4646. **THALIA** ? — Ch. Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 268. — Brésil. 2

7. **CTENANTHE** Eichler, Beitr. Morph. Syst. Marant. (1884) 74 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7140. — Sept espèces de l'Amérique trop.

**C. Lubbersiana** Eichler miss. ex Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 160. **STROMANTHE** — Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXXII (1882) 84. **PHRYNIUM** **LUBBERSII** Hort. Makoy ex Bull. Soc. Hort. Liège V (1881) 21. — Brésil. 2

8. **CALATHEA** G.-F.-W. Meyer, Prim. Fl. Essequeb. (1818) 6 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7148. — Genre de 60 espèces environ de l'Afrique trop. occid. et de l'Amérique trop.

**C. Bachemiana** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXV (1875) 271 t. 15-17 fig. 4 ; Petersen in Engler et Prantl, *Die Natürl. Pflanzenf.* II 6, 40 fig. 31 et in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 115 t. 27. **MARANTA KEGELIANA** Hort. — Brésil. 2

**Calathea Lietzei** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXV (1875) 273 t. 15-17 fig. 8 ; Regel in *Gartenflora* (1878) 99 t. 935 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 111 t. 24. MARANTA — Hort. — Brésil. 2

**C. ornata** Kœrnicke in Regel, *Gartenflora* (1858) 87 et in *Monogr. Marant.* (1859) 127. MARANTA — Linden in *Fl. des Serres* IV (1848) t. 413-414 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 95. — Amérique trop. 2

— — var. **regalis** Petersen in *Fl. Brasil.* III (1890) 95 M. ORNATA Kœrnicke var. — Hort. ex Lemaire in *Illustr. Hort.* II (1855) t. 74. M. REGALIS Hort. ex *Fl. des Serres* X (1854-55) 231 t. 1066-67. — Pérou. 2

**C. undulata** Linden et André in *Illustr. Hort.* XIX (1872) 160 t. 98 ; *Gartenflora* (1876) t. 852 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 97. MARANTA — Linden et André, *Catal.* (1871) 4. — Équateur. 2

**C. varians** Kœrnicke, *Monogr. Marant.* (1859) 136 ; Petersen in *Fl. Brasil.* III 3 (1890) 116. PHRYNIUM — C. Koch et Mathieu, *Catal. Sem. Hort. Berol.* (1855) append. 12. MARANTA DISCOLOR Hort. — Amérique trop. 2

## CXXXIX. MUSACÉES

1. MUSA Linné, *Gén. Plant.* 2<sup>ed.</sup> VI (1764) n. 1141 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7151. — Genre d'environ 20 espèces habitant la région trop. de l'ancien monde.

**M. Ensete** J.-F. Gmelin, *Syst. Nat.* II (1791) 567 ; *Bot. Mag.* (1861) t. 5223-24 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 65 t. 1418-19 ; *Gartenflora* (1870) 66 t. 643 et (1875) 100 t. 828 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 135. — Abyssinie, Nubie, Bahr-el Abiad, Ouganda. 2

2. STRELITZIA Banks in Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 285 t. 2 : T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7152. — Quatre ou cinq espèces de l'Amérique trop.

**S. alba** Hort. ex Andrews, *Bot. Rep.* VI (1806) sub t. 432 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 137. HELICONIA — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 157. S. AUGUSTA Thunberg, *Prod. Fl. Cap.* I (1794) 45 ; *Bot. Mag.* (1845) t. 4167-68 ; *Fl. des Serres* II (1846) 217 t. 173-174. — Colonie du Cap. 2

**S. Reginae** Banks in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 285 t. 2 ; Redouté, *Liliacées* II t. 77 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1829) t. 1535 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 137. — Colonie du Cap, ailleurs naturalisé. 2

## CXL. BROMÉLIACÉES

1. **BROMELIA** Linné, *Gen. Plant.* ed. VI (1764) n. 395 pr. p. ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7155. — Genre de 4 ou 5 espèces  
de l'Amérique trop.

**B. Binoti** (Hort.) Ed. Morren ex *Gardn. Chron.* (1880) II 151 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 192. *B. Pinguin* var. — Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 26. — Brésil. 2

**B. Pinguin** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 285 ; Dillenius, *Hort. Eltham.* t. 240 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 396 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 196 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 25. **AGALLOSTACHYS** — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 36. — Amérique trop. 2

2. **NIDULARIUM** Lemaire, *Jard. Fleur.* IV (1854) misc. 60 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7157. — Genre de 15 espèces en-  
viron habitant l'Amérique trop. et surtout le Brésil.

**N. Amazonicum** Linden et Ed. Morren in *Linden, Catal.* (1873) 11. **KARATAS** — Baker in *Gard. Chron.* (1886) I 814 et *Handb. of Bromel.* 5 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 249. — Vallée de l'Amazone et province de Rio-de-Janeiro. 2

**N. Carolinæ** Lemaire in *Illustr. Hort.* sér. 4 VII (1858) 398 t. 245 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 233. **KARATAS** — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 52 t. 31 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 9. **BROMELIA** — Beer in Regel, *Gartenflora* VII (1857) 361 t. 211. **BILLBERGIA OLENS** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1864) t. 5502. **N. MEYENDORFFII** Regel in *Gartenflora* (1859) 264 fig. 5-8. — Brésil austr. 2

**N. chlorostictum** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1878) 207 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 227. **KARATAS** — Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 7. **BILLBERGIA** — Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil ? 2

**N. concentricum** Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 239. **N. ACANTHOCRATER** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1884) 140 t. 9 ; Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* t. 29 et 30 fig. 2. **Tillandsia** — Velloso, *Fl. Flumin.* III (1827) t. 133. **KARATAS** — Baker in *Bot. Mag.* (1886) t. 6904 et *Handb. of Bromel.* 8. — Brésil austr. 2

**N. fulgens** Lemaire, *Jard. Fleur.* IV (1854) t. 411 et misc. 60 ; Wittmack in Engler et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* II 1, 44 fig. 22 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 214. **KARATAS** — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 41 t. 24 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 9. **GUZMANNIA PICTA** et **NIDULARIUM PICTUM** Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil austr. 2



**Nidularium Innocentii** Lemaire in *Illustr. Hort.* II (1853) misc. 13 et IX (1862) t. 329; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 215. KARATAS — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 44 t. 26; Baker, *Handb. of Bromel.* 8. GEMELLARIA — Pinel ex Antoine, *loc. cit.* (1884) 44. — Brésil austr. 2

**N. Laurentii** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 80 et in *Gartenflora* (1867) 11 t. 529; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 238. KARATAS — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 48 t. 28; Baker, *Handb. of Bromel.* 7. BILLBERGIA AURANTIACA Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil austr. 2

**N. princeps** Ed. Morren mss. ex BAKER, *Handb. of Bromel.* (1889) 10; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 232. KARATAS — Baker, *loc. cit.* (1889) 10. K. MEYENDORFFII Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) t. 32; *Illustr. Hort.* (1860) t. 245. N. SPECTABILE Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil austr. 2

**N. purpureum** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 75; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 216. KARATAS — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 42 t. 25; Baker, *Handb. of Bromel.* 4. TILLANDSIA DISCOLOR et RUBRA Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil. 2

**N. sarmentosum** Regel in *Gartenflora* (1870) 268; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 231. KARATAS — Baker *Handb. of Bromel.* (1889) 5. ECHMEA IMMERSA Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil. 2

**N. Scheremetiewii** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 28 et in *Gartenflora* VII (1858) 137 t. 224; Lemaire, *Rev. Hort.* (1873) 230 cum icone; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 223. KARATAS — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 46 t. 27; Baker, *Handb. of Bromel.* 6. — Brésil austr. 2

**N. spectabile** T. Moore in *Gard. Chron.* (1873) 8; *Bot. Mag.* (1873) t. 6024; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* I (1873) t. 9; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 242. KARATAS — Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) t. 33; Baker, *Handb. of Bromel.* 11. N. EXIMIUM Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil centr. 2

**N. triste** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 79 et in *Gartenflora* XV (1866) 356; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 228. BROMELIA — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 30. KARATAS — Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 5. — Brésil austr. 2

3. CRYPTANTHUS Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* IV (1836) 298; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7159. — Six espèces décrites habitant le Brésil trop.

**C. acaulis** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 75; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 204 t. 54 fig. 1. C. UNDULATUS Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeit.* IV (1836) 299; Wawra, *Bot. Ergebn. Reize Maximil.* 163 t. 87; Baker, *Handb. of Bromel.* 15. TILLANDSIA — Lindley in *Bot. Reg.* (1828) t. 1157. — Brésil austr. 2

— var. **ruber** BAKER, *Handb. of Bromel.* (1889) 15. C. ACAULIS Beer var. RUBER Beer, *loc. cit.* (1857) 75. — Avec le type.

**Cryptanthus Beuckeri** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXX (1880) 241 et (1881) 342 t. 1; Baker, *Handb. of Bromel.* 17; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 210. — Brésil austr. ♀

**C. bivittatus** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) 15 et in *Gartenflora* (1865) 2 t. 458; Baker, *Handb. of Bromel.* 16; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 208. **BILLBERGIA** — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1861) t. 5270. **NIDULARIUM** — Lemaire in *Illustr. Hort.* IX (1862) misc. 58. — Brésil austr. ♀

**C. zonatus** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 76; Baker, *Handb. of Bromel.* 17. **PHOLIDOPHYLLUM** — Visiani, *Ind. Sem. Hort. Patav.* (1847) 4. **TILLANDSIA** Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil. ♀

4. **DISTEGANTHUS** Lemaire in *Fl. des Serres* III (1847) t. 227; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7160. — Une ou deux espèces de la Guyane.

**D. basilateralis** Lemaire in *Fl. des Serres* III (1847) t. 227; Baker, *Handb. of Bromel.* 18. — Guyane française. ♀

5. **RHODOSTACHYS** Philippi in *Linnaea* XXIX (1858) 57; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7161. — Genre de 6 ou 7 espèces du Chili, de la Colombie et de la Guyane.

**R. Andina** Philippi in *Linnaea* XXIX (1858) 57; Baker, *Handb. of Bromel.* 28. **BROMELIA LONGIFOLIA** Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* (1850-52) t. 65; Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 223. **B. CARNEA** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 31. **RUCKIA ELLEMETI** Regel in *Gartenflora* (1868) 63 t. 571. — Chili bor. ♀

**R. pitcairniæfolia** Benthham in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 662; Baker, *Handb. of Bromel.* 28. **BROMELIA** — K. Koch in *Wochenschr.* (1868) 325. **HECHTIA** — Verlot in *Rev. Hort.* (1868) 211 cum icone. **BROMELIA JOINVILLEI** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 161 t. 10-11. — Probablement originaire du Chili. (Baker.) ♀

6. **ACANTHOSTACHYS** Link, Klotzsch et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* I (1844) 21 t. 91; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7163 pr. p. — Deux espèces de l'Amérique trop.

**A. strobilacea** Link, Klotzsch et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* I (1844) 22 t. 9; Baker, *Handb. of Bromel.* 24. **HOHENBERGIA** — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1252; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 287 t. LXIII fig. 1. — Brésil centr. ♀

7. **BILLBERGIA** Thunberg, *Decad. Pl. Brasil.* III (1823) 30 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7164. — Genre de 30 à 40 espèces de l'Amérique trop.

**B. decora** Poeppig et Endlicher, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* II (1838) 42 t. 157 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1875) 221 t. 13 et 14 ; Baker in *Bot. Mag.* (1887) t. 6937 et *Handb. of Bromel.* 81 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 391. **B. BARAQUINIANA** Lemaire in *Illustr. Hort.* XI (1864) t. 421. **HELICODEA** — Lemaire in *Illustr. Hort.* XI (1864) sub t. 421. — Pérou, Nouvelle-Grenade. ♀

**B. Euphemiæ** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1872) 1 t. 1 et 2 ; Baker in *Bot. Mag.* (1882) t. 6632 et *Handb. of Bromel.* 77 ; Mez in *Fl. Brasil.* III (1891) 401. — Brésil austr. ♀

**B. horrida** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (mars 1856) 17 et in *Gartenflora* (1857) 148 et (1859) 321 t. 272 ; C. Koch in *Berlin. Gartenzeit.* (1858) 345 t. 8 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 336 t. 22 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 72 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 415. — Brésil. ♀

**B. Leopoldi** Linden in *Rev. Hort.* (1869) 87 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1871) I t. 1-4 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 82. **HELICODEA** — Lemaire in *Illustr. Hort.* XI (1864) sub t. 421. — Brésil (île Sainte-Catherine). ♀

**B. Liboniana** De Jonghe in *Journ. Hort. Prat.* (1851) cum icône ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1852) t. 197 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 5090 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 195 t. 1048 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1877) 57 t. 34 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 74 ; *Gartenflora* (1866) t. 514 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 413. — Brésil (prov. Rio et de Bahia). ♀

**B. Moreli Brongniart** in *Portef. Hort.* II (1848) 97 cum icône ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1860) 161 t. 11 et 12 et (1873) 17 t. 1 et 2 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 77 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 400. **B. WETHERILLI** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1855) t. 4835. — Brésil (Bahia). ♀

**B. nutans** H. Wendland in *Regel, Gartenflora* (1869) 162 t. 617 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 220 t. 15 ; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6423 et *Handb. of Bromel.* 75 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 419. **B. BONPLANDIANA** Gaudichaud (ubi ?) ex Baker, *loc. cit.* — Brésil, Argentine. ♀

**B. pyramidalis** Lindley in *Bot. Reg.* (1827) sub t. 1068 ; Schnitzlein, *Iconogr.* I t. 65 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1873) 289 t. 16 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 71 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 397. **BROMELIA** — Sims in *Bot. Mag.* (1815) t. 1732. — Brésil austr. ♀

— — var. **bicolor** LINDLEY in *Bot. Reg.* (1828) t. 1181 ; Baker, *loc. cit.* 71. **B. BICOLOR** Loddiges, *Bot. Cab.* XIX (1831) t. 1819. **B. LODDIGESII** Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. 2, I (1840) 206. — Avec le type.

**B. thyrsoides** Martius in ROEMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1260 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4756 ; Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* III (1850-52) t. 74 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 267 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1873) 295 t. 17 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 71. **B. FASTUOSA** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 110. — Brésil austr. ♀

**Billbergia viridiflora** H. Wendland in OTTO et DIETRICH, *Allgem. Gartenzeit.* XXII (1854) 154 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 133 t. 1019-20 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 324 t. 20-21 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 75 ; Mez in *Fl. Brasil.* III (1891) 424. — Brésil. 2

8. **QUESNELIA** Gaudichaud. *Voy. La Bonite* (Bot.) IV (1866) 20 t. 54 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7165. — Genre de 5 ou 6 espèces habitant les Andes, du Brésil au Pérou.

**Q. rufa** Gaudichaud, *Voy. La Bonite* (Bot.) IV (1866) 20 t. 54 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 84. **Q. ROSEO-MARGINATA** Carrière in *Rev. Hort.* (1880) 70 cum icone ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1881) 82 t. 4. **Q. ARDENSIS** Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 381. **BROMELIA ARVENSIS** Vellozo, *Fl. Flumin.* III (1827) 130. t. 114. **BILLBERGIA ROSEO-MARGINATA** Hort. ex C. Koch in *Wochenschr.* (1867) 141. **LIEVENA PRINCEPS** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879) 537 et in *Gartenflora* (1880) 289 t. 1024. — Brésil (prov. de Rio). 2

9. **PORTEA** C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1856) 7 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7166. — Trois ou quatre espèces du Brésil.

**P. kermesina** C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1856) 7 et in *Annal. Sc. Nat. sér. IV* 6 (1856) 368 ; Carrière in *Rev. Hort.* (1870) 230 cum icone ; Antoine in *Gartenflora* (1875) 129 t. 829 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 21 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 297. **BILLBERGIA BRONGNIARTII** Regel in *Gartenflora* (1875) 166 et in *Act. Hort. Petrop.* III (1875) 283. — Brésil (Bahia). 2

10. **ÆCHMEA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil. Prodr.* I (1798) 47 t. 8 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7167. — Genre d'environ 40 espèces de l'Amérique austr.

**Æ. bromeliifolia** Baker in BENTHAM et HOOKER, *Gen. Pl.* III (1883) 664 et *Handb. of Bromel.* 67 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 371. **TILLANDSIA** — Rudge, *Pl. Guian. Rar. Icon.* (1805) 32 t. 50 ; Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 1228. **BROMELIA TINCTORIA** Martius, *Reise Brasil.* II 554. **BILLBERGIA** — Martius ex Schultes f., *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1236 ; *Annal. de Gand* III t. 56. **ECHINOSTACHYS TINCTORIA** Hort. — Antilles, Vénézuéla, Guyane, Brésil. 2

**Æ. calyculata** Baker in TRIMEN, *Journ. of Bot.* (1879) 232 et *Handb. of Bromel.* 59 ; Mez in *Fl. Brasil.* III (1891) 353. **HOHENBERGIA** — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* (1871) t. 286. **HOPLOPHYTUM** — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1865) 162 t. 11. **MACROCHORDION LUTEUM** Regel et Linden in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 82 et in *Gartenflora* (1867) 164 t. 544. — Brésil austr. 2

- Æchmea cœrulescens** Baker in TRIMEN, *Journ. of Bot.* XVII (1879) 227 et *Handb. of Bromel.* 50; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 316. LAMPROCOCCUS — Regel in *Gartenflora* (1871) 225 t. 694. HOPLOPHYTUM — Ed. MORREN, *Catal. Bromél.* (1873) 9. PIRONNEAVA LUDDERMANNIANA C. Koch in *Wochenschr.* IX (1866) 182. — Patrie?
- Æ. corallina** Ad. Brongniart ex BEER, *Fam. der Bromel.* (1857) 106; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 313. LAMPROCOCCUS — Beer, *loc. cit.* (1857) 106; C. Koch in *Wochenschr.* III (1860) 76. — Brésil. 2
- Æ. distichanta** Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 269; *Bot. Mag.* (1864) t. 5447; Baker, *Handb. of Bromel.* 54; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 342. HOPLOPHYTUM — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 136. HOHENBERGIA — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* (1871) sub t. 284. — Paraguay. 2
- Æ. fasciata** Baker in TRIMEN, *Journ. of Bot.* (1879) 231 et *Handb. of Bromel.* 58; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 348. BILLBERGIA — Lindley in *Bot. Reg.* XIII (1827) t. 1130. HOPLOPHYTUM — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 129. HOHENBERGIA — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1253. B. RHODOCYANEA Lemaire in *Fl. des Serres* III (1847) t. 207; *Bot. Mag.* (1855) t. 4883. ÆCHMEA LEOPOLDI Hort. — Brésil austr. 2
- Æ. fulgens** Brongniart in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, XV (1841) 371; *Fl. des Serres* II (avril 1846) t. IX; Paxton, *Mag. of Bot.* X 179 cum icone; Baker, *Handb. of Bromel.* 52; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 312. LAMPROCOCCUS — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 103. — Guyane française. 2
- Æ. glomerata** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1867) t. 5668; Baker, *Handb. of Bromel.* 48. HOHENBERGIA STELLATA Schultes f., *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1251. H. ERYTHROSTACHYS Brongniart in *Rev. Hort.* (1855) 244 cum icone. — Brésil (Bahia). 2
- Æ. Lindeni** Ed. Morren ex C. Koch in *Wochenschr.* VIII (1865) 398; Baker in *Bot. Mag.* (1881) t. 6565 et *Handb. of Bromel.* 61; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 352. HOPLOPHYTUM — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1865) 164 et (1873) 81 t. 5. — Brésil austr. 2
- Æ. Mariæ-Reginæ** H. Wendland in *Hamb. Gartenzeit.* XIX (1863) 32; *Floral Mag.* new ser. I t. 8; Regel in *Gartenflora* (1864) 152; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 344; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6441 et *Handb. of Bromel.* 60. — Costa-Rica. 2
- Æ. miniata** Hort. ex BAKER, *Handb. of Bromel.* (1889) 53; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 314. LAMPROCOCCUS — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 104; C. Koch in *Wochenschr.* III 75. — Brésil (Bahia). 2
- Æ. nudicaulis** Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* (1864) 593; Baker in *Journ. of Bot.* (1879) 234 et in *Handb. of Bromel.* 62; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 356. BROMEIA — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 286; Hooker, *Exot. Fl.* II (1825) t. 143. BILLBERGIA — Lindley in *Bot. Reg.* (1827) sub t. 1068. HOHENBERGIA — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* (1871) sub t. 284. — Amérique trop. (des Antilles au Brésil). 2

**Æchmea paniculigera** Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* (1864) 593; Baker, *Handb. of Bromel.* 40; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 334. BROMELIA — Swartz, *Prodr. Veget. Ind. Occid.* (1788) 56. HOHENBERGIA — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* (1871) sub t. 284 (excl. syn.). — Jamaïque, Brésil, Vénézuëla. ♀

**Æ. Pineliana** Baker in TRIMEN, *Journ. of Bot.* (1879) 232 et *Handb. of Bromel.* 60; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 365. ECHINOSTACHYS — Ad. Brongniart in Planchon, *Hort. Donat.* (1854) 25; Hooker f. in *Bot. Mag.* (1862) t. 5321. MACROCHORDION — Lemaire in *Illustr. Hort.* IX (1862) misc. 62. — Brésil austr. ♀

**Æ. Schiedeana** Schlechtendal in *Linnaea* XVIII (1844) 437; Baker in Trimen, *Journ. of Bot.* (1879) 168 et *Handb. of Bromel.* 36. ÆCHMEA MACRACANTHA Ad. Brongniart in *Illustr. Hort.* (1880) 59. — Mexique centr. ♀

**Æ. suaveolens** Knowles et Westcott, *Floral Cab.* III (1840) 177 t. 134; Baker, *Handb. of Bromel.* 42; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 319. BILLBERGIA PURPUREO-ROSEA Hooker in *Bot. Mag.* (1834) t. 3304. HOPLOPHYTUM — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 135. — Brésil centr. et austr. ♀

**Æ. Veitchii** Baker in *Bot. Mag.* (1877) t. 6329 et *Handb. of Bromel.* 66. CHEVALIERIA — Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXVIII (1878) 177 t. 5; *Rev. Hort.* (1880) 450 cum icone; *The Garden* XIX (1881) 654 cum icone. — Nouvelle-Grenade. ♀

**Æ. Weillbachii** F. Didrichs in *Annal. Sc. Nat.* sér. 4, II (1854) 375; Baker, *Handb. of Bromel.* 53; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 309. LAMPROCOCCUS — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1861) 305 t. 17; Regel in *Gartenflora* (1867) 98 t. 539; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6435. L. LAURENTIANUS C. Koch in *Wochenschr.* III (1860) 73. — Brésil austr. ♀

11. **STREPTOCALYX** Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 141; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7168. — Trois espèces de la Guyane et du Brésil.

**S. Vallerandi** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1883) 13 t. 1-2; Baker, *Handb. of Bromel.* 30; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 281. LAMPROCOCCUS — Carrière in *Rev. Hort.* (1877) 129 cum icone. — Vallée de l'Amazone. ♀

12. **ORTGIESIA** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 80 et in *Gartenflora* (1867) 193 t. 547; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7169. — Deux espèces de l'Amérique trop.

**O. Legrelleana** Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 19. HOHENBERGIA — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* (1871) t. 285. ÆCHMEA — Baker in Trimen, *Journ. of Bot.* (1879) 236; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 349. O. PALIOLATA Ed. Morren, *Catal.* (1871) 2. — Uruguay. ♀

13. **PITCAIRNIA** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 7 t. 11 ; T. Durand. *Ind. Gen. n.* 7182. — Genre d'environ 70 espèces de l'Amérique trop.

**P. alta** Hasskarl, *Retzia* in *Verh. Nat. Ver. Nederl. Ind.* I (1856) 5 ; Baker in *Bot. Mag.* (1882) t. 6606 et *Handb. of Bromel.* 94. — Antilles. ♀

**P. Andreana** Linden in *Illustr. Hort.* XX (1873) 146 t. 139 ; *Bot. Mag.* (1880) t. 6480. — Vénézuëla, Nouvelle-Grenade. ♀

**P. bracteata** Dryander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, II (1811) 202 ; *Bot. Mag.* (1828) t. 2813 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 93. **P. LATIFOLIA** Redouté (non Aiton), *Liliacées* II (1804) t. 73-74. **P. COMMUTATA** Regel in *Gartenflora* (1868) 8 t. 557. — Ile Saint-Vincent. ♀

— — var. **sulphurea** Ker in *Bot. Mag.* (1811) t. 1416 ; Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 93. **P. SULPHUREA** Andrews, *Bot. Repos.* IV (1802) t. 249. — Avec le type.

**P. bromeliæfolia** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 7 t. 11 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 834 ; *Bot. Reg.* (1826) t. 1011 ; Redouté, *Liliacées* II t. 75 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 94. — Jamaïque. ♀

**P. Funkiana** O. Dietrich in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* XIX (1851) 337 ; Regel in *Gartenflora* (1855) 45 t. 113 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 110. **P. MACROCALYX** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1853) t. 4703. — Vénézuëla, Guyane. ♀

**P. muscosa** Martius ex Roemer et Schultes f., *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1240 ; *Bot. Mag.* (1854) t. 4770 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 96 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 453. — Brésil centr. ♀

**P. recurvata** C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) app. 4 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 110 ; Mez in *Fl. Brasil.* III (1891) 460. **PUYA** — Scheidweiler in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* X (1842) 275. **PEPINIA** — Ed. Morren (ubi ?) ex Baker, *loc. cit.* **PITCAIRNIA POLYANTHOIDES** Ad. Brongniart in *Rev. Hort.* (1855) 244. — Brésil ? ♀

**P. imbricata** Regel in *Gartenflora* XVII (1868) 135 t. 579 ; Baker in Britten, *Journ. of Bot.* XIX (1881) 307 et *Handb. of Bromel.* 113 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 316. **NEUMANNIA** — Ad. Brongniart in *Annal. Sc. Nat.* sér. 2, XV (1841) 369. **PHILOMOSTACHYS** — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 47. — Mexique centr. ♀

**P. latifolia** Solander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 401 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 856 ; Andrews, *Bot. Repos.* VIII (1808) t. 522 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 92. — Antilles, Brésil bor. ♀

**P. pulverulenta** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 36 t. 259 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 106. **P. PANICULATA** Ruiz et Pavon, *loc. cit.* III (1802) t. 260. **P. LONGIFOLIA** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1854) t. 4775. **P. EXCELSA** Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXV (1875) 381. — Pérou, Bolivie. ♀

- Pitcairnia undulata** Scheidweiler in OTTO et DIETRICH, *Allgem. Gartenzeit.* X (1842) 275 ; *Fl. des Serres* II t. 162 ; *Gartenflora* (1874) t. 781 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 114 ; Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1891) 443. **LAMPROCONUS** — Lemaire, *Jard. Fleur.* I (1852) sub t. 127. — Brésil (probablement dans la vallée de l'Amazone, Baker, *loc. cit.*) ♀
- P. violacea** Ad. Brongniart in *Annal. de Fl. et de Pomol.* I (1847) 116 cum icône ; Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* XV (1847) 299 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 118. — Indiqué comme originaire du Mexique ? ♀
14. **DYCKIA** Schultes f., *Syst. Veget.* VII, I (1829) 65 et VII 2 (1830) 1194 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7185. — Genre de 6 espèces du Brésil.
- D. altissima** Lindley in *Bot. Reg.* (1841) misc. 183 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 134 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 473. **D. PRINCEPS** Lemaire, *Jard. Fleur.* III (1853) t. 224-25. **GARRIELIA ENCHOLIRIOIDES** Gaudichaud, *Voy. La Bonite* (Bot.) IV (1866) 32 t. 115. — Brésil centr. ♀
- D. brevifolia** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* IV (1871) t. 236 et *Handb. of Bromel.* 130 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 493. — Brésil austr. ♀
- D. rariflora** Schultes f. in ROEMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII 2 (1830) 1195 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 131 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 480. **D. LEMAIREANA** Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil centr. ♀
- — var. **remotiflora** BAKER, *Handb. of Bromel.* (1889) 131. **D. REMOTIFLORA** Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* I (1838) 129 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 488. **D. RARIFLORA** Graham in *Bot. Mag.* (1834) t. 3349 ; Lindley in *Bot. Reg.* (1835) t. 1782. — Uruguay, Argentine. ♀
- D. sulphurea** C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1873) app. IV 3 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 131. — Montevideo. ♀
15. **HECHTIA** Klotzsch in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* III (1835) 401 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7186. — Deux ou trois espèces du Mexique.
- H. argentea** Baker in *Bot. Mag.* (1881) sub t. 6354 et in Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III (1884) 317 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 139. — Mexique centr. ♀
16. **CARAGUATA** Lindley, *Bot. Reg.* XIII (1827) sub t. 1068 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7188. — Douze espèces des Indes occ., de l'Amérique centr., de la Nouvelle-Grenade et de la Guyane.
- C. Andreana** Ed. Morren in *Rev. Hort.* (1884) 247 fig. 61 et (1886) 276 cum icône ; Baker in *Bot. Mag.* (1888) t. 7014 et *Handb. of Bromel.* 130. — Nouvelle-Grenade. ♀



**Caraguata Devansayana** Ed. Morren ex Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 144. GUZMANIA — Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXXIII (1883) 113 t. 8 et 9. — Équateur. 2

**C. lingulata** Lindley in *Bot. Reg.* (1827) sub t. 4068 ; Kerner, *Hort. Semp.* t. 274 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 143. TILLANDSIA — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 617 ; Jacquin, *Select. Stirp. Amer.* 92 t. 62. — Antilles, Guyane, Colombie, Équateur. 2

**C. Melinoni** Ed. Morren ex Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 145. GUZMANIA — Regel in *Gartenflora* (1885) 116. — Guyane française. 2

**C. musaica** Ed. André in *Illustr. Hort.* XXIV (1877) 27 t. 268 ; Baker in *Bot. Mag.* (1883) t. 6675 et *Handb. of Bromel.* 149. MASSANGEA — Ed. Morren in *Belg. Hort.* XXVII (1877) 30 et 199 t. 8-9. — Nouvelle-Grenade. 2

**C. sanguinea** Ed. André in *Rev. Hort.* (1883) 468 cum icone ; Baker in *Bot. Mag.* (1884) t. 6765 et *Handb. of Bromel.* 143. — Nouvelle-Grenade. 2

**C. virescens** Baker, *Handb. of Bromel.* (1889) 151. SCHLUMBERGERIA — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1879) 225 et 360 t. 49. PUYA — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1857) t. 4991. PITCAIRNIA — C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) app. 4. — Andes du Pérou. 2

17. GUZMANIA Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 37 t. 261 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7190. — Cinq espèces de l'Amérique trop. (des Antilles à l'Équateur).

**G. tricolor** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 38 t. 261 ; Loddiges, *Bot. Cab.* V (1822) t. 462 ; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 159 t. 918 ; Hooker f. *Exot. Fl.* II t. 163. — Antilles ; Andes (du Mexique au Pérou.) 2

18. TILLANDSIA Linné, *Gen. Plant.* ed. VI (1764) n. 396 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7192. — Genre d'environ 220 espèces habitant l'Amérique subtrop. et trop.

**T. Caput-Medusæ** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1880) 90 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 174. — Mexique. 2

**T. carinata** Baker in BRITTEN, *Journ. of Bot.* (1888) 49 et *Handb. of Bromel.* 212. VRIESEA — Wawra, *Bot. Ergebn. Reise Kais. Max.* (1883) 154 t. 26 ; Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 9 t. 7. V. BRACHYSTACHYS Regel in *Gartenflora* (1866) 258 t. 518 ; *Bot. Mag.* (1873) t. 6014. V. PSITTACINA Lindley var. — Ed. Morren in *Belg. Hort.* XX (1870) 161 t. 8. — Brésil austr. 2

**T. complanata** Benthham, *Voy. Sulphur* (Bot.) (1844) 173 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 202. — Jamaïque, Vénézuéla, Colombie, Équateur, Bolivie. 2

- Tillandsia cyanea** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1879) 297; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 320; Baker, *Handb. of Bromel.* 208. ALLARDTIA — Dietrich in Otto et Dietrich, *Allgem. Gartenzeit.* XX (1852) 242. PLATYSTACHYS — C. Koch et Sello, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) app. 11. — Guatemala. ♀
- T. fenestralis** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6998; Baker, *Handb. of Bromel.* 220. VRIESEA — Linden et André in *Illustr. Hort.* XXII (1875) 124 t. 214; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1886) 65 t. 4 et 5; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 550. — Brésil. ♀
- T. filifolia** Chamisso et Schlechtendal in *Linnaea* VI (1832) 53; Baker, *Handb. of Bromel.* 190. T. STRICTIFLORA Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1871) 117 t. 12. PLATYSTACHYS FILIFOLIA Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 264. — Mexique centr. ♀
- T. Gardneri** Lindley in *Bot. Reg.* (1842) sub t. 63; Baker, *Handb. of Bromel.* 199; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 590. ANOPLOPHYTUM INCANUM Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1881) 209 t. 11. A. ROLLISSONII Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil centr. et mérid., Trinité. ♀
- T. glaucophylla** Baker in BRITTEN, *Journ. of Bot.* (1887) 243 et *Handb. of Bromel.* 183. VRIESEA — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1848) t. 4415; *Fl. des Serres* V (1849) t. 432. PLATYSTACHYS — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 82. — Colombie. ♀
- T. hieroglyphica** Baker in BRITTEN, *Journ. of Bot.* (1888) 110 et *Handb. of Bromel.* 224. VRIESEA — Ed. Morren in *Illustr. Hort.* (1884) 41 t. 514, (1885) 40 et in *Belg. Hort.* (1885) 57 t. 10-12. MASSANGEA — Carrière in *Rev. Hort.* (1878) 175. M. TIGRINA Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Brésil austr. ♀
- T. incurvata** Baker in BRITTEN, *Journ. of Bot.* (1888) 49 et *Handb. of Bromel.* (1889) 213. VRIESEA — Gaudichaud, *Voy. La Bonite* (Bot.) IV (1866) 29 t. 68; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1882) 52 t. 2. T. INFLATA Baker in *Bot. Mag.* (1886) t. 6882. VRIESEA — Wawta ex Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 28 t. 18; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 521. — Brésil austr. ♀
- T. ionantha** Planchon in *Fl. des Serres* X (1854-55) 101 t. 1006; Hooker f. in *Bot. Mag.* (1871) t. 5892; Baker, *Handb. of Bromel.* 201. T. ERUBESCENS Wendland in *Allgem. Gartenzeit.* (1854) 453. PITYROPHYLLUM — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 79. — Brésil centr. ♀
- T. Leiboldiana** Schlechtendal in *Linnaea* XVIII (1845) 414; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* (Bot.) III 321; Baker, *Handb. of Bromel.* 180. — Mexique austr. ♀
- T. Lindeni** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1869) 321 t. 18; *Illustr. Hort.* XVI (1869) t. 610; *Floral Mag.* (1872) t. 44; *Garden* (1876) 466; *Rev. Hort.* (1878) 300; Baker, *Handb. of Bromel.* 210. PHYTARRHIZA — Ed. Morren in *Gard. Chron.* (1879) II 460. — Andes du Pérou austr. et occ. ♀
- T. Malzinei** Baker in *Kew Gard. Report* (1878) 59, in *Bot. Mag.* (1880) t. 6495 et *Handb. of Bromel.* 230. VRIESEA — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1874) 313 t. 14. — Mexique. ♀

**Tillandsia Morreniana** Hort. (sub *VRIESEA*) ex Ed. MORREN in *Belg. Hort.* (1887) 287 t. 10-12. — Baker (*Handb. of Bromel.* 212) dit que c'est un hybride des *T. CARINATA* et *PSITTACINA*.

**T. pruinosa** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* I (1797) 594 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1876) 257 t. 16 et 17 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 168 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 589. *PLATYSTACHYS* — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 265. — Antilles, Vénézuéla, Colombie, Pérou, Brésil. ♀

**T. psittacina** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1828) t. 2841 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 216. *VRIESEA* — Lindley in *Bot. Reg.* XXIX t. 10 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1882) 287 t. 10-12 ; Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* 8 t. 6 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 528. — Brésil austr. ♀

**T. punctulata** Chamisso et Schlechtendal in *Linnaea* VI (1831) 53 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 172. — Mexique centr. ♀

**T. regina** Vellozo, *Fl. Flumin.* III (1827) t. 142 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 227. *VRIESEA* — Beer, *Fam. der Bromel.* (1857) 97 ; Wawra, *Bot. Ausbeut. It. Princ. Sax. Coburg.* I (1883) 163 t. 36<sup>a</sup> ; Gard, *Chron.* (1878) fig. 41 ; Antoine, *Phyto-iconogr. Bromel.* (1884) 12 t. 9-10 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 569. *V. GIGANTEA* Lemaire in *Illustr. Hort.* XIV (1867) t. 516. *V. GLAZIOVIANA* Lemaire, *Illustr. Hort.* (1867) t. 516 (descript. exclus.) ; *Gartenflora* (1868) 68. — Brésil austr. ♀

**T. tessellata** Linden et André in LINDEN, *Catal.* (1873) 9 et in *Illustr. Hort.* (1873) 78 et (1874) 123 t. 179 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 226. *VRIESEA* — Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1882) 381 t. 14-16 ; C. Mez in *Fl. Brasil.* III 3 (1894) 559. — Brésil centr. ♀

**T. triglochinosoides** Presl, *Reliq. Haenkeanae* II (1833-36) 125 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 171. — Équateur. ♀

**T. virginalis** Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1880) 238 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 323 ; Baker, *Handb. of Bromel.* 202. *T. HETEROPHYLLA* Ed. Morren, *loc. cit.* (1873) 138. — Mexique. ♀

## CXLI. IRIDÉES

1. **IRIS** Linné, *Gen. Plant.* ed. VI (1764) n. 59 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7220. — Genre d'environ 100 espèces habitant l'Europe, l'Asie temp., l'Afrique et l'Amérique bor.

**I. Alberti** Regel in *Act. Hort. Petrop.* V (1877) 260 et in *Gartenflora* (1880) 33 t. 999 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 7020. — Turkestan. ♀

- Iris alata** Poiret, *Voy. en Barbarie* II (1789) 86 ; *Bot. Mag.* (1817) t. 1875 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 143 ; Baker, *Handb. of Irid.* 45. THELYSIA — Parlatore, *Fl. Ital.* III (1858) 317. CORESANTHE — Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 575 pr. p. XIPHON — Baker in Seeman, *Journ. of Bot.* (1871) 108. I. SCORPIOIDES Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 40 t. 6 ; Redouté, *Liliacées* IV (1808) t. 217. — Europe mérid., Maroc, Algérie. 2
- I. aphylla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 38 ; *Bot. Mag.* (1822) t. 2361 ; Baker, *Handb. of Irid.* 33. I. BOHEMICA F.-W. Schmidt, *Fl. Bohem.* IV (1794) 5. I. NUDICAULIS Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 296. I. DIANTHA C. Koch in *Linnaea* XXI (1848) 637. I. FURCATA Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Caucas.* III (1819) 42 et *Cent. Pl. Ross.* II t. 51. — De la Hongrie et de la Silésie au Caucase. 2
- I. arenaria** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* (1802) 57 t. 57 ; *Bot. Reg.* (1821) t. 549 ; Redouté, *Liliacées* V t. 296 ; Baker, *Handb. of Irid.* 29. — Moravie, Hongrie, Transylvanie, Moldavie, Russie mérid. 2
- I. aurea** Lindley in *Bot. Reg.* XXXIII (1847) t. 59 ; Baker in *Gard. Chron.* (1876) II 584 et *Handb. of Irid.* 15 ; Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 501 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 273. — Himalaya occ. 2
- I. Bartoni** Foster in *Gard. Chron.* (1883) I 275 ; *Bot. Mag.* (1886) t. 6869 ; Baker, *Handb. of Irid.* 37. — Kandahar. 2
- I. Bloudowii** Ledebour, *Fl. Altaica* IV (1833) 331 ; *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 101 et *Fl. Ross.* IV 102 ; *Gartenflora* (1880) t. 1020. I. FLAVISSIMA Pallas var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 29. — Sibérie altaïque. 2
- I. Boissieri** Henriques in *Bolet. Soc. Broter.* III (1885) 183 t. 3 ; Willkomm, *Illustr. Pl. Hisp.* II 46 t. 118 ; *Bot. Mag.* (1890) t. 7097. — Portugal. 2
- I. Caucasica** Hoffmann in *Comm. Soc. Phys.-Med. Mosq.* I (1808) 40 ; Regel in *Gartenflora* (1874) 195 t. 800 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1828) t. 255 ; Baker, *Handb. of Irid.* 45. XIPHON — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 124. — Asie Mineure, Perse, Kurdistan, Turkestan. 2
- I. Chamæiris** Bertoloni, *Fl. Ital.* III (1838) 609 ; Parlatore, *Fl. Ital.* III (1860) 291 ; Baker, *Handb. of Irid.* 27. I. LUTESCENS Redouté (non Lamarck), *Liliacées* V (1809) t. 263. — France mérid., Italie, Dalmatie. 2
- — var. **italica** BAKER, *Handb. of Irid.* (1892) 27. I. ITALICA Parlatore, *Fl. Ital.* III (1860) 285. — Italie. 2
- — var. **Olbiensis** BAKER, *loc. cit.* (1892) 28. I. OLBIENSIS Hénon in *Annal. Soc. Agricult. Lyon* VIII (1845) 462 cum icône ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 240 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 6110. — France mérid., Ligurie. 2
- I. Douglasiana** Herbert in Hooker et Arnott, *Bot. Beechey Voy.* (1841) 395 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 6083 ; Baker, *Handb. of Irid.* 7. — Californie. 2

- Iris ensata** Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 328 ; *Gartenflora* (1880) t. 1011 ; Baker, *Handb. of Irid.* 8. I. GRAMINEA Thunberg (non Linné) *Fl. Japon.* (1784) 34. I. PALASH Fischer in *Bot. Mag.* (1822) t. 2331. I. BREVI-SPATHA Fischer, *loc. cit.* (1824) t. 2528. I. FRAGRANS Lindley in *Bot. Reg.* XXVI (1840) t. 1. I. OXYPETALA Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* (1831) 358. — Europe temp. (du Japon à l'Himalaya et au Caucase). 2
- I. flavissima** Pallas, *Reise durch Provinz. Russ. Reich.* III (1776) 715 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* t. 220 et *Collect. Bot.* IV 108 ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 102 ; Baker, *Handb. of Irid.* 29. — Mongolie. 2
- I. Florentina** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 53 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 671 ; Redouté, *Liliacées* I t. 23 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 339 ; Bentley et Trimen, *Medic. Pl.* IV t. 273 ; Baker, *Handb. of Irid.* 38. — Europe centr. et mérid. 2
- — var. **albicans** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 146 ; *Handb. of Irid.* (1892) 38. I. ALBICANS Lange in *Kjæb. Vidensk. Meddel.* (1860) 76 et *Icon. Pl. Hisp.* t. 33. — Espagne.mérid. 2
- I. foetidissima** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 39 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 596 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 354 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 347 ; Baker, *Handb. of Irid.* 18. XIPHON — Parlatore, *Fl. Ital.* III (1860) 297. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 500. I. FETIDA Thunberg, *Disser. Iris* (1782) n. 49. — De Madère et du Portugal à l'Afghanistan ; Algérie. 2
- I. Germanica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 38 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 670 ; Redouté, *Liliacées* t. 309 ; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 924 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 338 ; Baker, *Handb. of Irid.* 37. — Europe centr., mérid. et mérid.-or. 2
- I. Gueldenstædtiana** Lepechin in *Act. Acad. Petrop.* I (1781) 292 t. 8 ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 98 ; Baker, *Handb. of Irid.* 14. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 500. I. DILUTA Marschall Bieberstein, *Cent. Pl. Ross.* (1832) t. 81. I. HALOPHILA Pallas, *Reise durch Provinz. Russ. Reich.* II (1773) 733. XYRIDION — Klatt, *loc. cit.* (1872) 500. — Europe mérid.-or., Asie occ. et centr. (de l'Asie Mineure à la Mongolie). 2
- I. Hartwegii** Baker in *Gard. Chron.* (1876) II 323 et *Handb. of Irid.* 6. — Californie. 2
- I. hexagona** Walter, *Fl. Carolin.* (1788) 66 ; *Bot. Mag.* (1884) t. 6787 ; Baker, *Handb. of Irid.* 18. — États-Unis mérid. (du Kentucky au Texas et à la Floride). 2
- I. Heylandiana** Boissier, *Fl. Or.* V (1881) 130 ; Baker, *Handb. of Irid.* 18. — Mésopotamie. 2
- I. Histrio** Reichenbach f. in *Bot. Zeit.* (1872) 488 ; *The Garden* XXXIII (1888) 558 t. 653 fig. 1 ; Baker, *Handb. of Irid.* 42. XIPHON — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1873) t. 6033. — Palestine. 2

**Iris humilis** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Caucas.* I (1808) 33 et *Cent. Pl. Russ.* t. 13; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 95; Baker, *Handb. of Irid.* 7. NEUBECKIA — Alefeld in *Bot. Zeit.* XXI (1863) 297. — De la Hongrie et de la Transylvanie au Caucase et à la Georgie. ʒ

**I. hybrida** Retzius, *Observ. Bot.* IV (1774) 6; Baker, *Handb. of Irid.* 36. I. AMGENA De Candolle in Redouté, *Liliacées* VI (1812) t. 336; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 2 t. 165. — Connu seulement en culture. ʒ

**I. Iberica** Hoffmann in *Comm. Soc. Phys. Med. Mosq.* I (1803) 41; *Bot. Mag.* (1870) t. 5847; *Gartenflora* (1863) t. 386 et (1872) 713; *Fl. des Serres* XIX (1873) 51 t. 1963; *Illustr. Hort.* XIX (1872) 289 t. 106; Baker, *Handb. of Irid.* 9. — Caucase, Arménie, Perse bor. ʒ

**I. imberbis** Poiret, *Voy. en Barbarie* II (1789) 85; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 145. I. JUNCEA Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 39 t. 4; Baker, *Handb. of Irid.* 41. XIPHION. — Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 570; *Bot. Mag.* (1871) t. 5890. — Maroc, Algérie, Tunisie, Italie, Sicile. ʒ

**I. juncifolia** Pallas, *Reise durch Provinz. Russich. Reich.* I (1801) 94. — Russie. ʒ

Obs. Non mentionné dans Baker, *Handb. of Irid.*

**I. Junonia** Schott et Kotschy in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* (1854) 209; Boissier, *Fl. Or.* V 138. I. PALLIDA Lamarck var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 146. — Cilicie. ʒ

Obs. Dans le *Handb. of Irid.* 39, Baker fait de l'I. JUNONIA une simple forme de l'I. PALLIDA.

**I. Kamaonensis** (KUMAONENSIS) Wallich, *Catal.* (1832) n. 5052; Baker, *Handb. of Irid.* 24; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 274. I. KINGIANA Foster in *Gard. Chron.* (1887) I 611; *Bot. Mag.* (1887) t. 6957. — Himalaya temp., centr. et occ. ʒ

**I. Kashmiriana** Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 744 et *Handb. of Irid.* 38; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 275. — Kashmir. ʒ

**I. Kolpakowskiana** Regel in *Act. Hort. Petrop.* V (1877) 263 et 634 et in *Gartenflora* (1878) 40, 161 t. 939; *The Garden* XXXIII (1888) 558 t. 658 fig. 4; Baker, *Handb. of Irid.* 43. XIPHION — Baker in *Bot. Mag.* (1880) t. 6489. — Turkestan. ʒ

**I. lævigata** Fischer ex FICHER et MEYER, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* V (1838) 37; *Gartenflora* (1864) t. 442 fig. 1; *Bot. Mag.* (1874) t. 6132; Baker, *Handb. of Irid.* 18. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 500. — Sibérie or. ʒ

— var. **Kämpferi** Regel in *Gartenflora* (1880) 65 t. 1003. I. KÄMPFERI Siebold ex Lemaire in *Illustr. Hort.* V (1858) t. 157; *Fl. des Serres* XX (1874) 45 t. 2073-74 (form.) — Japon. ʒ

**I. longipetala** Herbert in Hooker f. et Arnott, *Bot. Beechey Voy.* (1844) 395; *Bot. Mag.* (1862) t. 5298; Baker, *Handb. of Irid.* 10. — Californie. ʒ

- Iris lupina** Foster in *Gard. Chron.* (1887) I 738 ; Baker, *Handb. of Irid.* 19. — Arménie turque. ½
- I. lurida** Solander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 68 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 986 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 418 ; Baker, *Handb. of Irid.* 34. — Europe mérid.-or. ½
- I. lutescens** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 297 ; *Bot. Mag.* (1829) t. 2861 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 329 et *Pl. Crit.* X t. 917 ; Boissier, *Fl. Or.* V 136. — Europe centr., Salève ; Cappadoce. ½
- I. Mariæ Barbey** in *Æsterr. Bot. Zeit.* XLI (1881) 207. I. HELENÆ Barbey in Boissier, *Fl. Or.* V (1881) 132 et *Herbor. au Levant* (1882) 159 ; Baker, *Handb. of Irid.* 19. — Désert entre l'Égypte et la Palestine. ½
- I. mellita** Janka in *Magyar. Tud. Akad. Math. Term.* XII (1874) 172 ; Baker, *Handb. of Irid.* 30. I. PUMILA Grisebach (non Linné), *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 370 pr. p.. — Bulgarie. ½
- I. Milesii** Baker ex FOSTER in *Gard. Chron.* (1883) II 231 ; *Bot. Mag.* (1886) t. 6889 ; Baker, *Handb. of Irid.* 23 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 273. — Himalaya bor.-occ. (Kulu). ½
- I. Missouriensis** Nuttall in *Journ. Acad. of Philadelphia* VII (1834) 58 ; Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII (1883) 160 ; Baker, *Handb. of Irid.* 9. I. TOLMEANA Herbert in Hooker et Arnott, *Bot. Beechey Voy.* (1841) 396. I. HÆMATOPHYLLA Fischer var. VALAMETICA Herbert in Hooker f., *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 206. — Du Colorado à la Californie et au Mexique bor. ½
- I. Monnieri De Candolle** in REDOUTÉ, *Liliacées* V (1809) t. 236 ; Boissier, *Fl. Or.* V 130 ; Baker, *Handb. of Irid.* 15. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 500. — Crète, Rhodes. ½
- I. Nepalensis** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 54 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 2 t. 11 ; Baker, *Handb. of Irid.* 22 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 273. I. DECORA Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* I (1830) 77 t. 86. NEUBECKIA — Klatt in *Linnæa* XXXIV (1865-66) 588. — Himalaya temp. (de Simla à Assam.) ½
- I. Orientalis** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 9 ; Baker, *Handb. of Irid.* 16. I. OCHROLEUCA Linné, *Mant. Pl.* (1771) 175 ; *Bot. Mag.* (1788) t. 61 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 350 ; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 598 ; Boissier, *Fl. Or.* V 129. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 500. I. GIGANTEA Carrière in *Rev. Hort.* (1875) 356 cum icone. — Asie Mineure, île de Samos, Syrie. ½
- I. pallida** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 294 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 685 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 366 ; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 922 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 340 ; Boissier, *Fl. Or.* V 138 ; Baker, *Handb. of Irid.* 38. I. CENGIALTI Ambrosi, *Fl. Tirol. Austr.* I (1854) 643. — Europe mérid., Asie occ. ½
- — var. **Sicula** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 146. I. SICULA Tondaro, *Nuov. Gen. e Sp. Orto Bot. Palermo* I (1858) 7. — Sicile. ½

**Iris paradoxa** Steven in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* V (1814) 355; *Gartenflora* (1863) t. 386; *The Garden* (1887) 584 cum icone; Boissier, *Fl. Or.* V 132; *Bot. Mag.* (1889) t. 7081; Baker, *Handb. of Irid.* 20. — Géorgie, Perse bor. 2

**I. Persica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 40; *Bot. Mag.* (1786) t. 1; Redouté, *Liliacées* IV t. 189; *Fl. des Serres* X (1854-55) 189 t. 1045; Boissier, *Fl. Or.* V 121; Baker, *Handb. of Irid.* 44. XIPHION — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 1. — Asie Mineure, Perse. 2

**I. plicata** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 296; Redouté, *Liliacées* VI t. 356; Baker, *Handb. of Irid.* 39. I. APHYLLA Linné var. — Ker in *Bot. Mag.* (1806) t. 870. — « Connu seulement en culture. Sans aucun doute dérivé de l'I. PALLIDA. » (Baker.)

**I. prismatica** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 30; *Bot. Mag.* (1813) t. 1564; Baker, *Handb. of Irid.* 6. — États-Unis (du Maine à la Virginie, au Kentucky et au Tennessee). 2

**I. pseudo-pumila** Tineo, *Catal. Hort. Panorm.* (1827) 283; Parlatore, *Fl. Ital.* III; Baker, *Handb. of Irid.* 26. I. PANORMITANA Todaro, *Nuov. Gen. e Spec. Orto Bot. Palermo* I (1858) 3. — Sicile. 2

**I. pulchella** Regel in *Gartenflora* (1859) 310. — Hab ?

Obs. Baker ne fait pas mention de cette espèce dans le *Handb. of Irid.*

**I. pumila** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 38; *Bot. Mag.* (1787) t. 9; Redouté, *Liliacées* V t. 261; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 327; Baker, *Handb. of Irid.* 26. — Europe centr. et mérid.-or., Asie Mineure, Caucase. 2

**I. reticulata** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 34 t. 1 et *Cent. Pl. Ross. Merid.* t. 41; *Bot. Mag.* (1866) t. 5377; *Gartenflora* (1864) t. 452 et (1873) 354 t. 779 fig. 1; Baker, *Handb. of Irid.* 41. XIPHION — Klatt in *Linnea* XXXIV (1865-66) 572, 704. — De l'Asie Mineure au Caucase et à la Perse. 2

— — var. **Krelagi** Regel in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 419 et in *Gartenflora* 354 (1873) t. 779 fig. 2; Baker, *loc. cit.* 42. — Caucase.

**I. Rosenbachiana** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1884) 675; Baker, *Handb. of Irid.* 46. — Turkestan. 2

**I. Rossii** Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 809 et *Handb. of Irid.* 8. — Corée, Chine bor. 2

**I. rubro-marginata** Baker in *Gard. Chron.* (1875) 524 et *Handb. of Irid.* 30. — Asie Mineure centr., Scutari, Troie.

**I. Ruthenica** Dryander in Arton, *Hort. Kew.* ed. 2, I (1810) 417; *Bot. Mag.* (1808) t. 1123 et (1811) 1398; Baker, *Handb. of Irid.* 4. JONIS — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 502. — Transylvanie, Asie centr., Sibérie, Chine bor., Mongolie, Mandchourie. 2



- Iris setosa** Pallas ex LINK, *Bot. Jahrb.* I 3 (1794?) 71 et in Dietrich, *Sp. Pl.* I 143; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 96; *Gartenflora* (1861) t. 322; Baker, *Handb. of Irid.* 11. I. BRACHYCUSPIS Fischer in *Bot. Mag.* (1882) t. 2326. — Sibérie or., Japon, Amérique bor.-occ. ♀
- I. Sibirica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 39; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 3; Redouté, *Liliacées* V t. 239; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 341; Baker, *Handb. of Irid.* 9. XIPHION — Parlatore, *Fl. Ital.* III (1858) 300. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 500. — Europe centr. et mérid., Sibérie. ♀
- — var. **orientalis** BAKER, *Handb. of Irid.* (1892.) 9. I. ORIENTALIS Thunberg (non Miller) in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 328. I. SIBIRICA Thunberg (non Linné), *Fl. Japon.* (1784) 33. I. SANGUINEA Donn, *Hort. Cantabrig.* ed. VI (1811) 17. I. SIBIRICA Linné var. — Ker in *Bot. Mag.* (1813) t. 1604. — Sibérie or., Japon. ♀
- I. Sindjarensis** Boissier et Haussknecht in BOISSIER, *Fl. Or.* V (1881) 122; *Bot. Mag.* (1890) t. 7145; Baker, *Handb. of Irid.* 47. — Mésopotamie. ♀
- I. Sisyrinchium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 40; Redouté, *Liliacées* I (1802) t. 29; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* I (1806) t. 42; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 146; Baker, *Handb. of Irid.* 43. MORÆA — Ker in Kœnig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805) 132; *Bot. Mag.* (1811) t. 1407. XIPHION — Baker in Seemann, *Journ. of Bot.* (1871) 42; *Bot. Mag.* (1874) t. 6096. — Europe, Asie et Afrique méditerran., Asie occ., Afghanistan. ♀
- I. sordida** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* suppl. (1813) 4; Baker, *Handb. of Irid.* 33. — Connu seulement en culture. ♀
- I. spuria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 39; *Bot. Mag.* (1788) t. 58; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 4; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 345; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 14; Baker, *Handb. of Irid.* 14. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 500. I. SORDIDA Retzius, *Fasc. Observ. Bot.* (1774) 6. — Europe centr. et mérid., Perse, Algérie. ♀
- — var. **notha** BAKER, *Handb. of Irid.* (1892) 15. I. NOTHA Marschall Bieberstein, *Cent. Pl. Ross. Merid.* II (1810) t. 77. XYRIDION — Klatt in *Bot. Zeit.* (1872) 499. I. HALOPHILA Ker (non Pallas) in *Bot. Mag.* (1805) t. 875. Du Caucase au Kashmir. ♀
- I. suaveolens** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Or.* ser. I XIII (1853) 15; Baker, *Handb. of Irid.* 27; Velenovsky, *Fl. Bulg.* 533. — Bulgarie. ♀
- I. Susiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 38; *Bot. Mag.* (1788) t. 91; Savi, *Fl. Ital.* II t. 74; *Fl. des Serres* XI (1856) 23 t. 1067-68; Boissier, *Fl. Or.* V 130; Baker, *Handb. of Irid.* 17. — Asie Mineure, Perse. ♀
- I. tectorum** Maximowicz in *Bull. Acad. Sc. Pétersb.* XV (1871) 380; *Gartenflora* (1872) t. 716; *Bot. Mag.* (1874) t. 6118; *Fl. des Serres* XXII (1877) 23 t. 2282; Baker, *Handb. of Irid.* 23. I. CRISTATA Miquel (non Aiton), *Prol. Fl. Jap.* (1867) 305. — Chine, Japon. ♀

- Iris tenax** Douglas in *Bot. Reg.* (1829) t. 1218; *Bot. Mag.* (1834) t. 3343; Baker, *Handb. of Irid.* 7. JONIRIS — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 502 — Fort Vancouver, Colombie Brit., Orégon. Ț
- I. tenuifolia** Pallas, *Reise durch Provinz Russich. Reich.* III (1776) 714; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 93; Baker, *Handb. of Irid.* 4. JONIRIS — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 502. — De la mer Caspienne à la Daourie et à la Mongolie. Ț
- I. Tingitana** Boissier et Reuter, *Pagill. Pl. Afr. Bor. et Hisp.* (1852) 13; Baker in *Bot. Mag.* (1881) t. 6775 et *Handb. of Irid.* 40; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 146. XIPHON — Baker in Seemann, *Journ. of Bot.* (1871) 13 et *Syst. Irid.* 123. — Maroc. Ț
- I. tripetala** Walter, *Fl. Carolin.* (1788) 66; Baker, *Handb. of Irid.* 10. IRIS TRIDENTATA Sweet, *Brit. Flow. Gard.* III t. 274. — États-Unis mérid. (de la Caroline à la Floride.) Ț
- I. unguicularis** Poiret, *Voy. en Barbarie* II (1789) 86; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (monoc.) 181; Baker, *Handb. of Irid.* 3; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 146. I. STYLOSA Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 40 t. 5; *Bot. Mag.* (1869) t. 5773. JONIRIS — Klatt in *Bot. Zeit.* XXX (1872) 503. — Algérie. Ț
- I. variegata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 38; *Bot. Mag.* (1787) t. 16; Redouté, *Liliacées* IV t. 292; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 334; Baker, *Handb. of Irid.* 34. — Autriche, Turquie, Russie mérid. Ț
- I. Vartani** Foster in *Gard. Chron.* (1885) I 438; *Bot. Mag.* (1887) t. 6942; Baker, *Handb. of Irid.* 43. — Palestine. Ț
- I. versicolor** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 39; *Bot. Mag.* (1787) t. 21; Redouté, *Liliacées* VI t. 339; Bigelow, *Amer. Medic. Bot.* I t. 16; Baker, *Handb. of Irid.* 12. — Amérique bor., (des États-Unis bor. à la baie d'Hudson). Ț
- I. virescens** Delaroche in REDOUTÉ, *Liliacées* V (1809) t. 295; Rapin, *Guide Bot. Vaud* éd. II 575 (err. typ. 375); Gremli, *Excurs. Fl. d. Schweiz* ed. IV (1881) 394; Baker, *Handb. of Irid.* 32. — Suisse (Valais). Ț
- I. Virginica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 39; *Bot. Mag.* (1803) t. 703; Jacquuin, *Icon. Pl. Rar.* II t. 223. I. VERSICOLOR Linné var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 12. — Amérique sept. Ț
- I. xiphioides** Ehrhart, *Beitr. z. Naturk.* VII (1792) 140; *Bot. Mag.* (1803) t. 687; Redouté, *Liliacées* IV t. 212; Baker, *Handb. of Irid.* 40. XIPHON LATIFOLIUM Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3. I. ANGLICA Hort. ex Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. 1, I (1840) 437. I. PYRENAICA Bubani, *Sched. Crit.* 3. — Pyrénées françaises et espagnoles, Asturies. Ț
- I. Xiphium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 40 pr. p.; *Bot. Mag.* (1803) t. 656; Redouté, *Liliacées* VII t. 337; Baker, *Handb. of Irid.* 39; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 147. XIPHON VULGARE Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 122. — Espagne, France mérid., Corse, Maroc, Algérie. Ț

2. **HERMODACTYLUS** Adanson, *Hist. Fam. Pl.* II (1763) 60 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7221. — Genre de une ou peut-être trois espèces habitant la France mérid., l'Italie et la Grèce (ailleurs natur.).

**H. tuberosus** Salisbury in *Trans. Hort. Soc. London* I (1812) 304 ; Baker, *Handb. of Irid.* 47 ; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 147. **IRIS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 40 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 531 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX (1847) 7 t. 348 ; Boissier, *Fl. Or.* V 124. — Europe et Asie méditerran., Arabie ; ailleurs naturalisé. ♀

3. **TIGRIDIA** Ker in Kœnig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805) 246 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7226. — Genre de 7 espèces environ habitant le Mexique, l'Amérique centr., le Pérou et le Chili.

**T. Pavonia** Ker in Kœnig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805) 246 ; Baker, *Handb. of Irid.* 67. **FERRARIA** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 407 ; Andrews, *Bot. Repos.* III t. 178 ; Redouté, *Liliacées* I t. 6 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XV (1828) t. 1424. **F. TIGRIDIA** Ker in *Bot. Mag.* (1801) t. 532. **T. GRANDIFLORA** Salisbury in *Trans. Hort. Soc. London* I (1812) 309. — Mexique, Guatemala. ♀

— — var. **conchiflora** Planchon in *Fl. des Serres* IX (1853-54) 137 t. 908-910 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 136. **T. CONCHIFLORA** Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 1, II (1825) t. 128. — Mexique austr. ♀

4. **RIGIDELLA** Lindley, *Bot. Reg.* (1840) t. 16 et misc. 35 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7227. — Genre de 3 espèces du Mexique et de l'Amérique centr.

**R. flammea** Lindley in *Bot. Reg.* (1840) t. 16 ; Paxton, *Mag. of Bot.* VII 247 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 327 ; Baker, *Handb. of Irid.* 70. — Mexique. ♀

Obs. Baker (*loc. cit.*) rapporte à cette espèce comme forme remarquable le **R. ORTHANTHA** Lemaire in *Fl. des Serres* (1845) 107 t. 45 ; Hemsley, *loc. cit.* III 327.

**R. immaculata** Herbert in *Bot. Reg.* (1844) t. 68 ; *Fl. des Serres* V (1849) t. 502 et XXI (1875) 111 t. 2215 ; Hemsley, *Biol. Centr.-Amer.* III 327 ; Baker, *Handb. of Irid.* 70. — Guatemala. ♀

5. **FERRARIA** Linné, Gen. Plant. ed. VI (1764) n. 1018 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7229. — Six espèces de l'Afrique austr.

**F. undulata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1353 ; *Bot. Mag.* (1791) t. 144 ; Jacquin, *Hort. Vindob.* t. 63 ; Redouté, *Liliacées* I t. 28 ; Baker, *Handb. of Irid.* 73 ; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 157. — Colonie du Cap. 2

6. **CROCUS** Linné, Gen. Plant. ed. VI (1764) n. 55 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7232. — Genre de 70 espèces environ habitant toute la Région Méditerr., l'Europe et l'Asie centr.

**C. Alatavicus** Regel et Semenov in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* LI (1868) I 434 ; *Gartenflora* (1877) 193 t. 906 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 45 ; Baker, *Handb. of Irid.* 84. — Monts Alatau, Turkestan. 2

**C. Asturicus** Herbert in *Bot. Mag.* (1843) sub t. 3998 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 7 ; Baker, *Handb. of Irid.* 94. — Espagne bor. 2

**C. aureus** Sibthorp et Smith, *Fl. Græca Prodr.* I (1806) 24 et *Fl. Græca* (1806) t. 35 ; *Bot. Mag.* (1830) t. 2986 ; *Engl. Bot.* (suppl.) t. 2646 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX 9 t. 357 et *Pl. Crit.* X t. 925 ; Boissier, *Fl. Or.* V 108. — Transylvanie, Grèce, Asie Mineure. 2

Obs. Baker (*Handb. of Irid.* 77) en fait une forme du *C. MÆSIACUS* Ker.

**C. Balansæ** J. Gay in BALANSA, *Pl. Exsicc.* (1854) n. 34 et ex Maw in *Gard. Chron.* (1879) I 234 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 51 ; Boissier, *Fl. Or.* V 107 ; Baker, *Handb. of Irid.* 90. — Asie Mineure (Smyrne). 2

**C. Banaticus** Heuffel in *Flora* XVIII (1835) 255 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 361 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 24 ; Baker, *Handb. of Irid.* 82. **C. VELUCHENSIS** Baker in *Bot. Mag.* (1875) t. 6197. — Banat, Hongrie, Transylvanie. 2

**C. biflorus** Miller in *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 4 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 845 ; Andrews, *Bot. Repos.* VI (1805) t. 362 ; Reichenbach f., *Fl. Exot.* I t. 37 et *Pl. Crit.* X t. 935 et 936 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 356 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* 357 t. 59 ; Boissier, *Fl. Or.* V 112 ; Baker, *Handb. of Irid.* 79. — Europe mérid. (de l'Italie à la Grèce), Asie Mineure, Caucase, Perse. 2

— — var. **pusillus** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 81 et *Handb. of Irid.* (1892) 79. **C. PUSILLUS** Tenore, *Mem. Crochi Fl. Napol.* (1826) 8 t. 1 et *Fl. Napol.* t. 206 ; *Bot. Cab.* (1828) t. 1454 ; *Bot. Reg.* (1837) t. 1987 ; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 936. — Italie. 2

**C. Byzantinus** Ker in *Bot. Mag.* (1808) sub t. 1111 ; Herbert in *Bot. Reg.* (1847) t. 4 fig. 5 ; Hooker f. in *Bot. Mag.* (1875) t. 6141 ; Baker, *Handb. of Irid.* 94. **C. IRIDIFLORUS** Heuffel ex Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX (1847) 40 et in *Oesterr. Bot. Wochenbl.* (1857) 222. — Banat, Transylvanie. 2

- Crocus Cambessedesii** J. Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 320 (err. typ. 220); Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 13; Baker, *Handb. of Irid.* 87. C. CAMBESSEDIANUS Herbert in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 37 fig. 4. — Iles Baléares. ♀
- C. cancellatus** Herbert in *Bot. Mag.* (1841) sub t. 3864 et (1874) t. 6103; *Bot. Reg.* (1847) t. 16 fig. 4 et 5; Boissier, *Fl. Or.* V 101; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 31; Baker, *Handb. of Irid.* 93. C. SPRUNERI Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 103. — Attique, Céphalonie, Leucade, Arménie turque. ♀
- — var. **Cilicicus** MAW ex Boissier, *Fl. Or.* V (1882) 102. C. CILICICUS Kotschy, *Pl. Exsicc.* n. 316 (fide Boissier, *loc. cit.*). — Cilicie. ♀
- — var. **Damascenus** MAW mss. ex Boissier, *Fl. Or.* V (1881) 101. C. DAMASCENUS Herbert in Lindley, *Bot. Reg.* (1845) t. 37 fig. 1. C. EDULIS Boissier et Blanche ex Boissier, *loc. cit.* V (1881) 101. — Syrie. ♀
- C. Carpetanus** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Nov. Hisp.* (1842) 24; Grælls, *Ramill. Pl. Espan.* I 10 t. 4; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 41; Baker, *Handb. of Irid.* 85. — Portugal, Espagne. ♀
- C. chrysanthus** Herbert in *Journ. Hort. Soc. London* II (1847) 285; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 62; *Bot. Mag.* (1875) t. 6162; Boissier, *Fl. Or.* V 111; Baker, *Handb. of Irid.* 78. — Macédoine, Thrace, Roumélie, Asie Mineure. ♀
- C. Clusii** J. Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 320 (err. typ. 220); Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 10; Baker, *Handb. of Irid.* 92. C. CLUSIANUS Herbert in *Bot. Reg.* (1845) t. 37 fig. 8. — Portugal. ♀
- C. Etruscus** Parlatore, *Fl. Ital.* III (1850) 228; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 22; Baker in *Bot. Mag.* (1886) t. 6862 et *Handb. of Irid.* 86. — Toscane. ♀
- C. Gaillardotii** Maw in *Gard. Chron.* (1879) I 234 et *Monog. Gen. Crocus* t. 40; Boissier, *Fl. Or.* V 105; Baker, *Handb. of Irid.* 91. C. HYEMALIS Boissier et Blanche, var. — Boissier et Blanche in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 93. — Syrie. ♀
- C. Haussknechtii** Boissier et Reuter in HAUSSKNECHT, *Pl. exsicc.* (1866) et *Fl. Or.* V (1881) 100. C. SATIVUS Linné, var. — Maw ex Boissier, *loc. cit.* V (1882) 100; Baker, *Handb. of Irid.* 86. — Perse. ♀
- C. hyemalis** Boissier et Blanche in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2 IV (1859) 93 et *Fl. Or.* V 106; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 43; Baker, *Handb. of Irid.* 91. — Syrie, Palestine. ♀
- C. Imperati** Tenore, *Mem. Crochi Fl. Napol.* (1826) 10 t. 3 et *Fl. Napol.* III (1829-30) 411; *Bot. Reg.* (1837) t. 1993; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 937; *Gartenflora* (1885) 311 cum icone; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 14; Baker, *Handb. of Irid.* 88. — Italie mérid. ♀
- C. Korolkowi** Maw et Regel in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879) 499; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 56; Boissier, *Fl. Or.* V 109; Baker in *Bot. Mag.* (1885) t. 6852<sup>a</sup> et *Handb. of Irid.* 78. — Turkestan. ♀

- Crocus lævigatus** Bory et Chaubard, *Nouv. Fl. Pélopon. et Cyclad.* (1838) 21 t. 2 fig. 1; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 49; Boissier, *Fl. Or. V* 109; Baker, *Handb. of Irid.* 92. — Grèce, Cyclades. ♀
- C. Lazicus** Boissier in BALANSA, *Pl. Orient. Exsicc.* (1866) n. 1533 et *Fl. Or. V* (1881) 97; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 12; Baker, *Handb. of Irid.* 79. — Asie Mineure (Lazistan). ♀
- C. medius** Balbis, *Add. ad Fl. Pedemont.* (1801) 83 et misc. bot. I 6; *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 37 fig. 5; Parlatore, *Fl. Ital.* III 239; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 20; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 27; Baker, *Handb. of Irid.* 93. — France mérid.-or., Ligurie. ♀
- C. minimus** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 243 et in Redouté, *Liliacées* II t. 81; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 944 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 359; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 49; Baker, *Handb. of Irid.* 81. — Corse, Sardaigne. ♀
- C. Nevadensis** Amo et Campo in *Rev. Cienc. Madrid.* V (1855) 55; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 42; Baker, *Handb. of Irid.* 88. **C. ATLANTICUS** Pomel, *Nouv. Matér. Fl. Atlant.* (1875) 388. **C. ALGERIENSIS** Baker in *Gard. Chron.* (1877) I 45. — Espagne mérid., Algérie. ♀
- C. nudiflorus** Smith, *Engl. Bot.* (1798) t. 491 et ed. 3 t. 1500; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 6; Baker, *Handb. of Irid.* 93; Baxter, *Brit. Bot.* t. 137. **C. SPECIOSUS** Wilson (non Marschall Bieberstein), *Engl. Bot.* (1833) t. 2752. **C. MULTIFIDUS** Ramond in *Bull. Soc. Philom.* II (1800) 129 t. 8. — France mérid., Espagne bor., aill. natural. ♀
- C. ochroleucus** Boissier et Gaillardot in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 93 et *Fl. Or. V* 98; *Bot. Mag.* (1862) t. 5297; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 41; Baker, *Handb. of Irid.* 89. — Syrie, Palestine. ♀
- C. Olivieri** Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 319 (err. typ. 219); *Bot. Mag.* (1873) t. 6031; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 53; Boissier, *Fl. Or. V* 408; Baker, *Handb. of Irid.* 88. **C. LAGENÆFLORUS** Salisbury var. **OLIVIERIANUS** Herbert in *Bot. Reg.* (1843) misc. 29. — Grèce, Chios. ♀
- C. pulchellus** Herbert in *Bot. Reg.* (1844) t. 3 fig. 1; *Flor. Mag.* (1850) 273 cum icone; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 65; Boissier, *Fl. Or. V* 414; Baker, *Handb. of Irid.* 94. — Turquie, Grèce, Asie Mineure. ♀
- C. reticulatus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 28 et *Cent. Pl. Fl. Ross.* t. 1 pr. p.; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 939 et 940 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 356; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 109; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 35; Boissier, *Fl. Or. V* 402; Baker, *Handb. of Irid.* 85. — Du Trentin au Caucase. ♀
- C. Salzmanni** J. Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 320 (err. typ. 220); *Bot. Mag.* (1872) t. 6000; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 9; Baker, *Handb. of Irid.* 89. **C. SALZMANNIANUS** Herbert in *Bot. Reg.* (1847) t. 4 fig. 4. **C. TINGITANUS** Herbert in *Bot. Mag.* (1841) t. 3868. — Maroc. ♀

- Crocus sativus** Linné, *Sp. Pl.* ed. 1 (1753) 36; *Engl. Bot.* (1796) t. 343; Redouté, *Liliacées* III t. 173; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 360; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 29; Boissier, *Fl. Or.* V 100; Baker, *Handb. of Irid.* 86. C. GRÆCUS Heldreich, *Sert. Hellen.* (1876) 11. — Grèce, Cyclades, Crète, Smyrne (cult. et subsp. de l'Angleterre à l'Himalaya). 2
- C. serotinus** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806) t. 30; *Bot. Mag.* (1810) t. 1267; Reichenbach f., *Pl. Crit.* X t. 943; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I (1861) 146; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 4; Baker, *Handb. of Irid.* 89. — Espagne mérid. 2
- C. Sieberi** J. Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 320 (err. typ. 220); *Bot. Mag.* (1851) t. 6036; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 33; Boissier, *Fl. Or.* V 102; Baker, *Handb. of Irid.* 83. C. NIVALIS Bory et Chaubard, *Nouv. Fl. Pélop. et Cyclad.* (1828) 21 t. 2 fig. 1; *Bot. Reg.* (1847) t. 4 fig. 2. — Grèce, Cyclades, Crète. 2
- C. speciosus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 27 et *Cent. Pl. Fl. Ross.* t. 71; *Bot. Reg.* (1839) t. 40; *Bot. Mag.* (1841) t. 3861; *Gartenflora* (1862) t. 379; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 64; Boissier, *Fl. Or.* V 114; Baker, *Handb. of Irid.* 94. — De l'Autriche au Caucase et à l'Afghanistan. 2
- C. suaveolens** Bertoloni, *Descr. Zafferani Ital.* (1826) n. 3 et *Fl. Ital.* I (1733) 231; *Bot. Mag.* (1841) t. 3864; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 2 t. 232; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 15; Baker, *Handb. of Irid.* 82. — Toscane, environs de Rome et de Naples. 2
- C. Suterianus** Herbert in *Bot. Reg.* (1847) misc. 5; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 52; Boissier, *Fl. Or.* V 108. C. OLIVIERI J. Gay var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 88. C. AUCHERI Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 4, XIII (1853) 16. — Asie Mineure. 2
- C. Tournefortii** J. Gay in *Bullet. Férussac* XXV (1831) 320 (err. typ. 220); Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 47; Boissier, *Fl. Or.* V 109. C. BORYI J. Gay var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 92. C. TOURNEFORTIANUS Herbert in *Bot. Reg.* (1845) t. 37 fig. 3. C. ORPHANIDIS Hooker f. in *Bot. Mag.* (1840) t. 5776. — Cyclades Melos, Syrie. 2
- C. vallicola** Herbert in *Bot. Reg.* (1845) misc. 2; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 2; Boissier, *Fl. Or.* V 97; Baker, *Handb. of Irid.* 90. — Arménie. 2
- C. vernus** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 84; *Engl. Bot.* (1796) t. 344; Jacquin, *Fl. Austr.* Icon. V t. 36; Redouté, *Liliacées* t. 266; Reichenbach f., *Fl. Exot.* t. 22 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 355; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 26; Baker, *Handb. of Irid.* 82. C. MULTIFLORUS Schur, *Enum. Pl. Transsilv.* (1866) 652. — Europe centr. et mérid. 2
- C. versicolor** Ker in *Bot. Mag.* (1808) t. 1110; Maw, *Monogr. Gen. Crocus* t. 16; Baker, *Handb. of Irid.* 81. — France mérid.-or. et mérid. 2
- C. vitellinus** Wahlenberg in *Isis* XVI (1828) 101; *Bot. Mag.* (1879) t. 6416; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 50; Boissier, *Fl. Or.* V 106. C. SYRIACUS Boissier et Gaillardot in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 94 (excl. syn. C. BALANSÆ). — Syrie. 2

**Crocus zonatus** J. Gay in BALANSA, *Pl. Or. Exsicc.* (1855) n. 823 ; Maw, *Monog. Gen. Crocus* t. 4 ; Boissier, *Fl. Or.* V 98 ; Baker, *Handb. of Irid.* 87. **C. KOTSCHYANUS** C. Koch (non Herbert), *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) app. 7. — Cilicie. ♀

7. **ROMULEA** Maratti, *Plant. Romuleæ et Saturn.* (1772) 13 t. 1 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7235. — Genre d'environ 55 espèces habitant l'Europe occ., la Rég. Méditerran., l'Afrique occ. et austr.

**R. Bulbocodium Sebastiani** et Mauri, *Fl. Romance Prodr.* (1818) 17 ; Risso, *Fl. de Nice* t. 12 ; Boissier, *Fl. Or.* V 115 ; Baker, *Handb. of Irid.* 98. **IXIA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 51 pr. p. ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II t. 271 ; *Bot. Mag.* (1794) t. 265. — Europe, Asie et Afrique (rég. Méditerran.). ♀

**R. speciosa** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 89. **TRICHONEMA** — Ker in *Bot. Mag.* (1812) t. 1476. **SPATHALANTHUS** — Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 1, III (1829) t. 300. **IXIA BULBOCODIUM** Linné var. — Andrews, *Bot. Repos.* III (1801) t. 170. **R. ROSEA** Ecklon var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 103. — Colonie du Cap. ♀

8. **NEMASTYLIS** Nuttall in *Trans. Amer. Phil. Soc.* V (1837) 157 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7241. — Genre d'environ 6 espèces habitant l'Amérique bor. et trop.

**N. acuta** Herbert in *Bot. Mag.* (1840) t. 3779 ; Baker, *Handb. of Irid.* 111. **IXIA** — Barton, *Fl. N. Amer.* I (1820) 76. **N. GEMINIFLORA** Nuttall in *Amer. Phil. Trans.* V (1837) 157. — Arkansas, Texas. ♀

9. **SCHIZOSTYLIS** Backhouse et Harvey in *Bot. Mag.* (1864) t. 5422 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7258. — Deux espèces de l'Afrique austr.

**S. coccinea** Backhouse et Harvey in *Bot. Mag.* (1864) t. 5422 ; Baker, *Handb. of Irid.* 147 ; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 173. — Cafrerie, Natal, Transvaal. ♀

10. **IXIA** Linné, *Gen. Plant.* ed. VI (1764) n. 56 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7263. — Genre d'environ 25 espèces de l'Afrique austr.

**I. speciosa** Andrews, *Bot. Repos.* II (1801) t. 126 ; Baker, *Handb. of Irid.* 163 ; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 186. **I. CRATEROIDES** Ker in *Bot. Mag.* (1801) t. 504. — Colonie du Cap. ♀



11. **FREESIA** Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 672 pr. p. ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7264. — Deux espèces de l'Afrique  
austr.

**F. refracta** Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 673 et in Durand et Schinz,  
*Consp. Fl. Afric.* V 188; Baker, *Handb. of Irid.* 167 pr. p. **GLADIOLUS** — Jac-  
quin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786-93) t. 241; Redouté, *Liliacées* VII t. 419. **TRITONIA** — Ker in Kœnig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805) 227; *Bot. Reg.* II  
t. 135. **T. ODORATA** Loddiges, *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1820. **FREESIA** —  
Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) 672. — Colonie du Cap (natural. en  
Amérique). ♀

— — var. **alba** Hort., *The Garden* (1887) 529; *Gartenflora* (1889) 356 cum  
icone.

12. **CROCOSMA** Planchon in *Fl. des Serres* VII (1851-52) 161  
t. 702; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7270. — Genre monotype.

**C. aurea** Planchon in VAN HOUTTE, *Fl. des Serres* VII (1851-52) 161 t. 702;  
Baker, *Handb. of Irid.* 189; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.*  
V 203. **TRITONIA** — Pappe mss. ex Hooker f. in *Bot. Mag.* (1847) t. 4335;  
*Bot. Reg.* (1847) t. 61. **CROCANTHUS MOSSAMBICENSIS** Klotzsch in Peters, *Reise  
nach Mossamb.* II (1862-64) 516 t. 57. — De la Colonie du Cap au Moçam-  
bique. ♀

13. **TRITONIA** Ker in Kœnig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805)  
227; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7272. — Genre d'environ  
35 espèces de l'Afrique australe.

**T. crocosmiaeiflora** Lemaire (sub **MONTBRETIA**) ex Ed. Morren in *Belg.  
Hort.* (1881) t. 14; *Flor. Mag.* new ser. 472. — Hybride de **T. POTTSH** et  
de **CROCOSMA AUREA** (Baker, *Handb. of Irid.* 195 in obs.).

**T. hyalina** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) 163 et *Handb. of Irid.*  
191; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 205. **IXIA** — Linné f.,  
*Suppl. Pl.* (1781) 91. **I. FENESTRATA** Jacquin (non Thunberg), *Icon. Pl.  
Rar.* II (1786-93) t. 289. **TRITONIA** — Ker in *Bot. Mag.* (1803) t. 704. —  
Colonie du Cap. ♀

**T. Pottshii** Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 195; Klatt in Durand et Schinz,  
*Consp. Fl. Afric.* V 207. **MONTBRETIA** — Baker in *Bot. Mag.* (1883) t. 6722.  
— Gri-Koua, Natal, Transvaal. ♀

14. **SYNNOTIA** Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1826) t. 150; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7274*. — Cinq espèces de l'Afrique austr.

**S. bicolor** Sweet, *Hort. Brit.* ed. II (1830) 501; Baker, *Handb. of Irid.* 198; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 211. **GLADIOLUS** — Thunberg, *Diss. Gladiol.* (1781) n. 16 t. 2 fig. 1; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II t. 240. **IXIA** — Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 548; **SPARAXIS** — Ker in Koenig et Sims, *Annals of Bot.* I (1805) 225. — Colonie du Cap. 2

15. **GLADIOLUS** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 57 pr. p.; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7273*. — Genre d'environ 100 espèces habitant l'Europe centr., toute la Rég. Méditerr., l'Afrique trop. et austr. et les îles Mascareignes.

**G. atrovioleaceus** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 14 et *Fl. Or.* V 141. **G. ALEPPICUS** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 13. — Syrie, Perse, Arménie turque. 2

**G. Byzantinus** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3; *Bot. Mag.* (1805) t. 874; Reichenbach f., *Pl. Crit.* t. 643; Boissier, *Fl. Or.* V 139; Baker, *Handb. of Irid.* 193; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 214. — Europe et Asie Méditerr., Algérie. 2

**G. imbricatus** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 37; Marschall Bieberstein, *Cent. Pl. Ross. Merid.* t. 60; Reichenbach f., *Pl. Crit.* VI t. 599 et *Icon. Fl. Germ.* IX t. 350; Boissier, *Fl. Or.* V 141; Baker, *Handb. of Irid.* 199 pr. p. — Europe or., Asie occ. 2

**G. palustris** Gaudin, *Fl. Helv.* I (1828) 97 et VI 336; Sturm, *Deutschl. Fl.* IX t. 351; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 351; Parlatore, *Fl. Ital.* III 257; Baker, *Handb. of Irid.* 200. — Allemagne, Suisse, Autriche, Italie bor. 2

**G. Reuteri** Boissier, *Pugill. Pl. Nov. Hisp.* (1852) 112; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 140. **G. ILLYRICUS** Koch var. — Baker, *Handb. of Irid.* (1892) 200. — Portugal, Espagne. 2

16. **ANTHOLYZA** Linné, *Gen. Pl. ed. VI* (1764) n. 58; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7276*. — Genre d'environ 15 espèces de l'Afrique austr. et trop.

**A. Æthiopica** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 54; *Bot. Mag.* (1802) t. 561; Redouté, *Liliacées* II t. 110; Baker, *Handb. of Irid.* 230; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 228. **A. RINGENS** Andrews, *Bot. Repos.* III (1802) t. 210. — Colonie du Cap. 2

## CXLII. AMARYLLIDÉES

1. **NARCISSUS** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 286 : T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7281. — Environ 150 espèces décrites, mais 20 seulement bien distinctes de l'Europe temp. et mérid., Asie occ., centr. et or., Afrique boréale.

**N. biflorus** Curtis, *Bot. Mag.* (1792) t. 197 ; *Engl. Bot.* (1795) t. 276 ; Redouté, *Liliacées* III t. 160 ; Burbidge, *The Narcissus* t. 41 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 11. — Angleterre, France, Suisse, Italie, Tyrol. ♀

**N. Bulbocodium** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 289 ; *Bot. Mag.* (1789) t. 88 ; Redouté, *Liliacées* I t. 24 ; Burbidge, *The Narcissus* fig. 1<sup>a</sup> ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 2. — Portugal, Espagne, Algérie. ♀

— — var. **conspicuus** NOB. **NARCISSUS CONSPICUUS** D. Don in Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 2, IV (1836) t. 326 ; Burbidge, *The Narcissus* fig. 1<sup>c</sup>. **CORBULARIA** — Haworth, *Monog. Narciss.* (1831) n. 8. — Avec le type.

— — var. **Graëllsii** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 3. **CORBULARIA GRAELLSII** Webb in Bourgeau, *Pl. Hisp. Exsicc.* n. 228 et in Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I (1861) 150. — Castille.

— — var. **monophyllus** BAKER, *loc. cit.* (1888) 3 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 240. **CORBULARIA MONOPHYLLA** Durieu in Duchartre, *Rev. Bot.* II (1846-47) 425 et *Expl. Scient. Algérie* t. 47 fig. 3 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5833 ; Burbidge, *The Narcissus* fig. 2 et 23<sup>d</sup>. — Région Méditerran. (Europe et Asie), Algérie.

— — var. **nivalis** BAKER, *loc. cit.* (1888) 3. **N. NIVALIS** Graëlls, *Indicatio Pl. Nov.* (1854) 9 et *Ramill. Pl. Espanolas* (1859) 15 t. 6 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 150. — Espagne centr., Asturies.

**N. Jonquilla** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 290 excl. syn. ; *Bot. Mag.* (1787) t. 15 ; Redouté, *Liliacées* III t. 159 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IX t. 366 ; Burbidge, *The Narcissus* t. 40 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 10. — De l'Espagne à la Dalmatie ; Algérie. ♀

**N. juncifolius** Lagasca, *Gen. et Sp. Pl.* (1816) 13 ; Burbidge, *The Narcissus* t. 37<sup>a</sup> ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 154 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 6. — Espagne, Portugal, France mérid. ♀

— — var. **rupicola** BAKER, *loc. cit.* (1888) 7. **N. RUPICOLA** Dufour in Reimer et Schultes, *Sust. Veget.* VII (1829) 938 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 152 ; *Bot. Mag.* (1880) t. 6473<sup>c</sup>. **PHILOGYNE** — Reimer, *Syn. Ensati.* (1847) 211. **N. APODANTHUS** Boissier et Reuter, *Diagn. Pl. Nov. Hisp.* (1849) 25. **QUELTIA** — Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 356. — Portugal.

- Narcissus Pseudo-Narcissus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 289; *Engl. Bot.* (1791) t. 47; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 369; Burbidge, *The Narcissus* t. 8; Baker, *Handb. of Amaryll.* 3. — De l'Angleterre et de la Suède au Portugal et à la Transylvanie. ♀
- — subsp. **bicolor** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 4. N. BICOLOR Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 415; *Bot. Mag.* (1809) t. 1187. — Cette sous-espèce est inconnue à l'état spontané.
- — subsp. **minor** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 4. N. MINOR Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 415; *Bot. Mag.* (1788) t. 6; Redouté, *Liliacées* VIII t. 480; Burbidge, *The Narcissus* t. 5<sup>a</sup>. — Avec le type.
- — subsp. **moschatus** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 4. N. MOSCHATUS Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 415; *Bot. Mag.* (1810) t. 1300; Burbidge, *The Narcissus* t. 7. — Pyrénées, Espagne, Portugal.
- N. poeticus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 289; *Engl. Bot.* (1795) t. 275; Redouté, *Liliacées* III t. 160; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 364; Baker, *Handb. of Amaryll.* 11. — Europe centr. et mérid. ♀
- — subsp. **radiiflorus** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 12. N. RADII-FLORUS Salisbury, *Prodr. Stirp. Hort. Chapel Allerton* (1796) 225; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 364; Parlatore, *Fl. Ital.* III 118. — Alpes, Provence, Italie, Styrie. ♀
- — var. **stellaris** BAKER, *Handb. of Amaryll.* 11. N. STELLARIS Haworth, *Monogr. Narciss.* (1831) 15; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* II t. 132.
- N. serotinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 290; Desfontaines, *Fl. Atlant.* t. 82; Burbidge, *The Narcissus* t. 46; Parlatore, *Fl. Ital.* III 157; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 258; Boissier, *Fl. Or.* V 151. — Région Méditerran. de l'Espagne à la Grèce et à la Palestine. ♀
- N. Tazetta** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 290; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 358; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 23; Burbidge, *The Narcissus* t. 29; Boissier, *Fl. Or.* V 150; Baker, *Handb. of Amaryll.* 7. N. CANALICULATUS Gussone, *Enum. Pl. Insul. Inarim.* (1854) 329 t. 15. — Portugal?; Europe mérid., Afrique bor. ♀
- — var. **papyraceus** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 8. N. PAPYRACEUS Ker in *Bot. Mag.* (1806) t. 947; Jordan, *Icon. ad Fl. Europ.* t. 179; Parlatore, *Fl. Ital.* III 125. — Portugal, Espagne, France, Italie. ♀
- N. triandrus** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 416; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 152; Burbidge, *The Narcissus* t. 15<sup>a</sup>; Baker, *Handb. of Amaryll.* 5. ILLUS — Haworth, *Monogr. Narciss.* (1831) 4. — Espagne, Portugal. ♀
- — subsp. **calathinus** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 5. N. CALATHINUS Redouté, *Liliacées* III (1807) t. 177; Burbidge, *The Narcissus* t. 14.

2. **GALANTHUS** Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) n. 288 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7283. — Six espèces de l'Europe et de l'Asie occidentale.

**G. Elwesii** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1875) t. 6166 ; Regel in *Gartenflora* (1883) 151 cum icone ; Boissier, *Fl. Or.* V 145 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 17. — Asie-Mineure. ♀

**G. Imperati Bertoloni**, *Fl. Ital.* IV (1839) 5. **G. NIVALIS** Linné subsp. — Baker, *Handb. of Amaryll.* (1888) 17. **G. PLICATUS** Gussone (non Marschall Bieberstein), *Pl. Rar. Samn. et Aprut.* (1826) 140. — Italie bor. et mérid. ♀

Obs. Cette espèce présente dans les jardins une forme cultivée sous le nom de **G. MELVILLEI** Hort.

**G. nivalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 288 ; *Engl. Bot.* (1791) t. 19 ; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 3631 ; Boissier, *Fl. Or.* V 144 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 250 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 17. — Europe centr. et mérid., ailleurs natur. ♀

— — var. **Redoutei** Regel in *Gartenflora* (1874) 202 ; Boissier, *Fl. Or.* V 144. **G. REDOUTEI** Ruprecht ex Regel in *Gartenflora* (1863) 177 **G. NIVALIS** Redouté, *Liliacées* IV (1808) t. 200. — Caucase, Perse bor.

**G. plicatus** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 255 ; *Bot. Mag.* (1820) t. 2163 ; *Bot. Reg.* (1821) t. 545 ; Boissier, *Fl. Or.* V 145 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 18. **G. LATIFOLIUS** Salisbury, *Gen. Pl. Fragm.* (1866) 95 ; *Gartenflora* (1868) 130 t. 578. — Crimée, Dobrudsha. ♀

3. **LEUCOIUM** Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) n. 290 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7284. — Genre de 9 espèces de l'Europe occ., centr. et de toute la Région Méditerranéenne.

**L. æstivum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 414 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 621 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1210 ; Redouté, *Liliacées* III t. 135 ; Boissier, *Fl. Or.* V 143 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 19. — Europe occ., centr. et mérid., Asie occ. ♀

**L. autumnale** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 414 ; *Bot. Mag.* (1806) t. 960 ; Salisbury, *Parad. Londin.* t. 21 ; Boissier, *Fl. Or.* V 144 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 20. — Du Portugal et du Maroc aux îles Ioniennes. ♀

**L. hyemale** De Candolle, *Fl. Franç.* éd. 3 VI (1815) 326 ; Baker in *Bot. Mag.* (1883) t. 6711 et *Handb. of Amaryll.* 20. — France mérid. (Nice, Menton, Villefranche). ♀

**L. pulchellum** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806-07) t. 74 ; *Bot. Cab.* XV t. 1478 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 19. **L. HERNANDESI** Cambessedes in *Mém. Muséum Paris* XIV (1827) 315. — Sardaigne, Baléares. ♀

**Leucoium roseum** Martin, *Bibl. Physic. Econom.* (1804) 344; Loiseleur, *Fl. Gall.* I 190 t. 8; Reichenbach f., *Pl. Crit.* VIII t. 704; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 251; Baker, *Handb. of Amaryll.* 20. — Corse, Sardaigne. Ț

**L. trichophyllum** Schousboë, *Jagttagelser over Vextriget i Marokko* (1800) 154; *Bot. Reg.* (1821) t. 544; Reichenbach f., *Pl. Crit.* VIII t. 703; Baker, *Handb. of Amaryll.* 49; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 242. — Espagne, Portugal, Maroc, Algérie. Ț

4. **LAPIEDRA** Lagasca, Gen. et Sp. Nov. Diagn. (1816) 14;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 7285. — Genre monotype.

**L. Martinezii** Lagasca, Gen. et Sp. Nov. Diagn. (1816) 14; Boissier, *Voy. Bot. Espagne* t. 171; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I t. 47; Baker, *Handb. of Amaryll.* 21. — Espagne mérid. Ț

5. **STERNBERGIA** Waldstein et Kitaibel, Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung. II (1805) 172 t. 159; T. Durand, Ind. Gen. n. 7288.  
— Genre de 12 espèces de l'Europe or. et de l'Asie Méditerr.

**S. colchiciflora** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* II (1805) 172 t. 159; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 311; *Bot. Reg.* (1837) t. 2008; Reichenbach f., *Icon. Fl. Germ.* IX t. 372; Boissier, *Fl. Or.* V 147; Baker, *Handb. of Amaryll.* 28. — Sicile, Europe or., Asie-Mineure, Caucase. Ț

**S. lutea** Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 795; Boissier, *Fl. Or.* V 147; Baker, *Handb. of Amaryll.* 29. **AMARYLLIS LUTEA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 292; *Bot. Mag.* (1829) t. 2901; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 310. — Toute la Région Méditerr.; Caucase, Perse. Ț

6. **CHLIDANTHIUS** Herbert, Append. Treat. Bulb. Roots (1821) 46; T. Durand, Ind. Gen. n. 7294. — Genre de 3 espèces de l'Amérique austr.

**C. fragrans** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1829) 46 et *Amaryll.* (1837) 190 t. 27 fig. 2; Lindley, *Collect. Bot.* t. 34; *Bot. Reg.* (1822) t. 640; *Fl. des Serres* IV (1848) t. 326; Baker, *Handb. of Amaryll.* 28. — Andes du Pérou et de l'Équateur. Ț

7. **ZEPHYRANTHES** Herbert, *Append. Treat. Bulb. Roots* (1821) 30 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7296*. — Genre de 30 espèces de l'Amérique subtrop. et trop.

**Z. candida** Herbert in *Bot. Mag.* (1825) t. 2607 et *Amaryll.* (1837) 176 t. 24 fig. 2 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XV t. 1419 ; Bury, *Hexandr. Pl.* t. 25 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 34. AMARYLLIS — Lindley in *Bot. Reg.* IX (1823) t. 724. — Argentine, La Plata. ♀

8. **SPREKELIA** Heister, *Descr. Nov. Gen. Brunsvigiæ* (1753) 19 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7297*. — Genre monotype.

**S. formosissima** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 35 et *Amaryll.* 134 t. 44 fig. 41 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard. ser. 2* t. 144 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 507 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 38. AMARYLLIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 293 ; *Bot. Mag.* (1788) t. 47 ; Redouté, *Liliacées* I t. 5 ; Bury, *Hexandr. Pl.* I t. 6. — Mexique, Guatemala. ♀

— var. **glauca** BAKER, *Handb. of Amaryll.* (1888) 38. **S. GLAUCA** Lindley in *Bot. Reg.* (1841) t. 6. — Avec le type. ♀

9. **GRIFFINIA** Ker in *Bot. Reg.* (1820) sub t. 444 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7300*. — Sept ou huit espèces du Brésil.

**G. hyacinthina** Ker in *Bot. Reg.* (1820) sub t. 444 ; Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 21 ; Bury, *Hexandr. Pl.* t. 14 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 60. AMARYLLIS — Ker in *Bot. Reg.* (1816) t. 163. — Brésil. ♀

10. **CRINUM** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 245 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7301*. — Genre d'environ 80 espèces bien distinctes de l'Amérique bor., de l'Asie et de l'Afrique trop. et austr.

**C. giganteum** Andrews, *Bot. Repos.* III (1801) t. 169 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 181 ; Bury, *Hexandr. Pl.* t. 17 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 91 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 248. AMARYLLIS — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, II (1811) 226. **A. ORNATA** Ker in *Bot. Mag.* (1806) t. 923. — Afrique centr. et trop.-occ. ♀

**C. longifolium** Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* (1794) 59 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 93 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 249. AMARYLLIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 293 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 347 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 661. **C. CAPENSE** Herbert, *Amaryll.* (1837) 269. **C. ROSEUM** Ecklon ex M. Rœmer, *Syn. Ensatis* 84 (nomen). — Colonie du Cap, Natal. ♀

**Crinum pedunculatum** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holland.* (1810) 297 ; *Bot. Reg.* (1815) t. 52 ; Bury, *Hexandr. Pl.* t. 11 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI (1873) 455 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 77. C. AUSTRALE Donn, *Hort. Cantabrig.* ed. VI (1811) 83. — Australie or., Timor, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Guinée, Tahiti, île Lord-Howe. ♀

11. AMARYLLIS Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 289 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7302. — Genre monotype.

**A. Belladonna** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 293 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 733 ; Redouté, *Liliacées* III t. 180 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 95 ; Klatt in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 252. — Colonie du Cap. ♀

12. LYCORIS Herbert, *Append. Treat. Bulb. Roots* (1821) 20 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7304. — Genre de 4 espèces du Japon, de la Chine et de l'Asie centr.

**L. aurea** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 20 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 40. AMARYLLIS — L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 14 ; *Bot. Mag.* (1798) t. 409. — Chine, Formose. ♀

**L. radiata** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 20 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 40. AMARYLLIS — L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 15 ; Andrews, *Bot. Repos.* I t. 25 ; *Bot. Reg.* (1822) t. 596. NERINE JAPONICA Miquel, *Prol. Fl. Jap.* (1865-67) 71. — Chine, Japon. ♀

13. BRUNSVIGIA Heister, *Descr. Nov. Gen. Brunsvigia* (1753) 3 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7305. — Genre de 9 espèces de l'Afrique austr.

**B. Josephinæ** Ker in *Bot. Reg.* (1817) t. 192-93 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 97 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 254. AMARYLLIS — Delile in Redouté, *Liliacées* VII (1813) t. 370-72. — Colonie du Cap, Cafrerie, Orange, Natal. ♀

14. NERINE Herbert in *Bot. Mag.* (1820) t. 2124 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7306. — Genre de 9 espèces de l'Afrique austr.

**N. curvifolia** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 19 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 100 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 255. AMARYLLIS — Jacquin, *Hort. Schænbr.* I (1797) 33 t. 64 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 725 ; Redouté, *Liliacées* V t. 274. — Colonie du Cap. ♀

**N. Sarniensis** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 19 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 99 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 256. AMARYLLIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 293 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* t. 66 ; *Bot. Mag.* (1795) t. 294 ; Redouté, *Liliacées* I t. 35. — Colonie du Cap. ♀



15. **VALLOTA** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 29 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7308. — Genre monotype.

**V. purpurea** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 19 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 53 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 258. **AMARYLLIS** — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 417 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1430. — Colonie du Cap. 2

16. **CYRTANTHUS** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 414 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7309. — Genre de 15 espèces de  
l'Afrique trop. et austr.

**C. obliquus** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 414 ; Andrews, *Bot. Repos.* IV t. 265 ; *Bot. Reg.* (1827) t. 1133 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 54 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 260. **CRINUM** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 195. — Colonie du Cap. 2

17. **CLIVIA** Lindley, *Bot. Reg.* XIV (1828) t. 1182 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7310. — Genre de 3 espèces.

**C. Gardeni** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1856) t. 4895 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 62 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 262. — Natal, Transvaal. 2

**C. miniata** Regel in *Gartenflora* (1864) 131 t. 434 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 62 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 262. **IMANTOPHYLLUM** — Hooker f. in *Bot. Mag.* (1854) t. 4783 ; *Fl. des Serres* (1853-54) t. 949-50 et (1880) t. 2373-74. — Natal. 2

Obs. L'**IMANTOPHYLLUM CYRTANTHIFLORUM** Van Houtte, *Fl. des Serres* (1869-70) t. 1877 est un hybride des **C. NOBILIS** × **MINIATA**.

**C. nobilis** Lindley in *Bot. Reg.* (1828) t. 1182 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 61 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 262. **IMANTOPHYLLUM AITONI** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1828) t. 2856. — Colonie du Cap. 2

18. **HÆMANTHUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. 1 (1737) n. 276 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7311. — Genre de 50 ou 60 espèces de l'Afrique trop. et austr.

**H. albiflos** Jacquin, *Hort. Schœnbr.* I (1797) 31 t. 59 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1239 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 398 ; Loddiges, *Bot. Cab.* VII t. 602 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 68 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 263. — Colonie du Cap. 2

**H. carneus** Ker in *Bot. Reg.* (1821) t. 509 ; *Bot. Mag.* (1834) t. 3373 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 67 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 263. — Colonie du Cap (partie or.). 2

**Hæmanthus multiflorus Martyn**, *Monogr. cum icone ex Willdenow*, *Sp. Pl.* II (1800) 25 ; *Bot. Mag.* (1806) t. 961 et (1818) t. 1995 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 204 ; Loddiges, *Bot. Cab.* X t. 912 et XX t. 1948 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 63 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 263. H. KALBREYERI Baker in *Gard. Chron.* (1878) II 202 ; *Fl. des Serres* (1880) t. 2377. — Toute l'Afrique trop. ♀

**H. Natalensis Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1863) t. 5378 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 66 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 266. — Natal. ♀

**H. pubescens Linné f.**, *Suppl. Pl.* (1781) 193 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 73 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 266. H. QUADRIVALVIS Jacquin, *Hort. Schœnbr.* I (1797) 30 t. 58 ; *Bot. Mag.* (1813) t. 1523. — Colonie du Cap. ♀

**H. puniceus Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 325 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 320 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1315 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 65 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 266. — Colonie du Cap. ♀

**H. tigrinus Jacquin**, *Hort. Schœnbr.* I (1797) 29 t. 56 ; *Bot. Mag.* (1815) t. 1705 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 72 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 267. — Colonie du Cap. ♀

19. **EUCHARIS Planchon** in *Fl. des Serres* VIII (1852-53) 107 t. 788 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7317. — Genre de 4 esp. de la Colombie et du Pérou.

**E. candida Planchon** in LINDEN, *Catal.* n. 8 (1853) 3 et in Van Houtte, *Fl. des Serres* VIII (1853) 107 t. 788 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 110. — Andes de la Colombie. ♀

**E. grandiflora Planchon** in VAN HOUTTE, *Fl. des Serres*, sér. 1, IX (1853-54) 253 t. 957 ; *Bot. Mag.* (1857) t. 4971 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 110. E. AMAZONICA Linden in *Illustr. Hort.* XXXVIII (1881) 30. — Andes de la Colombie. ♀

**E. Sanderii Baker** in *Bot. Mag.* (1883) t. 6676 et (1885) t. 6831 (var.) ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 111. — Andes de la Colombie. ♀

20. **EUSTEPHIA Cavanilles**, *Icon. Pl. Rar.* III (1794) 20 t. 238 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7319. — Genre monotype.

**E. coccinea Cavanilles**, *Icon. et Descr. Pl.* III (1794) 20 t. 238 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 112. PLEDRANASSA RUBRO-VIRIDIS Baker in *Gard. Chron.* (1875) II 7. — Andes du Pérou. ♀

21. URCEOLINA Reichenbach, *Consp. Regn. Veget.* (1826) 61 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7320. — Genre de 5 espèces des Andes de l'Amérique austr.

**U. miniata** Benthām in BENTHAM et HOOKER F., *Gen. Pl.* III (1883) 732 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 111. PENTLANDIA — Herbert in *Bot. Reg.* (1839) t. 68. SPHÆROTHELE COCCINEA Link, Klotzsch et Otto, *Icon. Pl. Rar. Hort. Berol.* (1841-44) t. 38. — Andes du Pérou et de la Bolivie. 2

**U. pendula** Herbert, *Amaryll.* (1837) 193 ; *Bot. Mag.* (1864) t. 5464 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 110. CRINUM URCEOLATUM Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 88 t. 287 fig. b. U. AUREA Lindley in *Gard. Chron.* (1864) 627. — Andes du Pérou. 2

22. PHÆDRANASSA Herbert in *Bot. Reg.* (1845) misc. n. 23 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7321. — Genre de 4 espèces des Andes de l'Amérique austr.

**P. chloracra** Herbert in *Bot. Reg.* (1845) misc. 23 t. 17 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 107. PHYCELLA — Herbert in *Amaryll.* (1837) 155. PHYCELLA OBTUSA Herbert in *Bot. Reg.* (1844) misc. n. 93 et (1845) sub t. 17. — Andes de l'Équateur. 2

**P. eucrosioides** Benthām et Hooker, *Gen. Pl.* III (1883) 733. — Équateur. 2

23. STENOMESSION Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 40 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7322. — Genre d'une vingtaine d'espèces de l'Amérique trop.

**S. aurantiacus** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 49 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 113. PANCRATIUM — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp.* I (1815) 280. S. HARTWEGII Lindley in *Bot. Reg.* (1844) t. 42. — Andes de l'Équateur. 2

24. PANCRATIUM Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 101 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7323. — Genre d'une douzaine d'espèces des îles Canaries, de la Rég. Méditerran. et de l'Inde.

**P. collinum** Cosson et Durieu in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, I (1854) 228 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 118 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 268. — Algérie. 2

**P. maritimum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 291 ; Redouté, *Liliacées* I t. 8 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 309 ; Boissier, *Fl. Or.* V 152 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 118 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 268. — Toute la Région Méditerran. (Europe, Asie et Afrique). 2

**Pancratium parviflorum** Decaisne (non Desfontaines) in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, IV (1835) 346 ; Boissier, *Fl. Or.* V 152. — Syrie. Ț

25. **HYMENOCALLIS** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) 338 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7324. — Genre de 30 espèces de l'Amérique bor. et trop.

**H. adnata** Herbert, *Amaryll.* (1837) 215 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 677 (var. ♂ et ♀). **PANCRATIUM MEXICANUM** Lindley (non Linné) in *Bot. Reg.* (1825) t. 940. **H. LITTORALIS** Salisbury var. **ACUTIFOLIA** Hooker in *Bot. Mag.* (1826) t. 2621. — Mexique, Indes occ., Amérique centr. Ț

Obs. Baker (*Handb. of Amaryll.* 123) réunit cette espèce au polymorphe **H. LITTORALIS** Salisbury.

**H. Amancaes** Nicholson, *Dict. Gard.* II (1889) 465 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 129. **NARCISSUS** — Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 53 fig. 281. **PANCRATIUM** — Ker in *Bot. Mag.* (1809) t. 1224 ; *Bot. Reg.* (1822) t. 660. **ISMENE** — Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 46. — Pérou. Ț

**H. crassifolia** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 44 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 125. **PANCRATIUM** — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1830) 921 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 331. **H. CORONARIUM** Leconte in *Ann. Lyc. N.-York* III (1828-36) 145 t. 4 fig. 7-9. — États-Unis mérid. Ț

**H. lacera** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) 338 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 127. **PANCRATIUM ROTATUM** Ker in *Bot. Mag.* (1803) t. 827 ; Lodiges, *Bot. Cab.* (1817) t. 49 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 357. — États-Unis mérid. Ț

26. **EURYCLES** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) 337 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7327. — Deux espèces de l'Australie et de l'Archipel Malais.

**E. Amboinensis** Lindley in Loudon, *Encycl. of Pl.* (1829) 242. **PANCRATIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 291 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1419 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 384. **E. SYLVESTRIS** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) 337 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 130. — De la péninsule Malaise et des îles Philippines à l'Australie bor. Ț

**E. Cunninghamii** Aiton ex Loudon, *Hort. Brit. Suppl.* I (1832) 588 ; *Bot. Mag.* (1835) t. 3399 ; *Bot. Reg.* (1832) t. 1506 ; Bentham, *Fl. Austral.* VI 456 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 131. — Queensland, Nouvelles-Galles du sud. Ț

27. **CALOSTEMMA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 297 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7328. — Trois espèces de l'Australie.

**C. purpureum** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 298 ; *Bot. Mag.* (1820) t. 2200 ; *Bot. Reg.* (1820) t. 422 ; *Fl. des Serres* XI (1856) 127 t. 1135 ; Benth., *Fl. Austral.* VI 457 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 131. — Australie mérid., Nouvelles-Galles du Sud. ♀

28. **IXIOLIRION** Fischer ex Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 37 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7329. — Deux ou trois espèces de l'Asie occ. et centr.

**I. montanum** Herbert, *App. Treat. Bulb. Roots* (1821) 37 et *Amaryll.* 125 t. 20 fig. 3 ; Boissier, *Fl. Or.* V 154 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 132. **AMARYLLIS** — Labillardière, *Icon. Pl. Syr.* II (1791) 5 t. 1 ; Redouté, *Liliacées* V t. 241. — Asie occ. (de la Palestine à la Mésopotamie et à la Perse). ♀

**I. Pallasii** Fischer et Meyer in LEDEBOUR, *Fl. Ross.* IV (1853) 116 ; Regel in *Gartenflora* (1873) t. 775 et (1877) t. 910 ; Boissier, *Fl. Or.* V 154. **I. MONTANUM** Herbert var. — Baker, *Handb. of Amaryll.* (1888) 132. — Région Caspienne, Turkestan, Songarie, Sibérie ouralienne. ♀

29. **BOMAREA** Mirbel, *Hist. Nat. Pl.* IX (1804) 71 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7331. — Genre d'environ 60 espèces du Mexique et de l'Amérique centr. et austr.

**B. Carderi** Masters in *Gard. Chron.* (1876) I 793 et 795 fig. 143 ; *Floral Mag.* new ser. (1876) t. 239 ; Regel in *Gartenflora* (1879) 82 et 84 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 155. — Andes de la Nouvelle-Grenade. ♀

**B. edulis** Herbert, *Amaryll.* (1837) 111 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 154. **ALSTROEMERIA** — Tussac, *Fl. Antill.* I (1808) 109 t. 14 ; Andrews, *Bot. Repos.* X t. 649. **A. SALSILLA** Ker (non Linné) in *Bot. Mag.* (1814) t. 1615. — Amérique trop. (Cuba et du Mexique au Pérou et au Brésil mérid.) ♀

**B. frondea** Masters in *Gard. Chron.* (1882) I 668 fig. 102 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 157. — Andes de la Nouvelle-Grenade. ♀

**B. oligantha** Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 648 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 151. — Andes du Pérou. ♀

**B. Patacensis** Herbert, *Amaryll.* (1837) 120 t. 14 fig. 3 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 6692 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 157. **B. CONFERTA** Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 259 ; Masters in *Gard. Chron.* (1882) I 186. — Andes de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade. ♀

**Bomarea Shuttleworthii Masters** in *Gard. Chron.* (1882) I 76 t. 77 et 85 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 156. — Andes de la Nouvelle-Grenade. 2

**B. Williamsiae Masters** in *Gard. Chron.* (1882) II 553 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 156. — Nouvelle-Grenade. 2

30. **BRAVOA** La Llave et Lexarza, *Nov. Veget. Descr.* I (1824) 6 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7335. — Genre de 2 ou 3 espèces du Mexique.

**B. geminiflora Lexarza** in LA LLAVE et LEXARZA, *Nov. Veget. Descr.* I (1824) 6 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4741 ; Herbert, *Amaryll.* 124 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 160. **CÆTOCAPNIA** — Link et Otto, *Icon. Pl. Hort. Berol.* (1828-31) 33 t. 18. — Mexique austr. 2

31. **BESCHORNERIA** Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 844 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7336. — Genre de 3 ou 4 espèces du Mexique.

**B. Decosteriana Baker** in *Bot. Mag.* (1884) t. 6768 et in *Handb. of Amaryll.* 162. — Mexique. 2

**B. yuccoides Hooker** in *Bot. Mag.* (1860) t. 5203 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 162. — Mexique. 2

32. **AGAVE** Linné, *Hort. Upsal.* (1748) 87 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7337. — Plus de 150 espèces décrites, mais environ 50 seulement bien distinctes habitant l'Amérique subtrop. et tropicale.

**A. asperrima Jacobi** in *Hamb. Gartenz.* XX (1864) 561 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVIII 162 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 173. — Mexique. 2

**A. atrovirens Karwinski** in SALM-DYCK, *Hort. Dyck.* (1834) 302 et in *Bonplandia* (1859) 87 ; Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 55 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 174. **A. SALMIANA** Otto in Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeit.* (1842) 51 ; *Rev. Hort.* (1873) 373 t. 40-41. — Mexique. 2

**A. dasylirioides Jacobi** et Bouché in *Hamb. Gartenz.* XXI (1865) 344 ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5716 ; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 577 fig. 111 et *Handb. of Amaryll.* 185. **A. DEALBATA** Lemaire ex Jacobi, *loc. cit.* (1865) 346. — Mexique. 2

**A. densiflora Hooker** in *Bot. Mag.* (1857) t. 5006 ; Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 123 et 247 ; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 490 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 183. — Mexique. 2

- Agave filifera** Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* (1834) 309; Lemaire in *Illustr. Hort.* (1860) t. 243; Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 35; Baker in *Gard. Chron.* (1877) I 303 fig. 49 et *Handb. of Amaryll.* 166. — Mexique. 2
- A. heteracantha** Zuccarini in *Nov. Acta Acad. Nat. Cur.* XVI 2 (1833) 675; Kunth, *Enum. Pl.* V 836; Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 41; Regel in *Gartenflora* XIX (1870) 4 t. 639; Baker, *Handb. of Amaryll.* 168. — Texas, Mexique bor. 2
- A. Kerchovei** Lemaire in *Illustr. Hort.* XI (1864) 64; Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 215; Baker in *Gard. Chron.* (1877) I 567 fig. 78 et *Handb. of Amaryll.* 169. — Mexique. 2
- A. lophantha** Schiede in *Linnaea* IV (1829) 582; C. Koch in *Wochenschrift* (1860) 46; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 264 et *Handb. of Amaryll.* 167. — Mexique. 1
- A. macroacantha** Zuccarini in *Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* XVI 2 (1833) 676; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 137 fig. 27 et *Handb. of Amaryll.* 177. A. BESSERIANA De Smet ex Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXI (1865) 155; *Bot. Mag.* (1871) t. 5940. — Mexique austr. 1
- A. marmorata** Rœzl in Ed. MORREN, *Belg. Hort.* (1883) 238; Baker, *Handb. of Amaryll.* 179 — Mexique.
- A. Mexicana** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 52 (excl. var.  $\beta$ ); Jacobi, *Vers. Syst. Ord. Agave* 99 et 304; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 201 et *Handb. of Amaryll.* 180; Ricasoli in *Gard. Chron.* (1883) I 142 fig. 22. — Mexique. 2
- A. mitis** Martius, *Delect. Sem. Hort. Monac.* (1848) 4; Salm-Dyck in *Bonplandia* VII (1859) 93; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 717 fig. 137; Saunders, *Refug. Bot.* V t. 327 et *Handb. of Amaryll.* 191. — Mexique. 2
- A. polyacantha** Haworth, *Revis. Pl. Succ.* (1821) 35; C. Koch in *Wochenschrift* (1860) 38; Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXI (1865) 62; Baker in *Gard. Chron.* (1871) I 490 et *Handb. of Amaryll.* 183. A. XALAPENSIS Rœzl ex Jacobi, *loc. cit.* XXI (1865) 61. — Mexique. 2
- A. rigida** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 8; Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XX (1865) 83; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 397 et *Handb. of Amaryll.* 181. A. HOULLETHI Hort. Par. ex Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXII (1866) 268. — Mexique. 2
- A. Scolymus** Karwinski in SALM-DYCK, *Hort. Dyck.* (1834) 307; Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXI (1865) 83; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 328 in *Gard. Chron.* (1877) II 40 et *Handb. of Amaryll.* 176. A. VERSCHAFFELTHI Lemaire ex Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXI (1865) 122. — Mexique. 2
- A. striata** Zuccarini in *Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* XVI 2 (1833) 678; Kunth, *Enum. Pl.* V 832; *Bot. Mag.* (1851) t. 4590; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 556 et *Handb. of Amaryll.* 184. — Mexique. 2

**Agave Utahensis** Engelm. in S. WATSON, *Bot. King's Exped.* (1871) 497 ; Baker in *Gard. Chron.* (1877) II 137 et *Handb. of Amaryll.* 177. — Utah, Arizona.

**A. variegata** Jacobi in *Hamb. Gartenzeit.* XXI (1863) 439 ; Engelman in *Proc. Amer. Acad. Sc.* XVIII 161 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 326, in *Gard. Chron.* (1877) II 808 et *Handb. of Amaryll.* 196. — Mexique. ʒ

**A. Victoriae-Reginae** T. Moore in *Gard. Chron.* (1875) II 485 cum xylogr. ; *Fl. des Serres* XXI 169 cum xylogr. ; Engelm. in *Gard. Chron.* (1882) II 841 fig. 148 et 149 ; Baker in *Gard. Chron.* (1877) 528 et *Handb. of Amaryll.* 169. A. CONSIDERANTI Carrière in *Revue Hort.* (1875) 429 fig. 68. — Mexique. ʒ

**A. Wildingii** Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* II (1890) t. 32 ; Baker, *Handb. of Amaryll.* 187. — Mexique. ʒ

**A. xylonacantha** Salm-Dyck in *Bonplandia* VII (1859) 92 ; *Bot. Mag.* (1867) t. 5660 ; Baker in *Gard. Chron.* (1877) I 527 fig. 81 et *Handb. of Amaryll.* 168. A. XYLCANTHA Jacobi in *Jahresber. Schles. Gesell.* XLVI (1869) 141. — Mexique. ʒ

### CXLIII. TACCACÉES

1. **TACCA** Forster, *Char. Gener.* (1776) 65 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7342. — Genre de 10 espèces habitant la région trop. de l'ancien et du nouveau monde.

**T. cristata** W. Jack, *Malayan Pl.* in HOOKER, *Bot. Miscell.* II (1831) 73 ; Miquel, *Fl. Ind. Bat.* III 578 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI (1892) 287. ATACCIA — Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 466 ; Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 186 et 187 ; *Fl. des Serres* IX (1853) t. 860 et 861. — Singapore, Pulo-Pinang. ʒ

### CXLIV. DIOSCORÉACÉES

1. **BORDEREA** Miégeville in *Bull. Soc. Bot. France* XIII (1866) 374 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7344. — Genre monotype.

**B. Pyrenaica** Miégeville in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XIII (1866) 374. DIOSCOREA — Bubani et Bordère ex Grenier in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XIII (1866) 382. — Pyrénées or. et centr. ʒ



2. **DIOSCOREA** Plumier ex Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) 306 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7345. — Environ 150 espèces bien distinctes répandues dans la région trop. de l'ancien et du nouveau monde.

**D. discolor** Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 334. **D. ILLUSTRATA** Hort. ex Gard. Chron. (1873) 1371 fig. 345. — Brésil (Rio-Grande do Sul). 2

**D. rupicola** Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 378 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 275. **TESTUDINARIA** — Ecklon mss. (1837) ex Kunth, *loc. cit.* — Colonie du Cap. 2

3. **TESTUDINARIA** Salisbury in Burchell, Travels Interior South Africa II (1824) 147 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7346. — Deux espèces de l'Afrique austr.

**T. elephantipes** Burchell, *Trav. Inter. S. Afr.* II (1824) 147 ; *Bot. Reg.* (1825) t. 921 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 441. **TAMUS** — L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 29 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1347. **DIOSCOREA ELEPHANTOPUS** Sprengel, *Sylt. Veget.* IV cur. post. (1827) 143. — Colonie du Cap. 2

## CXLV. LILIACÉES

1. **RUSCUS** Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) 313 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7359. — Genre de 3 espèces habitant l'Europe, toute la Rég. Méditerr., le Caucase et Madère.

**R. hypoglossum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1041 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* X t. 955 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 969 ; Boissier, *Fl. Or.* V 341. **R. HYPOPHYLLUM** Linné, var. — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1787) 526 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 630. — Europe centr., mérid. et or., Bithynie. 5

**R. hypophyllum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1041 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 275 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 630 ; Boissier, *Fl. Or.* V 341 ; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algér.* (monoc.) 51 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 280. — Région Méditerr. ; Açores, Madère, Autriche, Caucase. 5

2. **DANAË** Medicus, *Malven Familie* (1787) 72 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7361. — Genre monotype.

**D. racemosa** Moench, *Method. Pl. Marburg.* (1794) 170 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 277 ; Boissier, *Fl. Or.* V 341 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 631. **SMILAX** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1471 ; Gärtner, *De Fruct. et Semin.* I 60 t. 16 fig. 8. **LAURUS** — Medicus, *Malv. Fam.* (1787) 72. — Archipel Grec, Caucase, Perse.  $\frac{1}{2}$

3. **ASPARAGUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 93 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7362. — Genre d'environ 110 espèces bien distinctes habitant les régions temp. et trop. de l'ancien monde.

**A. falcatus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 313 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 71 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 626 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 284. **A. ÆTHIOPICUS** Linné var. **TERNIFOLIUS** Baker in Saunders, *Refug. Bot.* IV (1871) t. 261 et in *Gard. Chron.* (1872) 1537 cum icone. — Afrique austr. et trop.  $\frac{1}{2}$

**A. lucidus** Lindley in *Bot. Reg.* (1844) misc. 29 ; Bentham, *Fl. Hongkong.* 371 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 72 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 605. **A. FALCATUS** Thunberg (non Linné), *Fl. Japon.* (1789) 139. — Japon, Amoy, Macao, Formose, Hong-Kong.  $\frac{1}{2}$

**A. medeoloides** Thunberg, *Prodr. Fl. Capens.* (1794) 66 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5384 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 627 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 285. **DRACENA** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 203. **MEDEOLA ASPARAGOIDES** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 339 ; Redouté, *Liliacées* VIII t. 442. — Afrique austr. et austr.-or.  $\frac{1}{2}$

**A. plumosus** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 613 ; *Gartenflora* (1880) 339 et 341 cum icone ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 287. — Colonie du Cap, Cafrerie, Natal.  $\frac{1}{2}$

— — var. ? **tenuissimus** Nob. **A. TENUISSIMUS** J. Veitch, *Catal.* (1882) 16 ; *Belg. Hort.* (1883) 328. — Afrique austr.

4. **LAPAGERIA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 64 t. 297 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7365. — Genre monotype.

**L. rosea** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 65 t. 297 ; *Bot. Mag.* (1849) t. 4447. **PHILESIA** — D. Dietrich, *Syn. Pl.* II (1840) 1122. — Chili.  $\frac{1}{2}$

5. **PHILESIA** Commerson ex Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 41 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7366. — Genre monotype.

**P. Magellanica** J.-F. Gmelin, *Syst. Nat.* (1767) 1012. *P. BUXIFOLIA* Lamarck ex Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 269 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4738 ; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 41 t. 873 ; *Illustr. Hort.* (1854) t. 3. — Détroit de Magellan, Chili austr. ♀

6. **LUZURIAGA** Ruiz et Pavon, *Fl. Peruv. et Chil.* III (1802) 65 t. 298 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7367. — Genre de 3 espèces du Chili, de Magellan et de la Nouvelle-Zélande.

**L. erecta** Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 280 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 574. *CALLIXENE POLYPHYLLA* Hooker, *Icon. Pl.* VII (1844) t. 674 ; *Bot. Mag.* (1869) t. 5192. — Patagonie, Terre-de-Feu, île Falkland. ♀

**L. marginata** Benthham et Hooker, *Gen. Pl.* III (1883) 768. *CALLIXENE* — Commerson ex Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 41 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* t. 248 ; Gaudichaud in *Annal. Sc. Nat.* V 169 t. 2 fig. 2 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 593. — Patagonie, Terre-de-Feu, île Falkland. ♀

7. **POLYGONATUM** Adanson, *Fam. des Plantes* II (1768) 54 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7371. — Genre d'une quinzaine d'espèces habitant la région temp. de l'hémisphère bor.

**P. biflorum** Elliott, *Sketch Bot. S. Carol.* I (1821) 393 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 525 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 556. *CONVALLARIA* — Walter, *Fl. Carol.* (1788) 122. *P. PUBESCENS* Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 234. *CONVALLARIA* — Willdenow, *Hort. Berol.* I (1816) 45. — Amérique bor.-or. ♀

**P. giganteum** A. Dietrich in Otto et Dietrich, *Gartenzeit.* III (1835) 22 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 136 ; A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. Stat.* ed. VI 525. *P. THUNBERGH* Morren et Decaisne in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, II (1834) 312. *P. LATIFOLIUM* Desfontaines var. *COMMUTATUM* Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 555. — Japon, Amérique bor.-oc. ♀

**P. latifolium** Desfontaines in *Annal. Mus. Paris* IX (1807) 50 ; Redouté, *Liliacées* V t. 243 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 138 ; Boissier, *Fl. Or.* V 332 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 554. *CONVALLARIA* — Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III (1775) 18 t. 232 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 434. — Autriche, Dalmatie, bassin du Danube, Russie centr. et austr., Japon. ♀

**P. oppositifolium** Boyle, *Illustr. Bot. Himal. Mount.* I (1839) 380 ; *Bot. Mag.* (1836) t. 3529 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI (1892) 320. *CONVALLARIA* — Wallich in *Asiat. Research.* XIII (1820) 380 cum icone ; Loddiges, *Bot. Cab.* VII t. 640 ; *Bot. Mag.* (1836) t. 3529. — Nepaul, Sikkim, Khasia, Assam. ♀

8. **ASPIDISTRA** Ker in *Bot. Reg.* (1822) t. 628 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7382. — Genre de 3 espèces habitant l'Himalaya, la Chine et le Japon.
- A. punctata** Lindley in *Bot. Reg.* (1826) t. 977; *Bot. Mag.* (1863) t. 5386; Nicholson et Mottet, *Dict. d'Hortic.* I 254. **A. ELATIOR** Hort. — Japon. 2  
Obs. La forme panachée, var. **VARIEGATA** Hort., est souvent cultivée.
9. **HEMEROCALLIS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 98 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7386. — Cinq espèces de l'Europe centr. et de l'Asie temp.
- H. Dumortieri** Ch. Morren in *Belg. Hortic.* II (1854) 195 t. 43 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 213 et in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 359. **H. RUTILANS** Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Sibérie or., Japon. 2
- H. Middendorffii** Trautvetter et Meyer in *Middendorff's Reise Sibiriens* (Fl. Ochotensis) I 2 (1856) 94 ; Regel in *Gartenflora* XV (1866) 292 t. 522. — Bassin de l'Amour. 2
- H. minor** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 873 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 358. **H. GRAMINEA** Andrews, *Bot. Repos.* (1802) t. 244 ; Kunth, *Enum. Pl.* V 588. — Sibérie, Japon, ? Chine. 2
10. **PHORMIUM** Forster, *Char. Gener.* (1776) 47 t. 24 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7387. — Deux espèces de la Nouvelle-Zélande et de l'île Norfolk.
- P. tenax** Forster, *Char. Gener.* (1776) 48 ; Redouté, *Liliacées* VIII t. 448-49 ; *Bot. Mag.* (1832) t. 3199 ; Hooker f., *Handb. N. Zeal. Fl.* (1864) 286 et 744. — Nouvelle-Zélande ; île Norfolk. 2
11. **FUNKIA** Sprengel, *Zweite Anleit. Kennt. Gewächse* II 1 (1817) 246 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7389 sub *Hosta*. — Quatre ou cinq espèces de la Chine et du Japon.
- F. lancifolia** Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 41 ; Sweet, *Flow. Gard.* II t. 273. **HEMEROCALLIS** — Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 335 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XVII t. 1658. *Hosta* — Trattinick *Arch. Gewächse.* (1812) 89 in obs. **F. ALBO-MARGINATA** Hooker in *Bot. Mag.* (1838) t. 3657. — Japon. 2
- F. Sieboldiana** Hooker in *Bot. Mag.* (1838) t. 3663. **HEMEROCALLIS CORDATA** Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 143. **H. SIEBOLDI** Loddiges, *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1869. **FUNKIA** — Lindley in *Bot. Reg.* (1839) t. 50. — Japon. 2

12. **GASTERIA** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alençon* (1809) 6 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n. 7392*. — Genre d'environ 40 espèces  
de l'Afrique austr.

**G. acinacifolia** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 49. **ALOE** — Jacquin,  
*Eclog. Pl. Rar.* I (1811) 49 t. 31 ; *Bot. Mag.* (1822) t. 2369 ; Kerner, *Hort.*  
*Semp.* t. 654. — Colonie du Cap.

— — var. **ensifolia** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 196. **G. ENSI-**  
**FOLIA** Haworth in *Philos. Mag.* (1825) 282 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes*  
sect. XXIX fig. 12.

**G. brevifolia** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 89 et in *Philos. Mag.*  
(1827) 350 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 186 ; Durand et  
Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 296. **ALOE BRACHYPHYLLA** Salm-Dyck, *Hort.*  
*Dyck.* (1834) 332 et *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 8 ; Kunth, *Enum.*  
*Pl.* IV 538. — Colonie du Cap. ♀

**G. candicans** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 360 ; Baker in *Journ. Linn.*  
*Soc.* XVIII (1880) 196 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 296. **ALOE** —  
Schultes f. in Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 681 ; Salm-Dyck,  
*Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 13 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 538. — Colo-  
nie du Cap. ♀

**G. carinata** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alençon* (1809) 6 ; Haworth, *Syn.*  
*Pl. Succul.* (1812) 87 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 192 ; Du-  
rand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 296. **ALOE** — Miller, *Gard. Dict.*  
ed. VIII (1768) n. 21 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1331 pr. p. ; Salm-Dyck, *Monog.*  
*Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 20 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 543. — Colonie du  
Cap. ♀

**G. excavata** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 253 ; Baker in *Journ. Linn.*  
*Soc.* XVIII (1880) 188 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 297. **ALOE**  
— Willdenow in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* V (1811) 276 ; Salm-Dyck,  
*Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 29 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 545. — Co-  
lonie du Cap. ♀

**G. maculata** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 348 ; Baker in *Journ. Linn.*  
*Soc.* XVIII (1880) 191 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 298. **ALOE** —  
Thunberg, *Diss. de Aloe* (1783) n. 10 pr. p. ; Salm-Dyck, *Monog. Gen.*  
*Aloes* sect. XXIX fig. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 536. — Colonie du Cap. ♀

**G. nigricans** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alençon* (1809) 6 ; Haworth, *Syn.*  
*Pl. Succul.* (1812) 86 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 185 ; Du-  
rand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 299. **ALOE** — Haworth in *Trans. Linn.*  
*Soc.* VII (1804) 13 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 7.  
**A. OBLIQUA** Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV (1804) t. 418 (excl. syn.). **A. LIN-**  
**GUA** Thunberg var. **CRASSIFOLIA** Solander ; *Bot. Mag.* (1805) t. 389. — Co-  
lonie du Cap. ♀

**Gasteria nitida** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 358; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 195; T. Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 299. ALOE — Salm-Dyck, *Catal. Rais. Aloes* (1817) 13 et *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 17; *Bot. Mag.* (1832) t. 2304; Kunth, *Enum. Pl.* IV 539. — Colonie du Cap. 2

**G. obtusifolia** Haworth in *Philos. Mag.* (1827) 350; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 186; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 300. ALOE — Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* II (1821) 62 et *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 37; Kunth, *Enum. Pl.* IV 548. — Colonie du Cap. 2

Obs. Le G. PETHAMENSIS Hort. ex Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 193 est un hybride artificiel; Baker (*loc. cit.*) dit de cette plante « Hybrida hortensis inter G. VERRUCOSAM et A. VARIEGATAM ad locum dictum Petham facto. »

**G. planifolia** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 188; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 300. ALOE — Baker in Saunders, *Refug. Bot.* III (1869) t. 162. — Colonie du Cap. 2

**G. pulchra** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 86; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 191; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 300. ALOE — Jacquin, *Hort. Schænbr.* IV (1801) t. 419; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 2; Kunth, *Enum. Pl.* IV 536. A. MACULATA Ker in *Bot. Mag.* (1804) t. 765. — Colonie du Cap. 2

**G. sulcata** Haworth in *Phil. Mag.* (1827) 353; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 187; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 301. ALOE — Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* II (1821) 54 et *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 32; Kunth, *Enum. Pl.* IV 545. — Colonie du Cap. 2

**G. trigona** Haworth in *Phil. Mag.* (1827) 358; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 194; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 301. ALOE TRIGONA Salm-Dyck, var. ELONGATA Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* II (1821) 45. A. ELONGATA Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 15; Kunth, *Enum. Pl.* IV 539. — Colonie du Cap. 2

**G. verrucosa** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alenç.* (1809) 6; Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 89; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 184; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 302. ALOE — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 20; *Bot. Mag.* (1805) t. 837; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 25; Kunth, *Enum. Pl.* IV 543. A. CARINATA De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* (1799) t. 63. A. DISTICHA Linné var.  $\beta$  Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 321. — Colonie du Cap. 2

**G. Zeyheri** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 190; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 302. ALOE — Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIX fig. 3<sup>b</sup>. — Colonie du Cap. 2

29. **ALOE** Linné, *Gen. Pl.*, ed. VI (1764) n. 430 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7393. — Genre d'environ 80 espèces habitant surtout l'Afrique austr. et les îles Mascareignes ; quelques espèces dans l'Afrique trop. et une dans la Rég. Méditerr. et les îles Canaries.

**A. Africana** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 4 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXVII fig. 2 ; *Bot. Mag.* (1824) t. 2517 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 532 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 180 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 303. **PACHIDENDRUM** — Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 36. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. arborescens** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3 ; De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* t. 38 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1306 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXVI fig. 3 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 529 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 303. **CATEVALA** — Medicus, *Theodora speciosa* (1786) 67. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. aristata** Haworth in *Phil. Mag.* (1825) 280 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 156 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 303. **A. LONGIARISTATA** Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VI (1820) 684 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XV fig. 7 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 518. — Colonie du Cap.  $\frac{2}{3}$

**A. brevifolia** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 8 ; De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* t. 81 ; *Bot. Reg.* (1826) t. 996 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XVI fig. 1 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 160 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 304. **A. PROLIFERA** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 16 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 519. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. cæsia** Salm-Dyck, *Catal. Hort. Dyck.* (1841) 29 et *Monog. Gen. Aloes* sect. XVII fig. 3 ; Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 706 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 531 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 172 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 305. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. ciliaris** Haworth in *Phil. Mag.* (1825) 281 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXV fig. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 529 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 169 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 305. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. distans** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 78 ; Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 714 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 528 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIV fig. 1 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 171 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 306. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. ferox** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 22 ; De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* t. 32 ; *Bot. Mag.* (1818) t. 4975 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXVII fig. 3 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 179 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 306. **PACHIDENDRUM** — Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 38. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**Aloe glauca** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 16 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XVII fig. 2 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 520 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* IV 520. A. RHODACANTHA De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* t. 44 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1278. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. humilis** Miller, *Abreg. Gard. Dict.* ed. VI (1771) n. 10 ; Jacquin, *Hort. Schœnbr.* IV t. 420 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 157 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 307. A. PERFOLIATA Linné var. — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 320. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. inermis** Forskal, *Fl. Ægypt.-Arab.* (1775) 74 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 181. — Arabie.  $\frac{1}{2}$

Obs. L'A. INERMIS Forskal est une espèce douteuse ; c'est avec réserve que nous lui rapportons la plante de la collection Barbey-Boissier.

**A. latifolia** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 82 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 526 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIII fig. 3 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 164 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 308. A. SAPONARIA Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 17. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. mitriformis** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 1 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 99 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1270 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 171 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 309. A. XANTHACANTHA Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXIV fig. 3. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. plicatilis** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 7 ; *Bot. Mag.* (1800) t. 457 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 73 ; Jacquin, *Hort. Schœnbr.* IV t. 423 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXVIII fig. 1 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 181 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 310. A. DISTICHA Linné var. — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 321. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. purpurascens** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 20 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXII fig. 2 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 524 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 174 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 311. A. PERFOLIATA Linné var. — Solander in Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 466. A. SOCCOTRINA Lamarck var. — Ker in *Bot. Mag.* (1812) t. 1474. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**A. Saponaria** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 17 et *Syn. Pl. Succul.* (1812) 83 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 526 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 164 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 311. A. PERFOLIATA Linné var. — Solander in Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 467 (excl. syn. DILLENII). — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

Obs. Le nom le plus ancien est A. DISTICHA Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 5 ; Baker rejette ce nom qu'il qualifie de « primum sed ineptum. »

**A. Serra** De Candolle in REDOUTÉ, *Pl. Grasses* (1799) t. 80 ; Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 697 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XX fig. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 522 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 160 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 312. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$



**Aloe serrulata** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 48; *Bot. Reg.* (1831) t. 1415; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XX fig. 4; Kunth, *Enum. Pl.* IV 522; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 163; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 312. *A. PERFOLIATA* Linné var. — Solander in Aiton, *Hort. Kew.* V (1789) 466. — Colonie du Cap. ♀

**A. striata** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 18 et *Syn. Pl. Succul.* 81; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 162; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 312. *A. PANICULATA* Jacquin, *Fragm. Bot.* (1800-09) 48 t. 68; Kunth, *Enum. Pl.* IV 522. — Colonie du Cap. ♂

**A. striatula** Haworth in *Phil. Mag.* (1825) 281; Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 703; Kunth, *Enum. Pl.* IV 529; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 169; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 313. — Colonie du Cap. ♂

**A. succotrina** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 85; De Candolle in Redouté, *Pl. Grasses* t. 85; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXII fig. 4; Kunth, *Enum. Pl.* IV 524; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 173; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 313. *A. PERFOLIATA* Linné var. — Curtis in *Bot. Mag.* (1800) t. 472. *A. VERA* Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) 45. — Colonie du Cap. ♂

**A. tenuior** Haworth in *Phil. Mag.* (1825) 281; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XXVII fig. 6; Kunth, *Enum. Pl.* IV 533; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 169; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 313. — Colonie du Cap. ♂

**A. vera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 320; Webb et Berthelot, *Hist. Nat. Canaries* III 2, 348; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 176; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 313. *A. BARBADENSIS* Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) 2. *A. VULGARIS* Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 86; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* t. 341; Bentley et Trimen, *Medic. Pl.* IV t. 282. — Originaire de l'Amérique trop. et disséminé dans les régions chaudes du monde entier. ♂

**A. virens** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 17 et *Syn. Pl. Succul.* 83; *Bot. Mag.* (1811) t. 1355; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XV fig. 8; Kunth, *Enum. Pl.* IV 518; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 157; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 314. — Colonie du Cap. ♂

30. **APICRA** Willdenow in *Gesell. Naturf. Freunde Berl. Mag.* V (1811) 167; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7394. — Genre de 7 espèces de l'Afrique australe.

**A. foliolosa** Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 274; Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* 64; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 218; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 315. *ALOE* — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 7; *Bot. Mag.* (1811) t. 1352; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. II fig. 4; Kunth, *Enum. Pl.* IV 495. — Colonie du Cap. ♂

**Apicra pentagona** Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 273 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 315. **HAWORTHIA** — Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 99. **ALOE** — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 7 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1352 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. II fig. 4. — Colonie du Cap. h

**A. spiralis** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 217 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 315. **ALOE** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 322 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 56 ; Jacquin, *Fragm. Bot.* t. 110 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1455. **A. IMBRICATA** Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 7 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. I fig. 7. — Colonie du Cap. 2

31. **HAWORTHIA** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alenç.* (1809) 7 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7395. — Genre d'environ 60 espèces dont une de l'Angola, les autres habitant l'Afrique austr.

**H. albicans** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 91 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 207 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 316. **APICRA** — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 271 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1452 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XII fig. 1. **H. VIRESCENS** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 52. — Colonie du Cap. 2

**H. altilinea** Haworth in *Phil. Mag.* (1824) 301 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 316. **ALOE** — Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 638. **H. ARISTATA** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 51. — Colonie du Cap. 2

**H. arachnoidea** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alenç.* (1809) 7 ; Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 96 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 210 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 316. **ALOE** — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 17 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 756 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 50 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XII fig. 2. — Colonie du Cap. h

**H. attenuata** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 92 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 203 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 317. **APICRA** — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 270. **H. ALTILINEA** Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IV fig. 12 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 505. **ALOE RADULA** Ker (non Jacquin) in *Bot. Mag.* (1811) t. 1345. — Colonie du Cap.

— — var. **clariperla** BAKER, *loc. cit.* XVIII (1880) 204. **H. CLARIPERLA** Haworth in *Phil. Mag.* (1828) 186. **ALOE ATTENUATA** Haworth var. — Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 12<sup>b</sup>. — Avec le type.

**H. coarctata** Haworth in *Phil. Mag.* (1824) 301 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 202 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 316. **ALOE** — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 647 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. VI 17 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 506. — Colonie du Cap. 2

**Haworthia cuspidata** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 51 et *Revis. Pl. Succul.* 51 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 318. ALOE — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 639. — Colonie du Cap. ♀

**H. cymbiformis** Duval, *Pl. Succul. Hort. Alenç.* (1809) 7 ; Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 93 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 318. ALOE — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 8 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 802. — Colonie du Cap. ♀

— — var. **planifolia** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 318. H. PLANIFOLIA Haworth in *Phil. Mag.* (1825) 282. ALOE — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 638 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XI fig. 2. — Avec le type. ♀

**H. fasciata** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 54 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 213 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 318. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 270. ALOE — Salm-Dyck, *Catal. Hort. Dyck.* (1841) 326 et *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 15 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 506. — Colonie du Cap. ♀

**H. glabrata** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 206 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 319. ALOE — Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* (1834) 325 et *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 13 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 505. — Colonie du Cap. ♀

— — var. **concolor** SALM-DYCK, *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 13 γ ; Durand et Schinz, *loc. cit.* 319. « Forma insignis, verisimiliter hybrida hortensis » (Baker, *loc. cit.*).

**H. lætevirens** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 43 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 212 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 319. ALOE — Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 335 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. X fig. 3 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 511. — Colonie du Cap. ♀

**H. margaritifera** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 55 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 204 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 319. ALOE — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) 14 ; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 5. ALOE PUMILA Linné var. — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 322. H. MAJOR Duval, *Pl. Succul. Hort. Alenç.* (1809) 7. — Colonie du Cap. ♀

— — var. **granata** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 205 ; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 319. H. GRANATA Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 57. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 269. — Avec le type. ♀

— — var. **semimargaritifera** BAKER, *loc. cit.* XVIII (1880) 205 ; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 320. H. SEMIMARGARITIFERA Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 53. ALOE — Salm-Dyck, *Catal. Rais. Esp. Aloes* (1817) 6 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 501. — Avec le type. ♀

**Haworthia mirabilis** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 95; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 212; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 320. ALOE — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 11; *Bot. Mag.* (1811) t. 1354; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IX fig. 1; Kunth, *Enum. Pl.* IV 508. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 269. — Colonie du Cap. ♀

**H. nigra** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 203; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 320. APICRA — Haworth in *Phil. Mag.* (1824) 302. ALOE — Schultes f. in Roemer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 657; Kunth, *Enum. Pl.* IV 495. — Colonie du Cap. ♂

**H. papillosa** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 58; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 201; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 320. ALOE — Salm-Dyck, *Catal. Rais. Esp. Aloes* (1819) 7 et *Monog. Gen. Aloes* sect. VII fig. 1; Kunth, *Enum. Pl.* IV 501. — Colonie du Cap. ♀

**H. Radula** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 93; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 206; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 321. ALOE — Jacquin, *Hort. Schœnbr.* IV (1804) 11 t. 422; Kunth, *Enum. Pl.* IV 504. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 270. — Colonie du Cap. ♀

**H. Reinwardti** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 53; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 202; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 321. ALOE — Salm-Dyck, *Obs. Bot. Hort. Dyck.* II (1821) 37 et *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 16; Kunth, *Enum. Pl.* IV 504. — Colonie du Cap. ♀

**H. reticulata** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 94; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 210. ALOE — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 9; Loddiges, *Bot. Cab.* (1828) t. 1354; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. X fig. 1. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 272. — Colonie du Cap. ♀

**H. rigida** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 49; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 203. ALOE — De Candolle, in De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 62; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IV fig. 3; Kunth, *Enum. Pl.* IV 499. **H. expansa** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 91. ALOE — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 8; Loddiges, *Bot. Cab.* (1828) t. 1430. — Colonie du Cap. ♂

**H. rugosa** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 206. ALOE — Salm-Dyck, *Hort. Dyck.* (1834) 223 et *Monog. Gen. Aloes* sect. VI fig. 9; Kunth, *Enum. Pl.* IV 504. **H. Radula** Haworth var. **ASPERIOR** Haworth, *Revis. Pl. Succul.* (1821) 54. — Colonie du Cap. ♀

**H. subrigida** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 201. ALOE — Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IV fig. 1. **A. rigida** Jacquin (non De Candolle), *Fragm. Bot.* (1809?) t. 108. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 272. — Colonie du Cap. ♂

**Haworthia tessellata** Haworth in *Phil. Mag.* (1824) 300; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 211. ALOE — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 635; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. VII fig. 1; Kunth, *Enum. Pl.* IV 211. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

— — var. **parva** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 211. H. PARVA Haworth in *Phil. Mag.* (1824) 301. ALOE — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 653; Salm-Dyck, *loc. cit.* sect. VIII fig. 2. — Avec le type.  $\frac{1}{2}$

**H. tortuosa** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 90; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 201. ALOE — Haworth in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) 7; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IV fig. 2. A. RIGIDA Ker in *Bot. Mag.* (1810) t. 1337. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

**H. translucens** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 52; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. XII fig. 1; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 212. APICRA — Willdenow in *Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* V (1811) 258. H. ARACHNOIDES Haworth var. — Sims in *Bot. Mag.* (1811) t. 1417. — Colonie du Cap.  $\frac{2}{3}$

**H. turgida** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 22; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209. ALOE — Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829-30) 635; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. IX fig. 2; Kunth, *Enum. Pl.* IV 509. — Colonie du Cap.  $\frac{2}{3}$

**H. viscosa** Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 90; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 209. ALOE — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1833) 460; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 16; *Bot. Mag.* (1805) t. 814; Salm-Dyck, *Monog. Gen. Aloes* sect. III fig. 3. — Colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

32. **HESPERALOE** Engelman in S. Watson, *Bot. King's Exped.* (1871) 497; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7406. — Genre monotype.

**H. yuccæfolia** Engelman in S. WATSON, *Bot. King's Exped.* (1871) 497; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 250; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1880) 231. ALOE — A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII (1868) 390. — Texas.

33. **YUCCA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 429; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7407. — Genre de 20 espèces environ habitant les États-Unis mérid., le Mexique et l'Amérique centr.

**Y. aloifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 319; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 20; Redouté, *Liliacées* VII t. 401 et 402; *Bot. Mag.* (1815) t. 1700; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 221. Y. SERRULATA Haworth, *Syn. Pl. Succul.* (1812) 62. — Antilles et du Mexique à la Caroline. — — var. **tricolor** BAKER, *loc. cit.* XVIII (1880) 221. Y. TRICOLOR Hort. fide Baker. Forme à feuilles panachées; cultivée.

**Yucca angustifolia** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 227; *Bot. Mag.* (1824) t. 2236; *Rev. Hort.* (1852) 467 fig. 101 et 102; Kunth, *Enum. Pl.* IV 226; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 253; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 227. — Du Missouri et de l'Iowa au Colorado et au Nouveau-Mexique.  $\mathfrak{h}$

**Y. filamentosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 319; *Bot. Mag.* (1806) t. 900; Redouté, *Liliacées* IV t. 227 et 229; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 227 et in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 324. — Régions littorales du Maryland à la Floride.  $\mathfrak{z}$

— var. **flaccida** ENGELMANN in *Trans. St-Louis Acad.* III (1873) 52; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 254; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 228. **Y. FLACCIDA** Haworth, *Suppl. Pl. Succul.* (1819) 34; *Bot. Mag.* (1817) t. 1895; Carrière in *Rev. Hort.* VIII (1859) 555 fig. 119 et 120; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 323. — Avec le type.

**Y. gloriosa** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 319; Redouté, *Liliacées* VI t. 326 et 327; *Bot. Mag.* (1810) t. 1260; Kunth, *Enum. Pl.* IV 273; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 320; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 251; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 225. — Régions littorales de la Caroline à la Floride.  $\mathfrak{h}$

**Y. recurvifolia** Salisbury, *Parad. Londin.* (1805) t. 31; Carrière in *Rev. Hort.* VIII (1859) 488 t. 104; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 321. **Y. GLORIOSA** Linné var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 225. — De la Caroline à la Floride.  $\mathfrak{h}$

**Y. Treculeana** Carrière in *Rev. Hort.* VII (1858) 580 et (1869) 406 fig. 82; Baker in *Gard. Chron.* (1870) 828 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 226. **Y. CANALICULATA** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1860) t. 5204; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 252. — Texas et Mexique bor.

Obs. Baker (*loc. cit.*) rapporte à cette espèce les **Y. AGAVOIDES**, **CONCAVA**, **CON-TORTA**, **CORNUTA**, **REVOLUTA** et **UNDULATA** Hort.

**Y. Whipplei** Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Surv.* (1858) 221; Baker in *Gard. Chron.* (1876) II 496 fig. 42 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 230; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 254; *The Garden* (1889) 561 cum icone. — Californie. Arizona.  $\mathfrak{z}$

34. **DRACAENA** Linné, *Mantissa Pl.* I (1767) 9; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7408. — Environ 40 espèces des rég. chaudes de l'ancien monde.

**D. Draco** Linné, *Syst. Nat.* ed. XII 2 (1767) 246; *Fl. des Serres* VI (1851) 255 t. 613; *Bot. Mag.* (1851) t. 4571; Lemaire, *Jard. Fleur.* II (1852) t. 124; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 527; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 327. **ASPARAGUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 451. — Canaries, Madère.  $\mathfrak{h}$

35. **CORDYLINE** Royen ex Adanson, Fam. des Pl. (1763) 54 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7409. — Genre d'une dizaine d'espèces de l'Asie trop., de l'Australie et des îles du Pacifique.

**C. indivisa** Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. 2, I (1840) 449 ; Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 30 ; Hooker, *Fl. Zeland.* I 258 et *Handb. N.-Zeal. Fl.* 281 ; *Gard. Chron.* (1860) 792 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 543. — Nouvelle-Zélande. ♀

36. **NOLINA** Michaux, Fl. Bor.-Amer. I (1803) 207 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7410. — Genre de 10 espèces du Texas, de la Californie et du Mexique.

**N. Bigelovii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 247. **BEAUCARNEA** — Baker in Trimen, *Journ. of Bot.* (1872) 326 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 235. **DASYLIRION** — Torrey in *Bot. Whipple Exped.* (1856) 451. — Arizona. ♀

**N. Hartwegiana** Hemsley, *Biol. Centr.-Amer. Bot.* III (1884) 371. **DASYLIRION** — Zuccarini in *Abhandl. Akad. München* IV 2 (1845) 22. **BEAUCARNEA** — Baker in Trimen, *Journ. of Bot.* (1872) 327 pr. p. et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 237. — Mexique. ♀

37. **DASYLIRION** Zuccarini in Otto et Dietrich, Allg. Gartenz. VI (1838) 258 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7411. — Genre de 50 espèces du Texas et du Mexique.

**D. acrotrichum** Zuccarini in *Abhandl. Akad. München* III (1843) 228 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5030 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 145 t. 1448 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 239. **D. GRACILE** Zuccarini *loc. cit.* IV 2 (1845) 22 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 10 cum icone. — Mexique. ♀

**D. glaucophyllum** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 5041 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 239. **D. GLAUCUM** Zuccarini in *Abhandl. Akad. München* IV 2 (1845) 22 ; Carrière in *Rev. Hort.* (1872) 435 cum icone. — Mexique. ♀

**D. quadrangulatum** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 250 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) 244. — Mexique bor. ♀

38. *ASTELIA* Banks et Solander ex R. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 291 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7412. — Genre de 10 espèces des îles du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Amérique antarctique.

**A. Banksii** A. Cunningham in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II (1836) 374 ; Hooker f., *Handb. N.-Zeal. Fl.* 284. *HAMELINIA VERATROIDES* A. Richard, *Fl. N.-Zeland.* (1832) 158 t. 24. — Nouvelle-Zélande. ♀

39. *ASPHODELUS* Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1735) n. 421 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7416. — Six ou sept espèces habitant la Rég. Méditerran., l'Inde et les îles Mascareignes.

**A. cerasiferus** J. Gay in *Bull. Soc. Bot. Fr.* IV (1857) 640 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 60<sup>a</sup> et <sup>b</sup> ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 204 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 331. *A. RAMOSUS* Linné subsp. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 270. *A. RAMOSUS* Reichenbach (non Linné), *Icon. Fl. Germ.* X (1848) t. 514. *A. COMOSUS* Jordan in *Bull. Soc. Bot. Fr.* VII (1860) 737. — Espagne, France, Algérie. ♀

**A. Liburnicus** Scopoli, *Fl. Carniolica* ed. II, I (1772) 245 t. 12 ; Jacquin, *Eclog. Pl.* 113 t. 77. *ASPHODELINE* — Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 116 et *Icon. Fl. Germ.* X (1848) t. 516 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 275. *A. CAPILLARIS* Redouté, *Liliacées* VII (1813) t. 380. *ASPHODELINE* — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 562. — Grèce, Crète, Dalmatie, Istrie, Italie. ♀

**A. microcarpus** Viviani in *Linnaea* I (1826) 500 ; Gay in *Bull. Soc. Bot. Fr.* IV (1857) 609 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 69<sup>d</sup> ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 332. *A. RAMOSUS* Linné subsp. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 270. *A. ÆSTIVUS* Brotero, *Fl. Lusit.* I (1804) 525 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 537. — Région Méditerran. (de l'Espagne à la Syrie et l'Égypte). ♀

40. *ASPHODELINE* Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 116 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7417. — Genre d'une quinzaine d'espèces de la Rég. Méditerran. et de l'Asie occ.

**A. lutea** Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 116 et *Icon. Fl. Germ.* X (1848) t. 517 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 561 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 274. *ASPHODELUS* — Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 309 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 773 ; Redouté, *Liliacées* V t. 223. — De l'Italie et du Maroc au Caucase et à l'Arabie. ♀



41. **PARADISIA** Mazzucato, Viaggio all' Alpi Giulie (1814) 27 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 7418. — Genre monotype.

**P. Liliastrum** Bertoloni, *Fl. Ital.* IV (1839) 133 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 286. **HEMEROCALLIS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 344. **ANTHERICUM** — Linné, *loc. cit.* ed. II (1762) 445 ; *Bot. Mag.* (1795) t. 318. **PHALANGIUM** — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 545 ; Redouté, *Liliacées* V t. 255. **CZACKIA** — Andrzejowski, *Dissert.* (1818) cum icone. — Europe mérid. et centr. ♀

42. **BULBINE** Linné, Hort. Cliffort. (1737) 122 pr. p. ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7421. — Genre de 23 espèces, toutes africaines à l'exception de deux d'origine australienne.

**B. alooides** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 372 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 557 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 348 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 336. **ANTHERICUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 319 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 26 ; Redouté, *Liliacées* V t. 283 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1317. — Afrique austr. et trop.-or. ♀

**B. frutescens** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 372. **ANTHERICUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 310 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 816 ; De Candolle et Redouté, *Pl. Grasses* t. 14 ; Redouté, *Liliacées* VIII t. 284. **B. CAULESCENS** Linné ex Steudel, *Nomencl. Bot.* éd. I (1821) 125 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 343. — Colonie du Cap. ♀

**B. longiscapa** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 372 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 564 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 344. **ANTHERICUM** — Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786-93) 17 t. 404 ; Redouté, *Liliacées* VIII t. 423 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1339. — Colonie du Cap. ♀

43. **CHLOROGALUM** Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 681 ;  
T. Durand, Ind. Gen. n. 7422. — Trois espèces de la Californie.

**C. pomeridianum** Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 682 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 291. **ANTHERICUM** — Ker in *Bot. Reg.* (1821) t. 564. **SCILLA** — De Candolle in Redouté, *Liliacées* VIII (1816) t. 421. **PHALANGIUM** — Don in Sweet, *Flow. Gard.* second ser. (1837) t. 381. — Californie. ♀

44. **BOWIEA** Harvey ex Hooker f. in *Bot. Mag.* (1867)  
t. 5619 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7426. — Genre monotype.

**B. volubilis** Harvey ex Hooker f. in *Bot. Mag.* (1867) t. 5619 ; *Gartenflora* (1881) 376 cum icone ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 291 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 338. — Natal. ♀

45. **EREMURUS** Marschall Bieberstein, *Cent. Pl. Ross. merid.* II (1818) t. 61 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7429. — Genre de 20 espèces habitant l'Orient, l'Asie Russe et l'Inde.

**E. aurantiacus** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 285. — Afghanistan. ♀

**E. Kaufmanni** Regel in *Gartenflora* (1873) 260 et in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 430 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 282. — Turkestan. ♀

**E. Korolkowi** Regel in *Act. Hort. Petrop.* III (1875) 116. — Turkestan. ♀

**E. Olgaë** Regel in *Gartenflora* (1871) 260 et (1881) 196 t. 1048 ; Regel in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 430 et *Fl. Turkest.* I 126. t. 2. — Turkestan, Boukhara or. ♀

**E. robustus** Regel in *Gartenflora* (1873) 257 t. 769, (1877) 18 et (1878) 29 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 6726 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 284. **HENNINGIA** — Regel in *Bull. Soc. Natur. Moscou* XII (1868) I 457. — Sibérie, (Alatau), Turkestan. ♀

**E. spectabilis** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* III (1819) 269 et *Cent. Pl. Ross. Merid.* II (1818) t. 61 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4870 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* t. 188 ; Boissier *Fl. Or.* V 322 **E. CAUCASICUS** Steven in *Bull. Soc. Natur. Moscou* IV (1832) 251. — Asie-Mineure, Syrie, Caucase, Perse, Sibérie. ♀

**E. Turkestanicus** Regel in *Gartenflora* (1873) 260 et in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 427 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 281. — Turkestan. ♀

46. **ANTHERICUM** Linné, *Gen. Pl.*, ed. VI (1764) n. 422 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7431. — Genre d'environ 50 espèces habitant l'Europe, l'Amérique et l'Afrique trop. et extratrop.

**A. croceum** Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 476 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1877) 297. **PHALANGIUM** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 196. **ORNITHOGALUM** — Elliot, *Sketch Bot. South Carol. and Georgia* I (1821) 397 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 371. — Alabama, Géorgie, Floride, Louisiane. ♀

— — var. **album** Nob. *Schœnolirium album* Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Surv.* (1858) 220. — Avec le type. ♀

**A. revolutum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 310 ; Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* 62 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 1044 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 311 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 347. **PHALANGIUM** — Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 368. **TRACHYANDRA** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 580. — Colonie du Cap. ♀

47. **ARTHROPODIUM** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 276 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7437. — Genre d'une douzaine d'espèces de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie.

**A. cirrhatum** R. Brown in *Bot. Mag.* (1822) t. 2350 ; *Bot. Reg.* (1823) t. 709 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 622 ; Hooker f., *Fl. Nov. Zeland.* I 254 et *Handb. N.-Zeal. Fl.* 285 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) 354. **ANTHERICUM** — Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 448. — Nouvelle-Zélande. 2

48. **AGAPANTHUS** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 17 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7461. — Genre de 2 ou 3 espèces de la colonie du Cap.

**A. Africanus** Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V (1893) 354. **CRINUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 292. **A. UMBELLATUS** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 18 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 500 ; Redouté, *Liliacées* I t. 4 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 479 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 369. — Colonie du Cap. 2

— — var. **maximus** DURAND et SCHINZ *loc. cit.* V (1893) 355. **A. UMBELLATUS** L'Héritier var. — Lindley in *Bot. Reg.* XXIX (1843) t. 7 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 369. Variété fréquemment cultivée.

Obs. Nous pensons que c'est à cette variété qu'il faut rapporter l'**A. UMBELLATUS** L'Héritier var. **GIGANTEUS** Regel in *Gartenflora* (1880) 198. (**A. GIGANTEUS** Hort.).

**A. minor** Loddiges, *Bot. Cab.* (1817) t. 42 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 369 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 355. **A. UMBELLATUS** L'Héritier var. — Redouté, *Liliacées* VII (1813) t. 403 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 479. — Colonie du Cap. 2

49. **TULBAGHIA** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 148 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7462. — Genre d'une douzaine d'espèces de l'Afrique austr. et trop.

**T. alliacea** Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* (1794) 60 et *Fl. Capens.* (ed. Schultes) 306 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 371 et in Saunders, *Refug. Bot.* V t. 349 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 355. — Colonie du Cap, Natal. 2

**T. violacea** Harvey in *Bot. Mag.* (1837) t. 3555 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 485 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 372 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 356. — Colonie du Cap. 2

50. **TRISTAGMA** Poeppig, *Fragm. Syn.* (1833) 8 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7463. — Trois espèces du Chili.
- T. nivale** Poeppig, *Nov. Gen. et Sp.* II (1838) 28 t. 140 ; Gay, *Fl. Chil.* VI 125. MILLA — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 383. — Chili. ♀ ?
51. **MILLA** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* II (1793) 76 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7465. — Genre monotype.
- M. biflora** Cavanilles, *Icon. et Descr. Pl.* II (1793) 76 t. 196 ; *Bot. Reg.* (1833) t. 1555 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 179 t. 1459 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 478 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 380. — De l'Arizona au Mexique. ♀
52. **BREVOORTIA** Wood in *Proc. Acad. Sc. Philad.* (1867) 81 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7468. — Genre monotype.
- B. coccinea** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 239. BRODIEA — A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII (1867) 389 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 378 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5857 ; *Fl. des Serres* XIX (1873) 9 t. 1935. BREVOORTIA IDA-MAIA Wood in *Proc. Acad. Philad.* (1867) 82. — Californie. ♀
53. **BRODIEA** Smith in *Trans. Linn. Soc.* X (1811) 2 t. 1 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7470. — Genre de 40 espèces environ habitant l'Amérique bor.-occ. et austr. extratrop.
- B. Bridgesii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 237 ; *Gard. and Forest.* (1883) 135. — Californie centr. ♀
- B. capitata** Bentham, *Pl. Hartweg.* (1857) 339 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 237. DICHELOSTEMMA — Wood in *Proc. Acad. Sc. Philad.* (1878) 173. MILLA — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 381 et in *Bot. Mag.* (1871) t. 5912. — De l'Utah à la Californie. ♀
- B. congesta** Smith in *Trans. Linn. Soc.* X (1811) 3 t. 1 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 377 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 236. DICHELOSTEMMA — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 470. — De la Californie au Territoire de Washington. ♀
- B. grandiflora** Smith in *Trans. Linn. Soc.* X (1810) 2 ; *Bot. Reg.* (1828) t. 1183 ; *Bot. Mag.* (1829) t. 2877 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 376 pr. p. ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 236. HOOKERA CORONARIA Salisbury, *Parad. Londin.* (1806) t. 98. — De la Colombie anglaise à la Californie. ♀
- — var. ? **major** BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1857) 339 ; S. Watson, *loc. cit.* XIV (1879) 236. B. CALIFORNICA Lindley ex van Houtte, *Fl. des Serres* V (1849) t. 428<sup>b</sup>. — Californie.

**Brodiaea Howellii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 301; *Bot. Mag.* (1888) t. 6989. — Territoire de Washington. ♀

**B. ixioides** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 238. ORNITHOGALUM — Aiton, *Hort. Kew.* II (1789) 257. MILLA — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1872) 383. CALLIPRORA LUTEA Lindley in *Bot. Reg.* (1833) t. 1590; *Bot. Mag.* (1837) t. 3588. — Orégon, Californie. ♀

**B. lactea** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 238. ALLIUM — Benth., *Pl. Hartweg.* (1857) 339. HESPEROSCORDUM — Lindley in *Bot. Reg.* (1834) t. 1639. H. HYACINTHINUM Lindley, *loc. cit.* (1834) sub t. 1293. MILLA — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 385. — De la Colombie anglaise à la Californie. ♀

**B. laxa** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 237. TRITELEIA — Benth. in *Trans. Hort. Soc.* I (1835) 413 t. 15 fig. 2; *Bot. Reg.* (1834) t. 1685. SEUBERTIA — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 475. MILLA — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 384. — Californie. ♀

**B. multiflora** Benth., *Pl. Hartweg.* (1857) 339; *Bot. Mag.* (1872) t. 5989; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 377; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 236. — Orégon, Californie. ♀

**B. stellaris** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII (1881-82) 380. — Californie. ♀

**B. terrestris** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 6; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 236. B. TORREYI Wood in *Proc. Calif. Acad.* (1868) 172. — Californie. ♀

**B. uniflora** Lindley in *Bot. Reg.* (1837) t. 1921; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 179 t. 1459. MILLA — Graham in *Edinb. New Phil. Journ.* (1833) 174; *Bot. Mag.* (1834) t. 3367; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 382. — Buénos-Ayres, Chili. ♀

54. **BLOOMERIA** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 11; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7473. — Deux espèces de la Californie.

**B. aurea** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 11; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 235. ALLIUM CROCEUM Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Surv.* (1859) 218. NOTHOSCORDUM AUREUM Hook f. in *Bot. Mag.* (1871) t. 5896. — Californie. ♀

**B. Clevelandi** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XX (1885) 376. — Californie. ♀

55. **ALLIUM** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 294; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7476*. — Genre d'environ 270 espèces habitant l'hémisphère bor.-extratrop., l'Abyssinie et le Mexique.

**A. acuminatum** Hooker, *Fl. Bor.-Amer. II* (1840) 184 t. 196; Lindley in Paxton, *Flow. Gard.* 130 t. 25; *Fl. des Serres VI* (1851) 339 t. 644; Regel, *Allior. Monog.* 232. **A. MURRAYANUM** Regel in *Gartenflora* (1874) 200 t. 770 fig. 1; S. Watson, *Bot. of Calif. II* 352 t. 37 fig. 6. — États-Unis occid. (de la Californie au fleuve Fraser). 2

**A. attenuifolium** Kellogg in *Proc. Calif. Acad. II* (1863) 110 fig. 34; S. Watson, *Bot. King's Exped.* 486 t. 37 fig. 8-9 et *Bot. of Calif. II* 148; Regel, *Allior. Monog.* 96. **A. RETICULATUM** Benthham (non Nuttall), *Pl. Hartweg.* (1857) 339. — De la Californie à l'Orégon. 2

**A. Bidwelliæ** S. Watson in *Proc. Amer. Acad. XIV* (1879) 231 et *Bot. of Calif. II* 150. — Californie (Sierra Nevada). 2

**A. Bigelovii** S. Watson in *Bot. King's Exped. V* (1871) 487 t. 38 fig. 8-9 et in *Proc. Amer. Acad. XIV* (1879) 231. — Arizona, Nouveau-Mexique, Mexique bor. 2

**A. Cassium** Boissier, *Diagn. Pl. Or. ser. 1, XIII* (1853) 28 et *Fl. Or. V* 271. **A. ROSEUM** Linné var. — Regel, *Allior. Monog.* (1875) 219. **A. CYDNI** Schott ex Kotschy in *Æsterr. Wochenbl.* (1854) 217. — Cilicie, Syrie bor. 2

**A. Cepa** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 300; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca IV* t. 326; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ. X* t. 494; Boissier, *Fl. Or. V* 249; Regel, *Allior. Monog.* 92. — Patrie inconnue! Peut-être originaire de la Perse? — Cultivé partout. 2

**A. cernuum** Roth, *Catalecta Bot. II* (1800) 33 t. 2; *Bot. Mag.* (1810) t. 1324; Redouté, *Liliacées VI* t. 345; Kunth, *Enum. Pl. IV* 435; Regel, *Allior. Monog.* 136. **A. TRICORNE** Poiret, *Encycl. Méth. Bot. IX* (1810) 270. — États-Unis (partie mérid., occ. et or.). 2

**A. Chamæmoly** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 301; *Bot. Mag.* (1809) t. 1203; Redouté, *Liliacées VI* t. 325; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ. X* t. 501; Regel, *Allior. Monog.* 214; Boissier, *Fl. Or. V* 268; Durand et Schinz, *Comp. Fl. Afric. V* 357. — Toute l'Europe mérid. et l'Afrique bor. 2

**A. circinnatum** Sieber, *Reise nach Ins. Kreta II* (1823) 316 t. 6; Regel, *Allior. Monog.* 209; Boissier, *Fl. Or. V* 269. **A. CLUSIANUM** Bory et Chaudard (non Retzius), *Fl. Pélop.* (1838) 21. — Crète, Péloponèse. 2

**A. Cusickii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad. XIV* (1879) 228. — Orégon. 2

**A. decipiens** Fischer, *Catal. Jard. Pl. Gorenki ed. II* (1812) 10; Regel, *Allior. Monog.* 245; Boissier, *Fl. Or. V* 282. **A. NIGRUM** Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc. I* (1808) 266. **A. TULIPÆFOLIUM** Ledebour, *Fl. Altaica II* (1808) 9 et *Icon. Pl. Ross. t. 137*. — Sibérie, Songarie, Turkestan, Russie austr. 2

- Allium Doloncarensse** Regel, *Allior. Monog.* (1875) 113. — Orégon. ♀
- A. Douglasii** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1840) 184 t. 197 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 451 ; S. Watson, *Bot. King's Exped.* V 488 ; Regel, *Allior. Monog.* 233. — États-Unis occid. ♀
- A. eriophyllum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 112] et *Fl. Or.* V 272 ; Regel, *Allior. Monog.* 236. — Assyrie, Perse. ♀
- A. falcifolium** Hooker et Arnott in *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 400 ; S. Watson, *Bot. King's Exped.* V 488 t. 36 fig. 7-8 et *Bot. of Calif.* II 151. — Californie. ♀
- A. fimbriatum** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 232 et *Bot. of Calif.* II 150. — Californie. ♀
- A. flavum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 298 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1330 ; Redouté, *Liliacées* II t. 119 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 485 ; Regel, *Allior. Monog.* 187 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 555 ; Boissier, *Fl. Or.* V 255. — Toute l'Europe mérid., Caucase, Perse. ♀
- — var. **Nebrodense** Regel, *Allior. Monog.* (1875) 189. A. NEBRODENSE Gussone, *Prodr. Fl. Sicul.* I (1829) 404. — Sicile. ♀
- A. Geyeri** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 227. A. RETICULATUM Nuttall var. β S. Watson, *Bot. King's Exped.* (1871) 486. — De l'Idaho au Territoire de Washington. ♀
- A. hæmatochiton** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 227 et *Bot. of Calif.* II 148. — Californie. ♀
- A. hymenorrhizum** Ledebour, *Fl. Altaïca* II (1830) 12 et *Icon. Fl. Ross.* t. 359 ; Regel, *Allior. Monog.* 131 ; Boissier, *Fl. Or.* V 248. A. MACRORRHIZUM Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 32. — Songarie, Turkestan, Sibérie Altaïque, Perse. ♀
- A. Insubricum** Boissier et Reuter in REUTER, *Catal. Sem. Hort. Genève* (1854) 4 et in *Linnaea* XXIX (1757) 721. — Alpes de la Suisse italienne. ♀
- Obs. Certains auteurs réunissent cet ALLIUM à l'A. NARCISSIFLORUM Villars.
- A. junceum** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1826) 226 et *Fl. Græca* IV 19 t. 322 ; Regel, *Allior. Monog.* 71 ; Boissier, *Fl. Or.* V 238. — Chypre. ♀
- A. Karataviense** Regel in *Gartenflora* XXVII (1878) 162 t. 941 et *Allior. Monog.* 243 ; *Fl. Turkest.* I 98 t. 16 fig. 1-3 ; *Bot. Mag.* (1879) t. 6451. — Sibérie (monts Alatau). ♀
- A. madidum** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 228. — Orégon. ♀
- A. modestum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 33 et *Fl. Or.* V 261. — Palestine. ♀
- Obs. Regel (*Allior. Monog.* 193) réunit cet ALLIUM à l'A. PANICULATUM Linné var. PALLENS Regel.

- Allium Moly** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 301 ; *Bot. Mag.* (1800) t. 499 ; Redouté, *Liliacées* II t. 97 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 501 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 445 ; Regel, *Allior. Monog.* 215. — Europe mérid. ♀
- A. narceissiflorum** Villars, *Hist. Pl. Dauph.* II (1787) 258 t. 6<sup>b</sup> ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 434 ; Grénier et Godron, *Fl. de Fr.* III 241 ; Regel, *Allior. Monog.* 181. **A. NIGRUM** Allioni (non Linné), *Fl. Pedem.* II (1785) 158 t. 25. **A. PEDEMONTANUM** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 77 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 504. **A. GRANDIFLORUM** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 68. — Alpes de la France et de l'Italie bor. ♀
- A. nigrum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 430 ; Redouté, *Liliacées* II t. 102 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 505 ; Regel, *Allior. Monog.* 225 ; Boissier, *Fl. Or.* V 279. — Europe mérid. et mérid.-or., Asie occ., Afrique bor. Canaries.
- A. Nuttallii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 227. **A. MUTABILE** Michaux var.  $\beta$  S. Watson, *Bot. King's Exped.* V (1871) 486. — États-Unis austro-occ., Mexique. ♀
- A. obliquum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 296 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 4508 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 363 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 396 ; Regel, *Allior. Monog.* 126. — Sibérie, Songarie, Turkestan. ♀
- A. odorum** Linné, *Mant. Pl.* (1769) 62 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 432 ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 185 ; Regel, *Allior. Monog.* 176 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 343. **A. TATARICUM** Dryander (non Linné) in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, II (1811) 333 ; Redouté, *Liliacées* II t. 98 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1442. — De l'Inde à la Sibérie et au Japon. ♀
- A. Orientale** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 25 et *Fl. Or.* V 282 ; Regel, *Allior. Monog.* 229. **A. ERDELII** Baker (non Roth) in *Bot. Mag.* (1879) t. 6426. — Asie Mineure, Chypre, Syrie, Palestine, Mésopotamie. ♀
- A. Ostrowskyanum** Regel in *Gartenflora* XXX (1881) 223. — Turkestan. ♀
- A. Palmeri** S. Watson, *Bot. King's Exped.* V (1871) 487 t. 27 fig. 10 et 11 ; Regel, *Allior. Monog.* 112. — Nouveau-Mexique. ♀
- A. paniculatum** Linné, *Syst. Nat.* ed. X (1759) 978 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 318 ; Grénier et Godron, *Fl. de Fr.* III 209 ; Regel, *Allior. Monog.* 191 ; Boissier *Fl. Or.* V 259. — Grèce, Macédoine, Asie occid. (de la Palestine au Caucase). ♀
- var. **rupestre** Regel, *Allior. Monog.* (1875) 192. **A. RUPESTRE** Steven in *Mém. Soc. Natur. Mosc.* III (1812) 260 ; Reichenbach *Pl. Crit.* V (1827) 17 t. 428. **A. PANICULATUM** Linné var. *pallens* Boissier, *Fl. Or.* V (1884) 260 pr. p. — Caucase. ♀
- A. parviflorum** Viviani, *Append. Fl. Corsicæ Prodr.* (1825) 2 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 411 ; Bertoloni, *Fl. Ital.* IV 45 ; Regel, *Allior. Monog.* 116. **A. PAUCIFLORUM** Grénier et Godron, *Fl. de Fr.* III (1855) 210. — Corse, Sardaigne. ♀



- Allium platycaule** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 234. A. ANCEPS Baker in *Bot. Mag.* (1876) t. 6227. — Californie. ♀
- A. polyphyllum** Karelin et Kirilow in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* XV (1842) 509; Kunth, *Enum. Pl.* IV 684; Regel, *Allior. Monog.* 129. — Songarie, Turkestan. ♀
- A. pulchellum** G. Don in *Mem. Wernerian Soc.* VI (1827) 46; Kunth, *Enum. Pl.* IV 403; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 208; Boissier, *Fl. Or.* V 256. A. FLAVUM Linné var. — Regel, *Allior. Monog.* (1875) 188. A. PANICULATUM Allioni, *Fl. Pedem.* II (1789) 157; Redouté, *Liliacées* V t. 252; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 482. A. VALDENSE Reuter in *Compt.-rend. Soc. Hallerienne* (1854-56) 126. A. VALDENSIUM Nyman, *Consp. Fl. Europ.* (1881) 740. — Europe mérid., Asie occ., Algérie. ♀
- A. reticulatum** Fraser ex G. Don in *Mem. Wernerian Soc.* VI (1827) 36; Nuttall in Torrey, *Bot. U. S. and Mex. Bound. Surv.* 217; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 184 t. 195; Regel, *Allior. Monog.* 122. A. STELLATUM Fraser var. β Ker in *Bot. Mag.* (1816) t. 1840. — Amérique bor. (du Saskatchewan au Mexique). ♀
- A. Sanbornii** Wood in *Proc. Acad. Philad.* (1868) 171; S. Watson, *Bot. King's Exped.* V 486 t. 37 fig. 7 et *Bot. of Calif.* II 148; Regel, *Allior. Monog.* 136. — Nouvelle-Californie. ♀
- A. scorzoneraefolium** De Candolle in REDOUTÉ, *Liliacées* II (1805) t. 92; Don, *Monog. Allior.* 79; Schultes f. in Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 1090; Kunth, *Enum. Pl.* IV 445; Regel, *Allior. Monog.* 208. — Patrie inconnue. ♀
- A. serratum** S. Watson, *Bot. King's Exped.* V (1871) 487 t. 37 fig. 495 et *Bot. of Calif.* II 149; Regel, *Allior. Monog.* 114. — Californie. ♀
- A. stamineum** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 119 et *Fl. Or.* V 256; Regel, *Allior. Monog.* 195. — Asie occ. (de la Palestine à la Perse). ♀
- A. stellatum** Fraser ex KER in *Bot. Mag.* (1813) t. 1576; Don, *Monog. Allior.* 70; Schultes f. in Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 1088; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 184 t. 194; Kunth, *Enum. Pl.* IV 433; Regel, *Allior. Monog.* 148. — Saskatchewan, Nootka, Missouri. ♀
- A. stellerianum** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 82; Kunth, *Enum. Pl.* IV 426; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 181 (excl. var.) et *Icon. Fl. Ross.* t. 384; Regel, *Allior. Monog.* 149. A. BISULCUM Delaroche in Redouté, *Liliacées* V (1809) t. 286; *Bot. Mag.* (1811) t. 1381. — Sibérie. ♀
- A. stipitatum** Regel in *Gartenflora* XXX (1881) 223 t. 1062. — Turkestan. ♀
- A. strictum** Schrader, *Hort. Gotting.* (1809) t. 1; Kunth, *Enum. Pl.* IV 419; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 178; Reichenbach, *Pl. Crit.* V t. 105 et *Icon. Fl. Germ.* X t. 493; Regel, *Allior. Monog.* 164; Boissier, *Fl. Or.* V 246. — Europe centr. et or., Asie occ., centr. et or. ♀

- Allium subhirsutum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 295; Schultes f., *Syst. Veget.* VII 1190; Kunth, *Enum. Pl.* IV 440; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 502; Regel, *Allior. Monog.* 219; Boissier, *Fl. Or.* V 270; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 362. — Région Méditerr. (Europe, Asie et Afrique). 2
- A. subtilissimum** Ledebour, *Fl. Altaïca* II (1830) 22; *Icon. Fl. Ross.* t. 360 et *Fl. Ross.* IV 173; Kunth, *Enum. Pl.* IV 415; Regel, *Allior. Monog.* 103. — Sibérie austr., Songarie. 2
- A. subvillosum** Salzmänn in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1830) 1104; Regel, *Allior. Monog.* V 248; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 363. **A. subhirsutum** Desfontaines (non Linné), *Fl. Atlant.* I (1798) 286; Redouté, *Liliacées* VI t. 305. **A. vernale** Tineo in Gussone, *Fl. Sicul. Prodr. Suppl.* I (1832) 96; Parlatores, *Fl. Ital.* II 529. **A. album** Santi, *Viagg. al Montemiatto* I (1795) t. 7. — Italie, Canaries, Afrique bor. 2
- A. Tataricum** Linné f., *Suppl. Pl.* (1771) 196; *Bot. Mag.* (1808) t. 1142; Redouté, *Liliacées* II t. 98; Regel, *Fl. Turkest.* t. 14 fig. 5 et *Allior. Monog.* 178; Boissier, *Fl. Or.* V 246. — Russie austr., Asie occ. (de la Perse à la Sibérie) et centr. 2
- A. tricoccum** Solander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. I 4 (1789) 428; Don, *Monog. Allior.* 93; Kunth, *Enum. Pl.* IV 444; S. Watson, *Bot. King's Exped.* V 485; Regel, *Allior. Monog.* 178. — États-Unis. 2
- A. trifoliatum** Cyrillo, *Pl. Rar. Neapol.* fasc. II (1792) 11 t. 3; Boissier, *Fl. Or.* V 270. **A. subhirsutum** Linné var. **græcum** Regel, *Allior. Monog.* (1875) 221. **A. subhirsutum** Sibthorp et Smith (non Linné), *Fl. Græca* IV (1823) t. 313. **A. subhirsutum** Linné var. — Battandier in Battandier et Trabut, *Fl. d'Alger* (monoc.) (1884) 152 et *Flore de l'Algér.* (monoc.) (1895) 58; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 363. — Italie, Grèce, Chypre. 2
- A. unifolium** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1868) 112 fig. 35; S. Watson, *Bot. King's Exped.* V 486 t. 36 fig. 9, 10 et *Bot. of Calif.* II 147; Regel, *Allior. Monog.* 146; *Bot. Mag.* (1877) t. 6320. — Californie. 2
- A. urceolatum** Regel in *Gartenflora* XXII (1873) 226, in *Act. Hort. Petrop.* III (1873) 405 et *Allior. Monog.* 98. **A. cœruleum** Stscheglew. (non Pallas) in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* (1854) 202. — Songarie, Turkestan. 2
- A. validum** S. Watson in *Bot. King's Exped.* V (1871) 350 et 486 et in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 286; Regel, *Allior. Monog.* 147; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 147. — De l'Orégon à la Californie et à la Nevada. 2
- A. Victorialis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 295; Jacquin, *Fl. Austr. Icon* III t. 216; Redouté, *Liliacées* VI t. 303; *Bot. Mag.* (1829) t. 1222; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 506; Regel, *Allior. Monog.* 170; Boissier, *Fl. Or.* V 245. — Europe mérid.-oc. et centr.,<sup>1</sup> Caucase, Daghestan, Sibérie, Japon, Kamtchatka. 2
- A. viviparum** Karelin et Kirilow in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* (1841) 852; Regel, *Allior. Monog.* 99. **A. cœruleum** Pallas var. — Ledebour, *Fl. Ross.* IV (1853) 170. — Sibérie occ., Songarie, Turkestan. 2

**Allium Wallichianum** Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. 2, I (1840) 52. A. Cœruleum Wallich (non Pallas), *Catal.* (1832) n. 5076. A. WALLICHII Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 443 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1874) 291 ; Regel, *Allior. Monog.* 142 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 341. — Himalaya oc., Nepaul, Sikkim, Kumaon. 2

56. **LACHENALIA** Jacquin in Nov. Act. Helv. I (1787) 39 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7488. — Environ 30 espèces de l'Afrique austr.

**L. pendula** Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 464 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II t. 400 ; Redouté, *Liliacées* I t. 52 ; *Bot. Mag.* (1800) t. 490 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 403 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 369. — Colonie du Cap. 2

**L. versicolor** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 409 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 371. — Colonie du Cap. 2

— — var. **purpurea** BAKER, *loc. cit.* XI (1871) 409. L. PURPUREA Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786-93) t. 393 ; Trattinick, *Arch. d. Gewächsch.* II t. 401 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 289 ; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 371. — Avec le type.

57. **ALBUCA** Linné, *Sp. Pl.* II (1762) 438 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7494. — Environ 30 espèces de l'Afrique austr.

**A. caudata** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1793) t. 442 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 375 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* I t. 45 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 288 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 378. — Colonie du Cap. 2

**A. minor** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 438 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 720 ; Redouté, *Liliacées* I t. 21 ; Loddiges, *Bot. Cab.* IX t. 809 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* IV t. 239 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 287 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 379. — Colonie du Cap. 2

58. **VELTHEIMIA** Gleditsch in Act. Acad. Berol. (1769) 66 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7497. — Trois espèces de l'Afrique austr.

**V. Capensis** Redouté, *Liliacées* IV (1808) t. 493 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 384. ALETRIS — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 456 ; *Bot. Mag.* (1800) t. 504. V. VIRIDIFOLIA Jacquin, *Hort. Schœnbr.* I (1797) t. 78 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 411. — Colonie du Cap. 2

59. **MUSCARI** Miller, *Gard. Dict.* ed. VI (1752) ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7499. — Genre d'une quarantaine d'espèces de l'Europe, l'Asie occ. et l'Afrique bor.

**M. Atlanticum** Boissier et Reuter, *Pugill. Pl. Nov. Hisp.* (1852) 114 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 206 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 385. **BOTRYANTHUS** — Nyman, *Consp. Fl. Europ.* (1882) 734. — Espagne, Algérie. ♀

**M. bicolor** Boissier in LETOURNEUX, *Pl. Egypt.* (1878) et *Fl. Or.* V 294. — Égypte inférieure. ♀

**M. botryoides** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 1 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 361 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. I t. 15 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 219 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 417. **HYACINTHUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 318 ; *Bot. Mag.* (1791) t. 157. — Europe occ., centr. et or. ♀

**M. commutatum** Gussone, *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 426 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 369 ; Tenore, *Fl. Neapol.* t. 229 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 417. **HYACINTHUS** — Tenore, *Syll. Pl. Fl. Neapol.* (1831) 176. **BOTRYANTHUS** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 314 ; Parlatores, *Fl. Ital.* II 503. — Europe mérid., Asie occ. ♀

**M. comosum** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 231 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 457 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 219 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 414. **HYACINTHUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 318 ; *Bot. Mag.* (1790) t. 133. **BELLEVALIA** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 306. — Canaries, Région Méditerr., Asie occ. ♀

**M. Heldreichii** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 109 et *Fl. Or.* V 298 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* III t. 172 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 418. — Grèce (Parnasse). ♀

**M. macrocarpum** Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. I, III (1827) t. 210 ; Parlatores, *Fl. Ital.* II 508 ; Boissier, *Fl. Or.* V 289. **M. MOSCHATUM** Willdenow var. **FLAVUM** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 193 ; *Bot. Mag.* (1813) t. 1565 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 413. — Cappadoce (Grèce, Sicile, indig.?).

**M. maritimum** Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 308 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 416 ; Freyn in *Flora* (1885) 18 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 385. **BELLEVALIA** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 307 pr. p. **LEOPOLDIA** — Parlatores, *Fl. Ital.* II (1852) 498. — Algérie, Tripolitaine, Cyrénaïque, Crète. ♀

**M. moschatum** Willdenow, *Enum. Pl. Hort. Berol.* (1809) 378 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 734 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 413 ; Boissier, *Fl. Or.* V 288. **HYACINTHUS MUSCARI** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 317. **M. AMBROSIAECUM** Mönch, *Method. Pl. Marb.* (1794) 633 ; Redouté, *Liliacées* III t. 132. — Caucase, Kurdistan. ♀

**Muscari neglectum** Gussone in TENORE, *Syll. Pl. Fl. Neapol.* Append. V (1842) 13 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 218 ; Boreau, *Fl. Centr. Fr.* ed. 3, II 621 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 416. BOTRYANTHUS — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 679 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 502. — France, Allemagne, Italie. Ț

**M. pallens** Fischer, *Catal. Pl. Jard. Gorenki* (1812) 9 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 1 III t. 259 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 418 ; Boissier, *Fl. Or.* V 299. HYACINTHUS — Marschall Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 283 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 331. — Caucase. Ț

**M. pulchellum** Heldreich et Sartorius in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 109 et *Fl. Or.* V 295 ; Regel in *Gartenflora* (1862) t. 377. BOTRYANTHUS SARTORII Todaro, *Hort. Bot. Panorm.* (1875) t. 6. — Grèce, Antiliban, ? Perse bor. Ț

Obs. Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 416 réunit ce MUSCARI au M. RACEMOSUM Miller.

**M. racemosum** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 232 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 416 pr. p. ; Boissier, *Fl. Or.* V 295. HYACINTHUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 318 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* t. 187 ; *Bot. Mag.* (1790) t. 122. — Europe occ., centr., et mérid., Asie occ. Ț

— — var. **brachyatherum** BOISSIER, *Fl. Or.* V (1884) 295. M. STRANGWAYSII Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 389. M. SZOVITZIANUM Ruprecht mss. ex Boissier, *loc. cit.* — Turquie d'Europe, Asie Mineure, Caucase.

60. HYACINTHUS Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 427 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7500. — Genre d'environ 30 espèces habitant la Rég. Méditerr., l'Orient, l'Afrique trop. et austr.

**H. amethystinus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 317 ; Redouté, *Liliacées* I t. 14 ; *Bot. Reg.* (1819) t. 398 ; *Bot. Mag.* (1823) t. 2425 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 304 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 427. — Espagne, France mérid., Croatie, Bosnie. Ț

**H. candicans** Baker in SAUNDERS, *Refug. Bot.* III (1870) t. 174 ; *Fl. des Serres* XXI (1875) 47 t. 2172-73 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 425 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 386. — Colonie du Cap, Natal. Ț

**H. fastigiatus** Bertoloni in *Ann. Stor. Nat.* IV (1830) 62 et *Fl. Ital.* IV 157 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 217 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 430. SCILLA — Viviani, *Append. Fl. Corsic. Prodr.* (1825) I. H. POUZOLZII J. Gay ex Loiseleur in *Mém. Soc. Lin. Paris* VI (1827) 407 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 484. — Corse. Ț

**Hyacinthus Orientalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 317; *Bot. Mag.* (1806) t. 937; *Bot. Reg.* (1826) t. 995; Redouté, *Liliacées* VIII t. 465; Kunth, *Enum. Pl.* IV 303; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 460; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 426; Boissier, *Fl. Or.* V 309. — Dalmatie, Grèce, Algérie, Asie occ. ☞

**H. paradoxus** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* I (1835) 30; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 432. MUSCARI — C. Koch in *Linnæa* XXII (1849) 253; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 153. BELLEVALIA — Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 36 et *Fl. Or.* V 308. — Syrie, Liban, Palestine, Désert Egypto-Arabe. ☞

**H. Romanus** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 224; Redouté, *Liliacées* VI t. 334; Kunth, *Enum. Pl.* IV 307; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 431; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 388. SCILLA — Ker in *Bot. Mag.* (1806) t. 939. BELLEVALIA — Reichenbach, *Fl. Germ. Exkurs.* I (1830-32) 105; Kunth, *Enum. Pl.* IV 307; Boissier, *Fl. Or.* V 301. — Europe et Afrique méditerran., Chypre. ☞

**H. sessiliflorus** Viviani, *Fl. Libyc. Specim.* (1824) 21 t. 7 fig. 5; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 311; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 388. MUSCARI — Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 66. BELLEVALIA — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 309; Boissier, *Fl. Or.* V 305. — Afrique bor.-or., Asie occ. ☞

**H. spicatus** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 237; *Bot. Reg.* (1836) t. 1869; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 428. STRANGVEJA — Bertoloni in *Mem. Soc. Ital. Moden.* XXI (1835) 1; Boissier, *Fl. Or.* V 309. BELLEVALIA — Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 VII (1846) 110. FOXIA — Parlatore, *Nuov. Gen. e Spec. Piant. Monoc.* (1854) 18. — Grèce, Crète, îles Ioniennes. ☞

**H. Webbianus** Nyman, *Syll. Fl. Europ.* Suppl. (1865) 64. BELLEVALIA — Parlatore, *Nuov. Gen. e Spec. Piant. Monoc.* (1854) 19 et *Fl. Ital.* II 480. — Italie centr. ☞

Obs. Baker, *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 432 réunit ce HYACINTHUS au H. DUBIUS Gussone.

61. **PUSCHKINIA** Adams in *Nov. Act. Acad. Petrop.* XIV (1805) 164; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7501. — Genre de 2 espèces habitant l'Asie Mineure, le Caucase et l'Afghanistan.

**P. scilloides** Adams in *Nov. Act. Acad. Petrop.* XIV (1805) 164; Lindley, *Collect. Bot.* t. 24; *Bot. Mag.* (1821) t. 2224; Kunth, *Enum. Pl.* IV 338; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 435; Boissier, *Fl. Or.* V 310. ADAMSIA — Willdenow in *Mag. Gess. Naturf. Fr. Berl.* (1818) 16. — Crète, Asie occ. (du Liban au Kurdistan). ☞

— — var. **Libanotica** BOISSIER, *Fl. Or.* V (1884) 310. P. LIBANOTICA Zuccarini in *Abh. Akad. Muench.* III (1840) 238. — Liban.

62. **CHIONODOXA** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, V (1844) 61 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7502. — Cinq espèces de l'Orient.

**C. Cretica** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 XIII (1853) 24 et *Fl. Or.* V 311 ; Jaubert et Spach, *Illustr. Pl. Or.* V t. 433 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 435. — Crète. ♀

**C. Lucillæ** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 V (1844) 61 et *Fl. Or.* V 311 ; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6423 (var. *FORBESII*) et in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) 435 ; *The Garden XVIII* (1881) 12 t. 239 ; *Gartenflora* (1887) 457 t. 1255 fig. a. — Asie Mineure. ♀

**C. Sardensis** Barr et Snyders, *Catal.* (1883) ex Boissier, *Fl. Or.* suppl. (1888) 371 ; *The Garden XVIII* (1885) 178 t. 505 ; *Gartenflora* (1887) 457 t. 1255 fig. b et c. — Lydie (Sardes). ♀

63. **EUCOMIS** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 17 t. 18 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7504. — Cinq espèces de l'Afrique austr.

**E. punctata** L'Héritier, *Sert. Angl.* (1788) 18 t. 18 ; *Bot. Mag.* (1806) 943 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 218 ; *Fl. des Serres XXII* (1877) t. 2307 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 302 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 225 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 389. *BASILÆA* — Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* I (1791) t. 289 fig. 2. *ORNITHOGALUM* — Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* (1794) 62. — Colonie du Cap, Natal, Orange. ♀

**E. regia** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 433 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 302 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 225 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 389. **E. CLAVATA** Baker in Saunders, *Refug. Bot.* IV (1870) t. 238. — Colonie du Cap, Natal, Orange. ♀

64. **SCILLA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 449 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7505. — Genre de 80 espèces bien distinctes habitant l'Europe, l'Asie temp. et mont., l'Afrique extratrop. et mont. (et le Chili ?).

**S. amoena** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 309 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II t. 218 ; *Bot. Mag.* (1796) t. 344 ; Redouté, *Liliacées* V t. 298 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 464 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 240. — Autriche, Allemagne, Italie bor. ♀

**S. autumnalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 309 ; *Bot. Mag.* (1793) t. 249 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 317 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 463 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 234 ; Boissier, *Fl. Or.* V 224. — De l'Angleterre, au Caucase et à la Syrie, Algérie. ♀

- Scilla bifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 309 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 746 ; Redouté, *Liliacées* V t. 254 ; Boissier, *Fl. Or.* V 227 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 464 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 239. — Europe occ., centr. et mér., Asie occ. ♀
- — var. **nivalis** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 249 ; Boissier, *Fl. Or.* V 227. S. NIVALIS Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, V (1844) 63. — Grèce, Asie Mineure. ♀
- S. hæmorrhoidalis** Webb in Webb et Berthelot, *Phytogr. Canar.* (1836-50) 336 t. 230 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 235 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 392. S. DASYANTHA Webb, *loc. cit.* (1836-50) 337 t. 231. — Canaries. ♀
- S. hyacinthoides** Linné, *Syst. Natur.* ed. XIII (1788-93) 272 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1140 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 465 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 237 ; Boissier, *Fl. Or.* V 225. NECTAROSCILLA — Parlatore, *Nuov. Gen. e Spec. Piant. Monoc.* (1854) 27. — Toute la Région Méditerranéenne. ♀
- S. Italica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 308 pr. p. ; *Bot. Mag.* (1795) t. 304 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XV (1828) t. 1483 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 464 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 323 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 238. — France mérid., Allemagne, Suisse, Italie. ♀
- S. Japonica** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 233. ORNITHOGALUM — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 137 et *Icon. Pl. Jap.* t. 34. — Japon, île Loo-Choo. ♀
- S. Lilio-Hyacinthus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 308 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 205 ; Rœmer, *Script. de Pl. Hisp.* t. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 328 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 237. — France centr. et mérid., Espagne bor. ♀
- S. lingulata** Poiret, *Voy. en Barb.* II (1889) 151 ; Desfontaines, *Fl. Atlant.* I t. 85 fig. 1 ; Redouté, *Liliacées* VI t. 321 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 324 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 244 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 395. — Algérie, Maroc. ♀
- S. nonscripta** Hoffmannsegg et Link in *Gess. Nat. Fr. Berlin, Neue Schrift.* IV (1803) 19 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1461 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 224 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 256. HYACINTHUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 316. S. NUTANS Smith, *Engl. Bot.* (1797) t. 377 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 327. AGRAPHIS — Link, *Bot. Handb.* I (1829) 166. — De l'Angleterre à l'Espagne, l'Italie et l'Illyrie. ♀
- S. Numidica** Poiret, *Voy. en Barbarie* II (1789) 150 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 234 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 395. S. PARVIFLORA Desfontaines, *Fl. Atlant.* I (1798) 300 t. 87 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 234 ; Battandier et Trabut, *Fl. d'Alger* (monoc.) 161. STELLARIS — Steinheil in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, VI (1836) 286. — Algérie. ♀



**Scilla obtusifolia** Poiret, *Voy. en Barbarie* II (1789) 149; Desfontaines, *Fl. Atlant.* I 299 t. 86; Redouté, *Liliacées* IV t. 190; Kunth, *Enum. Pl.* IV 315; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 234; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 395. — Maroc, Algérie, Sennaar, Abyssinie. ♀

— — var. **fallax** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 234; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 396. S. FALLAX Steinheil in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2, I (1834) 103 t. 4; Battandier et Trabut, *Fl. d'Alger* (monoc.) 161. — Maroc, Algérie.

— — var. **intermedia** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 235. S. INTERMEDIA Gussone, *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 417. — Sicile, Sardaigne, Corse.

**S. odorata** Link in SCHRADER, *Journ. für Bot.* II (1799) 319; Kunth, *Enum. Pl.* IV 322; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 213; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 242. — Portugal, Espagne. ♀

**S. Peruviana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 309; Redouté, *Liliacées* III t. 167; *Bot. Mag.* (1804) t. 749; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 465; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 240; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 395. S. HEMISPHERICA Boissier, *Voy. Bot. Esp.* (1839-45) 613 et *Fl. Or.* V 225. S. ELONGATA Parlatore, *Nuov. Gen. et Spec. Piant. Monoc.* (1854) 24. S. SICULA Tineo in Gussone, *Fl. Sicul. Syn.* II (1844) 813 in add. — Portugal, Corse, Italie cont. et insul., Algérie, Égypte. ♀

**S. pratensis** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Rar. Hung.* II (1805) 207 t. 189; *Bot. Reg.* (1839) t. 63; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 463; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 236. — Croatie, Bosnie, Dalmatie. ♀

**S. puschkinioides** Regel in *Act. Hort. Petrop.* III (1375) 295 et in *Gartenflora* XXX (1881) 227 t. 1051 fig. 1. — Turkestan. ♀

**S. Sibirica** Andrews, *Bot. Repos.* VI (1805) t. 365; Loddiges, *Bot. Cab.* II (1818) t. 151; Kunth, *Enum. Pl.* IV 318; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 238. S. AMENA De Candolle (non Linné) in Redouté *Liliacées* III (1807) t. 130. — De la Russie centr. et mérid. à l'Arménie, la Géorgie et le Kurdistan. ♀

**S. Strangwaysii** Tenore, *Ind. Sem. Hort. Neapol.* (1839) 12; Boissier, *Fl. Or.* V 228 in obs. — Turquie d'Europe. ♀

**S. verna** Hudson, *Fl. Angl.* ed. II (1778) 142; *Engl. Bot.* (1791) t. 23; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 463; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 241. S. UMBELLATA Ramond in *Bull. Soc. Philom.* II (1800) 130 fig. 6; Redouté, *Liliacées* III t. 168. — Iles Féroë, Irlande, Angleterre, France, Espagne bor. ♀

65. **CAMASSIA** Lindley in *Bot. Reg.* XVIII (1832) t. 1486 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7506. — Deux espèces de l'Amérique bor.

**C. esculenta** Lindley in *Bot. Reg.* XVIII (1832) t. 1486 ; *Fl. des Serres* III (1847) t. 275 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 256 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 240. **SCILLA** — Hooker in *Bot. Mag.* (1827) t. 2774. **PHALANGIUM** — Nuttall in Fraser, *Catal.* (1813). — De la Colombie à la Californie et l'Utah. ♀

— — var. **Leichtlini** Baker in *Bot. Mag.* (1877) t. 6287. **C. LEICHTLINI** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XX (1885) 376. **CHLOROGALUM** — Baker in *Gard. Chron.* (1874) I 689. — Avec le type.

**C. Fraseri** Torrey, *Bot. Whipple Exped.* (1856) t. 91 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 257 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 240. **SCILLA** — A. Gray, *Man. Bot. N. Unit. St.* ed. V (1868) 533. **S. ESCULENTA** Ker (non Hooker) in *Bot. Mag.* (1813) t. 1574. — De la Pensylvanie à l'Iowa et au Texas. ♀

66. **ORNITHOGALUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 418 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7507. — Genre de 70 espèces environ habitant l'Europe, l'Orient et l'Afrique extratrop. et trop. (naturalisé en Amérique).

**O. Arabicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 307 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 728 ; *Bot. Reg.* (1823) t. 706 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 470 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 270 ; Boissier, *Fl. Or.* V 213. — Canaries, Madère, Europe et Afrique médit., Chios, Arabie. ♀

**O. Armeniacum** Baker in *Gard. Chron.* (1879) I 748 ; Boissier, *Fl. Or.* V 219. — Arménie, ? Cilicie. ♀

**O. caudatum** Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 442 ; Jacquin, *Collect. Bot.* II (1789) 315 et *Icon. Pl. Rar.* II t. 423 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 805 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* IV (1871) t. 262 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 276 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 400. — Congo, Cap de Bonne-Espérance. ♀

**O. collinum** Gussone, *Ind. Sem. Hort. Boccadif.* (1825) et *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 412 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 468 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 441 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 265. — Dalmatie, Italie, Sicile. ♀

**O. comosum** Linné, *Cent. Pl.* II (1756) 15 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II II t. 426 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 468 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 359 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 262. — Autriche, Italie, Dalmatie, Macédoine. ♀

**Ornithogalum crenulatum** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 498 ; Thunberg, *Fl. Capens.* (ed. Schult.) 315 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 371 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 278 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 401. — Cap de Bonne-Espérance. ♀

**O. cuspidatum** Bertoloni, *Fl. Ital.* IV (1839) 99 in obs. ; *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 21 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 264 ; Boissier, *Fl. Or.* V 217. O. BYSANTINUM Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie. ♀

**O. divergens** Boreau, *Fl. Centr. Fr.* ed. I (1840) 507 et ed. 3, II 625 ; Jordan, *Icon. Fl. Europ.* t. 125 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 190 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 436 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 267 ; Boissier, *Fl. Or.* V 218. — Europe mérid. et centr.-or., Chios. ♀

**O. fimbriatum** Willdenow in *Gess. Natur. Fr. Berlin, Neue Schrift.* III (1801) 420 ; Lindley, *Collect. Bot.* t. 8 ; *Bot. Mag.* (1831) t. 3077 ; *Bot. Reg.* (1821) t. 555 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 362 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 268 ; Boissier, *Fl. Or.* V 221. — Turquie d'Europe, Asie Mineure, Syrie. ♀

**O. lacteum** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786-93) 20 t. 434 ; Andrews, *Bot. Repos.* IV (1803) t. 274 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1134 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 418 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 283 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 402. — Colonie du Cap. ♀

**O. lanceolatum** Labillardière, *Icon. Pl. Syr.* V (1812) 11 t. 8 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 360 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 263 ; Boissier, *Fl. Or.* V 216. — Syrie, Asie Mineure, Chypre, Mésopotamie. ♀

**O. montanum** Tenore, *Prodr. Fl. Napol.* (1811) XXII ; *Bot. Reg.* (1838) t. 28 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* t. 470 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 360 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 264 ; Boissier, *Fl. Or.* V 216. — Grèce, Asie Mineure, Syrie, Mésopotamie, Chypre. ♀

**O. Narbonense** Linné, *Cent. Pl.* II (1756) 15 ; *Bot. Mag.* (1824) t. 2510 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 188 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 477 et *Pl. Crit.* X t. 906 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 417 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 277 ; Boissier, *Fl. Or.* V 214. — Canaries, Europe mérid., Asie occ., Algérie. ♀

**O. nutans** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 308 ; *Bot. Mag.* (1794) t. 269 ; *Fl. Danica* VII t. 912 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* IV t. 301 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 272 ; Boissier, *Fl. Or.* V 212. MYOGALUM — Link, *Bot. Handb.* I (1829) 164 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 348. — Europe centr. et or., Asie Mineure. ♀

**O. paterfamilias** Godron in *Mém. Soc. Émul. Doubs sér. 2*, V (1854) 27 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 190 ; Walpers, *Annal. Bot.* VI 117 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 267. — France mérid. ♀

- Ornithogalum Pyrenaicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 306 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* II t. 403 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 234 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* X t. 907 et *Icon. Fl. Germ.* X t. 471 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 355 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) 275 ; Boissier, *Fl. Or.* V 213. — De l'Angleterre à l'Espagne, la Grèce et le Caucase. ♀
- O. tenuifolium** Gussone, *Fl. Sicul. Prodr.* I (1827) 413 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 467 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 265 ; Boissier, *Fl. Or.* V 218. **O. GUSSONII** Tenore, *Fl. Napolitana* III (1824-29) 371 t. 226 fig. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 364. — France, Italie, Grèce, Asie occ. Égypte. ♀
- O. Visianicum** Tommasini ex VISIANI in *Mem. Inst. Venet.* XX (1876) 176 et *Fl. Dalm. Suppl.* II (1877) 60. — Dalmatie. ♀
67. **LILIUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 410 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7509. — Genre d'environ 50 espèces bien distinctes habitant la région temp. de l'hémisphère bor. (Ancien et Nouveau Monde).
- L. auratum** Lindley in *Gard. Chron.* (1862) 644 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5338 ; *Fl. des Serres* XV (1862-63) 57 t. 1328-31 ; *Illustr. Hort.* IX (1862) t. 338 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 234. — Japon. ♀
- L. callosum** Siebold et Zuccarini, *Fl. Jap.* I (1835) 86 t. 14 ; *Fl. des Serres* III (1847) t. 230 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 262 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 250. **L. POMPONICUM** Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 134. — Japon. ♀
- L. Canadense** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 303 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 858 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 258 ; *Fl. des Serres* (1856) t. 1174 ; Bury, *Hexandr. Pl.* t. 12 ; *Belg. Hort.* VII (1857) 292 t. 48 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 240 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 256. — Du Canada à la Géorgie. ♀
- — var. **flavum** PLANCHON in Van Houtte, *Fl. des Serres* XI (1856) t. 1174. **L. CANADENSE** Linné var. **FL. FLAVO** Ker in *Bot. Mag.* (1804) t. 800.
- L. Carniolicum** Bernhardi ex MERTENS et KOCH, *Deutschl. Fl.* II (1826) 536 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 260 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 452 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 404 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 247 ; Boissier, *Fl. Or.* V 175. **L. CHALCEDONICUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 434 pr. p. ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon. Suppl.* t. 20. — Lombardie, Istrie, Dalmatie, Illyrie, Autriche, Bosnie. ♀
- L. Catesbæi** Walter, *Fl. Carol.* (1788) 123 ; *Bot. Mag.* (1794) t. 259 ; Loddiges, *Bot. Cab.* IX (1824) t. 807 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 2 t. 185 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 263 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 240 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 255. **L. CAROLINIANUM** Catesby (non Michaux), *Natur. Hist. of Carolina* II (1733) t. 58. — De la Caroline à la Floride. ♀

**Lilium Chaleedonicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 302 pr. p.; *Bot. Mag.* (1787) t. 30; Redouté, *Liliacées* V t. 276; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 453; Kunth, *Enum. Pl.* IV 262; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 249; Boissier, *Fl. Or.* V 176. — Grèce, îles Ioniennes. ♀

**L. Columbianum** Hanson ex Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 243. L. CANADENSE Linné var. PARVIFLORUM Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1840) 141. L. LUCIDUM Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* VI (1874) 144. — De la Colombie brit. à l'Orégon et à la Californie. ♀

Obs. Déjà indiqué dans le *Gard. Chron.* (1871) 1257 sous le nom de L. COLUMBIANUM Hort.

**L. concolor** Salisbury, *Parad. Lond.* (1806) t. 47; Kunth, *Enum. Pl.* IV 259 et 653; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 236. L. SINICUM Lindley et Paxton, *Brit. Fl. Gard.* II (1851-52) 115 t. 193; Lemaire in *Illustr. Hort.* III (1856) t. 100; *Fl. des Serres* XII (1857) 49 t. 1206. — Chine. ♀

— — var. **Partheneion** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 237. L. PARTHENEION Siebold et De Vriese, *Tuinbouw Fl.* II (1855) 344 cum icone. L. CORIDION Siebold et De Vriese, *loc. cit.* II (1855) 341; Duchartre, *Obs. Genre Lis* 42. — Avec le type.

— — var. **pulchellum** BAKER, *loc. cit.* XIV (1874) 237. L. PULCHELLUM Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1839) 56; Regel in *Gartenflora* (1860) 81 t. 284 fig. 2. — Dahourie.

**L. Dauricum** Ker in *Bot. Mag.* (1809) sub t. 1210; *Bot. Reg.* (1822) t. 594; Kunth, *Enum. Pl.* IV 264; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 238. L. PENSYLVANICUM Ker in *Bot. Mag.* (1805) t. 872. L. SPECTABILE Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 321; Kunth, *Enum. Pl.* IV 676. — Des monts Altaï au Kamtchatka, Japon. ♀

**L. elegans** Thunberg in *Mém. Acad. Sc. St-Petersb.* III (1814) 203 t. 3 fig. 2; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 239. L. PHILADELPHICUM Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 135. L. THUNBERGIANUM Schultes in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 415; Lindley in *Bot. Reg.* (1839) t. 38; Maund, *The Botanist* t. 158; Paxton, *Mag. of Bot.* VII 127 cum icone. — Japon. ♀

— — var. **alutaceum** BAKER et DYER in *Gard. Chron.* (1872) 1356 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 239.

— — var. **armeniaceum** BAKER et DYER, *loc. cit.* (1872) 1356 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 239.

— — var. **atrosanguineum** BAKER et DYER, *loc. cit.* (1872) 1356 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 239.

**L. giganteum** Wallich, *Tent. Fl. Nepal.* (1824-26) 21 t. 12-13 (excl. syn.); *Bot. Mag.* (1853) t. 4673; *Fl. des Serres* VIII (1852-53) 59 t. 771-72; *Belg. Hort.* III (1853) 133 t. 21 fig. 1-3; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 227; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 349. L. CORDIFOLIUM D. Don (non Thunberg), *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 21 t. 12-13 (excl. syn.) — Himalaya tempérée. ♀

**Lilium Hansonii Leichtlin** ex BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 245. — Japon. ♀

**L. Humboldtii Rœzl et Leichtlin** ex DUCHARTRE, *Obs. Genre Lis* 105 in *Journ. Soc. Hort. France* ser. 2, V (1871) 43; Regel in *Gartenflora* (1872) t. 724; *Fl. des Serres* XIX (1873) t. 1973-74; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 244; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 257. **L. BLOOMERIANUM** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* III (1863) 160. **L. CANADENSE** Linné var. **PUBERULUM** Torrey, *Bot. Pacif. Railr. Rep.* (Whipple expéd.) IV (1857) 146. — Californie. ♀

**L. Japonicum Thunberg**, *Fl. Jap.* (1784) 133; *Bot. Mag.* (1813) t. 1591; Loddiges, *Bot. Cab.* V t. 438; Reichenbach, *Fl. Exot.* II t. 88; Kunth, *Enum. Pl.* IV 257; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 230. — Japon, Corée. ♀

**L. Kramerii Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1873) t. 6058; *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2061-62. — Peut-être hybride des **L. SPECIOSUM** et **JAPONICUM**. ♀

**L. lancifolium Thunberg** in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 333 et in *Mém. Acad. Sc. St-Pétersb.* III (1811) 202 t. 3; Kunth, *Enum. Pl.* IV 266; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 251. **L. BULBIFERUM** Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 134. — Japon. ♀

**L. Leichtlini Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1867) t. 5673; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 39 t. 1736; *Illustr. Hort.* XV (1868) t. 540; *Belg. Hort.* (1868) 156 t. 11; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 248. — Japon. ♀

**L. longiflorum Thunberg** in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 333; *Bot. Mag.* (1802) t. 560; Loddiges, *Bot. Cab.* X t. 985; Kunth, *Enum. Pl.* IV 266; *Fl. des Serres* III (1847) t. 270; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 229. — Japon, Chine, Formose, Hong-Kong, îles Loo-Choo. ♀

**L. maritimum Kellogg** in *Proc. Calif. Acad.* VI (1874) 140; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 256. **L. CANADENSE** Linné var. **PARVIFLORUM** Bolander in *Proc. Calif. Acad.* V (1875) 206. — Californie. ♀

**L. Maximowiczii Regel**, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) *Suppl.* (1867) 26 et in *Gartenflora* (1868) 322 t. 596. **L. LEICHTLINII** Hooker f. var. **MAJUS** Wilson in *Journ. of Hort.* (1873) 371 cum icône; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 248. — Japon. ♀

**L. monadelphum Marschall Bieberstein**, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 267; *Bot. Mag.* (1811) t. 1405; Reichenbach, *Fl. Exot.* II t. 89; Regel in *Gartenflora* (1872) 257 t. 733; Kunth, *Enum. Pl.* IV 260; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 246; Boissier, *Fl. Or.* V 173. — Caucase, Perse bor. ♀

— — var. **Szovitzianum** BAKER ex Boissier, *Fl. Or.* V (1881) 173. **L. SZOVITZIANUM** Fischer et Lallemand, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1839) 58; *Fl. des Serres* V (1849) t. 507-509. — Asie Mineure. ♀

**Lilium pardalinum Kellogg** in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 12 cum icône ; *Bot. Mag.* (1889) t. 7092 ; Duchartre, *Obs. Genre Lis* 97 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 242 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 257. — Californie. ♀

— — var. **angustifolium** KELLOGG ex S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 2478. L. RÖZLI Regel in *Gartenflora* (1870) 321 t. 667. — Avec le type.

— — var. **puberulum** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 242. L. PUBERULUM Hort. Leichtlin ex Baker, *loc. cit.*

**L. Parryi** S. Watson in *Proceed. Davenport Acad.* II 188 t. 5 et 6 et in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 256 ; Elwes, *Monog. of Gen. Lilium* t. 12 ; T. Moore in *Florist and Pomol.* (1883) 3 t. 553 ; Baker in *Bot. Mag.* (1882) t. 6650. — Californie. ♀

**L. parvum Kellogg** in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 179 t. 52 ; Regel in *Gartenflora* (1872) 163 t. 725 ; Elwes, *Monog. of Gen. Lilium* t. 30 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 256. L. CANADENSE Linné var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 241. — De la Californie à l'Orégon. ♀

**L. Philadelphicum Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 435 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 519 et (1889) t. 7080 ; Redouté, *Liliacées* II t. 104 ; *Bot. Reg.* (1822) t. 594 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 263 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 235 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 255. — Du Canada à la Caroline et au Colorado. ♀

**L. pomponium Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 302 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 971 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 432 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 266 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 181 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 249. — France mérid., Italie bor. ♀

— — var. **Pyrenaicum** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 249. L. PYRENAICUM Gouan, *Illustr. et Obs. Bot.* (1773) t. 25 ; Redouté, *Liliacées* III t. 145 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 433. — Pyrénées.

**L. superbum Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 434 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 936 ; Redouté, *Liliacées* II t. 103 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) t. 1014-15 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 258 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 242 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 257. — Du Canada à la Géorgie et à la Caroline. ♀

— — var. **Carolinianum** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 243 ; S. Watson, *loc. cit.* XIV (1879) 257. L. CAROLINIANUM Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 197 ; *Bot. Mag.* (1821) t. 2280 ; *Bot. Reg.* (1821) t. 580 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 258. L. MICHAUXII Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 457. L. MICHAUXIANUM Schultes f. in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 258. L. AUTUMNALE Loddiges, *Bot. Cab.* IV (1819) t. 355. — De la Virginie à la Floride et à la Caroline.

**Lilium tenuifolium** Fischer, *Catal. Pl. Jard. Gorenki* ed. II (1812) 8 ; *Bot. Mag.* (1832) t. 3140 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 275 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 263 ; Regel in *Gartenflora* IX (1860) t. 284 ; *Fl. des Serres* XIV (1861) 213 t. 1473. **L. PUMILUM** De Candolle in Redouté, *Liliacées* VII (1813) t. 378 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 250. **L. LINIFOLIUM** Horneman, *Hort. Hafn.* I (1813) 326. **L. PUNICEUM** Siebold et De Vriese in *Ann. Hort. Pays-Bas* (1861) 23. — Des Monts Altaï à l'Amour, Chine bor. ♀

**L. tigrinum** Ker in *Bot. Mag.* (1810) t. 1237 ; De Candolle in Redouté, *Liliacées* VII t. 395 et VIII t. 435 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 259 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 233. **L. SPECIOSUM** Andrews (non Thunberg), *Bot. Repos.* IX (1809) t. 586. — Chine, Japon. ♀

Obs. Baker (*loc. cit.*) rapporte comme forme à cette espèce le **L. FORTUNEI** Hort.

**L. Washingtonianum** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 13 ; Regel in *Gartenflora* (1872) 4 t. 710 ; *Fl. des Serres* XIX (1873) 69 t. 1975-76 ; Baker in *Gard. Chron.* (1871) 709 t. 142 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 232 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 256. — Californie. ♀

68. **FRITILLARIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 411 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7510. — Plus de 50 espèces décrites, mais une quarantaine seulement bien distinctes habitant la région temp. de l'hémisphère bor. (Ancien et Nouveau Monde.)

**F. acmopetala** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 104 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 851 ; *Bot. Mag.* (1877) t. 6321 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 262 ; Boissier, *Fl. Or.* V 180. — Syrie, Cilicie. ♀

**F. Armena** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 106 ; *Bot. Mag.* (1878) t. 6365 ; Boissier, *Fl. Or.* V 185. — Arménie Turque. ♀

Obs. Baker (*Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 266) rapporte avec doute ce **FRITILLARIA** au **F. TULIPIFOLIA** Marschall Bieberstein.

**F. aurea** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* IV (1854) 137 et in Walpers, *Annal. Bot.* VI 106 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 259 in obs. ; Boissier, *Fl. Or.* V 183. — Cilicie. ♀

**F. biflora** Lindley in *Bot. Reg.* XX (1834) sub t. 1663 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 254 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 273 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 258. **F. LANCEOLATA** Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Survey* (1859) 217 t. 61. — Californie. ♀

**F. Bucharica** Regel in *Acta Hort. Petrop.* VIII (1884) 652 et in *Gartenflora* XXXIII (1884) 72 et 321 t. 1171. — Boukharie. ♀



**Fritillaria citrina** Baker in *Gard. Chron.* (1893) I 538. — Taurus, Grèce. ♀

**F. crassifolia** Boissier et Huet in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 103 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 264 ; Boissier, *Fl. Or.* V 182. — Iles Ioniennes, Grèce, Crète. ♀

**F. Delphinensis** Grenier in GRENIER et GODRON, *Fl. de Fr.* III (1855) 180 ; Parlatores, *Fl. Ital.* II 412 ; Walpers, *Annal. Bot.* IV 107 ; Planchon in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XX (1873) 114 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 254. F. TUBÉFORMIS Grenier et Godron in *Mém. Soc. Émul. Doubs* (1854) ex Grenier et Godron, *loc. cit.* — Dauphiné, Savoie. ♀

— — var. **Moggridgei** BOISSIER et REUTER in litt. ex Planchon, *loc. cit.* XX (1873) 116 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1874) 253. — Alpes Maritimes.

**F. Ehrharti** Boissier et Orphanides in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 105 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 268 ; Boissier, *Fl. Or.* V 186. — Ile Syra. ♀

**F. Græca** Boissier et Spruner in BOISSIER, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, VII (1846) 104 ; Walpers, *Annal. Bot.* I 851 ; *Bot. Mag.* (1858) t. 5052 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 262 ; Boissier, *Fl. Or.* V 181. F. PYRENAÏCA Sibthorp et Smith (non Linné), *Fl. Græca* VI (1827) t. 328. — Grèce (Attique). ♀

**F. imperialis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 303 ; *Bot. Mag.* (1817) t. 194 ; Redouté, *Liliacées* III t. 131 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 274. F. CORONA-IMPERIALIS Gärtner, *De Fruct. et Semin.* I (1788) 64 t. 17 fig. 1. PETILUM IMPERIALIS Jaume Saint-Hilaire, *Exp. Familles Nat.* I (1805) 120 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 246. — Perse, Afghanistan, Kaschmire. ♀

**F. involuerata** Allioni, *Auct. Fl. Pedem.* (1789) 34 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 249 pr. p. ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 445 ; Parlatores, *Fl. Ital.* II 413 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 180 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 36 ; Planchon in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XX (1873) 110 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 256. — Provence, Alpes Maritimes. ♀

**F. lanceolata** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 230 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 181 t. 193 ; Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Surv.* t. 61 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 271 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 259 et *Bot. of Calif.* II 169. — De Vancouver et de la Colombie Britannique à l'Oregon et à la Californie. ♀

— — var. **floribunda** BENTHAM, *Pl. Hartweg.* (1857) 338 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 259 et *Bot. of Calif.* II 169. F. VIRIDIA Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 9. LILIORHIZA — Kellogg, *loc. cit.* II (1863) 468. — Californie.

— — var. **gracilis** S. WATSON, *loc. cit.* XIV (1879) 259. F. LANCEOLATA Pursh var.? Bentham, *loc. cit.* (1857) 338. — Californie.

- Fritillaria latifolia** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1799) 92 ; Redouté, *Liliacées* I t. 51 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 853 et (1809) t. 1207 ; Boissier, *Fl. Or.* V 178. *F. lutea* Miller var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 259. — Caucase, Perse. ♀
- F. Libanotica** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 270 ; Boissier, *Fl. Or.* V 180. *THERESIA* — Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 20. — Liban, Antiliban, Palestine. ♀
- F. liliacea** Lindley in *Bot. Reg.* XX (1834) t. 1663 ; Regel in *Gartenflora* (1872) 65 t. 715 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 273 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 258 et *Bot. of Calif.* II 168. *LILIORHIZA LANCEOLATA* Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 46 t. 1. — Californie. ♀
- F. lutea** Marschall-Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 269 et *Cent. Pl. Ross.* t. 41 ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 145 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 250 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 259 ; Boissier, *Fl. Or.* V 178. — Caucase, Arménie. ♀
- F. macrophylla** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 51 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 253 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 268. *NANOLIRION* — Boissier, *Fl. Or.* V (1884) 190. *LILIUM ROSEUM* Wallich, *Catal.* (1832) n. 5077 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4725. *F. THOMSONIANA* D. Don in Royle, *Illustr. Himal. Pl.* (1839) 388 t. 92. *LILIUM* — Lindley in *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 1. — Afghanistan, Himalaya occ., Nepaul. ♀
- F. Meleagris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 304 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 622 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 222 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 251 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 442 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 254. — Europe occ., centr. et or. ♀
- — forma **alba** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 254. *F. ALBA* Parkinson, *Paradisus Terrestris* 41 t. 4. — Avec le type.
- F. meleagroides** Patrin in Roemer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 395 ; *Bot. Mag.* (1833) t. 3280. *F. MINOR* Ledebour, *Fl. Altaica* II (1830) 34, *Icon. Pl. Fl. Ross.* II 12 t. 130 et *Fl. Ross.* IV 146. — Sibérie (des monts Altaï à la Songarie). ♀
- F. Messanensis** Rafinesque in Desvaux, *Journ. de Bot.* IV (1814) 272 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 445 ; Morren in *Belg. Hort.* (1851) 10 t. 445 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 413 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 220 ; Boissier, *Fl. Or.* V 181. — Europe mérid., Crète. ♀
- F. obliqua** Ker in *Bot. Mag.* (1805) t. 857 ; Boissier, *Fl. Or.* V 184. *F. TRISTIS* Heldreich et Sartorius in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 104. — Grèce. ♀
- F. Oranensis** Pomel, *Nouv. Matériaux Fl. Atlant.* (1874) 253 ; Baker in *Gard. Chron.* (1880) I 340 fig. 62 ; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (monoc.) 73 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 407. *F. MELEAGRIS* Desfontaines (non Linné), *Fl. Atlant.* I (1798) 293. *F. PYRENAICA* Munby (non Linné), *Fl. de l'Algérie* (1847) 35. *F. MUNBYI* Baker in *Gard. Chron.* (1877) I 45. — Algérie. ♀

- Fritillaria Persica** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 436 ; Redouté, *Liliacées* II t. 67 ; *Bot. Mag.* (1813) t. 1537 ; Trattinick, *Thes. Bot.* t. 79 ; Boissier, *Fl. Or.* V 188. — Arménie. Ț
- F. Pontica** Wahlenberg apud J. BERGGREN in *Resor i Europa och Osterland* Append. (1826) 27 et in *Isis* XXI (1828) 983 ; Boissier, *Fl. Or.* V 179. F. OLYMPICA C. Koch in *Linnaea* XXII (1849) 232. — Macédoine, Thrace, Bithynie, Anatolie. Ț
- F. pudica** Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 64 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 267 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 260 et *Bot. of Calif.* II 170. LILIUM — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 288 t. 8. AMELLION — Rafinesque in *Americ. Monthly Mag.* (1818) 265. — Territoire de Washington, Orégon, Utah, Californie. Ț
- F. Pyrenaica** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 304 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 664 , Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 443 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 179 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 220. — Pyrénées. Ț
- F. recurva** Benthams, *Pl. Hartweg.* (1857) 340 ; *Bot. Mag.* (1876) t. 6264 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 272 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 258 et *Bot. of Calif.* II 168. — Californie, Orégon. Ț
- F. Rhodocanakis** Orphanides in *Atti Congr. Bot. Firenze* (1874) 214 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1878) 323 ; Boissier, *Fl. Or.* V 182. — Ile Hydra (Grèce). Ț
- F. Ruthenica** Wickström in *Vet. Acad. Handl. Stockholm* II (1821) 6 t. 5 fig. 2 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 343 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 252 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 258 ; Boissier, *Fl. Or.* V 188. F. VERTICILLATA Marschall-Bieberstein (non Willdenow), *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 268. — Russie centr.-or. et mérid., Sibérie Oural., Caucase. Ț
- F. tenella** Marschall-Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 269 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 443 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 255 ; Boissier, *Fl. Or.* V 179. F. MONTANA Hoppe in *Flora* XV (1832) II 476 ; Moggridge, *Contrib. Fl. of Mentone* t. 25. F. ORSINIANA Parlatore, *Fl. Ital.* II (1852) 411. — Alpes Maritimes, Littoral autrichien, Dalmatie, Banat, Apennins, Caucase. Ț
- F. Thunbergii** Miquel, *Prol. Fl. Jap.* (1865-67) 321 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 61. F. VERTICILLATA Willdenow var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 258. UVULARIA CIRRHOSA Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 136 et *Icon. Fl. Jap.* decas II t. 1 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 202. — Japon. Ț
- F. tulipifolia** Marschall-Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 270 et *Cent. Pl. Ross. Merid.* t. 21 ; *Bot. Mag.* (1872) t. 5969 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 266 ; Boissier, *Fl. Or.* V 185. THERESIA — Klatt in *Hamb. Gartenzeit.* XVII (1860) 438 (excl. syn.). — Caucase. Ț
- F. verticillata** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1799) 91 ; Ledebour, *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 2 et *Fl. Ross.* IV 148 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 252 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 258. F. LEUCANTHA Fischer ex Römer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 397 ; Graham in *Bot. Mag.* (1831) 3083. — Monts Altaï. Ț
- F. Walujewi** Regel in *Gartenflora* XXVIII (1879) 353 t. 993. — Turkestan. Ț

69. **TULIPA** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 91 ; T. Durand, *Ind.*

*Gen. n.* 7511. — Genre de 50 espèces environ bien distinctes habitant l'Europe, l'Afrique bor., et l'Asie occ.-centr. et or.

**T. acuminata** Vahl in HORNEMANN, *Hort. Bot. Hafn.* I (1813) 328 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 282. **T. cornuta** De Candolle in Redouté, *Liliacées* VIII (1816) t. 443 ; *Bot. Reg.* (1816) t. 127. **T. turcica** Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 221. — Forme de jardin, d'origine incertaine. ♀

**T. Alberti** Regel in *Gartenflora* XXVI (1877) 235 et 257 t. 912 ; Baker in *Bot. Mag.* (1881) t. 6761. — Turkestan. ♀

**T. altaica** Pallas in SPRENGEL, *Syst. Veget.* II (1825) 63 ; Ledebour, *Icon. Pl. Fl. Ross.* t. 134 et *Fl. Ross.* IV 138 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 226 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 288 ; Regel in *Gartenflora* XXVII (1878) t. 942 fig. *a e g h.* — Sibérie centr.-mérid. ♀

**T. australis** Link in SCHRADER, *Journ. für Bot.* II (1799) 317 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 293. **T. breyniana** Ker in *Bot. Mag.* (1804) t. 717. **T. celsiana** De Candolle in Redouté, *Liliacées* I (1802) t. 38 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 224 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X (1848) t. 446. — Portugal, Espagne, France mérid., Savoie. ♀

**T. batalini** Regel in *Gartenflora* XXXVIII (1889) 503 t. 1307. — Boukhara. ♀

**T. Biebersteiniana** Schultes f. in ROEMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII (1829) 382 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 97 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 224 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 291 ; Boissier, *Fl. Or.* V 199. — Russie austro.-or., Caucase, Asie Mineure. ♀

**T. biflora** Pallas, *Reise Prov. Russ. Reich.*, ed. 2, III (1776) 727 ; *Bot. Reg.* (1821) t. 535 ; Reichenbach, *Pl. Crit.* IV t. 395 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 292 ; Boissier, *Fl. Or.* V 200. **ORITHYA** — Kunth, *Enum. Pl.* IV 227. **T. sylvestris** Linné var. — Ledebour, *Fl. Ross.* IV (1853) 136. — Russie austro.-or., Caucase, Sibérie oural., Turkestan. ♀

**T. clusiana** Ventenat in REDOUTÉ, *Liliacées* I (1802) t. 37 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1390 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* IV t. 329 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 223 ; Moggridge, *Contrib. Fl. Mentone* t. 21 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 281 ; Boissier, *Fl. Or.* V 194. **T. rubro-alba** Brotero, *Fl. Lusit.* I (1804) 520. — Toute l'Europe Méditerran. ♀

**T. didieri** Jordan, *Obs. Pl. Crit.* I (1846) 34 t. 5 fig. *a* ; Jordan et Fourreau, *Icon. Fl. Europ.* VIII t. 17 ; Perrier in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XIV (1862) 95 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 283. **T. fransoniiana** Parlatores, *Nuov. Gen. et Sp. Plant. Monoc.* (1854) 15 et *Fl. Ital.* II 392. — Italie, Savoie. ♀

**T. eichleri** Regel in *Gartenflora* (1874) 193 t. 799 ; Baker in *Bot. Mag.* (1875) t. 6191 ; Boissier, *Fl. Or.* V 194. — Transcaucasie, Perse. ♀

**Tulipa fragrans** Munby in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XIII (1866) 236 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 291 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 408. **T. SYLVESTRIS** Desfontaines (non Linné), *Fl. Atlant.* I (1798) 294. **T. CELSIANA** De Candolle var. — Laxmann ex Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (monoc.) (1884) 167. — Algérie. ♀

**T. Gesneriana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 306\* pr. p. ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1135 ; *Bot. Reg.* XXIV (1838) t. 46 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 221 pr. p. ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 134 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 284 ; Boissier, *Fl. Or.* V 194. — Europe centr.-or., Russie mérid., Sibérie, Caucase. ♀

— — var. **minor** Boissier, *Fl. Or.* V (1813) 194 ; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6439. **T. SCHRENKII** Regel in *Gartenflora* (1873) 297 et in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 452. — Arménie, Perse, Caucase, Sibérie occ. ♀

**T. Greigi** Regel in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 449 et in *Gartenflora* (1873) 290 t. 773 ; *Fl. des Serres* XXI (1875) t. 2261 ; Baker in *Bot. Mag.* (1875) t. 6177 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 289 ; Boissier, *Fl. Or.* V 196. Turkestan occ. ♀

**T. Iliensis** Regel in *Gartenflora* XXVIII (1879) 162 t. 975 fig. c et d ; Baker in *Bot. Mag.* (1880) t. 6518. — Turkestan. ♀

**T. Kaufmanniana** Regel in *Gartenflora* XXVI (1877) 194 t. 906 fig. 6-10 ; Baker in *Bot. Mag.* (1886) t. 6887. — Turkestan. ♀

**T. Kesselringii** Regel in *Act. Hort. Petrop.* V (1877) 637 et in *Gartenflora* XXVIII (1879) 34 t. 964 ; Baker in *Bot. Mag.* (1884) t. 6754. — Turkestan. ♀

**T. Kolpakowskyana** Regel in *Act. Hort. Petrop.* V (1877) 266 et in *Gartenflora* XXVI (1877) 234 et XXVII (1878) 293 t. 951 ; Baker in *Bot. Mag.* (1883) t. 6718. — Turkestan. ♀

**T. Korolkowi** Regel in *Act. Hort. Petrop.* III 2 (1875) 295. — Turkestan. ♀

**T. lanata** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1884) 647 t. 4 et in *Gartenflora* XXXIII (1884) 71. — Boukhara. ♀

**T. linifolia** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1884) 648 et in *Gartenflora* XXXIII (1884) 71 et XXXV (1886) 1235. — Boukhara. ♀

**T. maleolens** Reboul, *Nonnull. Sp. Tulip. Florent. Append.* (1823) 1 ; *Bot. Reg.* (1839) t. 66 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 153 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 280 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 480 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 280. — Italie bor. ♀

**T. Maximowiczii** Regel in *Gartenflora* XXXVIII (1889) 505 t. 1307. — Boukhara. ♀

**Tulipa Oculus-Solis Saint-Amans** in *Recueil Soc. Agric. Agen.* I (1804) 75 et *Fl. Agen.* (1821) 1452 t. 3; Redouté, *Liliacées* IV (1808) t. 219; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II t. 102; Kunth, *Enum. Pl.* IV 222; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 448; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 278. — France mérid., Suisse, Italie. ♀

**T. Ostrowskyana Regel** in *Gartenflora* XXXIII (1884) 34, 71 et 338 t. 1144 fig. 1 et 2; Baker in *Bot. Mag.* (1886) t. 6895. — Turkestan. ♀

**T. praecox Tenore**, *Fl. Napol.* I (1811-13) 170 t. 32; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. I t. 187; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 449; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 280; Boissier, *Fl. Or.* V 192. T. GESNERIANA Ker (non Linné) in *Bot. Reg.* (1819) t. 380. — France mérid., Italie, Grèce, Chios, Syrie, Palestine. ♀

Obs. N'est peut-être qu'introduit en France et en Italie (Boissier).

**T. Sommieri Levier** in *Archiv. Ital. de Biolog.* (1884) extr. 15 et in *Bull. Soc. Scienc. Nat. Neuchâtel* XIV (1884) extr. 77. — Italie bor. ♀

**T. strangulata Reboul**, *Nonnull. Sp. Tulip. Florent. Append.* (1823) 6; Schultes f., *Syst. Veget.* VII 375 et 1682; Kunth, *Enum. Pl.* IV 221; Parlatore, *Fl. Ital.* II 399; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 287; Boissier, *Fl. Or.* V 192. T. SCABRISCAPA Strangways var. — Strangways in *Bot. Reg.* (1837) t. 1990 fig. 3; Bertoloni, *Fl. Ital.* IV 86. — Italie bor. ♀

— — form. **variopicta** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 287. T. VARIOPICTA Reboul, *Select. Sp. Tulip. Florent.* (1838) 7; Parlatore, *Fl. Ital.* II 399. — Avec le type.

**T. suaveolens Roth**, *Catalecta Bot.* I (1795) 45; *Bot. Mag.* (1805) t. 839; Redouté, *Liliacées* II t. 111; *Fl. des Serres* XII (1857) 85 t. 1223; Kunth, *Enum. Pl.* IV 220; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 287; Boissier, *Fl. Or.* V 193. — Russie mérid., Caucase. ♀

**T. sylvestris Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 305; *Fl. Dan.* (1768) t. 375; *Engl. Bot.* (1792) t. 63; *Bot. Mag.* (1809) t. 1202; Redouté, *Liliacées* III t. 165; Kunth, *Enum. Pl.* IV 224; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 446; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 290; Boissier, *Fl. Or.* V 197. — Europe occ., centr. et mérid. ♀

— — var. **Turkestanica** REGEL in *Act. Hort. Petrop.* II (1873) 443 et in *Gartenflora* XXII (1873) 293. T. TURKESTANICA Hort. — Turkestan.

**T. triphylla Regel** in *Act. Hort. Petrop.* V (1877) 636 et in *Gartenflora* XXVII (1878) 197 t. 942 fig. b c d; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6459. — Turkestan. ♀

**T. uniflora Besser** mss. ex BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 295; ORITHYA — D. Don in Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. II (1836) t. 336. ORNITHOGALUM — Linné, *Mant. Pl.* (1767) 62. GAGEA — G. Don in Loudon, *Hort. Brit.* (1830) 134; Schultes f. in Roemer et Schultes, *Syst. Veget.* VII 553. — Sibérie centr. et mérid. ♀

70. **ERYTHRONIUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 414 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7512. — Genre de 7 espèces habi-  
tant l'Europe, l'Asie Russe, le Japon et l'Amérique bor.

**E. albidum** Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* I (1818) 223 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 298 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 260. — De New-York et de la Pensylvanie au Minnesota et au Texas. ♀

**E. Americanum** Ker ex Sims in *Bot. Mag.* (1808) t. 1113 ; Bigelow, *Medic. Bot.* III 151 t. 58 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 298 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 260. — Du Canada à la Flo-  
ride et à l'Arkansas. ♀

**E. Dens-Canis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 305 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* I t. 9 ; Redouté, *Liliacées* II t. 94 ; *Bot. Mag.* (1786) t. 5 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 441 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 217 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 297. — Europe centr. et mérid. ♀

**E. grandiflorum** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 231 ; *Bot. Reg.* (1835) t. 1786 ; *Fl. des Serres* XX (1874) 105 t. 2117 ; *Belg. Hort.* XXVI (1876) 104 t. 6 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 260 et *Bot. of Calif.* II 170. — Territoire de Washington, Oregon, Californie. ♀

— — var. **giganteum** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 182 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 298. **E. GIGANTEUM** Lindley in *Bot. Reg.* (1835) sub t. 1786 ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5714. **E. GRANDIFLORUM** Pursh var. **ALBIFLORUM** Hooker ex S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 261. **E. GRANDIFLORUM** van Houtte (non Pursh) in *Fl. des Serres* XX (1874) t. 2117. — Territoire de Washington. ♀

— — var. ? **Smithii** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 182 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 261 et *Bot. of Calif.* II 171. **E. SMITHII** Hort., *So Mokou Zoussetz* vol. V fol. 87 sub *kata kuri*. — Ile Vancouver ; (Californie ?).

**E. purpurascens** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XII (1877) 277 et XIV (1879) 261 et *Bot. of Calif.* II 171. **E. GRANDIFLORUM** Pursh var. **MULTIFLORUM** Torrey, *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 146. **FRITILLARIA MULTISCAPIDEA** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* I (1855) 46. — Californie. ♀

71. **GAGEA** Salisbury in Koenig et Sims, *Ann. of Bot.* II (1806) 555 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7513. — Genre de 25 espèces environ habitant l'Europe, l'Afrique bor., l'Asie temp. et mont.

**G. foliosa** Schultes f. in REIMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII (1830) 1703 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 236 ; Ball, *Spicil. Fl. Marocc.* 685 ; Boissier, *Fl. Or.* V 265. **ORNITHOGALUM** — Presl, *Delic. Prag.* (1822) 149. **O. SPATHACEA** Sibthorp et Smith (non Schultes), *Fl. Græca* IV (1823) t. 341. — De la Thrace et de la Grèce au Caucase et à la Syrie, Maroc. ♀

**Gagea Granatelli Parlature**, *Fl. Palerm.* I (1845) 376 err. typ. 276 et *Fl. Ital.* II 428; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (monoc.) 72; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* V 409. ORNITHOGALUM — Parlature in *diar. l'Occhio* (1839) 45. G. ARVENSIS Rœmer et Schultes var. — Richter, *Pl. Europ.* I (1890) 197. G. MAURITANICA Durieu, *Explor. Scient. Algér.* (1867) t. 45<sup>bis</sup> fig. 4. — Sicile, Algérie. ♀

**G. reticulata Schultes f.** in Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1829) 542; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 181; Regel, *Fl. Turkest.* t. 19 fig. 1-4; Boissier, *Fl. Or.* V 208. ORNITHOGALUM — Pallas, *Reise Prov. Russ. Reich.* III (1776) 727. — Caucase, Perse, Arménie, Mésopotamie, Afghanistan, Syrie. ♀

72. **LLOYDIA** Salisbury in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) 328;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7511. — Genre de 2 ou 3 espèces distinctes de l'Europe, l'Asie centr. et bor., et l'Amérique bor.

**L. serotina Reichenbach**, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 102; Kunth, *Enum. Pl.* IV 244; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 300. ANTHERICUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 444; *Engl. Bot.* (1800) t. 793. PHALANGIUM — Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 241; Redouté, *Liliacées* V (1809) t. 270. L. ALPINA Salisbury in *Trans. Hort. Soc. Lond.* I (1812) 328. L. STRIATA Sweet, *Hort. Brit.* ed. II (1830) 527. — Europe, Asie, Amér. bor. ♀

73. **CALOCHORTUS** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 240;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7515. — Genre de 35 espèces bien distinctes de l'Amérique bor.

**C. albus Douglas** ex BENTHAM in Maund et Henslow, *The Botanist* II (1840) t. 98; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 304; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 262 et *Bot. of Calif.* II 172. CYCLOBOTHRÀ — Bentham in *Trans. Hort. Soc. Lond.* (1835) 413 t. 14 fig. 3; *Bot. Reg.* (1834) t. 1661; *Fl. des Serres* XI (1856) 195 t. 1171; *Belg. Hort.* VII (1857) 201 t. 32. — Californie. ♀

— — var. **paniculatus** BAKER in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 304; G. Renth in Regel, *Gartenflora* (1885) 72. C. PANICULATUS Hort. CYCLOBOTHRÀ — Lindley in *Bot. Reg.* (1834) sub t. 1662; Kunth, *Enum. Pl.* IV 304. — Avec le type.

**C. aureus S. Watson** in *Amer. Naturalist* (1873) VII 303 et in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 265; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 305. — Utah. ♀



- Calochortus Benthami Baker** in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 304 et in *Bot. Mag.* (1880) t. 6473 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 262 et *Bot. of Calif.* II 173. *C. ELEGANS* Pursh var. *LUTEUS* Benth., *Pl. Hartweg.* (1857) 338. *C. NITIDUS* Wood (non Douglas) in *Proc. Acad. Philad.* (1868) 169. — Californie. ♀
- C. coeruleus S. Watson** in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 263 et *Bot. of Calif.* II 173. *CYCLOBOTHRA* — Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 4. *C. ELEGANS* Pursh var. — Benth., *Pl. Hartweg.* (1857) 328. — Californie. ♀
- C. elegans Pursh**, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 240 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 304 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 263 et *Bot. of Calif.* II 173. *CYCLOBOTHRA* — Lindley in *Bot. Reg.* (1834) sub t. 1661 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 229. — Colombie Brit., Idaho, Missouri, Océan, Californie. ♀
- C. flavus Schultes f.** in ROEMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII (1830) 1535 ; Maund, *The Botanist.* IV t. 170 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 308 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 268. *CYCLOBOTHRA* — Lindley in *Bot. Reg.* (1834) sub t. 1662. *CYCLOBOTHRA BARBATA* D. Don in Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. 1, III (1828) t. 273. — Mexique. ♀
- C. Greenei S. Watson** in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 264 et *Bot. of Calif.* II 175. — Californie, Océan. ♀
- C. Kennedyi Porter** in *Bot. Gazette* II (1877) 79 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 265 et *Bot. of Calif.* II 175. — Californie. ♀
- C. Leichtlini Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1870) t. 5862 ; *Fl. des Serres* XX (1871) 103 t. 2116 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 310. — Californie. ♀
- Obs. Watson (*Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 267) réunit cette espèce au *C. NUTTALLII*.
- C. lilacinus Kellogg** in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 5 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 306 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 263 et *Bot. of Calif.* II 174. *C. UMBELLATUS* Wood in *Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* (1868) 168. *C. UNIFLORUS* Hooker f. (non Hooker et Arnott) in *Bot. Mag.* (1869) t. 5804. — Californie. ♀
- C. luteus Douglas** ex LINDLEY in *Bot. Reg.* (1833) t. 1567 ; Paxton, *Mag. of Bot.* t. 221 ; *Fl. des Serres* II (1846) 79 t. 40 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 309 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 265 et *Bot. of Calif.* II 175. — Californie. ♀
- var. **oculatus S. Watson** in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 265 et *Bot. of Calif.* II 176. — Avec le type.
- C. macrocarpus Douglas** in *Trans. Hort. Soc. Lond.* ser. 1, VII (1828) 276 t. 8 ; *Bot. Reg.* (1828) t. 1152 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 309 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 266 et *Bot. of Calif.* II 176. — Du Territoire de Washington et de l'Idaho à la Caroline. ♀

**Calochortus Maweanus** Leichtlin ex Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 305; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 262 et *Bot. of Calif.* II 173. *C. ELEGANS* Hooker f. (non Pursh) in *Bot. Mag.* (1872) t. 5976. — Californie. ♀

Obs. Baker (*loc. cit.*) ne voit dans ce *CALOCHORTUS* qu'une forme du *C. ELEGANS* Pursh.

**C. nitidus** Douglas in *Trans. Hort. Soc. Lond.* ser. 1 VII (1828) 277 t. 9 fig. a; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 307; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1880) 264 et *Bot. of Calif.* II 175 in obs. *CYCLOBOTHRA* — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 230. — De l'Orégon à la Nevada. ♀

**C. nudus** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 263 et *Bot. of Calif.* II 174. *C. ELEGANS* Pursh var. — Bentham, *Pl. Hartweg.* (1857) 338. — Californie. ♀

**C. Nuttallii** Torrey et Gray in *Pacif. Railr. Rep.* II (1855) 124; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 266 (excl. syn.); S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 266 et *Bot. of Calif.* II 177 pr. p. *FRITILLARIA* — Nuttall, *Gen. of N.-Amer. Pl.* I (1818) 222; Baker, *loc. cit.* XIV (1874) 271. *C. LUTEUS* Nuttall in *Journ. Acad. Philad.* VII (1834) 53. — De la Californie au Dakota, au Colorado et au Nouveau-Mexique. ♀

**C. Palmeri** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 266 et *Bot. of Calif.* II 176. — Californie. ♀

**C. pulchellus** Douglas ex BENTHAM in *Trans. Hort. Soc.* ser. 2, I (1834) 412; Wood in *Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* (1868) 168; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 303; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 262 et *Bot. of Calif.* II 172. *CYCLOBOTHRA* — Bentham, *loc. cit.* ser. 2, I (1834) 412 t. 14 fig. 1; *Bot. Reg.* (1834) t. 1662; Kunth, *Enum. Pl.* IV 228. — Californie. ♀

**C. splendens** Douglas ex BENTHAM in *Trans. Hort. Soc. Lond.* ser. 2, I (1834) 411 t. 15 fig. 1; *Bot. Reg.* (1834) t. 1676; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 309; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 266 et *Bot. of Calif.* II 176. — Californie. ♀

**C. venustus** Douglas ex BENTHAM in *Trans. Hort. Soc. Lond.* ser. 2, I (1834) 412 t. 15 fig. 3; *Bot. Reg.* (1834) t. 1669; Maund, *The Botanist.* I t. 30; Paxton, *Mag. of Bot.* II t. 175; *Fl. des Serres* II (1846) 79 t. 10 fig. 3; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 310; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 265 et *Bot. of Calif.* II 176. — Californie. ♀

**C. Weedii** Wood in *Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* (1868) 169; *Bot. Reg.* (1828) t. 1152; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 264 et *Bot. of Calif.* II 175. *C. LUTEUS* Douglas var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1874) 309. *C. CITRINUS* Baker in *Bot. Mag.* (1875) t. 6200. — Californie. ♀

**74. COLCHICUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 107; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7516. — Genre de 30 espèces distinctes habitant l'Europe, l'Asie occ. et centr., et l'Afrique bor.

**C. alpinum** De Candolle, *Fl. de Fr.* III (1805) 195; Kunth, *Enum. Pl.* IV 142; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 171; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 425; Parlatores, *Fl. Ital.* III 184; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 492. **C. MONTANUM** Allioni, *Fl. Pedem.* I (1785) 117 t. 74 fig. 2. — France mérid.-or., Suisse, Helvétie. ♀

**C. amabile** Heldreich in *Atti Congr. Botan. Firenze* (1874) 227 et *Sert. Hellen.* 3; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 426; Boissier, *Fl. Or.* V 158. — Grèce, Eubée. ♀

**C. arenarium** Waldstein et Kitaibel, *Descr. et Icon. Pl. Hung.* II (1805) 195 t. 179; Redouté, *Liliacées* VIII t. 467; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 425; Kunth, *Enum. Pl.* IV 143; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 432. — Hongrie, Thrace, Céphalonie. ♀

**C. Boissieri** Orphanides in *Atti Congr. Botan. Firenze* (1874-76) 31; Boissier, *Fl. Or.* V 156. — Laconie. ♀

**C. Byzantinum** Ker in *Bot. Mag.* (1807) sub t. 1028 et 1122; Schultes f., *Syst. Veget.* VII 1509; Kunth, *Enum. Pl.* IV 149; Regel in *Gartenflora* (1873) t. 753; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1874) 428; Boissier, *Fl. Or.* V 160. **C. AUTUMNALE** Linné var. **LATIFOLIUM** Redouté, *Liliacées* VIII (1816) t. 468. — Transylvanie, Thrace. ♀

**C. crociflorum** Regel (non Sims) in *Act. Hort. Petrop.* VII (1880) 385 et in *Gartenflora* (1881) 33 t. 1035. — Kokan. ♀

**C. crocifolium** Boissier (non alior.), *Diagn. Pl. Or.* ser. I, V (1844) 67 et *Fl. Or.* V 165. — Perse, ? Assyrie. ♀

Obs. Plusieurs auteurs réunissent cette espèce au **C. MONTANUM** Linné.

**C. fasciculare** Boissier, *Fl. Or.* V (1884) 163. **HYPOXIS** — Linné, *Syst. Veget.* ed. X (1759) 986; Russell, *Hist. of Aleppo* II (1794) 250 t. 9. **MONOCARYUM** — Schultes f. in Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1830) 1935 (form. monstr.); Kunth, *Enum. Pl.* IV 156. — Syrie. ♀

Obs. Baker (*Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 432) rapporte ce **COLCHICUM** au **C. MONTANUM** Linné.

**C. lætum** Steven in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* VII (1829) 262 t. 43; Kunth, *Enum. Pl.* IV 140; Regel in *Gartenflora* (1862) t. 379; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 429; Boissier, *Fl. Or.* V 157. **C. AUTUMNALE** Marschall-Bieberstein (non Linné), *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 293 (quoad pl. Cauc.). — Caucase. ♀

**C. luteum** Baker in *Gard. Chron.* (1874) II 34; Hooker f. in *Bot. Mag.* (1875) t. 6153; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 434; Boissier, *Fl. Or.* V 166. — Afghanistan, Beloutchistan, Turkestan. ♀

**Colchicum Neapolitanum Tenore**, *Fl. Neapol. Prodr.* Append. V (1842) 11 et *Fl. Napol.* t. 221 fig. 2 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 142 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 182 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 431. **C. ARENARIUM** Grenier et Godron (non Waldstein et Kitaibel), *Fl. de Fr.* III (1855) 171. — France mérid., Autriche, Italie, Dalmatie, ? Maroc. ♀

**C. Parkinsoni Hooker f.** in *Bot. Mag.* (1888) t. 6090 ; Boissier, *Fl. Or.* V 158. **C. FRITILLARICUM** CHIENSE Parkinson, *Parad. Terr.* 155 fig. 5. — Iles de l'Archipel, Smyrne. ♀

Obs. Baker (*Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 425) réunit ce **COLCHICUM** au **C. VARIEGATUM** Linné.

**C. Persicum Baker** in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 430 ; Boissier, *Fl. Or.* V 167 in obs. — Lazistan. ♀

**C. speciosum Steven** in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* VII (1829) 265 t. 15 ; *Bot. Mag.* (1874) t. 6078 ; *Floral Mag.* new ser. t. 235 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 139 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 428 ; Boissier, *Fl. Or.* V 159. — Caucase, Perse. ♀

**C. variegatum Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 342 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 1028 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 238 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 239 ; Gussone, *Fl. Sicil. Syn.* I 437 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 425 ; Boissier, *Fl. Or.* V 158. — Grèce, Crète. ♀

75. **BULBOCODIUM** Linné, *Coroll. Gen.* (1736) 6 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7518. — Genre monotype.

**B. vernum Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 294 ; *Bot. Mag.* (1791) t. 153 ; Redouté, *Liliacées* III t. 197 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 428 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 146 (excl. syn.) ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 169 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 456. — Dauphiné, Savoie, Suisse. ♀

76. **MERENDERA** Ramond in *Bull. Soc. Philom. Paris* (1798) 178 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7519. — Genre de 10 espèces de la Région Méditerr. à l'Afghanistan et à l'Abyssinie.

**M. Bulbocodium Ramond** in *Bull. Soc. Philom. Paris* (1798) 178 t. 12 fig. 2 ; Redouté, *Liliacées* I t. 25 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 149 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 169 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1874) 440. **COLCHICUM MONTANUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 342 pr. p. (quoad syn. CLUSH). **MERENDERA** — Lange in Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I (1861) 193. — Pyrénées, Espagne centr. ♀

**M. Caucasica Marshall-Bieberstein**, *Fl. Taur.-Cauc.* I (1808) 293 et *Cent. Pl. Ross.* t. 50 ; *Bot. Mag.* (1838) t. 3690 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 438 ; Boissier, *Fl. Or.* V 168. **COLCHICUM** — Sprengel, *Syst. Veget.* II (1825) 143. **BULBOCODIUM TRIGYNUM** Adam in Weber et Mohr, *Beitr. z. Naturk.* I (1808) 149 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 1207. — Caucase, Arménie, Kurdistan, Perse. ♀

**Merendera Persica** Boissier et Kotschy in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1 XIII (1853) 37 et *Fl. Or.* V 169; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 440. *M. AITCHISONI* Hooker f. in *Bot. Mag.* (1873) t. 6012. — Perse bor., Afghanistan. ♀

**M. sobolifera** Fischer et Meyer, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* I (1834) 24; Kunth, *Enum. Pl.* IV 150; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 439; Boissier, *Fl. Or.* V 167. *BULBOCODIUM HASTULATUM* Frivaldsky in *Flora* (1836) 434. — Thrace, Arménie, Syrie, Perse. ♀

77. **BURCHARDIA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holland.* (1810) 272; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7520. — Genre monotype.

**B. umbellata** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 273; Kunth, *Enum. Pl.* IV 164; Bentham, *Fl. Austral.* VII 33; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 448. — Australie temp., Tasmanie. ♀

78. **CHAMELIRION** Willdenow in Gesell. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) 18; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7531. — Genre monotype.

**C. luteum** A. Gray, *Manual Bot. N. Unit. St.* ed. V (1867) 527; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 468. *VERATRUM* — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1044. *HELONIAS* — Aiton f. in *Bot. Mag.* (1807) t. 1062. *H. PUMILA* Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II (1786-93) t. 253. *C. CAROLINIANUM* Willdenow in *Ges. Nat. Fr. Berl. Mag.* II (1808) 19; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 282. — Du Canada à la Georgie et du Nebraska à l'Arkansas. ♀

79. **XEROPHYLLUM** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 210; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7533. — Trois espèces de l'Amérique bor.

**X. tenax** Nuttall, *Gen. of N. Amer. Pl.* I (1818) 225; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 284 et *Bot. of Calif.* II 184. *HELONIAS* — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 243 t. 9. *X. ASPHODELOIDES* Nuttall var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 467. *X. SETIFOLIUM* Lindley (non Michaux) in *Bot. Reg.* (1833) t. 1613. — Californie. ♀

80. **TOFIELDIA** Hudson, *Fl. Angl.* ed. II (1778) 157 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7538. — Genre de 15 espèces des régions temp. et mont. de l'hémisphère bor. et des Andes de l'Amérique austr.

**T. palustris** Hudson, *Fl. Angl.* ed. II (1778) 157 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 536 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 166 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 486 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 282. **ANTHERICUM CALYCVLATUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1762) 442 pr. p. ; *Fl. Dan.* (1762) t. 36. **T. BOREALIS** Wahlenberg, *Fl. Lappon.* (1812) 89. — Europe, Asie et Amérique bor. ♀

**T. occidentalis** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 283 et *Bot. of Calif.* II 184. — Californie. ♀

81. **UVULARIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 412 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7542. — Genre de 4 ou 5 espèces de l'Amérique bor.

**U. grandiflora** Smith, *Exot. Bot.* I (1804) 99 t. 51 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1112 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 201 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 462 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 268. **U. PERFOLIATA** Linné var. **MAJOR** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 199 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 184. — Du Canada à la Floride et au Mississipi. ♀

**U. perfoliata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 304 ; Smith, *Exot. Bot.* I 97 t. 49. *Bot. Mag.* (1794) t. 255 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 200 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 461 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 268. **U. PERFOLIATA** Linné var. **MINOR** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 199 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 184. — Amérique bor.-or. (du Canada à la Caroline). ♀

**U. sessilifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 304 ; Smith, *Exot. Bot.* I 101 t. 52 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1402 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XIII (1827) t. 1262 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 201 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 462. **OAKESIA** — S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 269. — Du Canada à la Floride et à l'Arkansas. ♀

82. **SANDERSONIA** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 4716 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7545. — Genre monotype.

**S. sanguinea** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 4716 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 453 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 418. — Natal, Cafrerie. ♀

83. **LITTONIA** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 4723 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7546. — Genre de 4 espèces de l'Afrique or. et austr., et de l'Arabie.

**L. modesta** Hooker in *Bot. Mag.* (1853) t. 4723 ; Harvey, *Gen. South Afric. Pl.* ed. II, 403 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 458 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 418. — Cafrerie, Natal, Transvaal. ♀

84. **TRICYRTIS** Wallich, *Tent. Fl. Nepal.* (1826) 61 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7548. — Cinq espèces de l'Himalaya, de la Chine et du Japon.

**T. hirta** Hooker in *Bot. Mag.* (1863) t. 5355 ; *Fl. des Serres* XX (1862-65) 79 t. 1540 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 464. **UVULARIA** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 136. **T. JAPONICA** Miquel in *Ann. Mus. Lugd.* III (1867) 155 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 74. — Japon. ♀

85. **DISPORUM** Salisbury in *Trans. Hort. Soc. London* I (1812) 331 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7549. — Genre de 12 espèces environ habitant les montagnes de l'Asie trop. et centr., le Japon et l'Amérique bor.

**D. Hookeri** Nicholson, *Dict. Gard.* I (1885) 484. **UVULARIA** — Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 360 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1490. **PROSARTES** — Torrey, *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 144 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 270 et *Bot. of Calif.* V 179. — Californie. ♀

**D. Menziesii** Nicholson, *Dict. Gard.* I (1885) 485. **PROSARTES** — D. Don in *Trans. Linn. Soc.* XVIII (1839) 533 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 270 et *Bot. of Calif.* II 178. **UVULARIA SMITHII** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 174 t. 189. — De la Colombie Brit. à la Californie. ♀

**D. Oreganum** S. Watson (sub **PROSARTE**) in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 27 et *Bot. of Calif.* II 179 in obs. **UVULARIA LANUGINOSA** Persoon var. **MAJOR** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 174. — De l'Oregon et de l'Idaho à la Colombie Brit. ♀

**D. pullum** Salisbury in *Trans. Hort. Soc. Lond.* I (1812) 331 ; Kunth, *Enum. Pl.* VI 360 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 589 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 360. **D. CHINENSE** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 50. — Inde or., Java, Chine. ♀

86. **CLINTONIA** Rafinesque in *Americ. Monthly Mag.* (1818) 266 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7550. — Genre de 6 espèces de l'Amérique bor., de l'Himalaya, de la Sibérie et du Japon.
- C. Andrewsiana** Torrey, *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 150 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 272 et *Bot. of Calif.* II 180. — Californie. ♀
- C. borealis** Rafinesque in *Atlantic Journ.* (1833) 120 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 271. DRACENA — Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 454 t. 3 ; Andrews, *Bot. Repos.* III t. 206. SMILACINA — Ker in *Bot. Mag.* (1811) t. 1403. — Du Labrador à la Caroline bor. ♀
- C. uniflora** Kunth, *Enum. Pl.* V (1850) 159 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 272 et *Bot. of Calif.* II 179. SMILACINA — Menzies in Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 175 t. 190. — De la Colombie Brit. à la Californie. ♀
87. **SCOLIOPUS** Torrey in *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 145 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7551. — Deux espèces de la Californie et de l'Orégon.
- S. Bigelovii** Torrey in *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 145 t. 22 ; Regel in *Gartenflora* (1875) 227 t. 348 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 272 et *Bot. of Calif.* II 180 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 493. — Californie. ♀
- S. Hallii** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 272 et *Bot. of Calif.* II 181 in obs. S. BIGELOVH A. Gray (non Torrey) in *Proc. Amer. Acad.* VIII (1872) 404. — Orégon. ♀
88. **MEDEOLA** Gronovius ex Linné, *Gen. Pl. ed.* VI (1764) n. 455 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7552. — Genre monotype.
- M. Virginiana** Linné, *Sp. Pl. ed.* I (1753) 339 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* II 266 fig. 2 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1316 ; Barton, *Mat. Medic. Unit. St.* t. 38 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 272. GYROMIA VIRGENICA Nuttall, *Gen. N. Amer. Pl.* I (1818) 238. — Du Canada à la Floride et à l'Arkansas. ♀
89. **TRILLIUM** Linné, *Sp. Pl. ed.* I (1753) 339 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7553. — Genre de 15 espèces environ de l'Amérique bor., de l'Asie cont., temp. et mont. et du Japon.
- T. cernuum** Linné, *Sp. Pl. ed.* I (1753) 339 ; Smith, *Spicil. Bot.* t. 4 ; *Bot. Mag.* (1806) t. 954 ; Barton, *Mat. Medic. Unit. St.* II t. 40 ; S. Wood in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 275. — De Terre-Neuve et de la rivière Mackenzie à la Georgie. ♀



- Trillium erectum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 340 ; *Bot. Mag.* (1800) t. 470 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* II t. 267 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 57 t. 990 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 274. T. PENDULUM Willdenow, *Hort. Berol.* (1816) t. 35. — Du Canada à la Caroline, au Tennessee et au Missouri. ♀
- T. erythrocarpum** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 216 t. 75 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XIII (1827) t. 1232 ; Sweet, *Brit. Flow. Gard.* ser. I t. 212 ; *Bot. Mag.* (1830) t. 3002 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 275. — Du Nouveau-Brunswick au Wisconsin et à la Georgie. ♀
- T. grandiflorum** Salisbury, *Parad. Londin.* (1806) t. 1 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XIV t. 1349 ; Regel in *Gartenflora* (1868) t. 575 ; *Fl. des Serres* X (1854-55) 63 t. 991 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 274. T. RHOMBOIDEUM Michaux var. — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 215. T. ERYTHROCARPUM Curtis (non Michaux), *Bot. Mag.* (1805) t. 855. — États-Unis (du Vermont à la Caroline et à l'ouest au Wisconsin et au Kentucky). ♀
- T. nivale** Riddell, *Syn. Fl. West. Stat.* (1835) 93 ; Baker in *Bot. Mag.* (1879) t. 6449 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 275. — De la Pensylvanie au Kentucky, à l'Iowa et au Wisconsin. ♀
- T. ovatum** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 245 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 274 et *Bot. of Calif.* II 181. T. OBOVATUM Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 180. T. CALIFORNICUM Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* II (1863) 50 fig. 2. — De la Colombie angl. à la Californie. ♀
- T. petiolatum** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 244 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 180 t. 192 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 274 et *Bot. of Calif.* II 181 in obs. — Idaho, Oregon, Territoire de Washington.
- T. recurvatum** Beck in SILLIMAN, *Amer. Journ. of Science* ser. 1, XI (1826) 178 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 273 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* ed. VI 531. T. UNGUICULATUM Nuttall in *Trans. Amer. Phil. Soc.* V (1837) 154. — Du Wisconsin à l'Indiana et à l'Arkansas. ♀
- T. sessile** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 340 ; *Bot. Mag.* (1788) t. 40 ; Redouté, *Liliacées* III t. 133 ; *Fl. des Serres* XXII (1877) 79 t. 2311 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 273 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* ed. VI 530. — États-Unis (de la Pensylvanie au Wisconsin et au sud à la Floride et à l'Alabama).
- — var. **angustipetalum** TORREY, *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 151 ; S. Watson, *loc. cit.* XIV (1879) 273 et *Bot. of Calif.* II 181. — De la Californie à l'Oregon.

90. **VERATRUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 769 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7556. — Genre de 9 espèces de l'Europe, de l'Asie Russe et de l'Amérique bor.

**V. Californicum** Durand in *Journ. Acad. Nat. Sc. Phil.* ser. 2, III (1855) 103 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 277. **V. ESCHOLTZII** A. Gray var. **WATSONI** Baker in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) 471. **V. ALBUM** S. Watson (non Linné), *Bot. King's Exped.* (1871) 344. — Colombie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique. ♀

**V. nigrum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1044 ; *Bot. Mag.* (1806) t. 963 ; Redouté, *Liliacées* VII t. 416 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* X t. 423 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 174. — Europe centr. et or., Asie bor. et or. jusqu'au Japon. ♀

91. **ZYGADENUS** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 213 t. 22 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7558. — Genre de 10 espèces de la Sibérie, de l'Amérique bor. et du Mexique.

**Z. elegans** Pursh, *Fl. Amer. Sept.* I (1814) 241 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 278. **Z. BRACTEATUS** Sweet, *Hort. Brit.* ed. I (1827) 429 ; Schultes f., *Syst. Veget.* VII 159. **Z. CHLORANTHUS** Richardson in Francklin, *Narrative Journey Polar Sea, Append.* VII (1823) 736. **Z. GLAUCUS** Nuttall in *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* VII (1834) 56. **ANTICLEA** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 192 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 482. — Toute l'Amérique bor. jusqu'au Nouveau-Mexique. ♀

**Z. Fremontii** Torrey ex S. WATSON, *Bot. King's Exped.* (1871) 343 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 279 et *Bot. of Calif.* II 183 ; Baker in *Gard. Chron.* (1874) 66 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 480. **ANTICLEA** — Torrey in *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 144. — Californie. ♀

**Z. glaberrimus** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 214 t. 22 ; Redouté, *Liliacées* t. 461 ; Kunth, *Enum. Pl.* IV 194 (excl. syn.) ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 480 ; S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 278. **HELONIAS** — Link, *Enum. Pl. Hort. Berol.* I (1821) 348. **H. BRACTEATA** Sims in *Bot. Mag.* (1815) t. 1703 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1828) t. 1339. — De la Virginie à la Floride et à l'Alabama. ♀

**Z. Nuttallii** A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* ed. II (1856) 476 in obs. ; S. Watson, *Bot. King's Exped.* 348 et in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 278 ; Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 481. **AMIANTHUM** — A. Gray in *Ann. Lyc. N. York.* IV (1848) 123 (excl. var.  $\beta$ ). **AMIANTHUS** — Kunth, *Enum. Pl.* IV (1843) 179. **ANTICLEA** — Torrey in *Pacif. Railr. Rep.* IV (1856) 144. — Du Texas au Colorado. ♀

**Zygadenus paniculatus** S. Watson in *Bot. King's Exped.* (1871) 343 et in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 279. HELONIAS — Nuttall in *Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* VII (1834) 87. Z. NUTTALLII A. Gray var. — Baker in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1879) 481. — De la Californie et de l'Idaho à l'Utah et au Saskatchewan. ♀

**Z. venenosus** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XIV (1879) 279 et *Bot. of Calif.* II 183. — De la Californie à l'Utah, à l'Idaho et à la Colombie brit. ♀

## CXLVI. COMMELINACÉES

1. **PALISOTA** Reichenbach, *Consp. Regn. Veget.* (1828) 59 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7572. — Genre de 8 espèces de l'Afrique trop.

**P. Barteri** Hooker f. in *Bot. Mag.* (1862) t. 5348 ; Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* III 132 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 422. — Fernando-Po, Kameroun. ♀

2. **COCHLIOSTEMA** Lemaire in *Illustr. Hort.* VI (1859) Misc. 70 et t. 217 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7577. — Genre monotype.

**C. odoratissimum** Lemaire in *Illustr. Hort.* VI (1859) misc. 70 et t. 217 ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5705 ; Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* III 232. **C. JACOBINIANUM** K. Koch et Linden in *Wochenschrift* (1867) 322 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 33 t. 1837-39. — Équateur. ♀

3. **DICHORISANDRA** Mikan, *Delic. Faun. et Fl. Brasil.* (1820) t. 3 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7586. — Genre de 30 espèces de l'Amérique trop.

**D. Aubletiana** Schultes f. in RÖEMER et SCHULTES, *Syst. Veget.* VII (1830) 1181 ; Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* III 273. — Antilles et Amérique trop. contin. ♀

— — var. **ovata** CLARKE in De Candolle, *Monog. Phan.* III (1881) 274. **D. OVATA** Martens ex Rœmer et Schultes, *Syst. Veget.* VII (1839) 1182. — Brésil, Guyane.

**D. mosaica** Linden in *Belg. Hort.* XVII (1867) 103 ; Regel in *Gartenflora* (1868) 290 t. 593 ; *Fl. des Serres* XVI (1865-67) 187 t. 1711-12 ; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* I (1873) t. 10 ; Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* III 280. **D. UNDATA** Linden ex Van Houtte in *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 87 t. 1763-64. **D. MUSAICA** Auct. — Brésil, Guyane. ♀

4. **TRADESCANTIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 277 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7588. — Genre de 32 espèces de  
l'Amérique bor. chaude et trop.

**T. Virginiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 288 ; *Bot. Mag.* (1789) t. 105  
et (1836) t. 3501 ; Redouté, *Liliacées* II t. 95 ; Spach, *Hist. Nat. Veget.*  
*Atlas* t. 75 ; Meeham, *Fl. and Ferns U. S.* I t. 1 ; Clarke in De Candolle,  
*Monog. Phan.* III 290. — États-Unis, Cuba, Mexique. 2

5. **RHOEO** Hance in Walpers, *Annal. Bot.* III (1852) 659 ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7593. — Genre monotype.

**R. discolor** Hance in WALPERS, *Annal. Bot.* III (1852) 660 ; Clarke in De  
Candolle, *Monog. Phan.* III 316. **TRADESCANTIA** — L'Héritier, *Sert. Angl.*  
VIII (1788) t. 12 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1192 et (1858) t. 5079 ; Redouté, *Lilia-*  
*cées* III t. 168 ; Baker in Saunders, *Refug. Bot.* t. 48. — Mexique, Cuba,  
Saint-Thomas. 2

6. **ZEBRINA** Schnizlein in *Bot. Zeit.* VII (1849) 870 ; T. Du-  
rand, *Ind. Gen.* n. 7595. — Deux espèces du Texas et du  
Mexique bor.

**Z. pendula** Schnizlein in *Bot. Zeit.* VII (1849) 870 ; Decaisne in *Rev.*  
*Hort.* (1855) 141 ; Clarke in De Candolle, *Monog. Phan.* III 318. **CYANOTIS**  
**VITTATA** Lindley in *Journ. Hort. Soc.* V (1850) 139. **TRADESCANTIA ZEBRINA** ;  
**T. TRICOLOR** et **COMMELINA ZEBRINA** Hort. ex Clarke, *loc. cit.* — Mexique. 2

## CXLVII. JUNCACÉES

1. **JUNCUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 295 pr. p. ;  
T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7610. — Genre de 160 espèces  
bien distinctes, répandu sur presque tout le globe.

**J. arcticus** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1800) 206 ; *Fl. Dan.* (1794) t. 1095 (sub  
nom. **J. EFFUSUS**) ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 222. **J. EFFUSUS**  
Linné var.  $\alpha$  Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 326. **J. ACUMINATUS** Balbis, *Elenc.*  
*Piant. Torino* (1801) 87 ; E. Meyer, *Syn. Junc.* 11 ; Kunth, *Enum. Pl.* III  
t. 319. — Europe, Asie et Amérique arct. ; Alpes, Pyrénées, Abruzzes,  
mont Olympe (Bithynie). 2

**Juncus castaneus** Smith, *Fl. Britan.* I (1800) 383 ; *Engl. Bot.* (1801) t. 900 ; *Fl. Dan.* (1808) t. 1332 ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 402. J. TRICEPS Rostkovius, *Diss. de Junco* (1801) 48 ; E. Meyer, *Syn. Junc.* 57 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 357. — Régions arct. de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique ; hautes montagnes de l'Europe et de l'Asie centr. ♀

**J. Chamissonis** Kunth, *Enum. Pl.* III (1841) 348 ; Buchenau in *Abhandl. Nat. Ver. Bremen* VI (1879) 379 t. 4 et in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 198. J. IMBRICATUS Laharpe, *Monog. Joncées* (1823) 61 pr. p. J. PLATYCAULIS E. Meyer in *Linnaea* III (1828) 372 pr. p. — Amérique austr. (de l'Équateur au Chili, Juan-Fernandez, Argentine, Uruguay). ♀

**J. effusus** Leers, *Fl. Herborn.* (1789) 88 t. 13 fig. 2 ; *Fl. Dan.* (1794) t. 1696 ; *Engl. Bot.* (1801) t. 826 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 339 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IX t. 413 ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 228. J. EFFUSUS Linné var.  $\beta$  Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 326. — Europe, Afrique et Amérique bor., Australie. ♀

— — var. **vittatus** BUCHENAU in *Bot. Zeit.* (1867) 315-16. J. ZEBRINUS Hort. Angl. ex André in *Illustr. Hort.* XXVII (1880) t. 393. — Forme de culture.

**J. Jacquini** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 63 ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 208. J. BIGLUMIS Jacquin (non Linné), *Enum. Stirp. Agr. Vindob.* (1762) 61 t. 4 fig. 2 et *Fl. Austr. Icon.* III t. 221. J. ATRATUS Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 271 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 356. — Alpes, Carpathes, Transylvanie. ♀

**J. trifidus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 826 ; *Fl. Dan.* (1763) t. 107 et (1821) t. 1691 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 355 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IX t. 324 ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 182. — Europe alp. et subalp., Amérique bor. ♀

2. **LUZULA** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 158 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7611. — Genre de 40 espèces environ bien distinctes habitant les régions temp. et trop. mont. du monde entier.

**L. flavescens** Gaudin, *Agrostol. Helv.* II (1811) 239 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 365 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 353 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* IX t. 383 ; Buchenau in Engler, *Bot. Jahrb.* XII (1890) 80. JUNCUS — Host, *Icon. et Descr. Gram. Austr.* III (1805) 62 t. 94. L. HOSTII Desvaux in *Journ. de Bot.* I (1808) 140 t. 6 fig. 1. — Pyrénées, Jura, hautes montagnes de l'Europe centr. et or. ♀

## CXLVIII. PALMACÉES

1. RHOPALOSTYLIS H. Wendland et Drude in *Linnæa* XXXIX (1875) 180; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7630*. — Deux espèces de la Nouvelle-Zélande et de l'île Norfolk.

**R. Baueri** H. Wendland et Drude in *Bot. Zeit.* XXXV (1877) 638 t. 6. KENTIA — Seemann, *Fl. Vitiensis* (1868-73) 269. ARECA — Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* I (1855) 262 in obs.; Lemaire in *Illustr. Hort.* XV (1868) t. 575; de Kerchove, *les Palmiers* 328 t. 1; *Bot. Mag.* (1868) t. 5735. — Iles Norfolk et Chatham.

**R. sapida** H. Wendland et Drude in DE KERCHOVE, *Les Palmiers* (1878) 255. KENTIA — Martius, *Hist. Nat. Palm.* III (1836-50) 312 t. 15. ARECA — Solander in Forster, *Pl. Escul. Ins. Ocean. Austral.* (1786) 66 t. 151 et 152; Hooker, *Fl. Nov. Zel.* I 262 t. 59 et 60 et *Handb. New Zeal. Flora* 288 et 744; *Bot. Mag.* (1859) t. 5139; *Fl. des Serres* XIV (1861) 121 t. 1439. — Nouvelle-Zélande.

2. HOWEA Beccari, *Malesia* I (1877) 41, 66; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7655*. — Deux espèces de l'île de Lord Howe.

**H. Belmoreana** Beccari, *Malesia* I (1877) 66. KENTIA — F. Mueller, *Fragm. Phyt. Austral.* VII (1870) 99 et VIII (1874) 234; Bentham, *Fl. Austral.* VII 137. K. BALMOREANA Ch. MOORE ex André in *Illustr. Hort.* XXI (1874) 186 t. 191; de Kerchove, *Les Palmiers* 31 fig. 32 et 325 t. 9. — Ile de Lord Howe.

**H. Forsteriana** Beccari, *Malesia* I (1877) 66. KENTIA — F. Mueller ex Wendland in de Kerchove, *Les Palmiers* (1878) 248 et 315 t. 7; *Illustr. Hort.* XIX (1872) 231 cum xylogr.; Van Geert, *Catal. n. 70* (1873-74) cum xylogr.; Linden, *Catal. n. 95* (1876) 15 cum xylogr.; Bentham, *Fl. Austral.* VII 138 in obs. GRISEBACHIA — Wendland et Drude in *Linnæa* XXXIX (1875) 203. — Ile de Lord Howe.

3. PHOENIX Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 886; T. Durand, *Ind. Gen. n. 7690*. — Genre de 12 espèces de l'Afrique trop. et subtrop. de l'Asie occ., de l'Inde or. et de l'Asie or.-trop.

**P. dactylifera** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 1188; Delile, *Fl. d'Égypte* 169 et 312 t. 62; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 257 t. 120; Kunth, *Enum. Pl.* III 255; de Kerchove, *Les Palmiers* 123-150 fig. 71, 78, 79, 81, 148, 189 et 261; Battandier et Trabut, *Fl. de l'Algérie* (monoc.) 20; Durand et Schinz, *Conspect. Fl. Afric.* V 454. — Toute l'Afrique bor., Nubie, Kordofan.

**Phoenix reclinata** Jacquin, *Fragm. Bot.* I (1809) 27 t. 24; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 272 t. 164; Kunth, *Enum. Pl.* III 256; *Illustr. Hort.* VI (1859) misc. 85 cum icône; de Kerchove, *Les Palmiers* 330 t. 22; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 455. — Abyssinie, Natal, bassin du lac Ngami, colonie du Cap.

**P. tenuis** Verschaffelt, *Catal.* n. 84 (1869) 13 cum xylogr. *P. CANARIENSIS* Hort. ex Chabaud in *La Provence Agric.* (1882) 293 fig. 66-68. — Canaries.

4. **CHAMEROPS** Linné, *Mus. Cliffort.* (1736) 10; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7695. — Deux espèces de la Région Méditerran.

**C. humilis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1187; Andrews, *Bot. Repos.* IX (1809) t. 599; *Bot. Mag.* (1820) t. 2154; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 248-49 t. 120 et 124 fig. 2-5; Kunth, *Enum. Pl.* III 248; de Kerchove, *Les Palmiers* 240 fig. 77, 84, 85, 117-19, 133, 147 et 186; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 455. — Europe Médit., Asie Mineure, Maroc, Algérie.

5. **LIVISTONA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 267; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7706<sup>b</sup>. — Genre d'environ 15 espèces de l'Asie trop. cont. et insul., et de l'Australie.

**L. australis** Martius, *Hist. Nat. Palm.* III (1836-50) 242; Wendland et Drude in *Linnea* XXXIX (1875) 232; *Bot. Mag.* (1877) t. 6274; Bentham, *Fl. Austral.* VII 146. **CORYPHA** — R. Brown, *Prodr. Fl. Nov. Holl.* (1810) 267. — Queensland, Nouvelles-Galles du Sud, Victoria.

6. **TRACHYCARPUS** H. Wendland ex J. Gay in *Bull. Soc. Bot. France* VIII (1861) 429; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7706<sup>c</sup>. — Genre de 4 espèces de l'Inde, de la Chine et du Japon.

**T. excelsus** H. Wendland ex J. GAY in *Bull. Soc. Bot. France* VIII (1861) 429. **CHAMEROPS** — Thunberg, *Fl. Jap.* (1784) 139 (excl. var.  $\beta$ ); Miquel, *Prol. Fl. Jap.* 329; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 253 t. 144; J. Gay, *loc. cit.* VIII (1861) 410; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 1. — Japon.

7. **LATANIA** Commerson ex Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) 39; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7724. — Trois espèces des îles Mascareignes.

**L. Commersonii** J.-F. Gmelin, *Syst. Nat.* (1767) 1035; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 224 t. 148, 154 et 161. **L. BORBONICA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 427. **L. CHINENSIS** Jacquin, *Fragm. Bot.* (1800-09) 16 t. 16 fig. 1; Martius, *loc. cit.* III 240. **L. PLAGEOMA** Commerson ex Baker, *Fl. of Mauril.* (1877) 381. — Maurice.  $\dagger$

8. **COCOS** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1188 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7736. — Trente-cinq espèces de l'Amérique trop. et subtrop. ; une espèce de l'Asie trop. et de l'Australie bor.

**C. australis** Martius, *Palmetum Orbignianum* (1847) 95 t. 1 et 30 et *Hist. Nat. Palm.* III 289 ; D'Orbigny, *Voy. Amér. Mérid.* I t. 30 ; Drude in Martius, *Fl. Brasil.* III 2 420. — Amérique austr. (Uruguay, Buénos-Ayres). ‡

**C. nucifera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1188 ; Jacquin, *Hist. Stirp. Americ.* t. 253 ; Descourtilz, *Fl. Antilles* I t. 21 ; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III 423 t. 62, 75 et 86 ; Wallace, *Palms of Amazon* t. 48 ; Drude in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 404. — Patrie inconnue ! Plages de la région trop. dans le monde entier. ‡

**C. Weddelliana** H. Wendland in *Flor. et Pomol.* (1871) 114 ; de Kerchove, *Les Palmiers* 94 t. 40. GLAZIOVA MARTIANA Glaziou ex Drude in Martius, *Fl. Brasil.* III 2 (1882) 397 t. 86 et 88. — Brésil. ‡

9. **JUB.EA** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 308 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7738. — Genre monotype.

**J. spectabilis** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 308 t. 96 ; Martius, *Hist. Nat. Palm.* III t. 294 t. 161 fig. 2 ; Gaudichaud, *Voy. Bonite* t. 51 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 293. — Chili. ‡

## CXLIX. PANDANACÉES

1. **PANDANUS** Rumphius ex Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 64 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7743. — Genre d'environ 50 espèces bien distinctes, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie trop.

**P. Veitchi** Hort. ex *Gard. Chron.* (1868) 349 ; Ed. André in *Illustr. Hort.* XIX (1872) 39 cum xylogr. ; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* I t. 28. — Iles de la Mer du Sud. ‡



## CL. AROIDÉES

1. **ANTHURIUM** Schott in Wien. Zeitschr. f. Künst. III (1829) 828 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7758. — Genre d'environ 200 espèces de l'Amérique trop.

**A. acaule** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 22 et *Prodr. Aroid.* 476 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 75 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 59 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 137. **POTHOS** — Jacquin, *Select. Stirp. Americ.* 31 t. 153. — Antilles. ♀

**A. Andraeanum** Linden in *Illustr. Hort.* (1877) 43 t. 271 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 160. — Colombie. ♀

**A. cordatum** C. Koch et Sello in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853-54) Append. 5 et in *Annal. Sc. Nat.* sér. 4 I (1854) 346 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 177 et in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 70. — Vénézuéla ou Colombie. ♀

**A. cristallinum** Linden et André in Linden, *Catal.* (1873) n. 90 et in *Illustr. Hort.* XX (1873) 87 t. 128 ; Regel in *Gartenflora* (1876) 225 t. 873 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 68 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 167. — Pérou. ♀

**A. Hookeri** Kunth, *Enum. Pl.* III (1841) 74 ; C. Koch in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) Append. 6 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 60 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 139. **A. HUEGELII** Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* V (1855) 83 ; *Prodr. Aroid.* 460 et *Icon. Aroid.* I t. 18-20. **POTHOS ACAULIS** Hooker (non Jacquin), *Exot. Fl.* II (1825) t. 122. — Guadeloupe, Dominique, Saint-Vincent. ♀

**A. leuconeurum** Lemaire in *Illustr. Hort.* IX (1862) t. 314 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 68 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 169. — Amérique trop. (patrie inconnue, peut-être le Mexique ?). ♀

**A. magnificum** Linden, *Catal.* (1865) 2 et in *Belg. Hort.* XV (1865) 98 ; Regel in *Gartenflora* (1866) 162 t. 508 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 68 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 167. — Colombie. ♀

**A. ochranthum** C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) Append. 6 et in *Annal. Sc. Nat.* sér. 4 I (1854) 349 et in *Wöchenschr. f. Gärtn.* (1864) 197, 249 ; Schott, *Prodr. Aroid.* 532 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 72 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 187. — Costa-Rica, Panama. ♀

**A. Scherzerianum** Schott in *Æstr. Bot. Wochenbl.* (1857) 53 et *Prodr. Aroid.* 430 ; *Bot. Mag.* (1862) t. 5349 ; *Gartenflora* (1865) t. 482 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 139 t. 1794-95 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 55 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 116. — Costa-Rica, Guatemala.

**Anthurium splendidum** Hort. Bull. ex *Illustr. Hort.* XXX (1883) t. 510; *Gard. Chron.* (1883) I 381. — Colombie. 2

**A. Veitchii** Masters in *Gard. Chron.* (1876) II 772 fig. 143; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 70 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 178. — Colombie. 2

2. **ZAMIOCULCAS** Schott, Synop. Aroid. (1856) 71; T. Durand, Ind. Gen. n. 7760. — Genre monotype.

**Z. Loddigesii** Schott, Syn. Aroid. (1856) 71; *Bot. Mag.* (1872) t. 5985; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 208. **CALADIUM ZAMIEFOLIUM** Loddiges, *Bot. Cab.* XV (1828) t. 1408. — Zanzibar, Réunion. 2

3. **GONATOPUS** Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 208; T. Durand, Ind. Gen. n. 7761. — Genre monotype.

**G. Boivini** Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 209. **ZAMIOCULCAS** — Decaisne in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XVII (1870) 321; *Bot. Mag.* (1873) t. 6026; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 472. — Zanzibar. 2

4. **ACORUS** Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) 104; T. Durand, Ind. Gen. n. 7762. — Deux espèces habitant toute la région temp. de l'hémisphère bor.

**A. gramineus** Solander in Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) 474; Smith, *Spicil. Bot.* 15 t. 17; Richard in Guillemain, *Archiv. Bot.* I 22 t. 3; Kunth, *Enum. Pl.* III 87; Schott, *Prodr. Aroid.* 580; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 218. — Japon. 2

5. **RHAPHIDOPHORA** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 77; T. Durand, Ind. Gen. n. 7767. — Genre de 20 espèces de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie trop. et des îles de l'Océan Pacifique.

**R. pertusa** Schott in *Bonplandia* V (1857) 43 et *Prodr. Aroid.* 382; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 244; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 546. **POTHOS** — Roxburgh, *Fl. Ind.* I (1820) 434; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* III t. 781. **SCINDAPSUS** — Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 21; Kunth, *Enum. Pl.* III 62. — Coromandel, Java, Timor, Australie trop.

6. **MONSTERA** Adanson, Fam. des Pl. II (1763) 470 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7768. — Genre de 15 espèces de l'Amérique trop.

**M. deliciosa** Liebmann in *Vidensk. Meddel. for Nat. Foren. Kiöbenhavn* (1849) 19 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 112 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 263. **PHILODENDRON PERTUSUM** Kunth et Bouché in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1848) 11. **TORNELIA FRAGRANS** Gutierrez in *Linnaea* XXVI (1853) 382 ; Schott, *Prodr. Aroid.* 354 et *Gen. Aroid.* t. 74. — Mexique.

**M. pertusa** Schott in *Wiener Zeitsch. für Kunst* IV (1830) 1028 et in *Linnaea* VI (1831) Beibl. 52 ; De Vriese, *Hort. Spaarn-Bergensis* (1839) ; Grisebach, *Fl. Brit. West Indian Isl.* 509 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 113 t. 20 et 21 ; De Candolle, *Monog. Phan.* II 261. **DRACONTIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 968 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* II t. 184 et 185. **MONSTERA ADANSONII** Schott in *Linnaea* VI (1831) Beibl. 52 et in *Meletem. Bot.* I (1832) 21 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 60. — Antilles, Costa-Rica, Vénézuéla, Colombie, Guyane, Brésil, Pérou.

7. **EPIPREMNUM** Schott in *Bonplandia* V (1857) 45 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7770. — Genre de 8 espèces de l'Archipel Malais.

**E. mirabile** Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 79 et *Prodr. Aroid.* 388 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 249. **RHAPHIDOPHORA LACERA** Hasskarl in *Flora* XXV (1842) II Beibl. I 11 pr. p. — Java.

8. **SPATHIPHYLLUM** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 22 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 7773. — Genre de 18 espèces de l'Amérique trop. et de l'Archipel Malais.

**S. cannaefolium** Schott, *Aroideae* I (1853) 1 t. I et *Prodr. Aroid.* 424 ; *Gartenflora* (1870) t. 640 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2 (1878) 103 t. 16 fig. 2 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 643. **POTHOS** — Dryander in *Bot. Mag.* (1802) t. 603 ; Loddiges, *Bot. Cab.* V t. 471. **MONSTERA** — Kunth, *Enum. Pl.* III (1841) t. 1. **S. CANNAEFORME** Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 103 t. 16 fig. 3. **ANTHURIUM DECHARDI** Ed. André in *Illustr. Hort.* XXIV (1877) 28 t. 269. — Vénézuéla, Guyane, Brésil. ♀

**S. Patini** N.-E. Brown in *Gard. Chron.* (1878) II 783 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 228 et 642. **ANTHURIUM** — R. Hogg in *Gard. Year Book* (1875) 123 ; Masters in *Gard. Chron.* (1875) I 525 fig. 409. **AMOMOPHYLLUM** — Engler in *Gard. Chron.* (1877) I 139. — Colombie. ♀

9. **SYMPLOCARPUS** Salisbury ex Nuttall, *Gen. North Americ. Pl.* (1818) 105 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7776. — Genre monotype.

**S. foetidus** Salisbury in NUTTALL, *Gen. N. Amer. Pl.* (1818) 106 ; Schott, *Gen. Aroid.* t. 90 ; *Bot. Mag.* (1833) t. 3224 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 84 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 212. **DRACONTIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 967. **ICTODES** — Bigelow, *Americ. Medic. Bot.* II (1819) 41. t. 24. **POTHOS** — Aiton, *Hort. Kew.* ed. I, III (1789) 318 ; Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 186. — États-Unis, Asie or., Japon. Ț

10. **CALLA** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 697 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7778. — Genre monotype.

**C. palustris** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 968 ; *Fl. Danica* (1769) t. 422 ; *Bot. Mag.* (1816) t. 1831 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 13 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 244. — Europe bor., occ. et centr., Asie et Amérique bor. Ț

11. **ANORPHOPHALLUS** Blume in *Batav. Diar.* (1825) ex De-caisne, *Herb. Timor. Deser.* (1835) 38 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7791. — Genre de 15 espèces de l'Asie trop.

**A. Rivieri** Durieu, *Catal. Grain. Jard. Bordeaux* (1862) 12 et in *Act. Soc. Linn. Bord.* XXVIII (1869) 15 ; *Gard. Chron.* (1873) 610 et 611 cum icône ; *Bot. Mag.* (1875) t. 6195 ; Ramey in *Assoc. Franç. Scienc.* sess. 4 (Nantes) 731 cum icône ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 312. — Cochinchine, Japon. Ț

12. **HOMALOMENA** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 20 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7798. — Genre de 20 espèces de l'Asie et de l'Amérique trop.

**H. aromatica** Schott in SCHOTT et ENDLICHER, *Meletem. Bot.* (1832) 20 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 335 ; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 532. **CALLA** — Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 513 ; *Bot. Mag.* (1821) t. 2279. **C. OCCULTA** Loddiges, *Bot. Cab.* I (1817) t. 12. — Inde or., Ceylan, Nicobar, Java, Célèbes, île Pitang. Ț

**H. Wallisii** Regel in *Gartenflora* (1877) 33 t. 891 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 342. **CURMERIA** — Masters in *Gard. Chron.* (1877) I 107 et 108 fig. 16. — Colombie. Ț

43. **PHILODENDRON** Schott in *Wien. Zeitschr. für Kunst* III (1829) 780 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7806. — Genre de plus de 100 espèces de l'Amérique trop.

**P. bipinnatifidum** Schott in *Wien. Zeitschr. für Kunst* III (1829) 780 et in *Linnaea* VI (1831) Litt. 53 et in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* (1832) 20 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 169 t. 35 et 36 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 429. ? *ARUM PINNATIFIDUM* Vellozo, *Fl. Flumin.* IX (1827) t. 110. — Brésil, Paraguay. *h*

**P. tripartitum** Schott in *Wien. Zeitschr. für Kunst* III (1829) 780 et in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 19 ; Engler in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 144 et in De Candolle, *Monog. Phan.* II 411. *ARUM* — Jacquin, *Hort. Schœnbr.* II (1797) 33 t. 190. *CALADIUM* — Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 491 ; Persoon, *Syn. Pl.* II 575. — Vénézuéla, Costa-Rica. *z*

44. **PELTANDRA** Rafinesque in Blainville, *Journ. Phys. et Chim.* LXXXIX (1819) 102 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7814. — Genre de 2 espèces de l'Amérique bor.-oc.

**P. Virginica** Rafinesque in BLAINVILLE, *Journ. Phys. et Chim.* LXXXIX (1819) 102 ; Torrey, *Fl. of State New-York* t. 124 ; Schott, *Gen. Aroid.* t. 41 fig. 16-25 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 339. *ARUM* — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 966. — Géorgie, Caroline, Floride, Rhode Island. *z*

45. **RICHARDIA** Kunth in *Mém. Muséum Paris* IV (1818) 433 t. 20 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7815 (sub *Zantedeschia*). — Genre de 5 espèces de l'Afrique trop. et austr.

**R. Africana** Kunth in *Mém. Mus. Paris* IV (1818) 433 t. 20 ; Schott, *Syn. Aroid.* 131 ; *Gen. Aroid.* t. 62 et *Prodr. Aroid.* 324 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 327. *R. ÆTHIOPICA* Sprengel, *Syst. Veget.* III (1826) 765 et V (1828) 594. *ZANTEDESCHIA* — Sprengel, *loc. cit.* III (1826) 765. *CALLA* — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 968 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 832. — Colonie du Cap, (Madère, natural.).

46. **ALOCASIA** Necker, *Elem. Bot.* III (1790) 289 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7819. — Genre de plus de 20 espèces de l'Inde occ., de l'Archipel Malais et de la Polynésie.

**A. Sanderiana** Hort. Bull ex REGEL in *Gartenflora* (1885) 311 et (1886) 451 cum icône. — Iles de l'Océan Pacifique.

17. **XANTHOSOMA** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 19 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7825. — Genre de plus de 20 espèces de l'Amérique trop.

**X. Lindenii** S. Moore in *Flor. and Pomol.* (1872) 4 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 482 et in Martius, *Fl. Brasil.* III 2, 191. **PHYLLO-TENIUM** — Ed. André in *Illustr. Hort.* XIX (1872) 3 t. 88 ; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* I t. 16. — Colombie. ♀

18. **ARISEMA** Martius in *Flora* XIV (1831) II 459 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7843. — Genre de plus de 50 espèces de l'Asie temp. et trop., de l'Abyssinie et de l'Amérique bor.

**A. atrorubens** Blume in *Rumphia* I (1835) 97 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 17 ; Morren in *Annal. de Gand* I (1846) t. 58 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 535. **ARUM** — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 315 ; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 481. **ARUM** **TRIPHYLLUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 965 pr. p. **ARUM** **TRIPHYLLUM** Linné var. **ZEBRINUM** Sims in *Bot. Mag.* (1806) t. 950 ; Loddiges, *Bot. Cab.* IV (1819) t. 320. — États-Unis occ. et mérid.-occ. ♀

**A. curvatum** Kunth, *Enum. Pl.* III (1841) 20 ; Schott, *Syn. Aroid.* 29 et *Prodr. Aroid.* 37 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 544. **ARUM** — Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 506 ; Wight, *Icon. Pl. Ind. Or.* III t. 788. — Himalaya. ♀

Obs. Hooker f. (*Fl. Brit. Ind.* VI 502) réunit cette espèce à l'**A. TORTUOSUM** Schott.

**A. Dracontium** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17 et *Syn. Aroid.* 28 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 18 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 547. **ARUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 964 ; *Bot. Reg.* (1822) t. 668 ; Loddiges, *Bot. Cab.* XII t. 1165. — Tennessee, Pensylvanie, Géorgie, Kentucky, Texas. ♀

**A. fimbriatum** Masters in *Gard. Chron.* (1884) II 680 ; Regel in *Gartenflora* (1884) 386-88 cum iconc. — Amérique trop. ♀

**A. Japonicum** Blume in *Rumphia* I (1835) 106 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 19 ; Schott, *Syn. Aroid.* 29 et *Prodr. Aroid.* 40 ; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 549. **ARUM** **DRACUNCULUS** Thunberg (non Linné), *Fl. Jap.* (1784) 233 pr. p. — Japon. ♀

— — var. **serratum** Engler, *loc. cit.* II (1879) 549. **ARUM** **SERRATUM** Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 338 et *Icon. Pl. Jap.* IV t. 7. **ARISEMA** — Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17 ; Schott, *Syn. Aroid.* 29 et *Prodr. Aroid.* 41 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 19. — Avec le type.

**Arisæma ringens** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 534. ARUM — Thunberg in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) 337; Kunth, *Enum. Pl.* III 17; Morren in *Annal. de Gand* II (1846) t. 97. — Japon. ʒ

— — var. **præcox** Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 535. A. PRÆCOX De Vriese, *Hort. Spaarn-Bergensis* I (1839); Schott, *Prodr. Aroid.* 32; Regel in *Gartenflora* (1861) 1 t. 1; *Bot. Mag.* (1861) t. 5267; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 4. — Avec le type.

— — var. **Sieboldii** Engler, *loc. cit.* II (1879) 534. A. SIEBOLDII De Vriese, *Hort. Spaarn-Bergensis* I (1839) A. RINGENS Schott, *Prodr. Aroid.* (1860) 31; C. Koch in *Allgem. Gartenzeit.* (1857) 87; Franchet et Savatier, *loc. cit.* II 4. — Avec le type.

19. ARISARUM Targioni-Tozzetti in Ann. Mus. Fis. Firenze II 2 (1810) 67; T. Durand, Ind. Gen. n. 7844. — Genre de 3 espèces de la Région Méditerranée.

**A. proboscideum** Savi, *Osserv. div. Piante* (1816) 6; Schott, *Syn. Aroid.* 4 et *Prodr. Aroid.* 24; Kunth, *Enum. Pl.* III 15; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 565. ARUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 966 (excl. var. β); Boccone, *Mus. Piant. Rar.* II t. 50; Willdenow, *Sp. Pl.* IV 485 (excl. var. β). — Italie. ʒ

**A. simorrhinum** Durieu in Duchartre, *Rev. de Bot.* I (1846) 360 et *Explor. Scient. Algér.* t. 44; Schott, *Prodr. Aroid.* 4 et *Syn. Aroid.* 24; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 564; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 479. ARISARUM VULGARE Hooker f. in *Bot. Mag.* (1873) t. 6023. — Maroc, Algérie. ʒ

20. SAUROMATUM Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17; T. Durand, Ind. Gen. n. 7846. — Genre de 6 espèces environ habitant l'Asie et l'Afrique trop.

**S. guttatum** Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17 et *Prodr. Aroid.* 71; Blume in *Rumphia* I 126; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 570; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 508. ARUM — Wallich, *Pl. Asiat. Rar.* II (1831) 10 t. 115. ARUM VENOSUM Lindley in *Bot. Reg.* (1826) t. 1017. — Inde or. (partie bor.), ? Java.

21. BIARUM Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I (1832) 17; T. Durand, Ind. Gen. n. 7847. — Genre de 12 espèces de la Région Méditerranée.

**B. Spruneri** Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 5 et *Fl. Or.* V 32; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 574. ISCHARUM — Schott, *Syn. Aroid.* (1856) 7. CYLLENIMUM — Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 9 et *Prodr. Aroid.* 65. — Grèce. ʒ

22. **ARUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 698 pr. p.; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7848. — Genre de 20 espèces environ habitant l'Europe, la Région Méditerr. et l'Asie occ. jusqu'à l'Afghanistan.

**A. Creticum** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 1, XIII (1853) 9 et *Fl. Or.* V 37; Raulin, *Descr. Phys. Crête* t. 17; Schott, *Syn. Aroid.* 11 et *Prodr. Aroid.* 94; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 590. — Crête. 4

**A. Dioscoridis** Sibthorp et Smith, *Fl. Græce Prodr.* II (1813) 245 et *Fl. Græca* t. 947; Kunth, *Enum. Pl.* III 24; Schott, *Syn. Aroid.* 78; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 583; Boissier, *Fl. Or.* V 35. **A. SPECTABILE** Regel (non Schott) in *Gartenflora* (1872) 353 t. 742. — Chypre. 4

**A. Italicum** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2; *Bot. Mag.* (1843) t. 2432; Kunth, *Enum. Pl.* III 24; Schott, *Syn. Aroid.* 10 et *Prodr. Aroid.* 82; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 11; Parlatores, *Fl. Ital.* II 244; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 591; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 481. — Açores, Europe centr. et mérid., Afrique bor., Chypre. 4

— — var. **Canariense** ENGLER in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 592; Durand et Schinz, *loc. cit.* V 482. **A. CANARIENSE** Webb et Berthelot, *Phytogr. Canar.* III (1836-50) 293. — Madère, Canaries.

**A. maculatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 966; *Fl. Dan.* (1770) t. 505; *Engl. Bot.* (1803) t. 4198; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 8; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 593. **A. VULGARE** Lamarck, *Fl. Franç.* III (1778) 537; Kunth, *Enum. Pl.* III 23. — Europe occ., centr. et mérid.-occ. 4

**A. Orientale** Marschall-Bieberstein, *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 207; Kunth, *Enum. Pl.* III 24; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 9; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 586; Boissier, *Fl. Or.* V 39. — Dalmatie, Asie Mineure, Caucase. 4

— — var. **gratum** ENGLER in De Candolle, *Monog. Phan.* II (1879) 588. **A. GRATUM** Schott, *Syn. Aroid.* (1856) 11 et *Prodr. Aroid.* 89. — Liban. 4

**A. pictum** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 410; Kunth, *Enum. Pl.* III 24; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 331; Parlatores, *Fl. Ital.* II 248; Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 582. **GYMNOMESIUM** — Schott in *Æsterr. Bot. Wochenbl.* V (1855) 17. **A. CORSICUM** Loiseleur, *Fl. Gall.* II (1807) 617. — Corse, Sardaigne. 4

23. **HELICOPHYLLUM** Schott, *Syn. Aroid.* I (1856) t. 22; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7849. — Quatre ou cinq espèces de l'Asie occ.

**H. Alberti** Regel in *Act. Hort. Petrop.* VIII (1884) 683; *Bot. Mag.* (1887) t. 6969. — Turkestan or. 4



**Helicophyllum crassifolium Engler** in DE CANDOLLE, *Monog. Phan.* II (1879) 597. TYPHONIUM — Ledebour, *Fl. Ross.* IV (1853) 10. EMINIUM LEDEBOURI Schott, *Syn. Aroid.* (1856) 17 t. 22; *Gen. Aroid.* t. 19 et *Prodr. Aroid.* 111. BIARUM LEHMANNI Budge, *Pl. Lehmann.* (1851) 503. HELICOPHYLLUM — Regel in *Act. Hort. Petrop.* VII (1880) 549 et in *Gartenflora* (1883) 223 et 291 t. 1056. — Turkestan or. ♀

24. DRACUNCULUS Adanson, *Fam. des Pl.* II (1763) 469 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7850. — Deux espèces de l'Europe  
mérid. et des Iles Canaries.

**D. vulgaris Schott** in SCHOTT et ENDLICHER, *Meletem. Bot.* I (1832) 17 ;  
Schott, *Gen. Aroid.* t. 22 et *Prodr. Aroid.* 120 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 29 ;  
Engler in De Candolle, *Monog. Phan.* II 602. ARUM DRACUNCULUS Linné,  
*Sp. Pl.* ed. I (1753) 964 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* X t. 940. D. POLY-  
PHYLLUS Blume in *Rumphia* I (1835) 124 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII  
t. 12. — Europe mérid. (du Portugal à la Grèce), Rhodes. ♀

25. HELICODICEROS Schott in OEstr. *Bot. Wochenbl.* III  
(1853) 369 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7851. — Genre mo-  
notype.

**H. muscivorus Engler** in DE CANDOLLE, *Monog. Phan.* II (1879) 605.  
ARUM — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 410 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III  
329. ARUM CRINITUM Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 314 ; *Bot. Reg.* (1824)  
t. 831. DRACUNCULUS — Schott in Schott et Endlicher, *Meletem. Bot.* I  
(1832) 17 ; Kunth, *Enum. Pl.* III 30 ; *Fl. des Serres* V (1849) t. 445-46.  
HELICODICEROS — Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 21. — Corse et petites îles  
entre la Corse et la Sardaigne. ♀

26. AMBROSINIA Linné, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) n. 517 ;  
T. Durand, *Ind. Gen. n.* 7854. — Genre monotype.

**A. Bassii Linné**, *Gen. Pl.* ed. VI (1764) 517 ; Gussone, *Fl. Sicul. Syn.* II  
(1844) 594 ; Bertoloni, *Fl. Ital.* X 252 ; Parlatore, *Fl. Ital.* II 231 ; Blume,  
*Rumphia* I 81 t. 366 ; *Bot. Mag.* (1878) t. 6360 ; Engler in De Candolle,  
*Monog. Phan.* II 619. ARUM PROBOSCEDEUM Linné var.  $\beta$  Linné, *Sp. Pl.* ed. I  
(1753) 966. — Sicile, Italie, Algérie. ♀

## CLI. ALISMACÉES

1. **SAGITTARIA** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1764) n. 723 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7865. — Genre d'environ 15 espèces habitant les régions temp. et trop. de l'Ancien et du Nouveau Monde.

**S. sagittifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 993 ; *Fl. Dan.* (1764) t. 172 ; *Engl. Bot.* (1792) t. 84 ; Redouté, *Liliacées* V t. 279 et 280 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 53 ; M. Micheli in De Candolle, *Monog. Phan.* III 66. Europe, Asie, Amérique bor., Mexique. ♀

— — var. **variabilis** M. MICHELI in De Candolle, *Monog. Phan.* III (1881) 69. **S. obtusa** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 409 ; Descourtilz, *Fl. des Antilles* VII t. 497. — Canada, États-Unis.

2. **BUTOMUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1764) n. 340 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7871. — Genre monotype.

**B. umbellatus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 372 ; *Fl. Dan.* (1775) t. 604 ; Redouté, *Liliacées* IV t. 209 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VII t. 58 ; M. Micheli in De Candolle, *Monog. Phan.* III 85. — Europe, Asie temp. et subtrop. ♀

3. **LIMNOCHARIS** Humboldt et Bonpland, *Pl. Æquinoc. I* (1808) 116 t. 34 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7874. — Genre de 3 ou 4 espèces de l'Amérique tropicale.

**L. nymphoides** M. Micheli in De Candolle, *Monog. Phan.* III (1881) 91. **STRATIOTES** — Humboldt et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 821. **HYDROCLEYS COMMERSOII** L.-C. Richard in *Mém. Mus. Paris* I (1815) 368 t. 18. **L. HUMBOLDTI** L.-C. Richard, *loc. cit.* I (1815) 369 t. 19 ; *Bot. Mag.* (1824) t. 2525 ; *Bot. Reg.* (1834) t. 1640. — Amérique mérid. (du Vénézuéla à l'Argentine). ♀

## CLII. NAIADACÉES

1. **APONOGETON** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 32 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7879. — Genre de 23 espèces de l'Asie et de l'Afrique trop. et temp. et de l'Australie.

**A. distachyus** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 215 ; Andrews, *Bot. Repos.* V t. 290 ; *Bot. Mag.* (1810) t. 1293 ; *Fl. des Serres* XVII (1867-68) 125 t. 1788 ; Engler in *Bot. Jahrb.* VIII (1887) 272 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 492. — Colonie du Cap, Natal. 2

**A. spathaceus** E. Meyer in DRÈGE, *Zwei Pfl. Docum.* (1843) 165 et in *Linnæa* XX (1847) 215 ; Engler in *Bot. Jahrb.* VIII (1887) 272 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 493. — Angola, Natal, Transvaal, Colonie du Cap. 2

— — var. **junceus** HOOKER F. in *Bot. Mag.* (1878) t. 6399. **A. JUNCEUS** Lehmann ex Steudel, *Nomencl. Bot.* ed. II 1 (1840) 114. — Transvaal.

## CLIII. CYPÉRACÉES

1. **CYPERUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1764) n. 32 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7923. — Environ 800 espèces décrites, dont 500 seulement bien distinctes, répandues dans le monde entier.

**C. alternifolius** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 28 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* II t. 298 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 33 ; Bæckeler in *Linnæa* XXXV (1867-68) 568 ; Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 289 et XXI (1884) 130 et in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 547. — Madagascar, Réunion. 2

**C. diffusus** Vahl, *Enum. Pl.* II (1837) 321 ; Miquel, *Fl. Ind. Bot.* III 264 ; Clarke in Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* VI 602. **C. ELEGANS** Swartz (non Linné), *Obs. Bot.* (1791) 301 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 28 ; Bæckeler in *Linnæa* XXXV (1867-68) 538. — Rég. trop. et subtrop. du monde entier. 2

**C. Iria** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 45 et ed. II 67 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 38 ; Boissier, *Fl. Or.* V 370 ; Clarke in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 565. **C. SANTONICI** Rottbæll, *Descr. et Icon. Pl.* (1773) 41 t. 9 fig. 1. — Australie, Asie or. et occ., Afrique centr.-or., Maurice. 2

**Cyperus longifolius** Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* VII (1806) 270 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 30 ; Bœckeler in *Linnaea* XXXV (1867-68) 535 ; Baker, *Fl. of Maurît.* 443 ; Clarke in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 566. — Iles Mascareignes, Colonie du Cap. ♀

**C. Papyrus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 47 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 64 ; Parlatores, *Mém. Papyrus* (1853) 32 t. 2 ; Bœckeler in *Linnaea* XXXVI (1869-70) 303 ; Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 191 et in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 571. PAPHYRUS ANTIQUORUM Willdenow in *Abh. Acad. Berlin* (1812) 70. — Toute l'Afrique trop., Syrie (Sicile, indig. ?). ♀

**C. textilis** Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* I (1794) 18 et *Fl. Capens.* (ed. Schultes) 100 ; Nees in *Linnaea* VII (1832) 513 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 32 ; Bœckeler in *Linnaea* XXXV (1867-68) 567 ; Clarke in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 579. — Afrique austr. et austr.-or. ♀

Obs. En Algérie et dans la France occ. (Bordeaux) cette espèce n'est sans doute qu'introduite.

2. **SCIRPUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1764) n. 33 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7934. — Genre de 200 espèces environ habitant le monde entier.

**S. alpinus** Schleicher, *Catal. Pl. Helv.* ed. IV (1821) 32 et in Gaudin, *Fl. Helv.* I 108 ; Koch, *Syn. Fl. Germ. et Helv.* ed. III 642 ; Gremli, *Excurs. Fl. Schweiz.* ed. III 279. — Suisse, (Valais, Engadine). ♀

3. **FICINIA** Schrader in *Comm. Gotting.* VII (1832) 143 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7936. — Genre de 40 espèces de l'Afrique trop. et austr.

**F. gracilis** Schrader, *Anal. Fl. Cap.* (1832) 44 ; Kunth, *Enum. Pl.* II 256 ; Bœckeler in *Linnaea* XXXVII (1871) 68 ; Clarke in Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 638. SCIRPUS — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* VI (1804) 763. ISOLEPIS — Nees in *Linnaea* VII (1832) 493. — Colonie du Cap, pays des Pondo. ♀

4. **KOBRESIA** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 205 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7984. — Genre de 8 espèces des régions bor. et mont. de l'Europe et de l'Asie.

**K. scirpina** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 205. ELYNA — Pax in Engler et Prantl, *Naturl. Pflanzenfam.* II 2 (1887) 122. E. SPICATA Schrader, *Fl. Germ.* I (1806) 155 ; Villars, *Hist. Pl. Dauph.* II t. 6 ; *Fl. Dan.* (1816) t. 1529 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* IV t. 77 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 384. — Europe alp., Asie extratrop., Amérique bor. ♀

5. **CAREX** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 705 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 7988. — Genre d'environ 500 espèces bien distinctes dispersées dans le monde entier, mais peu abondantes dans les régions tropicales.

**C. aquatilis** **Wahlenberg** in *Vet. Akad. Nya. Handl. Stockh.* (1803) 463 ; *Engl. Bot.* (1832) t. 2738 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 234 ; Hartmann, *Skandin. Fl.* ed. IV 466. **VIGNEA** — Reichenbach in *Möessler, Handb. d. Gewächsk.* ed. 2, III (1829) 1624. — Rég. arct. et bor. du monde entier. ♀

**C. ericetorum** **Pollich**, *Hist. Pl. Palat.* II (1777) 380 ; *Fl. Dan.* (1819) t. 1765 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 286 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 262 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 414. **C. APPROXIMATA** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 267. **C. MONTANA** Leers (non Linné), *Fl. Herborn.* (1775) 199 — Europe occ., centr. et mérid. (Asie temp. ?) ♀

**C. incurva** **Lightfoot**, *Fl. Scot.* II (1777) 344 t. 24 ; *Engl. Bot.* (1801) t. 927 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 199. **C. JUNCIFOLIA** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 264. — Europe bor., Alpes de la Suisse, de l'Italie et du Tyrol. ♀

**C. livida** **Willdenow**, *Sp. Pl.* IV (1805) 285 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 286 ; Booth, *Illustr. Gen. Carex.* t. 214 et 215 ; Hartmann, *Skandin. Fl.* ed. IV 460. **C. LIMOSA** Linné, var. — **Wahlenberg** in *Vet. Akad. Nya. Handl. Stockh.* (1803) 162. — Scandinavie. ♀

**C. Ioliacea** **Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 974 ; *Fl. Dan.* (1810) t. 1403 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 214 ; Booth, *Illustr. Gen. Carex* t. 127 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 655. **VIGNEA** — Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 57. — Europe bor. et centr.-bor.

**C. macrostyla** **Lapeyrouse**, *Hist. Abrég. Pl. Pyrén.* (1813) 562 ; De Candolle, *Fl. Franç.* VI 287. **C. DECIPIENS** Gay in *Annal. Sc. Nat.* ser. 1, XXVI (1832) 209 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 386. — Pyrénées. ♀

**C. mucronata** **Allioni**, *Fl. Pedem.* II (1785) 268 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* IV t. 87 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 201 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 418. **VIGNEA** — Reichenbach, *Fl. Germ. Excurs.* (1830) 1407. — Europe centr., Italie. ♀

**C. ornithopoda** **Willdenow**, *Sp. Pl.* IV (1805) 255 ; *Fl. Dan.* (1810) t. 1405 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 240 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 418. **C. PEDATA** Allioni (non Linné), *Fl. Pedem.* II (1785) 168. — Europe bor., occ. et centr., Italie. ♀

**C. Parryana** **Dewey** in *Silliman, Amer. Journ. Sci.* XXVII (1835) 239 t. 5 ; Bœckeler in *Linnaea* XLI (1877) 168. **C. ARCTICA** Dewey, *loc. cit.* XXVII (1835) 239 t. 5. — Amérique bor. (Saskatchewan.) ♀

- Carex pediformis** C.-A. Meyer, *Cyperac. Nov. in Mém. Sav. Étrang. Acad. St-Petersb.* I (1831) 219 t. 10; Kunze, *Suppl. zu Schkuhr, Riedgräs.* t. 16; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 290; Hartmann, *Skandin. Fl.* ed. IV 462. — Asie arct. et bor., Scandinavie (Silésie et Tyrol?). ♀
- C. plantaginea** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 392; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 286; Booth, *Illustr. Gen. Carex* 38 t. 94; Bœckeler in *Linnaea* XL (1876) 445. C. LATIFOLIA Mœnch, *Method. Pl. Marburg.* (1794) 324. — Amérique bor. ♀
- C. pseudo-Cyperus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 978; *Fl. Dan.* (1794) t. 1117; *Engl. Bot.* (1795) t. 242; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 275; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 426. — Régions temp. bor. et austr. du monde entier. ♀
- C. Pyrenaica** Wahlenberg in *Vet. Acad. Nya. Handl. Stockh.* (1803) 139; C.-A. Meyer, *Cyperac. Nov.* 18 t. 7; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 198; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 387. CALLISTACHYS — Heuffel in *Flora* XXVII (1844) 528. — Europe, Amérique bor., Nouvelle-Zélande. ♀
- C. rupestris** Allioni, *Fl. Pedem.* II (1785) 264 t. 92 fig. 1; Host, *Icon. Gram. Austriac.* IV t. 76; *Engl. Bot.* (1838) t. 2814; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 198; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 388. — Europe bor. et alp., Sibérie, Daourie. ♀
- C. straminea** Willdenow ex Schkuhr, *Riedgräs.* I (1801) 49 fig. 34 et 174; Booth, *Illustr. Gen. Carex* t. 371 et 384-89; Bœckeler in *Linnaea* XXXIX (1875) 116. C. MIRABILIS Dewey in Silliman, *Amer. Journ. Sci.* XXX (1836) 63 t. 2. — Amérique bor. ♀
- C. tenuis** Host, *Icon. Gram. Austriac.* IV (1809) 51 t. 92; Sturm, *Deutschl. Fl.* XV t. 53; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* VIII t. 211; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 421; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 664. C. STRIGOSA Allioni (non Hudson), *Fl. Pedem.* II (1785) 270. — Europe mont., centr. et mérid. ♀
- C. turfosa** Fries in *Bot. Notiz.* (1846) 104 et 107; Lange, *Handb. Danske Fl.* (1864) 685. C. STRICTA Goodenough var. — Hartmann, *Skandin. Fl.* ed. IV (1879) 468. — Europe centr. (part. centr. et bor.) ♀
- Obs. Bœckeler (*Linnaea* XL (1876) 418) réunit le C. TURFOSA Fries au C. ACUTA Linné.

## CLIV. GRAMINÉES

1. LOPHOLEPIS Decaisne in Arch. Mus. Paris I (1839) 147; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8031. — Genre monotype.
- L. ornithocephala** Steudel, *Syn. Pl. Glum.* I (1855) 112. HOLBÆLLIA — Wallich in Hooker, *Bot. Miscell.* II (1831) 144 t. 76 (non Ejusd. *Tent. Fl. Nepal.*); Kunth, *Enum. Pl.* I 171. — Inde or.

2. **PANICUM** Linné, *Gen. Pl.* (1737) n. 47 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8050. — Environ 900 espèces décrites dont 300 seulement bien distinctes habitant les régions temp. et surtout subtrop. et trop. du monde entier.

**P. plicatum** Lamareck, *Illustr. Genr. Bot.* I (1791) 171 et *Encycl. Méth. Bot.* IV 736 ; Jacquin, *Eclog. Gram. Rarior.* t. 1 ; Trinius, *Spec. Gram.* XIX t. 223 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 94 ; Steudel, *Syn. Pl. Glum.* I 64. — Région trop. du monde entier. 2

**P. undulatifolium** Arduino, *Animadv. Bot. Spec. Alt.* (1764) 14 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* III t. 52. **OPLISMENUS** — P. Beauvois, *Essai Nouv. Agrostogr.* (1812) 54 ; Trinius, *Sp. Gramin.* II 192 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 139. — Région trop. et subtrop. du monde entier.

3. **PHALARIS** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 38 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8085. — Genre de 10 espèces habitant l'Europe, la Région Méditerr. et l'Amérique extratrop.

**P. arundinacea** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 55 ; *Fl. Dan.* (1764) t. 259 ; *Engl. Bot.* (1797) t. 402 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* t. 133 ; Boissier, *Fl. Or.* V 474. **BALDINGERA** — Dumortier, *Agrostogr. Belg.* (1823) 130. — Europe, Asie, Amérique bor. 2

4. **STIPA** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 78 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8090. — Genre d'environ 100 espèces des régions temp. et trop. du monde entier.

**S. pennata** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 78 ; *Engl. Bot.* (1804) t. 1356 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* t. 333 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 46 ; Boissier, *Fl. Or.* V 502. — Europe centr. et mérid., Asie, Afrique bor. 2

5. **ALOPECURUS** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 50 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8107. — Genre d'environ 20 espèces bien distinctes de l'Europe et de l'Asie temp. (sans doute introd. seulement dans l'Amérique bor. et austr. et l'Australie).

**A. lanatus** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 43 ; Trinius, *Spec. Gram.* I t. 45 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 25 ; Boissier, *Fl. Or.* V 488. — Bithynie, Lycie, Cappadoce. 2

6. **TRisetum** Persoon, *Syn. Pl.* I (1805) 97 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8146. — Genre d'environ 50 espèces des régions temp. et mont. du monde entier.

**T. argenteum** Roemer et Schultes, *Syst. Veget.* II (1817) 663 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 298. *AVENA* — Willdenow, *Enum. Hort. Berol.* (1809) 123 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* VII t. 26 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 100 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 692. — Alpes de l'Autriche, de la Suisse et de l'Italie bor. ♀

**T. Baregense** Laffitte et Miègeville in *Bull. Soc. Bot. Fr.* XXI (1874) 46. *AVENA* — Nyman, *Consp. Fl. Europ.* (1882) 813. **T. AGROSTIDEUM** J. Gay (non Fries) in *Bull. Soc. Bot. Fr.* VIII (1861) 449. — Pyrénées. ♀

**T. distichophyllum** P. Beauvois, *Essai Agrostogr.* (1812) 88 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 523. *AVENA* — Villars, *Prosp. Pl. Dauph.* (1779) 16 et *Hist. Pl. Dauph.* II (1787) 144 ; Sturm, *Deutschl. Fl.* VII t. 26 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 100 ; Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. III 692. — Alpes de l'Europe centr. ♀

**T. velutinum** Boissier, *Elench. Pl. Nov. Hispan.* (1840) 62 et *Voy. Bot. Esp.* II (1843) 633 t. 174 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 71. *AEVNA* — Nyman, *Syll. Fl. Europ.* (1834-35) 413 et *Consp. Fl. Europ.* 812. — Espagne (Grenade). ♀

7. **AVENA** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 42 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8148. — Genre d'environ 50 espèces habitant les régions temp. de l'ancien monde et de l'Amérique bor. et austr.

**A. compacta** Boissier et Heldreich in Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. I VII (1846) 122 et *Fl. Or.* V 347. **A. NEUMAYERIANA** Visiani, *Fl. Dalm.* III (1852) 339 et *Suppl.* I t. 4 fig. 2. — Monténégro, Serbie, Grèce. ♀

8. **ECHINARIA** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1799) 385 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8194. — Genre monotype.

**E. capitata** Desfontaines, *Fl. Atlant.* II (1799) 385 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 168 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 453 ; Boissier, *Fl. Or.* V 363. **CENCHRUS** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1049 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* I t. 100. — Europe, Asie et Afrique méditerr. ♀



9. **SESLERIA** Scopoli, *Fl. Carniol.* ed. I (1760) 63 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8198. — Dix espèces de l'Asie occ. et de l'Europe.

**S. sphærocephala** Arduino, *Animadv. Bot. Spec. Alt.* II (1764) 20 t. 2. **CYNOSURUS** — Hoffmann, *Deutschl. Fl.* (1791) 49 pr. p. ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* t. 199 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 68. **S. MICROCEPHALA** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 706. — Autriche, Suisse, Lombardie. 2

10. **DIPLACHNE** P. Beauvois, *Essai Agrostogr.* (1812) 80 t. 16 fig. 9 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8209. — Genre de 15 espèces environ des régions chaudes du monde entier.

**D. fascicularis** P. Beauvois, *Essai Agrostogr.* (1812) 80 t. 16 fig. 9 ; Ræmer et Schultes, *Syst. Veget.* II 614. **FESTUCA** — Lamarck, *Illustr. Genr. Bot.* I (1791) 189. **LEPTOCHLOA** ? **POLYSTACHYA** Kunth, *Distrib. Méth. Gram.* I (1835) 91 et *Enum. Pl.* I 271. **FESTUCA** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* I (1803) 66 ; Elliot, *Sketch Bot. Carol.* t. 66. — États-Unis mérid., Mexique. 2

11. **DACTYLIS** Linné, *Gen. Pl.* ed. II (1742) n. 67 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8241. — Genre monotype.

**D. glomerata** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 71 ; *Fl. Dan.* (1778) t. 743 ; *Engl. Bot.* (1776) t. 335 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 147 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 386 ; Boissier, *Fl. Or.* V 596. — Europe, Asie, Afrique et Amérique bor. 2

— var. **juncinella** Boissier *Voy. Bot. Espagne* II (1845) 665 ; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 88. **D. JUNCINELLA** Bory in Bory, Drapiez et Van Mons, *Ann. Gen. Sc. Phys. Brux.* III (1820) 8. — Europe mérid. 2

12. **POA** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 55 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8247. — Genre d'environ 200 espèces décrites, mais 100 seulement bien distinctes, représenté dans le monde entier, mais surtout dans les régions temp. et froides.

**P. alpina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 67 ; *Fl. Dan.* (1780) t. 807 ; *Engl. Bot.* (1802) t. 1003 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 156 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 542 ; Boissier, *Fl. Or.* V 605. — Région arct. du monde entier, Europe alp., Asie bor.-occ. 2

13. **FESTUCA** Linné, Gen. Pl. (1737) n. 41 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8254. — Genre d'environ 250 espèces décrites, mais 80 seulement bien distinctes, représenté dans le monde entier, mais rare dans les régions trop.

**F. pumila** Chaix in VILLARS, *Hist. Pl. Dauph.* I (1786) 316 et II 102 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* II t. 91 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 135 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 575. — Alpes, Pyrénées, Transylvanie, Hongrie, Dalmatie, Corse. ♀

**F. punctoria** Sibthorp et Smith, *Fl. Græcæ Prodr.* I (1806) 60 ; Boissier, *Fl. Or.* V 620. **F. ACEROSA** Koch in *Linnaea* XIX (1847) 6. — Bithynie. ♀

14. **BROMUS** Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) n. 40 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8257. — Genre d'environ 40 espèces, répandu dans le monde entier, mais peu représenté dans la région trop.

**B. inermis** Leysser, *Fl. Halensis* (1761) 16 ; Schreber, *Beschreib. d. Gräser.* I t. 13 ; Host, *Icon. Gram. Austriac.* I t. 9 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* I t. 141 ; Boissier, *Fl. Or.* V 642. **FESTUCA** — De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 49. — Europe bor., centr. et or., Asie extratrop. ♀

15. **AGROPYRUM** J. Gærtner ex P. Beauvois, Essai Agrostogr. (1812) 101 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8272. — Genre de 32 espèces des régions temp. du monde entier.

**A. Tauri** Boissier et Balansa in *Bull. Soc. Bot. Fr.* IV (1857) 307 ; Boissier, *Diagn. Pl. Or.* ser. 2, IV (1859) 142 et *Fl. Or.* V 666. **TRITICUM INTERMEDIUM** Marshall-Bieberstein var. **PERTENUE** C.-A. Meyer, *Verzeich. Pfl. Caucasus* (1831) 25. — Cilicie ; région du Talysch. ♀

16. **ARUNDINARIA** Michaux, Fl. Bor.-Amer. I (1803) 73 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8281. — Genre d'environ 25 espèces de l'Asie trop. et subtrop. et de l'Amérique bor. et trop.

**A. Japonica** Siebold et Zuccarini ex STEUDEL, *Syn. Pl. Glum.* I (1855) 334 ; **BAMBUSA METAKE** Siebold ex Miquel, *Ann. Mus. Lugd. Bat.* II (1866) 284. — Japon.

**A. Simoni** A. et C. Rivière in *Bull. Soc. Acclim.* sér. 3, V (1878) 774. **BAMBUSA** — Carrière in *Rev. Hort.* (1866) 380. — Chine.

17. **PHYLLOSTACHYS** Siebold et Zuccarini in Abhandl. Akad. Muench. III 2 (1843) 745 t. 5 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8283. — Genre de 4 ou 5 espèces de la Chine, de l'Himalaya et du Japon.

**P. aurea** A. et C. Rivière in *Bull. Soc. Acclim.* sér. 3, V (1878) 716. BAMBUSA — Hort. ex A. et C. Rivière, *loc. cit.* — Chine, Japon.

**P. nigra** Munro in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) 38. BAMBUSA — Loddiges, *Catal.* (1823) ex Loudon, *Hort. Brit.* (1830) 124. — Chine, Japon.

**P. Quiloi** A. et C. Rivière in *Bull. Soc. Acclim.* sér. 3, V (1878) 697. BAMBUSA — Hort. ex A. et C. Rivière, *loc. cit.* BAMBUSA DUQUILIOI Hort., ex Carrière in *Rev. Hort.* (1869) 292. — Hab. ?

**P. violascens** A. et C. Rivière in *Bull. Soc. Acclim.* sér. 3 V (1878) 770. BAMBUSA — Carrière in *Rev. Hort.* (1869) 292. — Hab. ?

18. **BAMBUSA** Schreber, Gen. Pl. (1789) 236 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8289. — Genre d'environ 50 espèces de l'Asie et de l'Amérique trop. et subtrop.

**B. argentea-striata** Regel in *Gartenflora* XIV (1865) 363. — Japon.

**B. arundinacea** Willdenow, *Sp. Pl.* II (1799) 245 ; Roxburgh, *Pl. Coromand.* I 56 t. 79 ; Kunth, *Enum. Pl.* I 431. B. NEESIANA Arnott ex Munro in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) 103. — Inde or. h

**B. aurea-striata** Regel in *Gartenflora* XIV (1865) 362. — Japon.

**B. Fortunei** Van Houtte in *Fl. des Serres* XV (1863) 69 t. 1535. B. VARIEGATA Siebold ex Miquel, *Ann. Mus. Lugd. Bat.* III (1867) 285. — Japon.

**B. nana** Roxburgh, *Hort. Bengal.* (1814) 25 et *Fl. Ind.* II 199. B. VIRIDIGLAUDESCENS Carrière in *Rev. Hort.* (1865) 292. — Japon.

**B. striata** Loddiges ex LINDLEY in *Penny Cyclop.* III (1835) 357 ; *Fl. des Serres* XXI (1875) 99 t. 2210. B. VIRIDI-STRIATA Regel, *Ind. Sem. Hort. Pétrop.* (1866) 77 ; *Illustr. Hort.* XIX (1872) 319 t. 108. — Chine.

**B. tessellata** Munro in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) 419. — Chine.

## CLV. GNÉTACÉES

1. EPHEDRA Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) n. 766 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8304. — Genre de 20 espèces environ bien distinctes, de l'Europe centr., la Région Méditerr. et l'Amérique trop., subtrop. et temp.

**E. Helvetica** C.-A. Meyer, *Monog. Ephedr.* (1849) 87 t. 8 fig. 10 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 161 in obs. ; Gremli, *Excursionsfl. f. d. Schweiz* ed. III 417. **E. DISTACHYA** Gaudin (non Linné), *Fl. Helvet.* VI (1830) 304 ; Stapf, *Monog. Gatt. Ephedra* (1889) 65 t. II t. XVI f. 1 à 3. — Valais, Italie, France. *h*

## CLVI. CONIFÈRES

1. ARAUCARIA Jussieu, Gen. Pl. (1789) 413 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8308. — Genre de 10 espèces habitant l'Amérique austr., la Nouvelle-Calédonie, les îles du Pacifique et l'Australie.

**A. imbricata** Pavon in *Mem. Acad. Med. Matrit.* I (1797) 199 ; Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 1, II 9 t. 4 et ed. 2, II 106 t. 56 et 57 ; Loudon, *Arboret. Brit.* IV 2432 fig. 2286-93 ; Antoine, *Die Conif.* 107 t. 48-50 ; Endlicher, *Syn. Conif.* 186 ; Carrière, *Tr. des Conif.* 416 ; *Fl. des Serres* XV (1862-65) 147 t. 1577-80 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 199 fig. 50 et 51. **A. CHILENSIS** Mirbel in *Mém. Mus. Paris* XIII (1825) 49. **A. DOMBEYI** Richard, *Comm. Conif. et Cycad.* (1826) 86 t. 20 et 21. — Chili austr. *h*

2. PINUS Linné, Gen. Pl. ed. I (1737) n. 832 pr. p. ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8309. — Genre d'environ 70 espèces habitant tout l'hémisphère bor.

**P. Ajanensis** Fischer in TRAUTVETTER et MEYER, *Florul. Ochot.* (1856) 87 t. 22-24 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 385 fig. 104. **ABIES** — Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc. Lond.* V (1850) 212. **PINUS MENZIESII** Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 418 (quoad pl. Asiat.). **ABIES SITCHENSIS** C. Koch (non Bongard), *Dendrol.* II (1872) 247 pr. p. — Sibérie, île Sachalin, Japon. *h*

**Pinus Ajanensis** var. **microsperma** MASTERS, in *Gard. Chron.* (1880) I 115 et *On the Conif. of Japon* 509; Beissner, *loc. cit.* 388. **ABIES MICROSPERMA** Lindley in *Gard. Chron.* (1861) 22. **PICEA** — Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 339. **A. JEZGENSIS** Maximowicz (non alior.) in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* XV (1857) 235. — Japon.

**P. excelsa** Wallich miss. in LAMBERT, *Descr. Genus Pinus* ed. 2, I (1828) 40 t. 26; Wallich, *Catal.* n. 6059 et *Pl. Asiat. Rarior.* III 1 201; Forbes, *Pinet. Woburn.* 75 t. 29; Loudon, *Arboret. Brit.* IV 2285 fig. 2197-2202; Carrière, *Traité Conif.* 300; Boissier, *Fl. Or.* V 698; Hooker, *Fl. Brit. Ind.* V 651; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 285 fig. 59. **P. NEPALENSIS** De Chambray, *Traité Arbr. Résin.* (1845) 342. — Himalaya austro-occ., Bhotan, Nepaul, Gurhwal, Sirmour, Afghanistan. ♀

— — var. **Peuce** BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 286 fig. 70. **PINUS PEUCE** Grisebach, *Spicil. Fl. Rumel.* II (1844) 349; Christ in *Flora* (1865) 257 t. 2; Boissier, *Fl. Or.* V 698. **P. EXCELSA** Parlature (non Wallich) in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 405. — Serbie, Monténégro, Macédoine.

**P. Laricio** Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 339; Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 2, I 9 t. 4; Loudon, *Arboret. Brit.* IV 2206 fig. 2081-84; Carrière, *Traité des Conif.* ed. I 384; Boissier, *Fl. Or.* V 696; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 238 fig. 59-60. **P. SYLVESTRIS** Linné var. **MARITIMA** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 366. **P. MARITIMA** R. Brown in Aiton (non Lamarck), *loc. cit.* ed. 2, V (1813) 315. — Espagne, France mérid., Corse, Calabre, Grèce. ♀

— — var. **Austriaca** ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 179; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 241. **P. AUSTRIACA** Höss, *Monogr. d. Schwarzföhre* (1830) 6; Carrière, *Traité des Conif.* 387. **P. NIGRICANS** Host, *Fl. Austr.* II (1831) 628. **P. LARICIO** Poirét var. — Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 387. — Autriche, Carinthie, Styrie, Moravie, Galicie.

— — var. **Calabrica** HORT. ex Carrière, *Tr. des Conif.* (1853) 385; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 241. **P. CALABRICA** HORT. ex Gordon, *Pinetum* (1858) 168. **P. LARICIO** Poirét var. **STRICTA** Carrière, *loc. cit.* (1853) 385. — Italie mérid., Sicile. ♀

— — var. **Monspeliensis** BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 242. **P. MONSPELIENSIS** Salzmann ex Dunal in *Mém. Acad. Montpellier* (Sect. Sci.) II (1851) 82. **P. SALZMANNI** Dunal, *loc. cit.* II (1851) 82 cum icone. **P. LARICIO** Poirét var. **TENUIFOLIA** Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 387. **P. LARICIO** Poirét var. **CEBENNENSIS** et **PYRENAICA** Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III (1855-56) 153. — Catalogne, Pyrénées, Cévennes.

— — var. **Pallasiana** ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 179; Beissner, *loc. cit.* 242. **PINUS PALLASIANA** Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. II (1828) 2 t. 5. **P. MARITIMA** Pallas (non Aiton), *Index Taur.* (1795). **P. CARAMANICA** Bosc ex Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 957. **LARICIO** — Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 385. **P. HALEPENSIS** Marschall-Bieberstein (non Miller), *Fl. Taur.-Cauc.* II (1808) 408. — Russie mérid.-or. ♀

**Pinus monophylla** Torrey et Fremont, *Rep. Explor. Exped. Rocky Mountains* (1845) 319 t. 4; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 378; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 124; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 254. P. FREMONTIANA Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 254; *Journ. Hort. Soc.* IV (1849) t. 294. — Californie, Sierra Nevada, Arizona, Utah.  $\frac{1}{2}$

**P. montana** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 5; Boissier, *Fl. Or.* V 695; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 233. — Pyrénées, Alpes, Apennins, Dalmatie, Macédoine.  $\frac{1}{2}$

Obs. Pour Beissner (*loc. cit.*) le P. MONTANA Miller se présente sous trois sous-espèces (Hauptformen) bien tranchées, P. MUGHUS, P. PUMILIO et P. UNCINATA.

— — subsp. **Pumilio** BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 236. P. PUMILIO Hænke, *Beob. Reis. im Riesengeb.* (1791) 68; Waldstein et Kitaibel, *Icon. et Descr. Pl. Hung.* II t. 149; Guimpel, *Deutsch. Holzart.* 210 t. 154. P. MUGHUS Walhenberg (non Scopoli), *Fl. Carpat.* (1814) 311; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 523. P. SYLVESTRIS Linné var. — Gaudin, *Fl. Helv.* VI (1830) 183. — Hautes montagnes de l'Europe centr. et centr.-or.

**P. ponderosa** Douglas in LOUDON, *Arboret. Brit.* (1838) 2243 fig. 2432 et 2437; Forbes, *Pinet. Woburn.* t. 15; Antoine, *Die Coniferen* t. 8; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 125; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 260. P. BENTHAMIANA Hartweg in *Journ. Hort. Soc. Lond.* II (1847) 189 et III 233. P. BEARDSLEYI Murray in *Edinb. New Phil. Journ.* (1855) 286. — Californie, Océan.  $\frac{1}{2}$

**P. rigida** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 10; C. Koch, *Dendrol.* II 1, 307; A. Gray, *Man. Bot. N. U. State* ed. VI 490; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 266 fig. 63 et 64. P. TAEDA Linné var. — Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1; III (1789) 368. P. LODDIGESI Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2269. — États-Unis (du Maine au Vermont).  $\frac{1}{2}$

— — var. **serotina** ENGELMANN, *Revis. of Genus Pinus* (1880) 183; Loudon, *Encycl. of Trees* 979 fig. 1824-27; Beissner, *loc. cit.* 269. P. SEROTINA Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 205 et *Hist. Arbr. Forest.* I t. 7; Antoine, *Die Coniferen* t. 8. P. TAEDA Linné var. ALOPECUROIDES Aiton, *Hort. Kew.* ed. 2, V (1813) 317. — Géorgie, Floride.  $\frac{1}{2}$

**P. Strobis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1001; Michaux, *Arbr. Forest. Amér.* I 103 t. 10; Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. I 31 t. 22 et ed. 2, I 51 t. 32; Loudon, *Arboret. Brit.* IV 2280 fig. 2193-96; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 288 fig. 71-72; A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* ed. VI 490. — Canada, États-Unis or.  $\frac{1}{2}$

**P. sylvestris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1001 (excl. var.); Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 1, I 1 t. 1 et ed. 2, I 1 t. 1; Richard, *Comment. de Conifer.* t. 11; Antoine, *Die Conifer.* 9 t. 4 fig. 3; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 521; Boissier, *Fl. Or.* V 694; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 225 fig. 57 et 58. — Europe bor., centr. et or., Asie bor. et occ.  $\frac{1}{2}$

3. **CEDRUS** Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2402 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8310. — Genre de 3 (ou peut-être 1) espèces habitant l'Himalaya, l'Orient et l'Afrique bor.

**C. Atlantica** Manetti, *Catal. Hort. Modicia Suppl.* (1844) 8 ; Carrière, *Traité des Conif.* ed. I 285 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 302 fig. 76 ; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 950. **PINUS** — Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 137. **ABIES** — Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc.* V (1850) 214. **P. CEDRUS** Linné var. — Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 408. **C. AFRICANA** Gordon ex Knight, *Syn. Conif. Pl.* (1850) 42. — Algérie. ‡

**C. Libani** Loudon, *Arboret. Brit.* IV 2402 fig. 2257-82 ; Boissier, *Fl. Or.* V 699 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 297 fig. 73 et 74. **PINUS CEDRUS** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1001 ; Antoine, *Die Coniferen* t. 22 et 23. **LARIX** — Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3. **ABIES** — Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* VI (1804) 510 ; L.-C. Richard, *Comment. de Conif.* t. 14 et 17. — Asie Mineure, Syrie, Afghanistan, Himalaya, ? Algérie. ‡

Obs. Le nom de **C. LIBANI** apparaît déjà en 1714 dans Barrelier, *Pl. Hisp. Gall. et Ital. Icon.* 499.

4. **LARIX** Tournefort ex Adanson, *Fam. des Pl.* (1763) 480 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8311. — Genre de 8 espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

**L. Americana** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 203 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. States* ed. VI 493 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 329. **PINUS MICROCARPA** Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. I (1803) t. 37. **LARIX** — Bedford in Forbes, *Pinet. Woburn.* (1839) 139 t. 47. **L. INTERMEDIA** Loddiges, *Catal.* (1836) 50 ; Link in *Linnaea* XV (1841) 535. **P. PENDULA** Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 409 pr. p. — Du Canada à la Virginie. ‡

**L. Europea** De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 277 ; Schrank, *Fl. Monac.* II t. 155 ; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 531 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 321 fig. 85-87. **PINUS LARIX** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1001 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 156. **L. DECIDUA** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 1. — Alpes, Carpathes, Sudètes. ‡

**L. leptolepis** Murray, *Pines and Firs of Japan* (1863) 89 ; Gordon, *Pinetum* 128 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 318 fig. 83. **ABIES** — Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* (1844) 12 t. 103. **PINUS** — Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 130. **L. JAPONICA** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. III (1867) 353. **PINUS LARIX** Thunberg (non Linné), *Fl. Japon.* (1784) 275. — Japon. ‡

5. **PSEUDOLARIX** Gordon, *Pinetum* (1858) 292 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 8312*. — Genre monotype.

**P. Kämpferi** Gordon, *Pinetum* (1858) 292 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 310 fig. 78 et 79. **PINUS** — Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. III (1832 ?) VII. **ABIES** — Lindley in *Penny Cyclop.* I 34. **LARIX** — Fortune ex Gordon, *loc. cit.* (1858) 292. — Chine.  $\mathfrak{h}$

6. **PICEA** Link in *Abhandl. Akad. Berl.* (1827) 179 ; T. Durand, *Ind. Gen. n. 8313*. — Genre de 12 espèces habitant la région extratrop. de tout l'hémisphère bor.

**P. acicularis** Maximowicz, (ubi ?) ex BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 389. **P. JAPONICA** Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 33. — Japon.  $\mathfrak{h}$

**P. Alcockiana** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 343 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 377 fig. 101. **ABIES ALCOQUIANA** J.-G. Veitch, *Man. of the Conif.* (1861) 68 ; Lindley in *Gard. Chron.* (1861) 23 et (1862) 308 ; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 245. **PINUS** — Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 417. **ABIES BICOLOR** Maximowicz, *Mélang. Biol.* VI (1886) 24 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 467. — Japon.  $\mathfrak{h}$

**P. Engelmanni** Engelmann, in *Trans. Acad. Sci. St-Louis* II (1863) 212 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 343 fig. 97. **ABIES** — Parry in *Trans. Acad. Sci. St-Louis* II (1863) 123 ; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 242. **A. NIGRA** Engelmann in Silliman, *Amer. Journ. Sci.* XXXIII (1838) 330. **PINUS COMMUTATA** Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 417. — États-Unis occ.  $\mathfrak{h}$

**P. excelsa** Link in *Linnaea* XV (1841) 517 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 351 fig. 98 et 99. **PINUS ABIES** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1002 ; *Fl. Dan.* (1763) t. 193 ; Antoine, *Die Coniferen* t. 35. **PINUS EXCELSA** Lamarck, *Fl. Franç.* ed. 1 II (1778) 202 ; Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III 156. **ABIES** — De Candolle, *Fl. Franç.* III (1805) 275. **ABIES PICEA** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 2. — Europe bor. ; montagnes de l'Europe centr., Pyrénées.  $\mathfrak{h}$

— var. **eremita** Carrière, *Traité des Conif.* (1855) 247 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 362. **ABIES EXCELSA** De Candolle var. **ARENATA**, **EREMITA** et **CRASSIFOLIA** Hort. — Forme horticole.

**P. Jezoënsis** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 345 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 389. **ABIES** — Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1842) 19 t. 110. **PINUS** — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) 97 t. 37 fig. 1. — Japon bor.  $\mathfrak{h}$



**Picea obovata** Ledebour, *Fl. Altaica* IV (1833) 201; *Icon. Pl. Fl. Ross.* V t. 499 et *Fl. Ross.* III 671; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 368. ABIES — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1828) 2329. PINUS — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) 69 t. 37 fig. 2. ABIES EXCELSA De Candolle, var. — C. Koch, *Dendrol.* II 2 (1872) 238. — Russie bor. et or., Scandinavie, Asie bor. (de l'Oural au Kamtchatka). ♪

— — var. **Japonica** BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 370. ABIES OBOVATA Loudon var. — Maximowicz, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 3; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 466. PICEA MAXIMOWICZII Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 33; Masters in *Gard. Chron.* (1880) I 363. ABIES MAXIMOWICZII Hort. — Japon.

**P. Orientalis** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I (1855) 244; Boissier, *Fl. Or.* V 700; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 374 fig. 100. PINUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1421; Lambert, *Descr. Genus Pinus* I t. 31; Antoine, *Die Coniferen* t. 35. ABIES — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* VI (1804) 518; Jaubert et Spach, *Illust. Pl. Orient.* I t. 14. — Asie Mineure. ♪

**P. polita** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I (1855) 256 et ed. II 342; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 380 fig. 102. ABIES — Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1842) 20 t. 111; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 466. PINUS — Antoine, *Die Coniferen* (1840-46) 95 t. 36 fig. 1. PINUS ABIES Thunberg (non Linné), *Fl. Japon.* (1784) 275. — Japon. ♪

**P. rubra** A. Dietrich, *Fl. Gegend. Berl.* (1824) 795; Link in *Linnaea* XV (1841) 521; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 338 fig. 95. ABIES — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* VI (1804) 520. PINUS — Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 2 III 43 t. 28 et ed. III 66 t. 38; Antoine, *Die Coniferen* t. 34. P. AMERICANA RUBRA Hort. — Amérique bor. et arct. or. ♪

**P. Sitchensis** Trautvetter et Meyer, *Florul. Ochotensis* (1856) 87; Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I 260; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 126; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 390 fig. 105. PINUS — Bongard in *Mém. Acad. St-Petersb.* sér. 6 II (1838) 104. ABIES — Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc. Lond.* V (1850) 212. ABIES MENZIESII Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2321. PICEA — Carrière, *loc. cit.* ed. II (1867) 318. — Amérique bor.-occ. (de Sitcha à la Californie). ♪

7. **TSUGA** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I (1855) 185; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8314. — Genre d'environ 10 espèces.

**T. Brunoniana** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 247; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 654; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 397. PINUS — Wallich, *Pl. Asiat. Rarior.* III (1832) 24 t. 247. ABIES — Lindley in *Penny Cyclop.* I n. 9. — Himalaya temp. (de Bhotan au Nepaul). ♪

**Tsuga Pattoniana** Engelman in *Gard. Chron.* (1879) II 756 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 121 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 407 fig. 112 et 113. PINUS — Parlatores in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 429. ABIES PATTONI et PATTONIANA Jeffrey in *Bot. Exped. to Oregon* (1853) 1 cum icone. A. HOOKERIANA Murray in *Edinb. New Philos. Journ.* (1855) 289. TSUGA — Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 252. — États-Unis occ. ‡

**T. Sieboldi** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 245 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 394 fig. 106. ABIES TSUGA Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1842) 14 t. 106. PINUS — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) 23 t. 32 fig. 2 ; Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 83. ABIES ARARAGI Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1036. — Japon. ‡

8. **PSEUDOTSUGA** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 256 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8314 sub *Tsuga*. — Genre monotype.

**P. Douglasii** Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 256 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 119 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 411 fig. 114 et 115. PINUS — Sabine mss. in Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 2, III (1837) t. 90. ABIES — Lindley in *Penny Cyclop.* I 32. PICEA — Link in *Linnaea* XV (1841) 524. TSUGA — Carrière, *loc. cit.* ed. I (1855) 192. — Amérique bor.-occ. (de l'île Vancouver à la Californie et au Nouveau-Mexique). ‡

9. **ABIES** Jussieu, *Gen. Pl.* (1789) n. 414 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8315. — Genre d'environ 20 espèces habitant l'Europe, l'Asie temp. et trop. mont. et l'Amérique bor.

**A. balsamea** Miller, *Gard. Dict.* ed. VIII (1768) n. 3 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* ed. VI 492 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 464. PINUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1002. PICEA — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2339 fig. 2240-41. ABIES BALSAMIFERA Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 207. — Amérique bor. (partie bor.). ‡

— — var. **Hudsonica** SARGENT et ENGELMANN in *Trans. Acad. Science St-Louis* (1878) ; Beissner, *loc. cit.* 465. A. HUDSONICA Bosc ex Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I (1855) 200. PICEA — Hort. PICEA FRASERI Loudon var. HUDSONI Knight, *Syn. Conif.* (1850) 39. — New-Hampshire.

— — var. **longifolia** ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 103 ; Beissner, *loc. cit.* 465. PINUS BALSAMEA L. var. — Booth ex Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1044. A. IVALENSIS Hort. ex Beissner, *loc. cit.* — Avec le type.

**A. Cephalonica** Link in *Linnaea* XV (1841) 529 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 438. PINUS — Endlicher, *Cat. Hort. Vindob.* I (1842) 218 et *Syn. Conif.* 98. PICEA — Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1039 fig. 1940-46. PINUS ABIES Linné var. — Parlatores in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 422. ABIES ALBA Miller var. — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2325 fig. 2235-36. — Céphalonie. ‡

- Abies Cephalonica** var. **Apollinis** BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 440. PINUS ABIES Linné var. — Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 96. ABIES — De Candolle var. — Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc. Lond.* V (1850) 210. ABIES APOLLINIS Link in *Linnaea* XV (1841) 528; Boissier, *Fl. Or.* V 702. PINUS — Antoine, *Die Coniferen* (1840) 75. PICEA — Rauch ex Gordon, *Pinetum* Suppl. (1862) 44. — Grèce, Thessalie, Macédoine. ‡
- — var. **Reginæ-Amaliæ** BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 441. ABIES PECTINATA De Candolle var. — Hort. ex *Cat. Sem. Hort. Vratisl.* (1863). A. REGINÆ-AMALIÆ Heldreich in *Gartenflora* (1860) 313 et (1861) 286 cum icône. A. APOLLINIS Link var. — Boissier, *Fl. Or.* V (1884) 702. — Grèce (Arcadie).
- A. concolor** Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc. Lond.* V (1850) 210; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 118; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 470 fig. 129 et 130. PICEA — Gordon, *Pinetum* (1858) 155. PINUS — Engelmann ex Parlatores in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 426. — Californie, Orégon, Arizona, Utah, Colorado. ‡
- A. firma** Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1842) 15 t. 107; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 467; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 450 fig. 123. PICEA — Gordon, *Pinetum* (1858) 147. PINUS — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) 70 t. 27. A. TCHONOSKIANA Hort. Petrop. ex Beissner, *loc. cit.* — Japon. ‡
- A. Fraseri** Lindley in *Penny Cyclop.* I (1832) n. 5; Sargent in *Gard. and Forest* (1889) 472 et 475 cum icône; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 462. PINUS — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1814) 639. PICEA — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2340 fig. 2243-44. A. BALSAMEA Miller var. — Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 422. — États-Unis (Monts Alleghanis). ‡
- A. Numidica** De Lancy in CARRIÈRE, *Rev. Hort.* (1866) 106 et 108; Traub in Bonnier, *Rev. Gen. de Bot.* (1888) 405; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 447; Durand et Schinz, *Consp. Fl. Afric.* V 950. A. BABORENSIS Cosson mss. ex Parlatores in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 423 in syn. A. PINSAPo Boissier var. — Cosson in *Bull. Soc. Bot. Fr.* VIII (1861) 607. — Algérie. ‡
- A. Pinsapo** Boissier in *Bibl. Univ. Genève* nouv. sér. XIII (1838) 401 et *Voy. Bot. Espagne* II (1845) 584 t. 167-69; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 17; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 444 fig. 121. PINUS — Boissier, *loc. cit.* II (1845) 584. PICEA — Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1041 fig. 1947-48. A. HISPANICA De Chambray, *Traité Arbr. Résin.* (1845) 339. — Espagne. ‡
- A. subalpina** Engelmann ex L. WARD in *Amer. Natural.* X (1876) 555 et in *Trans. Acad. St-Louis* (1878) 597; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 466. ABIES BIFOLIA Murray in *Proc. Hort. Soc. Lond.* III (1863) 320 fig. 51-56. PICEA — Murray in *Gard. Chron.* (1875) I 106. ? PINUS LASIOCARPA Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 163 pr. p. PINUS AMABILIS Parlatores in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 426 pr. p.. — Amérique bor. (partie or.) de l'Alaska et l'Orégon.

**Abies venusta** C. Koch, *Dendrol.* II 2 (1873) 210. PINUS — Douglas in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* II (1836) 152. A. BRACEATA Hooker et Arnott in *Bot. Beechey Voy.* (1841) 394; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 118; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 488 fig. 138. PINUS — Don in *Trans. Linn. Soc.* XVII (1837) 442. PICEA — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2348 fig. 2256. — Californie. ‡

**A. Webbiana** Lindley in *Penny Cyclop.* I (1832) 30; Brandis, *Forest Fl.* 528; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 479. PICEA — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2344 fig. 2251-53. ABIES SPECTABILIS Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 422. PINUS — Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 2, I (1828) 54 t. 34. — Afghanistan, Rég. Himal. ‡

10. **CUNNINGHAMIA** Rob. Brown in Richard, *Comment. de Conif.* (1826) 149 t. 18; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8317. — Genre monotype.

**C. Sinensis** R. Brown in Richard, *Comment. de Conif.* (1826) 80 t. 18 fig. 3; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 197 fig. 49. PINUS ABIES Loureiro (non Linné), *Fl. Cochinch.* II (1790) 270. P. LANCEOLATA Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 1, I (1803) 52 t. 34. CUNNINGHAMIA — Lambert, *loc. cit.* ed. 2, I (1828) 89 t. 37. BELIS — Sweet, *Hort. Brit.* (1827) 475. B. JACULIFOLIA Salisbury in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) 315. — Chine austr. ‡

11. **SEQUOIA** Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 197; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8318. — Deux espèces de la Californie.

**S. gigantea** Lindley et Gordon in *Journ. Hort. Soc.* V (1850) 222; Decaisne in *Bull. Soc. Bot. Fr.* I (1854) 70 et 71; Torrey ex A. Gray in *Amer. Journ. Sci.* ser. 2, XVIII (1854) 287; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 160 fig. 40 et 41. WELLINGTONIA — Lindley in *Gard. Chron.* (1853) 819 et 823; *Bot. Mag.* (1854) t. 4777-78; *Fl. des Serres* IX (1853-54) 93 t. 892-93 et 903. SEQUOIA WELLINGTONIA Seemann in *Bonplandia* III (1853) 27. WASHINGTONIA CALIFORNICA Winslow in *Calif. Farm.* (1854) ex Hooker, *Kew Journal of Bot.* VII (1855) 29. — Californie. ‡

12. **CRYPTOMERIA** D. Don in *Trans. Linn. Soc.* XVIII (1841) 166; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8320. — Genre monotype.

**C. Japonica** Don in *Trans. Linn. Soc.* XVIII (1841) 167 t. 13 fig. 1; Hooker, *Icon. Pl.* VII t. 668; Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II 43 t. 124 et 124b; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 469; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 142 fig. 34 et 35. CUPRESSUS — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 421. TAXODIUM — Brongniart in *Annal. Sc. Nat.* sér. 1, XXX (1833) 183 (excl. var. HETEROPHYLLA). — Japon. ‡

13. **TAXODIUM** A. Richard in "Ann. Mus. Paris XVI (1810) 298 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8321. — Genre de 4 espèces de l'Amérique bor. et centr. et de la Chine.

**T. heterophyllum** Brongniart in *Ann. Sc. Nat.* sér. 1, XXX (1833) 184 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 154. **GLYPTOSTROBUS** — Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 70. **T. SINENSE** Forbes, *Pinet. Woburn.* (1839) 179. **SCHUBERTIA JAPONICA** Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 352. **TAXUS** et **CUPRESSUS NUCIFERA** Hort. ex Beissner. *loc. cit.* — Chine.  $\frac{1}{2}$

14. **FITZROYA** Hooker f. ex Lindley in *Journ. Hort. Soc.* VI (1851) 264 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8325. — Genre de 2 espèces de l'Amérique austr. (Chili, Patagonie) et de la Tasmanie.

**F. Patagonica** Hooker f. ex LINDLEY in *Journ. Hort. Soc.* VI (1851) 264 ; J. Gay, *Fl. Chilens.* V 411 ; *Bot. Mag.* (1851) t. 4616 ; *Fl. des Serres* VII (1851-52) 120 misc. 484 cum xylogr. ; Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I 109 ; Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 463. — Chili, Patagonie.  $\frac{1}{4}$

15. **THUYOPSIS** Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1844) 32 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8326. — Genre monotype.

**T. dolabrata** Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1844) 34 t. 119 et 120 ; Franchet et Lemaire, *Illustr. Hort.* IV (1857) t. 124 ; Eichler in Engler et Prantl, *Naturl. Pflanzenf.* I 2, 96 fig. 53 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 51 fig. 8 et 9. **THUYA** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 420 ; Lambert, *Descr. Genus Pinus* append. t. 1. **PLATYCLADUS** — Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 337. — Japon.  $\frac{1}{2}$

— — var. **nana** SIEBOLD et ZUCCARINI, *Fl. Japon.* II (1844) 34 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 54. **THUYOPSIS LETEVIRENS** Lindley fide Beissner, *loc. cit.* — Japon.

16. **LIBOCEDRUS** Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 42 ; T. Durand, Ind. Gen. n. 8327. — Genre de 8 espèces du Chili, de la Californie, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, de la Chine et du Japon.

**L. Chilensis** Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 44 ; Gay, *Fl. Chilens.* V 406 ; Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I 89 ; Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* 283 ; Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 455. **THUYA** — Don ex Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. 2, II (1828) 114. — Chili.  $\frac{1}{2}$

**Libocedrus Doniana** Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 43 ; Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I 85 et in *Rev. Hort.* (1866) 230 cum icones ; Gordon, *Pinetum* 132 ; Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* 283 ; Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 454 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 256. THUYA — Hooker in *Lond. Journ. Bot.* I (1842) 571 t. 18 et *Fl. Nov. Zel.* I 231. — Nouvelle-Zélande.  $\frac{1}{2}$

17. BIOTA D. Don in Lambert, *Descr. Gen. Pinus.* ed. II 2 (1828) 129 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8328 sub Thuya. — Genre monotype.

**B. Orientalis** Endlicher, *Syn. Conifer.* (1847) 46 ; Carrière, *Tr. des Conif.* 92 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* I 470 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 54. THUYA — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1735) n. 1002 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* t. 309 fig. 1 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* t. 118. — Japon, Chine.  $\frac{2}{3}$

— — var. **aurea** HORT. ex BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 60. T. AUREA Hort. ex Beissner, *loc. cit.*

— — var. **decussata** BEISSNER et HOCHSTETTER in BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 58. CHAMÆCYPARIS DECUSSATA Hort. ex Beissner, *loc. cit.* RETINISPORA JUNIPEROIDES Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 140.

— — var. **filiformis** HENKEL et HOCHSTETTER, *Syn. d. Nadelh.* (1865) 272 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 63. THUYA FILIFORMIS Loddiges in *Bot. Reg.* (1842) t. 20. CUPRESSUS — Hort. ex Beissner, *loc. cit.* B. ORIENTALIS Endlicher, var. PENDULA Parlature in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 462 ; Franchet et Savatier, *loc. cit.* I 470. C. PENDULA Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 265.

18. THUYA Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 935 pr. p. ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8328 pr. p. — Genre de 3 espèces de l'Amérique bor. et de l'Asie centr. et or.

**T. gigantea** Nuttall in *Journ. Acad. Philad.* VII (1834) 52 et *North-Amer. Sylva* III 102 t. 111 ; Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI 342 (excl. syn. DOUGLASI) ; Endlicher, *Syn. Conifer.* 52 ; *Revue Hort.* (1854) 224 fig. 12-14 ; Carrière, *Traité des Conif.* 105 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 46 fig. 6 et 7. T. LOBBII Hort. ex Beissner, *loc. cit.* (1891) 46. — Amérique bor.-or. (du fleuve Colombie à la Californie).  $\frac{1}{2}$

**T. Occidentalis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1002 ; Michaux, *Arbr. Forest. Amér.* III 29 t. 3 ; Schkuhr, *Bot. Handb.* III 287 t. 309 ; Loiseleur, *Nouv. Duham.* III 12 t. 4 ; Carrière, *Traité des Conif.* 403 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 32 fig. 3 et 4. — Du Canada à la Floride et à la Virginie.

**Thuya Occidentalis** var. **Ellwangeriana** HORT. ex BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 38 fig. 5 n. 2. T. ELLWANGERIANA HORT. ex Carrière in *Rev. Hort.* (1869) 350.

— — var. **ericoides** HORT. ex BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 35 fig. 5 n. 1. T. ERICOIDES HORT. ex Gordon, *Pinetum Suppl.* (1862) 91. RETINISPORA DUBIA Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 141.

— — var. **Wareana** HORT. ex BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 40. T. WAREANA, SIBIRICA et CAUCASICA HORT. ex BEISSNER. T. WAREANA HORT. ex Carrière, *loc. cit.* ed. I (1855) 104.

19. **CUPRESSUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) 294 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8329. — Genre de 12 espèces de l'Asie temp., de l'Europe mérid.-or., de l'Amérique bor. et du Mexique.

**C. macrocarpa** Hartweg in *Journ. Hort. Soc.* II (1847) 187 et IV 296 cum icone ; Torrey, *Bot. Mexic. Bound. Surv.* 211 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 114 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 103. C. LAMBERTIANA HORT. ex Carrière, *Tr. des Conif.* (1855) 166. C. HARTWEGI Carrière in *Rev. Hort.* (1855) 233. — Californie.  $\mathfrak{h}$

20. **CHAMÆCYPARIS** Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 329 ; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8330. — Genre de 4 espèces de l'Amérique bor. et du Japon.

**C. Lawsoniana** Parlatore in *Ann. Mus. Stor. Nat. Firenze* I (1864) 181 et in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 461 t. 9 fig. 22-25 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 114 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 70 fig. 16 et 17. CUPRESSUS — Murray in *Edinb. New Phil. Journ.* new ser. I (1855) 292 t. 9 ; *Bot. Mag.* (1866) t. 5581. CHAMÆCYPARIS BOURSIERI Carrière (non Decaisne), *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 125. — Orégon, Californie.  $\mathfrak{h}$

**C. Nutkatensis** Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 333 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 115 in obs. ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 79 fig. 18 et 19. CUPRESSUS — Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 165. C. NOOTKATENSIS Lambert, *Descr. Genus Pinus* ed. II (1828) 113. THUYA EXCELSA Bongard, *Végét. Ile Sutch* (1833) 46. — De la Colombie à l'Alaska.  $\mathfrak{h}$

**C. pisifera** Siebold et Zuccarini in ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 64 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* II 470 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 83 fig. 20. RETINISPORA — Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1844) 39 t. 122. CUPRESSUS — C. Koch, *Dendrol.* II 2 (1873) 170. THUYA — Masters in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 489. — Japon.  $\mathfrak{h}$

**Chamæcyparis pisifera** var. **plumosa** HORT. ex BEISSNER, *Handb. Nadelholzsk.* (1891) 87 fig. 22. CHAMÆCYPARIS — Hort. ex Beissner, *loc. cit.* RETINISPORA — Hort. ex Cartière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 791; Veitch ex C. Koch, *Dendrol.* II 2, 170.

— — var. **squarrosa** BEISSNER et HOCHSTETTER ex BEISSNER, *Handb. Nadelholzsk.* (1891) 85. CHAMÆCYPARIS SQUARROSA Siebold et Zuccarini ex Endlicher, *Syn. Conif.* (1847) 65; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* II 471. RETINISPORA — Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* II (1844) 40 t. 123. CUPRESSUS — Lawson et C. Koch in C. Koch, *Dendrol.* II 2 (1872) 171.

**C. sphæroidea** Spach, *Hist. Végét. Phan.* XI (1842) 331; A. Gray, *Man. Bot. N. U. States* ed. VI 493; Beissner, *Handb. Nadelholzsk.* 65 fig. 12 et 13. CUPRESSUS THYOIDES Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1003. THUYA SPHÆROIDALIS L. C. Richard, *Comment. de Conif.* (1826) 45 t. 8. — Amérique bor.-or. (du Canada à la Caroline).

— — var. **Andelyensis** CARRIÈRE, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 123; Beissner, *Handb. Nadelholzsk.* 68. RETINISPORA ANDELYENSIS Hort. (non Zuccarini) ex Beissner. CHAMÆCYPARIS LEPTOCLADA Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* (1865) 257 (excl. syn.).

21. **JUNIPERUS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 764; T. Durand, *Ind. Gen.* n. 8331. — Genre d'environ 30 espèces habitant les régions extratrop. et montagneuses de tout l'hémisphère boréal.

**J. Bermudiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1039; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind. Isl.* 504; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 120; Beissner, *Handb. Nadelholzsk.* 115. SABINA — Antoine, *Cupress. Gatt.* (1860) t. 87 et 88. J. OPPOSITIFOLIA Mœnch, *Method. Pl. Marburg.* (1784) 699. — Iles Bermudes et Bahamas; Floride. h

**J. Chinensis** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 127; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 136; Beissner, *Handb. Nadelholzsk.* 118 fig. 29. SABINA — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) t. 75, 76 et 78. J. BARBADENSIS et VIRGINICA Thunberg (non Linné), *Fl. Japon.* (1784) 26½ (excl. syn.). J. DIMORPHIA Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 839. J. DIOICA Hort. ex Beissner, *loc. cit.* — Chine, Japon.

— — var. **femina** BEISSNER, *loc. cit.* (1891) 120. J. CERNUA Roxburgh, *Fl. Ind.* III (1832) 839. J. FLAGELLIFORMIS et REEVESIANA Hort. ex Beissner, *loc. cit.*

— — var. **procumbens** ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 21; Beissner, *loc. cit.* 121. J. PROCUMBENS Siebold in *Ann. Soc. Hort. Pays-Bas* (1844) 31. J. JAPONICA Cartière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 31. — Avec le type.



- Juniperus communis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1040; *Fl. Dan.* (1794) t. 1119; *Engl. Bot.* (1808) t. 1100; Antoine, *Cupress. Gatt.* 26 t. 38-42; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 479; Boissier, *Fl. Or.* V 707; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 133 fig. 31 et 32. — Europe, Asie, Afrique et Amérique bor. 4
- — var. **Hibernica** GORDON, *Pinetum* (1858) 94; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 136. J. HIBERNICA Loddiges ex Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2490. J. COMMUNIS Linné var. STRICTA Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I (1855) 18. J. PYRAMIDALIS et STRIATA Hort.
- — var. **oblongo-pendula** CARRIÈRE, *Man. des Pl.* IV 310 fide Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 137. J. OBLONGO-PENDULA Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1082. J. COMMUNIS Linné var. REFLEXA Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2 (1868) 479.
- J. flaccida** Schlechtendal in *Linnaea* XII (1838) 495; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 492; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 140. SABINA — Antoine, *Die Coniferen* (1840-47) t. 49 et 50. J. FÆTIDA Spach var. — Spach in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2 XVI (1842) 300. — Mexique. 5
- J. nana** Willdenow, *Sp. Pl.* IV (1805) 854; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 132. J. COMMUNIS Linné var. — Loudon, *Arboret. Brit.* IV (1838) 2486. J. COMMUNIS Linné var. 7 Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1470. J. SIBIRICA Burgsdorf, *Anleit. Erz. u. Aupfl. Holz.* II (1790-91) 272; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 116. J. COMMUNIS Linné var. MONTANA Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 414. J. COMMUNIS Linné var. ALPINA Gaudin, *Fl. Helv.* VI (1830) 301; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 480. — Europe alp. et subalp., Afrique bor., Rég. arct. (Europe, Asie, Amérique).
- J. Occidentalis** Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1839) 166; Engelmann in *Trans. Acad. St-Louis* III (1877) 590; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 113; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 128. J. DEALBATA Hort. ex Knight, *Syn. Conif.* (1850) 12. — Orégon, Idaho, Californie. 4
- J. recurva** Buchanan-Hamilton ex D. DON, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 55; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 481; Griffith, *Icon. Pl. Asiat.* t. 373-74; Brandis, *Forest Fl.* 536; Boissier, *Fl. Or.* V 708; Hooker f., *Fl. Brit. Ind.* V 647. — Afghanistan, Himalaya temp. et alpin. 5
- J. Sabina** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1039; Pallas, *Fl. Ross.* t. 56; Reichenbach, *Icon. Fl. Germ.* XI t. 536; Boissier, *Fl. Or.* V 708; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 123; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 107. SABINA VULGARIS Antoine, *Cupress. Gatt.* (1860) t. 80 et 82. — Europe mont., Asie et Amér. bor. 5
- J. thurifera** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1039; Carrière, *Tr. des Conif.* ed. I 97 pr. p.; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 487; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 22; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 117. J. SABINOIDES Endlicher (non Grisebach), *Syn. Conif.* (1847) 24. — Portugal, Espagne, Maroc, Algérie. 5

- Juniperus Virginiana** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1039 ; Michaux, *Hist. Arbr. Amér.* III t. 5 ; Bigelow, *Amer. Medic. Bot.* t. 45 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. States* ed. VI 494 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 122 fig. 30. SABINA — Antoine, *Cupress. Gatt.* (1860) t. 83 et 84. J. ARBORESCENS Mœnch, *Method. Pl. Marburg.* (1794) 699. — Amérique bor.-or. (de la baie d'Hudson au Nouveau-Mexique). ‡
- — var. **Bedfordiana** KNIGHT, *Syn. Conif.* (1850) 12 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 124. J. BEDFORDIANA Hort. ex Loudon, *Encycl. of Trees* (1842) 1090. J. GOSSAINTHANE Loddiges ex Loudon, *loc. cit.* (1842) 1048. J. VIRGINIANA Linné var. — Carrière, *Tr. des Conif.* ed. II (1867) 45. — États-Unis mérid.-or. ‡
- — var. **Schotti** BEISSNER, *Handb. Nadelholzk.* (1891) 126. J. SCHOTTI et SCHOLLI Hort. ex Beissner, *loc. cit.* — Var. horticole.
22. **SAXEGOTHÆA** Lindley in *Journ. Hort. Soc.* VI (1851) 258 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8332 — Genre monotype.
- S. conspicua** Lindley in *Journ. Hort. Soc.* VI (1851) 258 et in Paxton, *Flow. Gard.* (1851-52) 111 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 195. — Chili. ‡
23. **PODOCARPUS** L'Héritier ex Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 580 : T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8334. — Genre de 50 espèces environ de l'Asie or. et trop. mont., de l'Afrique trop. et austr., des Antilles, de l'Amérique austr. et de l'Australie.
- P. Andina** Poeppig ex ENDLICHER, *Syn. Conif.* (1847) 219 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 195. P. SPICATA Poeppig et Endlicher (non Rob. Brown), *Nov. Gen. et Sp. Pl.* III (1818) 18. PRUMNOPITYS ELEGANS Philippi in *Linnaea* XXX (1859-60) 732. — Chili. ‡
24. **GINKGO** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 313 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8337. — Genre monotype.
- G. biloba** Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 313 ; Thunberg, *Fl. Japon.* 358 ; Siebold et Zuccarini, *Fl. Japon.* 72 t. 136 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* II 474 ; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 107 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 189. SALISBURIA ADIANTIFOLIA Smith in *Trans. Linn. Soc.* III (1804) 330. — Chine, Japon. ‡
25. **TORREYA** Arnott in Taylor, *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, I (1838) 130 ; T. Durand, *Ind. Gen. n.* 8339. — Genre de 4 espèces de l'Amérique bor., de la Chine et du Japon.
- T. Californica** Torrey in *N.-York Journ. Pharm.* III (1852) 49 ; Newberry, *Pacific Railr. Rep.* VI 61 cum icone 27 ; Parlatore in De Candolle, *Prodr. Regn. Veget.* XVI 2, 506 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 110 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 188. T. MYRISTICA Hooker in *Bot. Mag.* (1854) t. 4780. CARYOTAXUS — Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* (1865) 368. — Californie.

**Torreyia grandis** Fortune ex GORDON, *Pinetum* (1858) 326 ; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 99 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 185. CARYOTAXUS — Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* (1865) 367. — Chine bor.  $\frac{1}{2}$

**T. nucifera** Siebold et Zuccarini in *Abhandl. Akad. Muench.* III 4 (1846) 234 et *Fl. Japon.* II 64 t. 129 ; Miquel, *Prol. Fl. Japon.* 333 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Japon.* II 475 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 186. TAXUS — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1040. PODOCARPUS — Persoon, *Syn. Pl.* II (1807) 633. — Japon.  $\frac{1}{2}$

**T. taxifolia** Arnott in TAYLOR, *Ann. Nat. Hist.* ser. 1, I (1838) 130 ; C. Koch, *Dendrol.* II 2, 100 ; Beissner, *Handb. Nadelholzk.* 186 fig. 46. CARYOTAXUS — Henkel et Hochstetter, *Syn. d. Nadelh.* (1865) 367 (syn. excl.). T. MONTANA Hort. ex Gordon et Lindley in *Journ. Hort. Soc.* V (1850) 229. — Floride.  $\frac{1}{2}$

## CLVII. FOUGÈRES

### GLEICHENIACEÆ

1. GLEICHENIA J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 419 t. 9 fig. 10. — Genre de 40 espèces environ des contrées chaudes, mais répandu surtout en Asie, en Amérique et en Océanie.

**G. circinata** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 165 et 394 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 11 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 697 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 2. G. MICROPHYLLA Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 161 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 3. G. SEMIVESTITA Labillardière, *Sert. Austro-Caled.* I (1824) t. 11 ; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 177. — Malacca, Tasmanie, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie.

**G. dicarpa** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 161 ; Kunze, *Farnkr.* t. 70 fig. 2 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 40 et *Sp. Fil.* I 3 t. 1c ; Lowe, *Ferns* VIII t. 48 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 12 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 698. MERTENSIA — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* XI (1813) 670. — Archipel Malais, Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie.

— — var. **longipinnata** WILLIAMS in *The Garden* (1886) 517. — Australie.

**G. dichotoma** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 12 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 15 ; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 74 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 698. POLYPODIUM — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) t. 37. MERTENSIA — Willdenow in *Act. Acad. Holm.* (1804) 167 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 148. — Région trop. et sub-trop. du monde entier.

**Gleichenia flabellata** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 161 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 71 et *Sp. Fil.* I 6 ; Lowe, *Ferns* VIII t. 50 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 12 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 698. MERTENSIA — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* XI (1813) 670. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie.

**G. pubescens** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 8 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 14. MERTENSIA — Humboldt et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 73 ; Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 537 (excl. syn. omn.) ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 224. M. IMMERSA Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 28. GLEICHENIA — Hooker in Hooker et Greville, *Icon. Fil.* (1827) t. 15. — Toute l'Amérique trop.

— var. **longipinnata** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1874) 15. G. LONGIPINNATA Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 9. — Guyane holl.

**G. rupestris** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 160 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 2 t. 1<sup>b</sup> ; Lowe, *Ferns* VIII t. 53 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 12. — Australie.

Obs. Bentham, *Fl. Austral.* VII 697, réunit ce GLEICHENIA au G. CIRCINATA Swartz.

#### POLYPODIACEE

2. **ALSOPHILA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 158.

— Genre de 90 espèces environ surtout des régions trop. (une espèce au Japon et deux dans l'Amérique mérid. extra-trop.).

**A. Australis** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 158 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 50 t. 19<sup>a</sup> ; Lowe, *Ferns* VIII t. 63 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 40 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 710. A. EXCELSA Rob. Brown in Endlicher, *Prodr. Fl. Ins. Norfolk.* (1833) 16 ; Hooker, *loc. cit.* I 49 t. 18<sup>a</sup>. — Australie, Tasmanie. ‡

3. **ONOCLEA** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1062. — Genre de 3 espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique bor.

**O. Germanica** Swartz, *Syn. Fil.* (1804) 111 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 161 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 46. STRUTHIOPTERIS — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 288 ; Ledebour, *Fl. Ross.* IV 527 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 69. OSMUNDA STRUTHIOPTERIS Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1066 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 103. — Europe, Asie bor., Amérique bor. (du Canada à la Pensylvanie).

**O. sensibilis** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1062 ; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* IV t. 864 ; Lowe, *Ferns* VI t. 1 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 102 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 82 et *Sp. Fil.* IV t. 160 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 46. — De la Floride au Canada, rég. de l'Amour, Mandchourie, Japon.

4. **WOODSIA** Rob. Brown in *Trans. Linn. Soc.* XI (1813) 173 t. 11. — Genre 15 espèces environ répandues (l'Australie exceptée) surtout dans les hautes montagnes et la région arctique.

**W. hyperborea** Rob. Brown in *Trans. Linn. Soc.* XI (1813) 173 fig. 11 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 119 ; *Sp. Fil.* I 63 et *Brit. Ferns* t. 7 ; Lowe, *Ferns* VII t. 27 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 46 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 20. **POLYPODIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 39. — Rég. arct. et hautes montagnes de la zone temp. (Europe, Asie et Amérique).

**W. ilvensis** Rob. Brown in *Trans. Linn. Soc.* XI (1813) 173 ; *Engl. Bot.* (1830) t. 2626 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 63 et *Brit. Ferns* t. 8 ; Lowe, *Ferns* VII t. 8 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 46. **ACROSTICHUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1071. — Rég. arct. et hautes montagnes de la zone temp. (Europe, Asie, Amérique).

**W. mollis** J. Smith in HOOKER, *Gen. Fil.* (1838-42) 79 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 593 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 60 ; Lowe, *Ferns* VII t. 26 ; Baker et Hooker, *Syn. Fil.* 47. **PHYSATIUM** — Kaulfuss in *Flora* (1829) 341 et *Analecta Pterid.* 41 t. 27. **W. GUATEMALENSIS** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 60 t. 21<sup>a</sup>. **CHEILANTHES CANESCENS** Kunze in *Linnæa* XIII (1839) 143 et *Farnkr.* I 71 t. 35. — Du Mexique au Pérou et au Brésil.

**W. obtusa** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 62 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 48. **ASPIDIUM** — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 274 ; Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II 662. **POLYPODIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 39 et in Schkuhr, *Farnkr.* t. 21. **PHYSEMATIUM** — Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II (1840) 259. **W. PERRINIANA** Hooker in Hooker et Greville, *Icon. Fil.* I (1829) t. 68. — États-Unis.

**W. Oregana** Eaton in *Canad. Natur.* II (1865) 90 et *Ferns of N.-Amer.* II 185 t. 71 ; Williamson, *Fern Etchings* (1879) t. 51 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. States* ed. V 669 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 348. — De la Californie et de l'Oregon au lac Supérieur, au Colorado et à l'Arizona.

**W. scopulina** Eaton in *Canad. Natur.* II (1865) 91 et *Ferns of N.-Amer.* II 193 t. 71 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 348. — Californie, Oregon, Colorado.

5. **DICKSONIA** L'Héritier, Sert. Angl. (1788) 30. — Genre de 40 espèces croissant surtout dans l'Amérique trop. et la Polynésie ; le genre a encore quelques représentants dans l'Australie extratrop. et la Nouvelle-Zélande ; une espèce au Canada.

**D. Antarctica** Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* II (1806) 100 t. 249 ; *Fl. des Serres* XIX (1873) 101 t. 1989 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 66 ; Lowe, *Ferns* VIII t. 43 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 50 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 351 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 712. **BALANTIUM** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 134 ; *Gartenflora* V (1856) t. 168. — Australie or., Tasmanie, Nouvelle-Zélande. *h*

**D. lanata** Colenso in *Tasman. Journ. of Nat. Sci.* II (1842) 181 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 69 t. 23<sup>c</sup> ; *Fl. Nov. Zel.* II 10 et *Handb. N. Zeal. Fl.* 351 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 461. — Nouvelle-Zélande. *h*

**D. punctiloba** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 79 ; Lowe, *Ferns* VIII t. 42 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 54. **NEPHRODIUM** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 268. **ASPIDIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 60. **D. PUBESCENS** Schkuhr, *Farnkr.* (1809) t. 13. — Du Canada à la Caroline et au Tennessee. *h*

6. **HYMENOPHYLLUM** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 418 t. 9 f. 8. — Genre de 80 espèces environ des régions temp. et trop. du monde entier.

**H. caudiculatum** Martius, *Icon. Pl. Crypt. Brasil.* (1828-34) 102 t. 67 ; Kunze in Schkuhr, *Farnkr. Suppl.* t. 87 ; Lowe, *Nat. Hist. of Ferns* t. 68 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 102 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 286 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 61. **SPLEROCIONIUM** — Presl, *Hymenophyll.* (1841) 35. — Brésil, Pérou, Chili.

7. **TRICHOMANES** Linné, *Gen. Pl. ed.* II (1742) n. 947. — Genre de 90 espèces environ des régions temp. et trop. du monde entier.

**T. Petersii** Asa Gray in SILLIMAN, *Amer. Journ. of Sci.* (1853) 326 ; Hooker, *Icon. Pl.* X t. 986 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 74. — États-Unis, (Alabama).

**T. radicans** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1736 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 42 et *Sp. Fil.* I 124 ; Johnson et Sowerby, *Ferns of Great Brit.* t. 41 ; Lowe, *Ferns* VIII t. 11 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 81. — Régions chaudes des deux hémisphères (Europe, Asie, Afrique, Amérique).

**Trichomanes radicans** var. **Luschnathianum** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* ed. I (1863) 81. T. LUSCHNATHIANUM Presl, *Hymenophyll.* (1841) 45; Hooker, *Sp. Fil.* I 146 in obs.; Sturm in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 263. HYMENOPHYLLUM AXILLARE Raddi (non Swartz), *Fil. Brasil.* (1825) 67 t. 80. — Brésil, Vénézuéla.

**T. reniforme** Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 482; Hooker, *Exot. Ferns* t. 2 et *Sp. Fil.* I 115; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* I t. 31; Lowe, *Ferns* VIII t. 9; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 73; Hooker f., *Handb. N. Zeal. Fl.* 356. — Nouvelle-Zélande.

**T. sinuosum** A. Richard in WILLDENOW, *Sp. Pl.* V (1810) 502; Lamarck, *Pl. Bot. Encycl.* IV t. 871 fig. 1; Kunze in Schkuhr, *Farnkr. Suppl.* I 1 83 t. 77 fig. 1; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* I t. 13; Hooker, *Sp. Fil.* I 120; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 78; Sturm in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 258; Lowe, *Ferns* VIII t. 10. — Amérique trop. (de Cuba et du Mexique au Pérou et au Brésil).

8. **DAVALLIA** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 414 t. 9 f. 6. — Genre d'environ 125 espèces habitant les régions chaudes du monde entier, mais surtout bien représenté dans la Péninsule et les îles Malaises.

**D. alpina** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 231; Hooker, *Sp. Fil.* I 154; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 89. — Java, Bornéo, Polynésie.

**D. bullata** Wallich, *Catal.* (1829) n. 258; Hooker, *Sp. Fil.* I 169 t. 50<sup>b</sup>; Belg. *Hort.* (1856) 168 t. 31; Lowe, *Ferns* VIII t. 28; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 97; Beddome, *Ferns of S. Ind.* I t. 17 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 61. — Inde, Péninsule Malaise, Java, Japon, Chine austr.

**D. Canariensis** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 414 t. 9 fig. 6; Loddiges, *Bot. Cab.* (1817) t. 142; Hooker, *Sp. Fil.* I 169 t. 56<sup>a</sup>; Lowe, *Ferns* VIII t. 12; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 97; Willkomm et Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* I 10. TRICHOMANES — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1099. — Canaries, Madère, Afrique bor., Portugal, Espagne.

— — var. **pulchella** TH. MOORE in SIM, *Catal. Ferns* (1859) 34. — Avec le type.

**D. Chinensis** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 133; Hooker, *Sp. Fil.* I 187; Langsdorf et Fischer, *Icon. Filic.* 23 t. 27. TRICHOMANES — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1562. STENOLOMA — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 70 fig. 34. D. TENUIFOLIA Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 88 et Hooker, *Sp. Fil.* I 186; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 102; Beddome, *Ferns of S. Ind.* I t. 16. ADIANTUM — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 44. — Asie trop. et subtrop., Maurice, Réunion, Madagascar.

- Davallia dissecta** J. Smith mss. ex TH. MOORE in *Gard. Chron.* (1855) 469 cum icone; *Belg. Hort.* (1856) 143 t. 26; Lowe, *Ferns* VIII t. 20; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 469. — Java.
- D. divaricata** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 337; Hooker, *Sp. Fil.* I 167; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 96; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 60. D. POLYANTHA Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 168 t. 59<sup>a</sup>; Lowe, *Ferns* VIII t. 23; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 60. — Inde, Péninsule Malaise, Java, Hong-Kong.
- D. elegans** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 132 et 347; Hooker, *Sp. Fil.* I 164 t. 43<sup>a</sup>; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* t. 27; Lowe, *Ferns* VIII t. 22; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 18 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 59; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 93. — Asie et Afrique trop., Queensland.
- D. Fejeensis** Hooker, *Sp. Fil.* I (1846) 166 t. 55<sup>d</sup>; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 97; *Rev. Hort. Belg.* IV (1878) 23 fig. 14; Regel in *Gartenflora* (1881) 343 et 345 cum icone. — Iles Fidji.
- D. heterophylla** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 415; Hooker, *Exot. Ferns* t. 27 et *Sp. Fil.* I 152; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* II 230; Lowe, *Ferns* VIII t. 19; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 88. TRICHOMANES — Poirer, *Encycl. Méth. Bot.* VIII (1807) 78. — Péninsule Malaise, Polynésie.
- D. immersa** Wallich, *Catal.* (1829) n. 256; Hooker, *Sp. Fil.* I 156 et *Exot. Ferns* t. 79; Lowe, *Ferns* VIII t. 15; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 91; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 11. LEUCOSTEGIA — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 51. — Himalaya, Archipel Malais.
- D. Mariesii** Baker in VEITCH, *Catal.* (1880); Regel in *Gartenflora* (1880) 339 et 340 cum icone. — Japon.
- D. Novæ-Zelandiæ** Colenso in *Tasman. Journ. of Nat. Sci.* II (1842) 182; Hooker, *Sp. Fil.* I 158 t. 51<sup>b</sup> et *Gard. Ferns* t. 51; Lowe, *Ferns* VIII t. 16; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 91; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 358. MICROLEPIA — J. Smith, *Enum. Kew Ferns* (1856). — Nouvelle-Zélande.
- D. pentaphylla** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 232; Kunze in Schkur, *Farnkr. Suppl.* II t. 108; Hooker, *Exot. Ferns* t. 37 et *Sp. Fil.* I 163; Lowe, *Ferns* VIII t. 18; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 94. — Java, Polynésie.
- D. solida** Swartz in SCHRADER, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 87 et *Syn. Fil.* (1806) 132; Hooker, *Sp. Fil.* I 164 t. 42 et *Exot. Ferns* t. 57; Lowe, *Ferns* VIII t. 27; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 95; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 104 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 59 fig. 30. TRICHOMANES — Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 475. — Asie austro-oc., Polynésie, Australie.
- — var. **caudata** HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* ed. I (1863) 95. D. CAUDATA Cavanilles, *Praelud.* (1801) n. 694; Swartz, *Syn. Fil.* 132; Hooker, *Sp. Fil.* I 164. D. LINDLEYI Hooker, *loc. cit.* I (1846) 163 t. 48<sup>b</sup>; Lowe, *Ferns* VIII t. 17. — Java.
- D. Tyermanni** Baker in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* ed. II append. (1874) 467. HUMATA — Th. Moore in *Gard. Chron.* (1871) 870 t. 178; Hooker, *Icon. Pl.* XVII t. 1620. — Afrique trop.-occ.



9. **CYSTOPTERIS Bernhardi** in Schrader, *Neues Journ. f. d. Bot.* I 2 (1806) 5 et 26. — Genre de 5 espèces représenté dans le monde entier.

**C. bulbifera Bernhardi** in SCHRADER, *Neues Journ. f. d. Bot.* I 2 (1806) 10 et 26 ; Lowe, *Ferns* VII t. 36 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 499 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 103. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1553. **NEPHRODIUM** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 268. — Du Canada à la Virginie et à la Caroline.

**C. fragilis Bernhardi** in SCHRADER, *Neues Journ. f. d. Bot.* I 2 (1806) 27 et 47 t. 2 f. 9 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 23 et *Gen. Fil.* t. 52 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 497 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 103 ; Boissier, *Fl. Or.* V 740. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1553. — Zones froides, temp. et subtrop. du monde entier.

**C. montana Bernhardi** in SCHRADER, *Neues Journ. f. d. Bot.* I 2 (1806) 26 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 25 et *Sp. Fil.* I 200 ; Lowe, *Ferns* VII t. 34 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 104. **ASPIDIUM** — Swartz in Schrader, *loc. cit.* (1800) II 42. — Scandinavie, Écosse, Europe centr., Kamtchatka, Amérique bor. (partie occ.).

**C. regia Desvaux**, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 264 ; Presl, *Tent. Pteridogr.* (1836) 93 ; Lowe, *Ferns* VII t. 30. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1553. **C. alpina Desvaux**, *loc. cit.* (1827) 264 ; Hooker, *Sp. Fil.* I 497 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 103. **POLYPODIUM** — Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* VI (1793) t. 642. **C. alpina Desvaux** var. **TENUISECTA** Boissier, *Fl. Or.* V (1884) 740. — Hautes montagnes de l'Europe, de l'Asie Mineure, de la Perse et de l'Afghanistan.

10. **ADIANTUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 782. — Genre de 100 espèces environ représenté dans le monde entier, la zone glaciale exceptée.

**A. æmulum Th. Moore** in *Gard. Chron.* (1877) II 584 fig. 114. — Brésil. ♀

**A. Æthiopicum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1560 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 37 t. 77a ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 123 ; Baker in *Fl. Brasil.* I 2, 367 ; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 281 t. 37. **A. trapeziforme** Schkuhr (non Linné), *Farnkr.* (1809) t. 121. — Régions temp. du monde entier, montagnes du Mexique.

— — var. **emarginatum** DESVAUX, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 310 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 37 t. 77a. **A. EMARGINATUM** Bory in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 449. — Avec le type.

**A. affine Willdenow**, *Sp. Pl.* V (1810) 448 ; Lowe, *Ferns* III t. 7 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 117 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 360. **A. CUNNINGHAMI** Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 52 t. 76a. — Nouvelle-Zélande, Nouvelles-Galles du Sud, Queensland, île Norfolk.

- Adiantum amabile** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1868) 1090. — Pérou.
- A. Aneitense** Carruthers MSS. ex SEEMANN, *Fl. Vitiensis* (1873) 346; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 472. — Nouvelles-Hébrides.
- A. Bausei** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1879) II 456 fig. 69, 70 et 73; Regel in *Gartenflora* (1880) 274. — Hybride des *A. TRAPEZIFORME* et *DECORUM*.
- A. Capillus-Veneris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1096; *Engl. Bot.* (1806) t. 1564; Hooker, *Brit. Ferns* t. 41; *Gen. Fil.* t. 66 et *Sp. Fil.* II 36; Lowe, *Ferns* VIII t. 15; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 123. — Europe mérid.-occ., mérid. et centr., Asie, Afrique et Amérique (du Canada à l'Amazone).
- A. caudatum** Linné, *Mant. Pl.* (1771) 308; Hooker, *Syn. Fil.* II 13 et *Fl. Exot.* t. 104; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 115; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 2 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 83 fig. 44; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 362. — Asie trop. et subtrop., Afrique trop., Maurice, îles du Cap Vert.
- var. **ciliatum** Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 22. *A. CILIATUM* Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 213. *A. CAUDATUM* Linné var.  $\beta$  Hooker, *Sp. Fil.* II (1888) 44. — Asie trop., Chine, Maurice.
- A. colpodès** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1865) 530; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 124. — Équateur, Pérou.
- A. concinnum** Humboldt et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 310; Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I 17 et VII t. 668; Hooker, *Sp. Fil.* II 42; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 123. *A. TENERUM* Schkuhr (non Swartz), *Farnkr.* (1809) t. 121. — Du Mexique et des Indes occ. au Brésil et au Pérou.  $\zeta$
- A. cuneatum** Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* (1810-18) t. 26; Raddi, *Pl. Brasil. Gen.* I (*Filices*) t. 78; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 30; Lowe, *Ferns* III t. 5; Hooker, *Sp. Fil.* II 39; Hooker, *Syn. Fil.* 124; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 367. — Brésil.  $\zeta$
- A. curvatum** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 202; Hooker, *Sp. Fil.* II 29 t. 84<sup>c</sup>; Lowe, *Ferns* III t. 6; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 367; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 126. *A. BRASILIENSE* Raddi, *Pl. Brasil. Gen.* I (*Filices*) (1825) 57 t. 76. — Mexique, Brésil.  $\zeta$
- A. diaphanum** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 215; Hooker, *Sp. Fil.* II 11 t. 80<sup>c</sup>; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 117. *A. AFFINE* Hooker (non Willdenow), *loc. cit.* II (1858) 32. *A. SETULOSUM* J. Smith in Hooker, *Comp. Bot. Mag.* (1846) 22. — Chine austro-or., Java, Polynésie, Australie.  $\zeta$
- A. digitatum** Presl, *Tent. Pteridogr.* (1836) 159; Hooker, *Sp. Fil.* II 39; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 125; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 366. *A. SPECIOSUM* Hooker, *loc. cit.* II (1858) 46 t. 85<sup>c</sup>. *A. PALMATUM* Th. Moore in *Gard. Chron.* (1877) 140 fig. 5; Regel in *Gartenflora* (1877) 364. — Pérou, Brésil, Bolivie, Équateur.  $\zeta$
- A. excisum** Kunze in *Linnea* IV (1829) 82 et *Analecta Pterid.* (1837) 33 t. 21; Hooker, *Sp. Fil.* II 41; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 123. — Chili, Panama, Mexique austr.

**Adiantum flabellulatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1097 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 30 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 126 ; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 218 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 88. A. FUSCUM Retzcius, *Obs. Bot.* II (1791) 28 t. 5. — Inde, Malaisie, Chine austr., Japon.

**A. formosum** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* I (1810) 155 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 51 t. 86b ; Lowe, *Ferns* III t. 11 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 119 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 361. — Nouvelle-Zélande, Victoria, Queensland, Nouvelles-Galles du Sud. 2

**A. fulvum** Baoul, *Choix Pl. Nouv. Holl.* (1846) 9 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 52 t. 85a ; Lowe, *Ferns* III t. 19 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 120 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 360. — Nouvelle-Zélande, Nouvelles-Galles du Sud, îles Norfolk et Fidji. 2

**A. glaucophyllum** Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 40 et *Icon. Pl.* X t. 961 ; Hooker, *Syn. Fil.* 124. A. MEXICANUM Presl, *Tent. Pteridogr.* (1836) 158. — Mexique, Guatémala, Panama. 2

**A. gracillimum** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1874) I 14 ; De Kerchove in *Rev. Hort. Belg.* I (1875) 125 fig. 33. — Origine inconnue.

**A. Henslowianum** Hooker f. in *Trans. Linn. Soc.* XX (1847) 169 ; Hooker, *Syn. Fil.* II 45 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 118. A. SESSILIFOLIUM Hooker, *loc. cit.* II (1858) 44. — Colombie, Pérou, îles Galapagos. 2

**A. hispidulum** Swartz in SCHRADER, *Journ. f. d. Bot.* II (1800) 82 et *Syn. Fil.* 321 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 36 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 126 ; Lowe, *Ferns* III t. 13 ; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 3 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 87. A. PUBESCENS Schkuhr, *Farnkr.* (1809) 108 t. 116. — Asie, Afrique et Australie trop. 2

**A. intermedium** Swartz in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1817) 76 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 25 ; Lowe, *Ferns* III t. 20 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 116 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 364. A. FOVEARUM Raddi, *Pl. Brasil. Gen.* I (*Filices*) (1828) 53 t. 77. — Des Antilles et du Mexique au Brésil et au Pérou. 2

**A. Luddemannianum** Hort. ex MORREN et DEVOS, *Ind. Bibliograph.* (1887) 4.

Obs. Cet ADIANTUM hybride a été exposé à Gand par la maison Van Geert en 1878. Nous n'en avons pas trouvé de description.

**A. lunulatum** Burmann, *Fl. Ind.* (1768) 235 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 41 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 104 ; Belg. *Hort.* (1875) 62 t. 5 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 114 ; Beddome, *Ferns S. Ind.* t. 1 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 83. A. DOLABRIFORME Hooker, *Icon. Pl.* II (1837) t. 191. — Asie, Afrique, Amérique et Australie trop.

**A. macrophyllum** Swartz, *Prodr. Pl. Ind. Occid.* (1788) 135 et *Fl. Ind. Occid.* III 1707 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 132 et *Excot. Ferns* t. 55 ; Lowe, *Ferns* III t. 4 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 3 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 121. — Antilles et du Mexique à l'Équateur et au Pérou. 2

- Adiantum Neo-Guineense** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1877) II 12 ; Regel in *Gartenflora* (1877) 364. — Nouvelle-Guinée. ♀
- A. Parishii** Hooker, *Fil. Exot.* I (1859) t. 51 et *Sp. Fil.* II 237 et III t. 142a ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 114 ; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 16 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 82 fig. 42. — Moulmein.
- A. patens** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 439 ; Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1845) 556 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 29 t. 87a ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 126. — Du Mexique à l'Équateur et aux îles Galapagos. ♀
- A. pedatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1095 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 115 ; Descourtilz, *Fl. Antilles* IV t. 286 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 23 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 125 ; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 167 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 86. — Inde bor., Japon, Mandchourie, Unalasehka, Canada, États-Unis. ♀
- A. Peruvianum** Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1845) 555 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 35 t. 81c ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 116 ; Ed. André in *Illustr. Hort.* (1878) 171 t. 331. — Pérou. ♀
- A. pulverulentum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1096 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 119 ; Lowe, *Ferns* III t. 47 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 17 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 122 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 379. — Antilles, et du Mexique au Brésil et à l'Équateur. ♀
- A. reniforme** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1094 ; Loddiges, *Bot. Cab.* IX (1824) t. 841 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 115 ; Hooker, *Exot. Ferns* t. 8 et *Sp. Fil.* II 2 t. 71a ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 114. — Madère, Ténériffe, (Maurice et Réunion ?).
- A. rubellum** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1868) 365 ; Cogniaux et Marchal, *Les Pl. Ornem.* I (1873) t. 26 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 474. — Bolivie, Pérou. ♀
- A. serrato-dentatum** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 445 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 372. **A. RHOMBOIDEUM** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 20 t. 167 ; Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1845) 551 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 23. **A. OBTUSUM** Desvaux in *Mém. Soc. Linn. Paris* VI (1827) 309. — Guyane anglaise, Brésil, Vénézuéla. ♀
- A. tenerum** Swartz, *Prodr. Pl. Ind. Occid.* (1788) 35 et *Fl. Ind. Occid.* III 1749 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 45 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 124 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 382 ; Eaton, *Ferns N.-Amer.* II 231 t. 77. — Antilles et du Mexique au Pérou et à l'île Juan-Fernandez. ♀
- A. tetraphyllum** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 441 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 120 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 362. **A. PRIONOPHYLLUM** Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 46 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 21. **A. FRUCTUOSUM** Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 113 ; Kunze in Schkuhr, *Farnkr.* 28 t. 15. **A. LANCEA** Baker (non Linné) in Martius, *Fl. Brasil.* I 2 (1874) 373. — Antilles et du Mexique au Brésil ; Afrique trop.-occ.

**Adiantum tinctum** Th. Moore in *Proc. Hort. Soc.* II (1862) 543 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 474. — Pérou. ♀

**A. trapeziforme** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1097 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 33 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 368 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 118 ; Lowe, *Ferns* III t. 3. A. PENTADACTYLON Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* (1810-18) 22 t. 25 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 98. — Antilles et du Mexique au Brésil. ♀

**A. venustum** Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 17 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 40 t. 96b ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 125 ; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 20 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 86 fig. 45. — Afghanistan, Himalaya. ♀

**A. villosum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1558 ; Schkur, *Farnkr.* t. 120 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 18 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 12, 279 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 122. A. FALCATUM Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 19. — Antilles et de Panama au Brésil. ♀

**A. Williamsii** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1878) II 44 fig. 4 et 45 et (1879) II 104 fig. 15. — Pérou. ♀

11. **OCHROPTERIS** J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1842) 158. — Genre monotype.

**O. pallens** J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1842) 158 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 106 et *Sp. Fil.* II 54 t. 77b ; Fée, *Mém. Fam. Foug.* V t. 29 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 127 ; Baker, *Fl. of Mauriti.* 476. ADIANTUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 125 et 323. — Maurice.

12. **LONCHITIS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 781. — Genre de 2 ou 3 espèces de l'Amérique et de l'Afrique trop., de l'Afrique austr. et des îles Mascareignes.

**L. pubescens** Willdenow ex KAULFUSS, *Enum. Fil.* (1824) 195 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 68a et *Sp. Fil.* II 56 ; Schott, *Gen. Fil.* t. 6 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 128. — Afrique trop. et austr., îles Mascareignes.

13. **CHEILANTHES** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 5 et 126. — Genre d'environ 65 espèces habitant les régions temp. et surtout tropicales du monde entier.

**C. Clevelandi** Eaton in *Bull. Torrey Bot. Club* VI (1875) 33 et *Ferns of N.-Amer.* I t. 12 fig. 2 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 338. — Californie, Mexique bor.

**C. Cooperæ** Eaton in *Bull. Torrey Bot. Club* VI (1875) 33 et *Ferns of N.-Amer.* I t. 2 fig. 1 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 337. — Californie, Mexique bor.

**Cheilanthes Eatonii Baker** in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* ed. I (1863) 140. *C. TOMENTOSA* Hooker (non Link), *Sp. Fil.* II (1858) 96 t. 109<sup>b</sup> pr. p. — Nouveau-Mexique.

**C. fragrans Webb** et Berthelot, *Phytogr. Canar.* (1840-50) 452 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 81 et 115 ; Lowe, *Ferns* IV t. 17<sup>b</sup>. POLYPODIUM — Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 307. ADIANTUM — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 447. *C. ODORA* Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 127 et 327 ; Sibthorp et Smith, *Fl. Græca* X t. 966. — Du Portugal à l'Himalaya.

**C. gracillima Eaton** in *Mexic. Bound. Surv.* II (1858) 234 ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* II 247 t. 79 fig. 17-21 et S. Watson, *Bot. of Calif.* II 337 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 139. *C. VESTITA* Brackenridge (non Swartz), *Ferns of U. S. Expl. Exped.* (1854) 91. — De la Californie à l'Orégon et à la Colombie brit.

**C. leucopoda Link**, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1841) 66 ; Kunze in *Linnæa* (1850) 244 ; Mettenius, *Cheilanth.* 30 ; Eaton, *Ferns N.-Amer.* II 29 t. 49. Mexique. ♀

**C. Lindheimeri Hooker**, *Sp. Fil.* II (1858) 101 t. 107<sup>a</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 140 ; Fournier, *Man. Pl. Enum.* I 125 ; Eaton, *Ferns N.-Amer.* II 213. MYRIOPTERIS — J. Smith in *Bot. Voy. Herald.* (1852-57) 340. — Texas, Nouveau-Mexique, Mexique bor.

**C. microphylla Swartz**, *Syn. Fil.* (1806) 127 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 84 t. 98<sup>a</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 135 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 390 ; Eaton, *Ferns N.-Amer.* 81. ADIANTUM — Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1703. — Antilles et du Mexique au Pérou.

**C. tomentosa Link**, *Fil. Sp. Hort. Berol.* II (1841) 42 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 96 pr. p. ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* I 345 t. 45 fig. 1-5 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 140. *C. BRADBURNI* Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 97 t. 109<sup>b</sup>. — De la Caroline bor. et du Texas au Mexique. ♀

14. **ONYCHIUM Kaulfuss** in Berlin. Jahrb. f. Pharm. (1820) 45. — Genre de 4 ou 5 espèces de l'Asie trop. et subtrop. et de Cuba.

**O. Japonicum Kunze** in *Bot. Zeit.* (1848) 507 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 143 ; Beddome, *Ferns Brit. Ind.* t. 21 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 96. CENOPTERIS — Thunberg in *Nov. Act. Acad. Petrop.* IX (1793) 157 t. 6 ; Kaulfuss, *Enum. Fil.* 145 t. 1 fig. 8. TRICHOMANES — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 340. — Japon, Chine, Inde bor., Java. ♀

15. *PELLÆA* Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1841) 59. — Genre d'environ 25 espèces habitant les régions temp. et surtout trop. du monde entier.

**P. Alabamensis** Baker in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 148. CHEILANTHES — Kunze in Silliman, *Amer. Journ. Sci.* (1848) 87 et in *Linnea* XX (1850) 242 ; Hooker, *Exot. Ferns* t. 90 et *Sp. Fil.* II 89 t. 103<sup>b</sup>. PTERIS — Buckley in Silliman, *loc. cit.* (1843) 177. — États-Unis mérid. 2

**P. andromedæfolia** Fée, *Gen. Fil.* (1850) 129 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 149 ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* I 203 t. 27 fig. 1 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 150 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 339. ALLOSORUS — Kaulfuss in Kunze, *Analecta Pterid.* (1837) 18 t. 11. PTERIS — Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 188. — Andes de la Californie au Chili, colonie du Cap.

**P. aspera** Baker in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 148. CHEILANTHES — Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 111 t. 103<sup>a</sup> ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* II t. 74. — Nouveau-Mexique.

**P. atropurpurea** Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1841) 59 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 138 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 147. PTERIS — Linné, *Sp. Pl.* I (1753) 1076 ; Schkuhr, *Farnkr.* 93 t. 10. — Amér. (de la rég. subarct. au Mexique).

**P. densa** Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 150 t. 120<sup>b</sup> ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* I 77 t. 11 fig. 1 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 149 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 340. ONYCHIMUM — Brackenridge, *Fil. U. S. Expl. Exped.* (1854) 120 t. 13 fig. 2. — Oregón, Californie.

**P. gracilis** Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 138 t. 133<sup>b</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 145. ALLOSORUS — Presl, *Tent. Pteridogr.* (1836) 153 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. St.* ed. II 591 t. 9. PTERIS — Michaux (non Fée), *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 112. — Canada, États-Unis, Sibérie, Tibet, Inde or. 2

**P. intramarginalis** J. Smith, *Cat. Kew Ferns* (1855) 4 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 148 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 362. PTERIS — Kaulfuss mss. in *Linnea* V (1830) 613. CHEILANTHES — Kunze, *Analecta Pterid.* (1832) 21 t. 17 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 112. ALLOSORUS — Presl, *Tent. Pteridogr.* (1836) 153. — Mexique, Guatémala, Équateur, Argentine.

**P. marginata** Baker in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 151. CHEILANTHES — Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 22 et VII t. 669 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 105. ALLOSORUS CILIATUS et CHEROPHYLLUS Martens et Galeotti, *Foug. Mexic.* (1842) 47 et 48 t. 11. — Arizona, Mexique, Guatémala.

**P. mucronata** Baker in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 148. ALLOSORUS — Eaton in Silliman, *Amer. Journ. Sci.* (1856) 138. CHEILANTHES — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 45. P. WRIGHTIANA Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 142 t. 115<sup>b</sup>. — Californie, ? Mexique. 2

**Pellaea Ornithopus** Hooker, *Sp. Fil.* II (1858) 144 t. 146a ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* II 11 t. 47 fig. 7-10 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 340. CHEILANTHES — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1854) 250. — Californie. 2.

16. **CRYPTOGRAMMA** Rob. Brown ex Richardson, *Append. to Franklin Journey Polar Sea (1823)* 767. — Genre monotype.

**C. crispa** Hooker, *Sp. Fil.* II (1058) 128 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 144. OSMUNDA — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1512 ; *Fl. Dan.* (1770) t. 496. ALLOSORUS — Bernhardt in Schrader, *Neues Journ. f. d. Bot.* I (1806) II 36 ; Boissier, *Fl. Or.* V 726. PTERIS — Smith, *Fl. Brit.* (1804) 1137 ; *Engl. Bot.* (1803) t. 1160 ; Sowerby, *Brit. Ferns* 69 t. 39. **C. ACROSTICHOIDES** Rob. Brown ex Richardson, *Append. Franklin Journey Polar Sea (1823)* 754 et 767. — Europe, Amérique bor., Asie Mineure.

17. **PTERIS** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 780. — Genre d'une centaine d'espèces, répandu dans le monde entier (une espèce seulement dans la région arctique).

**P. arguta** Aiton, *Hort. Kew.* I (1789) 748 ; Webb et Berthelot, *Phytogr. Canar.* III 450 ; Lowe, *Ferns* III t. 41 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 184 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 160 ; Boissier, *Fl. Or.* V 728. — Portugal, Açores, Madère, Canaries.

**P. Cretica** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 130 ; Risso, *Fl. de Nice* t. 30 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 150 ; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* II t. 64 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 154 ; Boissier, *Fl. Or.* V 727 ; Beddome, *Fil. of S. India* t. 39. — Italie, Corse, Afrique or. et austr., Asie occ., centr. et or., Floride, Amérique centr. ; Brésil.

— — var. **albo-lineata** HORT. ex HOOKER in *Bot. Mag.* (1869) t. 5194 ; *Fl. des Serres* XVIII (1869-70) 135 t. 1905-06 ; Lowe, *Nat. Hist. Rar. and New Ferns* t. 25 ; Hooker et Baker, *loc. cit.* 154. — Brésil.

**P. leptophylla** Swartz in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1817) 70 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 413 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 23 et *Sp. Fil.* II 216 ; Lowe, *Ferns* III t. 47 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 171. LITOBROCHIA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 145. — Brésil.

**P. flabellulata** Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* II (1800) 172 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) 752 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 185 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 161. **P. ELEGANS** Jacquin (non Vellozo), *Fragm. Bot.* 74 (1800-09) t. 116. — Afrique austr., Réunion, Abyssinie, Fernando-Po.

— — var. **Ascensionis** HOOKER, *Sp. Fil.* II (1857) 185 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 161. **P. ASCENSIONIS** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 100 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 94. — Ascension.



**Pteris incisa** Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* II (1800) 171 ; Blume, *Enum. Fil. Javæ* 212 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 230 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 172. P. VESPERTILIONIS Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* (1806) 96 t. 245. P. PALLIDA Raddi, *Fil. Brasil.* 49 (1825) t. 71. — Asie, Afrique et Amérique trop. et subtrop., Afrique austr.

— — var. **aurita** HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 172. P. AURITA Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 213 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 59 t. 14 ; Schlechtendal, *Adumbr. Pl.* (sect. I *Filices*) t. 25 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 231. — Asie trop., cont. et insul. (de l'Inde à l'île Norfolk).

**P. longifolia** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1074 ; Jacquin, *Hort. Schænbr.* III t. 399 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 88 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 157 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 153 ; Boissier, *Fl. Or.* V 727 ; Beddome, *Fil. of S. Ind.* t. 33 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 106 fig. 55. — Régions trop. et temp. chaudes du monde entier.

**P. quadriaurita** Retzius, *Observ. Bot.* VI (1791) 38 ; *Bot. Mag.* (1860) t. 5183 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 179 t. 134<sup>b</sup> ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 31 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 158. — Régions trop. du monde entier, Chine austr., Japon.

Obs. Hooker et Baker (*loc. cit.*) considèrent le P. ARGYRÆA Th. Moore comme une simple forme de cette espèce (Lowe, *Ferns* t. 10).

**P. pedata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1532 ; Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* 17 t. 20 ; Raddi, *Fil. Brasil.* t. 65 ; *Bot. Mag.* (1833) t. 3247 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 34 et *Sp. Fil.* II 208 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 167. CASSEBEERA — J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* III (1841) 406. DORYOPTERIS — J. Smith, *Enum. Kew Ferns* (1846) 4. LITOBROCHIA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 149. Amérique trop., Indes Orient., Iles Mascareignes.

— — subvar. **lutea** HOOKER, *Garden Ferns* (1862) t. 22. P. ELEGANS Vellozo, *Fl. Flumin.* XI (1827) t. 81 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 167. DORYOPTERIS NOBILIS Hort. Angl. ex Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 408 in obs. — Brésil.

— — var. **palmata** BAKER in MARTIUS *Fl. Brasil.* I 2 (1874) 408. P. PALMATA Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 357 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 22 et *Sp. Fil.* II 209 in obs. ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 166. — Avec le type.

**P. scaberula** Richard in d'URVILLE, *Voy. de l'Astrolabe* I (1832) 82 t. 11 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 174 t. 93<sup>a</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 163 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 364. — Nouvelle-Zélande.

**P. semipinnata** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1534 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* t. 15 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 59 et *Sp. Fil.* II 169 ; Hooker et Baker *Syn. Fil.* 157 ; Beddome, *Fil. of S. Ind.* t. 34 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 107. — Japon, Chine austro-or., Hong-Kong, Bornéo, Philippines, Himalaya.

**Pteris serrulata** Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 425 ; Willdenow, *Sp. Pl.* V 373 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 91 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 167 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 153. — Chine, Japon, Natal.

**P. tremula** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 154 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 174 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 161 ; Hooker f., *Fl. Nov. Zeland.* II 25 et *Handb. New Zeal. Fl.* 364 ; Benth., *Fl. Austral.* VII 731. — Australie, Nouvelle-Zélande.

**P. umbrosa** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 154 ; Hooker, *Sp. Fil.* II 162 t. 430<sup>b</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 155 ; Benth., *Fl. Austral.* VII 730. — Australie temp. et trop.

18. **LOMARIA** Willdenow in *Berliner Mag.* III (1810) 160. — Genre d'environ 50 espèces, représenté dans toutes les régions du globe, mais surtout dans les régions temp. austr.

**L. Banksii** Hooker f., *Fl. Nov. Zeland.* II (1853) 31 t. 76 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 17 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 178 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 368. — Nouvelle-Zélande.

**L. Capensis** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 291 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 417. **OSMUNDA** — Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 306. **O. PROCERA** Forster, *Fl. Ins. Austral. Prodr.* (1786) n. 414. **LOMARIA** — Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 65 ; Hooker, *Icon. Pl.* V t. 427-28 ; *Gard. Ferns* t. 53 et *Sp. Fil.* III 22 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 179. — Afrique austr. ; Asie, Afrique et Amérique trop.

**L. discolor** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 293 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 5 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 175 ; Benth., *Fl. Austral.* VII 735. **OSMUNDA** — Forster, *Fl. Insul. Austral. Prodr.* (1786) n. 113. **STEGANIA FALCATA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 153. **ONOCLEA NUDA** Labillardière, *Pl. Nov. Holl. Specim.* II (1806) 96 t. 246. — Australie, Nouvelle-Zélande, île Norfolk.

**L. fluviatilis** Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 65 ; Raoul, *Choix Pl. Nouv.-Zélande* 9 t. 2<sup>b</sup> ; Hooker, *Sp. Fil.* III 34 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 181. **STEGANIA** — Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 152 ; Hooker f., *Fl. Nov. Zel.* II 28 et *Handb. New Zeal. Fl.* 366. — Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.

**L. gibba** Labillardière, *Sert. Austro-Caled.* (1824) t. 4 et 5 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 5 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 175. — Nouvelle-Calédonie, île des Pins, Anciteum.

**L'Herminieri** Bory ex KUNZE in Schkuhr's, *Farnkr. Suppl.* (1840-45) 173 73 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 40 et *Sp. Fil.* III 9 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 176. **BLECHNUM** — Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 54. — Antilles ; de la Colombie au Chili.

Obs. Dans Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 416, Baker réunit ce **LOMARIA** au **L. LANCEOLATA** Sprengel, de l'Océanie.

**Lomaria Patersoni** Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 62; Hooker, *Fil. Exot.* t. 49 et *Sp. Fil.* III 3; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 174; Bentham, *Fl. Austral.* VII 734. **STEGANIA** — Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 152. — Indes Orient., Archipel Malais, îles du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande.

**L. Penna-Marina Mettenius** miss. ex BAKER in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1870) 412. **POLYPODIUM** — Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 320. **L. ALPINA** Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 62; Hooker, *Fil. Exot.* t. 32; *Fl. Antart.* t. 150 et *Sp. Fil.* III 16; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 178. **STEGANIA** — Rob. Brown, *Prodr. Fl. N. Holl.* (1810) 152. — Brésil, Amérique temp. austr., Australie, Nouvelle-Zélande.

**L. punctulata Kunze** in *Linnaea* X (1836) 27; Hooker, *Sp. Fil.* III 31; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 179. **BLECHNUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 343; Schlechtendal, *Adumbr. Fil. Cap.* 37 t. 21 et 22. — Afrique austr. jusqu'à Natal, Java.

Obs. Baker (*loc. cit.*) rapporte à cette espèce comme forme monstrueuse, anormale, le **SCOLOPENDRIUM KREBSII** Kunze in *Linnaea* XVIII (1844) 118; *Bot. Mag.* (1857) t. 4768. **ONYCHIUM** — Kunze in *Linnaea* I (1826) 29.

**L. tabularis Mettenius** ex KUHN, *Fil. Afric.* (1868) 94; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 418. **PTERIS** — Thunberg, *Prodr. Pl. Cap.* II (1800) 171. **OSMUNDA BORYANA** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 111. **LOMARIA** — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 292; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 180. **L. MAGELLANICA** Desvoux in *Mag. Nat. Hist. Berl.* (1811) 330; Hooker, *Sp. Fil.* III 27 et *Gard. Ferns* t. 52. — Afrique austr., îles Mascareignes, Amérique trop. et temp. austr.

19. **BLECHNUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1077. — Genre de 40 espèces environ des régions temp. chaudes et de la région trop. de l'Ancien et du Nouveau Monde.

**B. Lanceola Swartz** in *K. Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1817) 72 t. 3 fig. 2; *Bot. Mag.* (1833) t. 3240; Hooker, *Icon. Pl.* X t. 970 et *Sp. Fil.* III 47; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 183. — Du Panama au Brésil et au Pérou.

**B. longifolium Humboldt** et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 413 et *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 13; *Bot. Mag.* (1828) t. 2818; Hooker, *Sp. Fil.* III 50; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 185. — Antilles et du Mexique au Pérou et au Brésil.

**B. Orientale Linné**, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1535; Schkhur, *Farnkr.* 101 t. 109; Hooker, *Fil. Exot.* t. 77 et *Sp. Fil.* III 52; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 186; Beddome, *Fil. of S. Ind.* t. 29 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 132 fig. 66. — Chine austr., Himalaya, Polynésie, Australie.

**B. unilaterale Willdenow**, *Sp. Pl.* V (1810) 407; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 184. **B. POLYPODIODES** Raddi, *Syn. Fil. Brasil.* (1819) n. 20 et *Gen. Pl. Brasil. (Filices)* 53 t. 60 fig. 2; Kunze in Schkuhr, *Farnkr.* 130 t. 58; Hooker, *Sp. Fil.* III 45. — Antilles, Amérique trop. contin.

20. **WOODWARDIA** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 411 t. 9. — Genre de 6 espèces de la zone temp. bor., dont une espèce pénétrant jusqu'au Guatemala.

**W. areolata** Th. Moore, *Ind. Fil.* (1837) p. XIV ; Hooker, *Sp. Fil.* III 70 et *Gard. Ferns* t. 61 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 189. **ACROSTICHUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1526. **W. ANGUSTIFOLIA** Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 411. — États-Unis (du Massachussets à la Floride).

**W. radicans** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 117 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 112 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 17 et *Sp. Fil.* III 67 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 188 ; Beddome, *Fil. of Brit. Ind.* t. 88 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 135 fig. 68. **BLECHNUM** — Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 307. — Madère, Canaries, Europe mérid., Inde, Java, Californie, Amérique centr.

— — var. **cristata** HORT. ex A. VAN GEERT in *Rev. Hort. Belge* IV (1878) 234 fig. 33. — Var. horticole.

**W. Virginica** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 412 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 66 t. 6 fig. 1-2 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 69 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 188. **BLECHNUM** — Linné, *Mant. Pl.* II (1771) 307. — Canada, États-Unis, Bermudes.

21. **DOODIA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 51. — Genre de 5 espèces de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Java, de la Polynésie et de Ceylan.

**D. aspera** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 151 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 54 ; *Exot. Fl.* I t. 8 et *Sp. Fil.* III 71 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 741. **WOODWARDIA** — Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 65. — Australie temp.

**D. media** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 151 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 74 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 190. **D. ASPERA** Rob. Brown var. — Bentham, *Fl. Austral.* VII (1878) 742. **D. KUNTHIANA** Gaudichaud in Freycinet, *Voy. de l'Uranie, Bot.* (1826) 401 t. 14. **W. LUNULATA** Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 66. — Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie.

22. **ASPLENIUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 783. — Genre d'environ 350 espèces, répandu dans le monde entier.

**A. alatum** Humboldt et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 273 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 137 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 121 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 200. — Antilles, et de la Colombie au Pérou et au Brésil austr.

**A. angustifolium** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 265 ; Schkuhr, *Farnkr.* 63 t. 67 et 69 ; Lowe, *Ferns* V t. 24 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 145 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 199. — Canada, États-Unis.

**Asplenium aspidioides** Schlechtendal, *Adumbr. Pl. I (Filices)* (1825-32) 24 t. 13; Mettenius, *Asplen.* 196; Hooker, *Sp. Fil.* III 223; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 223. — Équateur, îles Sandwich, Nilgherries, Madagascar, Fernando-Pô, Colonie du Cap.

**A. Belangeri** Kunze in *Bot. Zeit.* VI (1848) 176; Hooker, *Fil. Exot.* t. 44 et *Sp. Fil.* III 209; Lowe, *Ferns* V t. 5<sup>a</sup>; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* t. 13; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 223; Beddome, *Fil. of Brit. Ind.* t. 287. DAREA — Bory in Belanger, *Voy. Ind. Or., Bot.* (1846) 51. — Péninsule Malaise Java, Sumatra, Bornéo.

**A. bulbiferum** Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 433; Schkuhr, *Farnkr.* t. 79; Lowe, *Ferns* V t. 11; Hooker, *Icon. Pl.* V t. 423 et *Sp. Fil.* III 196; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 218. — Mexique, Guatémala, Inde Orientale, Océanie, îles Mascareignes, Natal.

— — var. **Fabianum** Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 218. A. FABIANUM Hombron et Jacquinot, *Voy. Pôle Sud* (1853) t. 3 bis. CÆNOPTERIS — Bory ex Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 299. — Îles Mascareignes, Australie, Nouvelle-Zélande.

— — var. **laxum** Hooker et Baker, *loc. cit.* (1863) 218. A. LAXUM Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 151; d'Urville, *Voy. Astrolabe* t. 3. — Australie.

**A. caudatum** Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 432; Lowe, *Ferns* V t. 44; Schkuhr, *Farnkr.* 72 t. 77; Hooker, *Sp. Pl.* III 152; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 209. A. CONTIGUUM Beddome, *Ferns of S. Ind.* (1863) t. 140. — Asie trop., Australie, Comores, Angola, Équateur, Brésil.

**A. cicutarium** Swartz, *Pl. Ind. Occid. Prodr.* (1788) 130 (excl. syn.); Hooker, *Gen. Fil.* t. 6 et *Sp. Fil.* III 198; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* t. 13; Lowe, *Ferns* V t. 20; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 220. — Amérique et Afrique trop., Transvaal.

**A. compressum** Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 52 et *Syn. Fil.* 79 et 270; Hooker, *Sp. Fil.* III 121 et *Fl. Exot.* t. 76; Lowe, *Ferns* X t. 16; Mellis, *S. Helena* 352; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 206. — Île Sainte-Hélène. ♀

**A. Colensoi** Hooker f. in *London Journ. of Bot.* III (1846) 26 (nomen nudum); Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 219. A. ADIANTOIDES Raoul var. — Hooker f. in *Icon. Pl.* X (1854) 984 et in *Fl. Nov.-Zeland.* II (1855) 35. A. HOOKERIANUM Colenso var. — Th. Moore, *Index Filic.* (1857) 137; Hooker, *Handb. New Zeal. Fl.* (1864) 373. — Nouvelle-Zélande.

**A. dimorphum** Kunze in *Linnaea* XXIII (1850) 233; Hooker, *Sp. Fil.* III 213 et *Second Cent. of Ferns* t. 37; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 223. — Île Norfolk.

- Asplenium ebeneum** Aiton, *Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 462 ; Mettenius, *Asplen.* 136 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 138 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 198 ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. States* ed. VI 684. — Du Canada aux Antilles et à l'Équateur, colonie du Cap.
- A. Filix-fœmina Bernhardi** in SCHRADER, *Neues Journ. f. d. Bot.* I (1806) II 26 t. 2 fig. 7 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 35 et *Sp. Pl.* III 217 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 227. POLYPODIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1551. — Europe, Asie, Afrique et Amérique (de Sitka au Vénézuéla). 2
- A. fissum** Kitaibel mss. in WILDENOW, *Sp. Pl.* V (1810) 348 ; Hooker, *Sp. Pl.* III 177 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 213. A. CUNEATUM Schkuhr, *Farnkr.* (1809) t. 56<sup>b</sup>. — De la Suède mérid., à l'Italie mérid et à la Turquie. 2
- A. flaccidum** Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 426 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 82 ; Lowe, *Ferns* V t. 19 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 205 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 749 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 374 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 222. — Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, îles Sandwich, Natal.
- A. fragrans** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1612 et *Syn. Fil.* 84 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 130<sup>b</sup> ; Hooker, *Sp. Fil.* III 181 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 216. — Antilles et du Mexique au Brésil et au Pérou.
- — var. **fœniculaceum** HOOKER, *Sp. Fil.* III (1860) 181 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 216. A. FœNICULACEUM Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 15 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 92 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 181. — Avec le type.
- A. Germanicum** Weiss, *Pl. Crypt. Fl. Gotting.* (1770) 299 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 27 et *Sp. Fil.* III 175 ; Lowe, *Ferns* V t. 3 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 212. A. ALTERNIFOLIUM Wulfen in Jacquin, *Miscell. Austriaca* II (1781) 51 t. 5 fig. 2 ; *Engl. Bot.* (1811) t. 2258. — De l'Écosse et de la Norvège à la Hongrie et à la Dalmatie.
- A. Gœringianum** Mettenius, *Asplen.* (1859) 198 t. 6 fig. 11 et 12 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 224. ASPIDIUM — Kunze in *Bot. Zeit.* VI (1848) 557. LASETREA — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 93. ATHYRIUM — Th. Moore, *loc. cit.* (1857) 185. — Japon.
- Obs. Baker (in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 227) croit que cet ASPLENIUM doit rentrer dans l'A. MACROCARPUM Blume, de l'Asie subtrop. et trop.
- A. Hallii** Hooker, *Second Cent. of Ferns* t. 30 et *Sp. Fil.* III (1860) 202 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 212 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 442. — Équateur, bassin de l'Amazone.
- A. longissimum** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 178 ; Mettenius, *Asplen.* 147 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 149 t. 190 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 199 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 145. — Java, Bornéo, Sylhet, Péninsule Malaise, Maurice. 2

**Asplenium marginatum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1539 ; Mettenius, *Asplen.* 170 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 63 et *Sp. Fil.* III 246 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 246. — Amérique trop. (Cuba et du Vénézuëla au Pérou et au Brésil).

**A. Hemionitis** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1537 ; *Bot. Mag.* (1856) t. 4911 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 91 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 194. **A. PALMATUM** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* II (1786) 302 et *Pl. Bot. Encycl.* IV t. 867 fig. 2 ; Lowe, *Ferns* V t. 6. — Espagne, Portugal, Afrique bor., Açores, Canaries, Madère, îles du Cap-Vert.

**A. Martensii** Kunze in SILLIMAN, *Amer. Journ. of Sci.* ser. 2, VI (1848) 86 ; Mettenius, *Asplen.* 200 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 219. **ATHYRIUM** — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 186. **ATHYRIUM GALEOTTI** Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 186 et 187. **ASPENIUM MICHAUXII** Martens et Galeotti (non Fée), *Mém. Foug. Mexic.* (1842) 62. — Mexique, Californie, Colombie.

Obs. Dans le *Syn. Fil.* 228, Hooker et Baker font de cette fougère, une forme de l'**A. FILIX-FEMINA** Bernhardt.

**A. monanthemum** Linné, *Syst. Veget.*, ed. Murray (1784) 1785 ; Smith, *Icon. Ined. Pl.* t. 73 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 74 ; t. 9 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 140 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 197. **A. MONANTHOS** Linné, *Mant. Pl.* I (1767) 130. — Amérique trop. (du Mexique au Chili), îles Sandwich, colonie du Cap, Madère, Açores.

**A. Nidus** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1537 ; *Bot. Mag.* (1831) t. 3101 ; Lowe, *Ferns* V t. 15 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 77 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 190. — Îles Mascareignes et de l'Himalaya au Queensland et aux îles Norfolk et Lord Howe.

**A. obtusilobum** Hooker, *Icon. Pl.* X (1854) t. 1000 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 221. — Îles Tanna et Aneiteum. ♀

**A. rhizophorum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1540 ; Swartz, *Obs. Bot.* 399 et *Syn. Fil.* 81 ; Willdenow, *Sp. Pl.* V 334 ; Mettenius, *Asplen.* 321 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 123 t. 137<sup>a-d</sup> ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 204. — Amérique trop. (Antilles, du Mexique au Pérou), îles Salomon.

**A. rhizophyllum** Kunze in *Linnaea* IX (1834) 71 ; Mettenius, *Asplen.* 115 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 200 ; Hooker et Baker, *Syn. Phil.* 220. **CENOPTERIS** — Thunberg in *Nov. Act. Acad. Petrop.* IX (1795) 158 ; Smith, *Icon. Ined.* II t. 50 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 193. — Floride, Amérique trop., Polynésie.

— — var. **myriophyllum** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1867) 220. **A. MYRIOPHYLLUM** Presl, *Reliq. Haenk.* I (1830) 48 ; Th. Moore, *Ind. Fil.* 147. **CENOPTERIS** — Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1626 et *Syn. Fil.* 88. — Avec le type.

**A. obtusatum** Forster, *Fl. Insul. Austral. Prodr.* (1786) n. 430 ; Labillardière, *Nov. Holl. Pl. Specim.* t. 242 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 68 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 46 et *Sp. Fil.* III 96 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 207. **A. consimile** Remy in J. Gay, *Fl. Chilens.* VI (1853) 501 ; Philippi in *Bot. Zeit.* XIV (1856) 630. — Pérou, Chili, Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande.

- Asplenium obtusatum** var. **lucidum** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1874) 207. *A. LUCIDUM* Forster, *loc. cit.* (1786) n. 427 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 72 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 72 t. 13 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 99. — Polynésie, Nouvelle-Zélande.
- A. plantagineum** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1537 ; Mettenius, *Asplen.* 161 ; Hooker, *Syn. Fil.* III 237 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 230. *DIPLAZIUM* — Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 62 ; Loddiges, *Bot. Cab.* (1829) t. 1588 ; Lowe, *Ferns* V t. 46. — Antilles et du Mexique au Brésil.
- A. polypodioides** Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 78 et *Asplen.* 190 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 257 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 238 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 163. *DIPLAZIUM* — Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 194. — Himalaya, Ceylan, Péninsule et îles Malaises.
- A. rutæfolium** Kunze in *Linnaea* X (1836) 524 ; Presl, *Tent. Pterid.* 108 ; Mettenius, *Asplen.* 110 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 206 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 222 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 138. *CÆNOPTERIS* — Bergius in *Act. Acad. Petrop.* III (1782) 249 t. 7 fig. 2. *DAREA* — Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 409. — Afrique austr. et austr.-or., Inde, Ceylan, Japon, Iles Fidji.
- A. septentrionale** Hoffmann, *Deutschl. Fl.* II (1795) 12 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 65 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 26 et *Sp. Fil.* III 174 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 198. *ACROSTICHUM* — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1524 ; *Fl. Dan.* (1763) t. 60. — Europe, Sibérie, Himalaya, montagnes Rocheuses, Nouveau-Mexique.
- A. Serra Langsdorf** et Fischer, *Icon. Fil.* (1810) 16 t. 19 ; Mettenius, *Asplen.* 151 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 154 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 206. *A. PÆRPIGH* Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 106 t. 3 fig. 21. — Toute l'Amérique trop., Afrique trop. occ.
- A. Seelosii** Leybold in *Flora* (1855) 348 t. 15 ; Mettenius, *Asplen.* 142 ; Hooker, *Second Cent. of Ferns* t. 26 et *Sp. Fil.* 175 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 198. *ACROPTERIS* — Heuffler, *Asplen. Sp. Europ. in Verh. zool. bot. Ver. Wien* VI (1856) 345. — Tyrol, Carinthie.
- A. Shepherdii** Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 82 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 75 et *Asplen.* 164 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 233. ? *A. STRIATUM* Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1539 ; Swartz, *Syn. Fil.* 82. *DIPLAZIUM* — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 114 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 55 fig. 3. — Jamaïque, Cuba ; du Mexique au Brésil et au Pérou.
- — var. **inæquilaterum** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 233. *A. INÆQUILATERUM* Mettenius, *Asplen.* (1859) 166. *DIPLAZIUM* — Liebmann, *Mexicos Bregner* (1849) 103. — Mexique.
- A. thelypteroides** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* (1803) 265 ; Schkuhr, *Farnkr.* 71 t. 76<sup>b</sup> ; A. Gray, *Man. Bot. N. U. Stat.* 627 et ed. VI 685 t. 18 f. 1, 2 ; Mettenius, *Asplen.* 184 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 229 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 226. *ATHYRIUM* — Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 226 ; Lowe, *Ferns* V t. 51. — Canada, États-Unis, Inde Orient., Chine cent..



**Asplenium Thwaitesii** Al. Braun, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) ; Mettenius, *Asplen.* 183 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 250 et *Second Cent. of Ferns* t. 45 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 235 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* 291. **DIPLAZIUM** — Klotzsch, *Cat. Hort. August.* (1857) 4 fide Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 339. — Ceylan.

Obs. Dans le *Handb. Ferns Brit. Ind.* 180, Beddome réunit cet ASPLENIMUM au DIPLAZIUM JAPONICUM Thunberg.

**A. trilobum** Cavanilles, *Præfud. Bot.* (1801) 255 ; J. Gay, *Fl. Chilena* VI t. 499 ; Hooker, *Second Cent. of Ferns* t. 11 et *Sp. Fil.* III 90 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 193. **A. TRAPEZOIDES** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 76. **A. PARVULUM** Hooker, *Icon. Pl.* III (1840) t. 222. — Chili, Brésil.

**A. umbrosum** J. Smith in HOOKER, *Journ. of Bot.* IV (1842) 174 ; Lowe, *Ferns* V t. 41 ; Mettenius, *Asplen.* 192 ; Webb et Berthelot, *Phytogr. Canar.* II 442 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 231 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 229. **ASPIDIUM** — Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 42. **ALLANTODIA** — Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 149. — Madère, Iles Canaries, Açores.

**A. viviparum** Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 109 t. 3 fig. 20 ; Mettenius, *Asplen.* 108 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 64 et *Sp. Fil.* III 215 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 225. **ACROSTICHUM** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 444. **DAREA** — Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 409. — Maurice, Réunion.

**A. Zeylanicum** Hooker, *Sp. Fil.* III (1860) 237 et *Second Cent. of Ferns* t. 16 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 230 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 228 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 173. — Ceylan.

23. **CETERACH** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 136. — Genre monotype.

**C. officinarum** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 136 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 113 ; Boissier, *Fl. Or.* V 722. **ASPLENIMUM CETERACH** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1538 ; Hooker, *Sp. Fil.* III 273 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 245. **SCOLOPENDRIUM** — Smith, *Engl. Bot.* (1803) t. 1244. **HEMIDICTYUM** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 194 fig. 85. — Europe, Caucase, Madère, Canaries, Açores, Algérie, ? Afrique austr., ? Brésil.

24. **SCOLOPENDRIUM** J. Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 410. — Genre d'une dizaine d'espèces, habitant l'Europe, l'Asie et l'Amérique bor. et austr.

**S. rhizophyllum** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 4 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 248. **ASPLENIMUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1536. **CAMPTOSORUS** — Link, *Fil. Hort. Berol.* (1841) 83 ; Presl, *Tent. Pterid.* 121 t. 4 ; Hooker, *Exot. Ferns* t. 85. — Canada, États-Unis.

**Scolopendrium vulgare** Smith in *Mém. Acad. Turin* V (1791) 421 t. 9 fig. 2; *Engl. Bot.* (1803) t. 1150; Hooker, *Brit. Ferns* t. 37 et *Sp. Fil.* IV 1; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 246. **ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1079. **S. OFFICINARUM** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 80. — Europe, Asie, Amérique bor., Mexique.

— — var. **crispum** A. Stelzner, *Catal.* n. 14 (1868). — Forme horticole.

## 25. DIDYMOCHLENA Desvaux, Prodr. Fam. Foug. (1827)

282. — Genre de 2 espèces, habitant l'Amérique trop. et la Péninsule et les Iles Malaises.

**D. lunulata** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 282; Hooker, *Sp. Fil.* IV 4 et *Gard. Ferns* t. 17; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 248; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 13 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 199 fig. 99. — Amérique trop., presqu'île et îles Malaises, îles Fidji, îles Mascareignes, Fernando-Po.

## 26. ASPIDIUM Swartz in Schrader, Journ. f. d. Bot. II (1800)

29. — Genre d'environ 60 espèces, répandu dans le monde entier.

**A. acrostichoides** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 44; Lowe, *Ferns* VI (1868) t. 19; Hooker, *Sp. Fil.* IV 9; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 250. **POLYPODIUM** — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 223. **NEPHRODIUM** — Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 267. — Du Canada à la Floride et au Mississipi.

**A. aculeatum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 53; Schkuhr, *Farnkr.* t. 39; *Engl. Bot.* (1806) t. 1362; Hooker, *Sp. Fil.* IV 18; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 252. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1552. **POLYSTICHUM** — Roth, *Tent. Fl. Germ.* III (1793) 79. — Dans le monde entier, mais rare dans les régions arctiques.

— — var. **lobatum** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 252. **A. LOBATUM** Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* II (1800) 37 et *Syn. Fil.* 53; *Engl. Bot.* (1806) t. 1563. **POLYPODIUM** — Hudson, *Fl. Angl.* ed. 2, II (1778) 159. — Avec le type.

**A. capense** Willdenow (non Swartz), *Sp. Pl.* V (1810) 267; Lowe, *Ferns* VI t. 40; Bentham, *Fl. Austral.* VII 758; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 254. **POLYPODIUM** — Linné ex Gmelin, *Syst. Nat.* (1791) 1313. **A. CORIACEUM** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 57; Schkuhr, *Farnkr.* 50 t. 50; Hooker, *Sp. Fil.* IV 32. — Régions trop. et extratrop.-autr. du monde entier.

**Aspidium capense** var. **angulare** BRAUN in METTENIUS, *Fil. Hort. Lips.* (1836) 88 ; Hooker et Baker, *loc. cit.* 252. **A. ANGULARE** Kitaibel in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 257. **POLYSTICHUM** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 83 ; Th. Moore, *Brit. Ferns* t. 12 et 13. — Avec le type.

**A. falcatum** Swartz in SCHRADER, *Journ. f. d. Bot.* II (1800) 31 et *Syn. Fil.* (1806) 43 ; Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* 13 t. 15 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 92 et *Sp. Fil.* IV 40 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 257. **CYRTOMIUM** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 86. **POLYPODIUM** — Linné f., *Suppl. Pl.* (1781) 446 ; Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 336 t. 36. **C. FORTUNEI** J. Smith. — Japon, Chine or.

— — var. **caryotideum** BAKER in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 257. **A. CARYOTIDEUM** Wallich, *Catal.* (1829) n. 376 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 69 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 13 et *Sp. Fil.* IV 40. **CYRTOMIUM** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 86 t. 2 fig. 26. — Inde Orient., Natal, Cafrerie.

**A. juglandifolium** Kunze in *Linnaea* XX (1847) 363 ; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 87 t. 22 et *Aspid.* 35 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 38 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 257. **POLYPODIUM** — Humboldt et Bonpland in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 195 et *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I 10 et VII t. 665. — Mexique, Colombie, Vénézuéla. 2

**A. lepidocaulon** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 12 t. 217 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 250. — Japon, Tuxo-Sima.

**A. Lonchitis** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 43 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 29 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 9 et Hooker, *Sp. Fil.* IV 8 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 250. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1548 ; *Engl. Bot.* (1800) t. 796. **POLYSTICHUM** — Roth, *Tent. Fl. Germ.* III (1793) 71. — Régions arct. et mont. de l'Europe, de l'Amérique bor., Daourie, Himalaya.

**A. munitum** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 236 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 261 et *Sp. Fil.* IV 10 t. 219 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 249. **POLYSTICHUM** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 83. — Amérique bor.-occ. (de Nootka à la Californie).

**A. triangulum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 44 ; Hooker, *Fl. Exot.* t. 33 et *Sp. Fil.* IV 14 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 250. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1088. — Jamaïque, Cuba.

**A. trifoliatum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 43, Schkuhr, *Farnkr.* t. 28 et 28<sup>b</sup> ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 33 et *Sp. Fil.* IV 45 ; Hooker et Baker *Syn. Fil.* 258. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1547 ; Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III t. 638. **A. PLUMIERI** Presl fide Hooker et Baker, *loc. cit.* — Cuba ; du Mexique au Brésil et au Pérou.

**A. viviparum** Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 280 et *Sixième Mém. Foug.* 21 t. 3 fig. 3 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 14 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 251. **ASPIDIUM** — Mettenius, *Aspid.* (1858) 44. — Cuba, Jamaïque.

27. **NEPHRODIUM** Richard in Michaux, Fl. Bor.-Amer. II (1803) 210. — Genre d'environ 285 espèces, représenté dans le monde entier.

**N. albo-punctatum** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 237 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 85 et *Fil. Exot.* t. 89. **ASPIDIUM** — Bory in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 242. **ARTHROPTERIS** — J. Smith ex Moore, *Ind. Fil.* 84. — Afrique trop.-occ. ; Maurice, Réunion.

**N. aristatum** Swartz (sub **ASPIDIO**), *Syn. Fil.* (1806) 53. **LASTREA** — Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 101 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 229. — Asie trop. et subtrop. contin. et insul.

**N. catopteron** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 137 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 284. **LASTREA** — Pappe et Rawson, *Syn. Fil. Afr. austr.* (1858) 12. — Afrique austr., Natal ; îles Mascareignes, Côte de Guinée.

**N. cicutarium** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 299. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1349. **ASPIDIUM** — Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1803) II 279 et *Syn. Fil.* 51 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 48. **P. HIPPOCREPIS** Jacquin, *Icon. Pl. Rar.* III (1786-93) t. 641. — Asie, Afrique et Amérique trop.

**N. crinitum** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 237 ; Hooker et Baker, *Sp. Fil.* IV 110 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 263. **POLYPODIUM** — Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 528 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* (1829) t. 66. — Maurice, Réunion.

**N. decursivo-pinnatum** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 259. **POLYPODIUM** — Van Hall ex Hooker, *Sp. Fil.* IV 231 et *Second Cent. of Ferns* t. 42. **ASPIDIUM** — Kunze ex *Pterid. Japon.* 553 ; Mettenius, *Aspid.* 75. **LASTREA DECURRENS** J. Smith ex Hooker, *loc. cit.* — Japon, Chine occ., Formose.

**N. dissectum** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 239 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 282. **POLYPODIUM** — Forster, *Fl. Insul. Austral. Prodr.* (1786) n. 441. **LASTREA** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 260. **N. MEMBRANIFOLIUM** Presl, *Reliq. Haenk.* (1828) 36 t. 5 fig. 2 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 131 t. 261. **LASTREA** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 76. **ASPIDIUM** — Mettenius, *Aspid.* (1856-60) 113. — Inde, Ceylan, Péninsule et Archipel Malais, Polynésie.

**N. erythrosom** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 120 t. 253 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 273. **ASPIDIUM** — Eaton in Asa Gray, *Pl. of Japon* (1859) 330 ; Franchet et Savatier, *Enum. Pl. Jap.* II 239. — Japon, Chine.

**N. fragrans** Richardson in *Append. to Franklin Journey Polar Sea* (1823) 754 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 70 ; Hooker, *Syn. Fil.* IV 122 et *Brit. Ferns* t. 16 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 275. **ASPIDIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 51. **LASTREA** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 76. **POLYSTICHUM** — Ledebour, *Fl. Rossica* IV (1853) 514. — Du Canada au Kamtchatka ; de l'Amérique arct. au Wisconsin.

**Nephrodium fuscipes Wallich** (sub *Aspidio*), *Catal.* (1829) n. 361. *LASTREA* — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 243. *N. SAGENIOIDES* Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 271. *ASPIDIUM* — Mettenius, *Aspid.* (1856-61) 113. *L. MELANOPUS* Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 110; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 38. — Birma, Péninsule Malaise, Philippines.

**N. Goldianum Hooker**, *Sp. Fil.* IV (1862) 121; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 102; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 272. *ASPIDIUM* — Hooker ex Goldie in *Edinb. Phil. Journ.* VI (1822) 333. *LASTREA* — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 76. *ASPIDIUM FILIX-MAS* Pursh (non Swartz), *Fl. Amer. Sept.* II (1813) 662. — Canada, États-Unis.

**N. hirtipes Hooker**, *Sp. Fil.* IV (1862) 113 t. 249; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 261. *ASPIDIUM* — Blume, *Enum. Fil. Java* (1830) 148; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 96. *LASTREA* — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 232 fig. 120. — Inde, Ceylan, Malaisie, Polynésie.

**N. Leuzeanum Hooker**, *Sp. Fil.* IV (1862) 61; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 293. *ASPIDIUM* — Kunze in *Bot. Zeit.* XIV (1836) 474; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 94 t. 22 fig. 8 et 9. *PLEOCNEMIA* — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 183; Hooker, *Gen. Fil.* t. 70<sup>a</sup> et 97. *POLYPODIUM* — Gaudichaud in Freycinet, *Voy. Bot. Uranie et La Physicienne* (1826) 371 t. 6. — Inde Orient., Chine, Java, Polynésie.

**N. marginale Michaux**, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 267; Hooker, *Syn. Fil.* IV 122; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 273. *ASPIDIUM* — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 50; Schkuhr, *Farnkr.* 193 t. 45<sup>b</sup>. *LASTREA* — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 77. *POLYPODIUM* — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1522. — Canada, États-Unis centr.

**N. molle Rob. Brown**, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 149; Hooker, *Gen. Fil.* t. 48 et *Sp. Fil.* IV 67 pr. p.; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 293. *POLYPODIUM* — Jacquin, *Collect. Bot.* III (1789) 188 et *Icon. Pl. Rar.* III (1786-93) t. 640. *ASPIDIUM* — Swartz in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 34 et *Syn. Fil.* 49; Bentham, *Fl. Austral.* VII 756. — Régions chaudes du monde entier.

— — var. **corymbiferum** REGEL et SCHMIDT in *Gartenflora* XXX (1881) 313. — Var. *horticole*.

**N. pachyphyllum Baker** in HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 299. *ASPIDIUM* — Kunze in *Bot. Zeit.* VI (1848) 259; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* 93 t. 21 et *Aspid.* 121; Hooker, *Sp. Fil.* IV 56. A. GRANDE J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* III (1841) 410. — Iles Malaises, Salomon, Philippines et Fidji.

**N. pennigerum Hooker**, *Sp. Fil.* IV (1862) 82; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 292; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 277. *ASPIDIUM* — Blume (non Swartz), *Enum. Fil. Java* (1830) 153. — Asie trop., Afrique trop.-occ.; île Anjouan.

**Nephrodium prolixum** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 256 ; Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 268. **ASPIDIUM** — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 251. **LASTREA** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 75. **ASPIDIUM** OCHTHODES in *Linnaea* XXIV (1851) 282. **LASTREA** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 240 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 106. — Inde Orient., Ceylan, Péninsule Malaise.

**N. sagittifolium** Th. Moore ex Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 78 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 294. **ASPIDIUM** — Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 153. — Java.

**N. Sieboldi** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 87 et *Fil. Exot.* t. 31 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 261. **ASPIDIUM** — Van Houtte ex Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 87 t. 20 fig. 1-4. **LASTREA** — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 103. — Japon.

**N. sparsum** Don, *Prodr. Fl. Nepalensis* (1825) 6 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 276. **ASPIDIUM** — Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 106. **LASTREA** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 252. **ASPIDIUM** PURPURASCENS Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 169. **NEPHRODIUM** — Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 132 t. 262. — Inde, Ceylan, Java, Maurice.

**N. Sprengelii** Hooker, *Sp. Fil.* IV (1862) 94 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 268. **ASPIDIUM** — Kaulfuss in *Flora* (1823) 365 et *Enum. Fil.* 239 ; Mettenius, *Aspid.* 81. **LASTREA** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 75. — Antilles, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama.

## 28. NEPHROLEPIS Schott, Gen. Fil. (1834) t. 3. — Genre de 6 espèces répandu dans les contrées tropicales.

**N. acuta** Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 79 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 153 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 301 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 94 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 284. **ASPIDIUM** — Schkuhr, *Farnkr.* (1809) 32 t. 31 ; Swartz, *Syn. Fil.* 46. — Asie, Afrique et Amérique subtrop. et trop.

Obs. Dans la *Flora Brasiliensis* I 2, 493, Baker réunit cette espèce à la var. BISERRATA du **N. EXALTATA**.

**N. cordifolia** Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 79 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 282. **POLYPODIUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1549. **ASPIDIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 45 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 754. — Asie, Afrique, Amérique et Océanie trop.

— — var. **tuberosa** Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2 (1874) 491. **ASPIDIUM** TUBEROSUM Bory in Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 234. **NEPHROLEPIS** — Presl, *Tent. Pterid.* 79 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 151 pr. p. ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 92. — Avec le type.

**Nephrolepis davallioides** Kunze in *Bot. Zeit.* IV (1846) 460 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 60 et *Sp. Pl.* IV 154 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 302. ASPIDIUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 48 et 247 ; Blume, *Enum. Fil. Javæ* 148 ; Hooker, *Icon. Pl.* IV t. 395-96. — Java.

**N. Duffii** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1878) I 622 ; Regel in *Gartenflora* XXVII (1878) 348 ; *Rev. Horticult. Belge* IV (1878) 186. — Hab. ? « Paraît être une forme anormale de N. TUBEROSA. » (Th. Moore).

**N. exaltata** Schott, *Gen. Fil.* (1834) t. 15. POLYPODIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1548 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 492 t. 31 et 46 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 152 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 301. ASPIDIUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 45 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 32<sup>b</sup> ; Raddi, *Fil. Brasil.* 30 t. 46. — Asie, Afrique, Amérique et Australie trop.

**N. Pluma** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1878) I 588 fig. 108 ; Regel in *Gartenflora* XXVII (1878) 348. — Madagascar.

29. **OLEANDRA** Cavanilles, *Prælund. Bot.* (1801) n. 623. — Genre de 6 espèces des régions trop. et subtrop. du monde entier.

**O. neriiformis** Cavanilles, *Prælund. Bot.* (1801) n. 623 ; Hooker, *Fil. Exot.* t. 58 et *Sp. Fil.* IV 156 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 302 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 286 fig. 146. ASPIDIUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 42 et 237 ; Kunze in Schkuhr, *Farnkr.* Suppl. 35 t. 18. A. ARTICULATUM Swartz, *loc. cit.* (1806) 42 et 236. OLEANDRA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 79. — Asie trop. et subtrop., Afrique austr. et trop.-occ., Amérique austr.

**O. nodosa** Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 79 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 157 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 303 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 495 t. 31 et 47. ASPIDIUM — Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 211 ; Hooker, *Exot. Fl.* t. 117. — Antilles, Guatemala, Guyane, Brésil.

30. **FADYENIA** Hooker, *Gen. Fil.* (1838-42) t. 58<sup>b</sup>. — Genre monotype.

**F. prolifera** Hooker, *Gen. Fil.* (1838-42) t. 58<sup>b</sup> et *Fil. Exot.* t. 36 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 303. ASPLENIUM — Swartz, *Prodr. Pl. Ind. Occid.* (1788) 129. ASPIDIUM — Hooker et Greville (non Rob. Brown), *Icon. Fil.* (1829) t. 96. A. FADYENI Mettenius, *Aspid.* (1856-61) 35. POLYSTICHUM GREVILLEANUM Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 82. — Cuba, Jamaïque.

31. **POLYPODIUM** Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 784. — Genre d'environ 350 espèces, plus ou moins répandu dans le monde entier.

**P. alpestre** Hoppe in SPRENGEL, *Syst. Veget.* IV 2 (1827) 230 ; Sowerby, *Ferns of Gr. Brit.* 84 t. 49 ; Hooker, *Brit. Ferns* t. 6 et *Sp. Fil.* IV 251 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 311. **ASPIDIUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 42 et 59 ; Schkuhr, *Farnkr.* 58 t. 60. **PHLEOPTERIS** — Mettenius, *Phlegopt.* (1836-61) 10. — Europe arct. bor. et mont., Sitka, Orégon, Californie.

**P. angustatum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 27 et 224 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 80 ; Hooker, *Sp. Fil.* V (1862) 44 ; *Gard. Ferns* t. 20. **NIPHOBOLUS** — Sprengel, *Syst. Veget.* IV (1827) 44 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 185. **NIPHOPSIS** — J. Smith ex Hooker, *loc. cit.* **PLEOPELTIS** — *Tent. Pterid.* (1836) 193 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 352. — De l'Inde bor. à Tahiti et à la Nouvelle-Galles du Sud.

**P. angustifolium** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1607 et *Syn. Fil.* 27 ; Raddi, *Pl. Brasil.* I (*Filices*) t. 24 ; Lowe, *Ferns* I t. 48 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 40 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 347. **MARGINARIA** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 188. **CAMPYLONEURON** — Fée, *Gen. Fil.* (1830-32) 257. — Cuba ; du Mexique au Brésil et au Pérou.

**P. aureum** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1087 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 12 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 16 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 347 ; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 155 t. 16. **PHLEBODIUM** — J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1845) 59. — De la Floride et du Mexique au Brésil (? Australie sec. F. Muell.).

— — var. **areolatum** HOOKER et BAKER, *Syn. Fil.* (1863) 347 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 528 t. 32 et 33. **P. AREOLATUM** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 171. **PHLEBODIUM** — J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* IV (1842) 59. **P. SPORODIOCARPUM** Humboldt et Bonpland in Willdenow, *loc. cit.* V (1810) 172. — Avec le type.

**P. auriculatum** Wallich, *Catal.* (1829) n. 314 ; Hooker, *Sp. Fil.* IV 238 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 306. **LASTREA** — Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* (1868) t. 203. **P. APPENDICULATUM** Wallich, *Catal.* (1829) n. 349 ; Beddome, *loc. cit.* 256. **PHLEOPTERIS** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 290 fig. 149. — Inde Orient., Java.

**P. Billardieri** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 147 ; Lowe, *Ferns* I t. 47 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 32 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 364 ; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 382. **P. SCANDENS** Labillardière (non Forster), *Fl. Nov. Holl. Specim.* II (1806) t. 240. — Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie et îles voisines.

Obs. Benthham (*Fl. Austral.* VII 770) réunit ce **POLYPODIUM** au **P. PUSTULATUM** Forster.



**Polypodium Californicum** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 102; Hooker, *Sp. Fil.* V 18; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 341; Eaton, *Ferns of N. Amer.* 243 t. 31 fig. 4-5; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 334. — Californie.

**P. Catherineæ** Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* (1810) t. 9; Lowe, *Ferns I* t. 44; Hooker, *Sp. Fil.* V 20; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 343; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 522 t. 33. MARGINARIA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 188. GONIOPHLEBIUM — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 255. P. GLAUCUM Raddi (non Kunze), *Pl. Brasil.* I (*Filices*) (1825) t. 29. — Brésil.

**P. Dryopteris** Linné, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1093; *Fl. Dan.* (1778) t. 759; Schkuhr, *Farnkr.* t. 25; Hooker, *Sp. Fil.* IV 250 et *Brit. Ferns* t. 4; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 309. PHEGopteris — Fée, *Gen. Fil.* (1850) 243. — Europe, Asie, Amérique bor.

— — var. **Robertianum** Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 343. P. ROBERTIANUM Hoffmann, *Fl. Germ.* II (1795) in add. LASTREA — Newmann, *Brit. Ferns* ed. II (1865) 17. P. CALCAREUM Smith, *Fl. Brit.* (1804) 1117; *Engl. Bot.* t. 1525; Th. Moore et Lindley, *Brit. Ferns* t. 6. P. DRYOPTERIS Linné var. — Grenier et Godron, *Fl. de Fr.* III (1856) 628. PHEGopteris — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 243. — Europe, Canada, États-Unis, Himalaya.

**P. falcatum** Kellogg in *Proc. Calif. Acad.* I (1860) 20; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 201 t. 26; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 334. — Californie.

Obs. Hooker et Baker (*Syn. Fil.* 334), réunissent ce POLYPODIUM au P. VULGARE Linné.

**P. fissum** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 351. NIPHOBOLUS — Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 58 t. 24; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 330 fig. 174. P. POROSUM Wallich, *Catal.* (1829) n. 266; Hooker, *Sp. Fil.* V 48. — Inde Orient., Ceylan, Java.

**P. glaucophyllum** Kunze in Schkuhr, *Farnkr.* Suppl. (1846) 227 t. 93; Hooker, *Sp. Fil.* V 18; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 340; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 522. GONIOPHLEBIUM — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 255. — Antilles, de la Colombie à l'Équateur.

**P. glaucum** Kunze (non Raddi) in Mettenius, *Polypod.* (1856-58) 102 t. 2 fig. 12; Hooker, *Sp. Fil.* V 88; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 365. DRYNARIA — J. Smith ex Hooker, *loc. cit.* (1863) 88; Brackenridge, *Fil. U. S. Wilkes Explor. Exped.* (1854) 54. — Iles Philippines.

**P. Heteractis** Mettenius et Kuhn in *Linnaea* XXXVI (1869-70) 140; Clarke, *Ferns of N. Ind.* 535. NIPHOBOLUS — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 327. N. LINGUA Hooker et Baker, *Sp. Fil.* (1863) 350 pr. p. et ed. II (1874) 512 in obs.; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* Suppl. t. 385. — Sikkim, Bhotan, Khasya.

**P. hexagonopterum** Michaux, *Fl. Bor.-Amer.* II (1803) 271; Swartz, *Syn. Fil.* 40; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* II t. 210; Hooker, *Sp. Fil.* IV 245; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 309; Lowe, *Ferns I* t. 49. PHEGopteris — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 243. — Canada et États-Unis jusqu'à la Floride.

- Polypodium juglandifolium** D. Don, *Prodr. Fl. Nepal.* (1825) 3; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 368. PLEOPELTIS — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 368 fig. 210. P. CAPITELLATUM Wallich, *Catal.* (1829) n. 326; Hooker, *Sp. Fil.* V 90; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* I t. 12. — Indes Orient.
- P. Lingua Swartz**, *Syn. Fil.* (1806) 225; Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* t. 24. ACROSTICHUM — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 330 t. 33. NIPHOBOLUS — Sprengel ex Kunze, *Pterid. Japon.* (1848) 596; Kunze in Schkur's, *Farnkr.* suppl. t. 63; Hooker, *Sp. Fil.* V 49 pr. p.; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 350 pr. p. — Japon.
- P. Meyenianum Schott** ex Hooker, *Sp. Fil.* V (1863) 94; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 366. AGLAOMORPHA — Schott, *Gen. Fil.* (1834) t. 49; Hooker, *Gen. Fil.* t. 91. — Philippines.
- P. Phegopteris Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1089; Schkuhr, *Farnkr.* t. 20; *Engl. Bot.* (1810) t. 2224; Hooker, *Brit. Ferns* t. 3 et *Sp. Fil.* IV 245; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 308. PHEGOPTERIS POLYPODIOIDES Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 243. — Europe (de la Laponie à l'Italie et la Grèce); Asie et Amérique bor.
- P. Phyllitidis Linné**, *Sp. Pl.* ed. I (1753) 1083; Hooker, *Sp. Fil.* V 38; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 348; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 321 t. 42 fig. 4-7; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 531 t. 34. CAMPYLONEURON — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 189. — Antilles; de la Floride au Brésil mérid.
- P. plesiosorum Kunze**, in *Linnaea* XVIII (1844) 313 cum ic.; Mettenius, *Filic. Hort. Lips.* (1856) t. 24 fig. 11-12; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 342. P. LORICEUM Hooker (non Linné), *Sp. Fil.* V (1863) 21 pr. p. — Du Mexique au Vénézuéla.
- Obs. Baker (*Syn. Fil.* 342) réunit le P. APPENDICULATUM Klotzsch (non Wallich) in Hooker, *Fil. Exot.* t. 87 comme forme au P. PLESIOSORUM.
- P. punctatum Swartz** in Schrader, *Journ. f. d. Bot.* (1800) II 21. PLEOPELTIS — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 357. ACROSTICHUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1524. P. IRIOIDES Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 513; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* II t. 125; Hooker, *Fil. Exot.* t. 4 et *Sp. Fil.* V 67; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 360. PHYMATODES — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 198. — Asie, Afrique et Australie trop.
- P. repens Aublet**, *Hist. Pl. Guiane* (1775) 962; Hooker, *Gen. Fil.* t. 71<sup>a</sup> et *Sp. Fil.* V 39; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 348. CAMPYLONEURON — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 190. P. PHYLLITIDIS Linné var. — Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2 (1874) 532 t. 33. — Antilles et du Mexique au Brésil et au Pérou.
- P. rigidum Hooker et Greville**, *Icon. Fil.* (1829-31) t. 163 et in *Bot. Miscell.* (1831) 239; Hooker, *Sp. Fil.* IV 246; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 310. PHEGOPTERIS — Mettenius, *Phegopt.* (1856-61) 10. — Andes, du Guatemala au Pérou.
- Obs. Dans le *Flora Brasiliensis* I 2, 462, Baker réunit ce POLYPODIUM à sa var. PHEGOPTEROIDEUM de l'ASPIDIUM ACULEATUM Swartz.

**Polypodium Scouleri** Hooker et Greville, *Icon. Fil.* (1829-31) t. 36 et *Sp. Fil.* V 19; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 342; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 193 t. 26; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 335. — Ile Vancouver, Colombie Brit., Orégon, Californie.

**P. serpens** Forster, *Fl. Insul. Austr. Prodr.* (1786) n. 435; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 349; Bentham, *Fl. Austral.* VII 767. **P. RUPESTRE** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 146; Hooker, *Sp. Fil.* V 46 pr. p. **NIPHOBOLUS** — Hooker et Greville, *Icon. Pl.* I (1829-31) t. 93. — Australie, Nouvelle-Zélande, îles de la Société.

**P. subauriculatum** Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 177 t. 83; Hooker, *Sp. Fil.* V 32; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 344; Bentham, *Fl. Austral.* VII 771; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 78. **GONIOPHLEBIUM** — Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* (1883) 322 fig. 173. — Indes Orient., péninsule et îles Malaises, Queensland.

**P. thyssanolepis** Al. Braun, ex Klotzsch in *Linnea* XX (1847) 392; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* ed. II 512. **P. RHAGADIOLEPIS** Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 237. **GONIOPHLEBIUM** — Fée, *Sept. Mém. Foug.* (1854-57) 62 t. 19 fig. 3. — Du Mexique au Pérou.

32. **NOTHOLENA** Rob. Brown, *Prodr. Fl. Nov.-Holl.* (1810) 145. — Genre de 35 espèces répandu dans les contrées chaudes, mais surtout dans les régions texano-mexicaines.

**N. Aschenborniana** Klotzsch in *Linnea* XX (1847) 417; Hooker, *Sp. Fil.* V 117 t. 287<sup>b</sup>; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 371. **CHEILANTHES** — Mettenius, *Cheilanthes* (1859) 21. — Arizona, Texas, Mexique.

**N. candida** Hooker, *Sp. Fil.* V (1864) 110; Eaton, *Ferns of N. Amer.* II 21 t. 49 fig. 1-3; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 336. **ALEURITEROPTERIS** — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 154. **CHEILANTHES** — Martens et Galeotti, *Foug. Mexic.* (1842) 73 t. 20 fig. 1. **N. SULPHUREA** J. Smith in Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1852-57) 233; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 373. — Du Texas au Pérou.

**N. dealbata** Kunze in *Silliman's Amer. Journ. Sci.* (1858) 82; Hooker, *Sp. Fil.* V 113; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 69 t. 9 fig. 2; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 374. **CHEILANTHES** — Pursh, *Fl. Amer. Sept.* II (1813) 671. — États-Unis (Missouri).

**N. ferruginea** Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 92; Hooker, *Sp. Fil.* V (1864) 108 et *Second Cent. of Ferns* t. 52; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 370; Eaton, *Ferns of N.-Amer.* I (1879) 297 t. 39 fig. 7-10. **CHEILANTHES** — Willdenow in Kauffuss, *Enum. Fil.* (1824) 209. — Antilles; Andes du Mexique au Chili.

**N. Grayi** Davenport in Eaton, *Ferns of N. Amer.* II (*Conspectus*) (1880) XXXI et in *Proc. Amer. Acad.* XVIII (1883) 184. — Arizona, Mexique bor.

**Notholaena Hookeri** Eaton, *Ferns of South-West* (1878) 308 t. 30 et *Ferns of N.-Amer.* II (1880) 25 t. 49 fig. 4-7. **N. GREACEA** Eaton in *Bot. Mexic. Bound. Survey.* (1838) 234. — Texas, Arizona, Nouveau-Mexique.

**N. Marantæ** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 143 ; Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 92 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 120 ; Hooker et Baker, *Sp. Fil.* 371 ; Beddome, *Handb. Ferns of Brit. Ind.* 374 fig. 213. **ACROSTICHUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1527. — Açores, Madère, Canaries, Cap Vert, Afrique bor., Abyssinie, Asie occ., Himalaya, France mérid., Portugal.

**E. Newberryi** Eaton in *Bull. Torr. Bot. Club* IV (1873) 12 et *Ferns of N. Amer.* I 301 t. 39 fig. 11-14 ; S. Watson, *Bot. of Calif.* II 336. — Californie (partie mérid. et île Guadeloupe).

**N. nivea** Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 93 ; Kunze, *Farnkr.* t. 22 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 111 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 374. **PTERIS** — Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* V (1804) 718. **CINCINALIS** — Fée, *Gen. Fil.* (1850-52) 160. — Andes du Mexique au Pérou.

**N. sinuata** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 135 ; Kunze, *Farnkr.* I 95 t. 45 ; *Bot. Mag.* (1853) t. 4699 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 107 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 370 ; Eaton, *Ferns of N. Amer.* I 293 t. 39 fig. 1-6. **ACROSTICHUM** — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 14. **GYMNOGRAMME** — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 219. — Andes du Mexique au Chili.

**N. tenera** Gillies ex Hooker in *Bot. Mag.* (1831) t. 3055 ; Kunze in Schkuhr, *Farnkr. Suppl.* I 44 22 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 76 et *Syn. Fil.* V 112 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 373. — Chili, Bolivie.

### 33. **GYMNOGRAMME** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 304.

— Genre d'environ 90 espèces, dispersé dans les régions chaudes du monde entier.

**G. calomelanos** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 76 ; Hooker, *Gard. Ferns* t. 30 et *Sp. Fil.* V 148 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 385 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 556. **ACROSTICHUM** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1529 ; Langsdorf et Fischer, *Icon. Fil.* t. 3. **CEROPTERIS** — Link, *Sp. Fil.* (1841) 141. — Antilles, Brésil, Pérou, Samoa ; îles de l'Afrique trop.-occ.

— — var. **chrysophilla** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 385. **G. CHRYSOPHYLLA** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 76 ; Henfrey in *Trans. Linn. Soc.* XXI (1854) 117 t. 14-16 ; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 679. **ACROSTICHUM** — Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 212. — Jamaïque, Cuba, Martinique.

**G. caudiformis** Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* (1863) 389. **POLYPODIUM** — Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1830) 146 t. 54 fig. 2 ; **GRAMMITIS** — Hooker in *Bot. Mag.* (1862) t. 5328 et *Sp. Fil.* V 158. **SELLIGUEA** — Carruthers in Seemann, *Fl. Vitiensis* (1873) 370 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 390. — Mergui, Moulmein, Indo-Chine, Malaisie, Polynésie.

**Gymnogramme decomposita** Baker in *Gard. Chron.* (1872) 1587 ; Regel in *Gartenflora* (1873) 91 et (1874) 340 et 342 cum iconc ; Baker in Hooker et Baker, *Syn. Fil.* ed. II 517. — Probablement d'origine andine.

**G. Ehrenbergiana** Eaton in *Proc. Amer. Acad.* XVIII (1883) 184. STENOGRAMME — Klotzsch in *Linnea* XX (1847) 411. G. PODOPHYLLA Hooker, *Sp. Fil.* V (1863) 152 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 390. BOMMERIA — Fournier in *Bull. Soc. Bot. France* XXVII (1880) 328. — Texas, Arizona, Mexique, Guatemala.

**G. Japonica** Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 26 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 151 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 390. HEMIONITIS — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 333. DICTYOGRAMME — Fée, *Cinq. Mém. Fam. Foug.* (1850) 170 t. 15. — Japon, Formose.

**G. pedata** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 69 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 131 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 383. HEMIONITIS — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 20 et 209. — Mexique et Guatemala.

**G. pulchella** Linden ex Th. Moore in *Gard. Chron.* (1856) 597 cum xylogr. ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 383. Hooker, *Fil. Exot.* t. 74. — Vénézuéla.

— — var. **Wetenhalliana** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1860) 934. G. WETENHALLIANA Th. Moore, *loc. cit.* — Var. horticole.

**G. sulphurea** Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 27 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 147 pr. p. ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 383. ACROSTICHUM — Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1597 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 4. — Antilles.

**G. triangularis** Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 72 ; Hooker, *Syn. Fil.* V 146 et *Fil. Exot.* t. 153 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 153 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 384. — De l'île Vancouver et de l'Oregon à l'Équateur.

**G. trifoliata** Desvaux, *Journ. de Bot.* III (1813) 25 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 149 et *Gard. Ferns* t. 4 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 384. ACROSTICHUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1527 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 3 et 22. — Jamaïque, Cuba, du Guatemala au Brésil et au Pérou.

**G. tartarea** Desvaux in *Berl. Mag.* V (1811) 303 et *Journ. de Bot.* III (1813) 26 ; Kaulfuss, *Enum. Fil.* 75 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 148 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 384 ; Ettingshausen, *Die Farnkr.* t. 38 fig. 3 et t. 39 fig. 10. ACROSTICHUM — Cavanilles, *Præclud. Bot.* (1801) n. 591 ; Swartz, *Syn. Fil.* 15. CEROPTERIS — Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1811) 142. — Amérique trop.

34. **MENISCIUM** Schreber, *Gen. Pl.* ed. II (1791) 757. — Genre de 10 espèces habitant toute la région tropicale.

**M. simplex** Hooker in *Lond. Journ. of Bot.* I (1842) 294 t. 11 ; *Sp. Fil.* V 162 et *Fil. Exot.* t. 83 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 390 ; Bentham, *Fl. Hong-Kong.* 457. — Chusan, Hon-Kong, Formose.

35. ACROSTICHUM Linné, Gen. Pl. ed. 1 (1737) n. 785. —

Genre d'environ 200 espèces habitant les régions chaudes, surtout en Amérique.

**A. alienum** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) et *Syn. Fil.* 13 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 272 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 419 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 589 t. 39. GYMNOPTERIS — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 244 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 85. CHRYSODIUM — Mettenius, *Fil. Hort. Lips.* (1856) 21 t. 10 fig. 5. — Cuba ; du Mexique au Pérou et à l'Amazonie.

**A. auritum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 195 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 257 et *Fil. Exot.* t. 31 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 416. STENOSEMA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 237 ; Hooker, *Gen. Fil.* t. 94. — Philippines, Malaisie, îles Salomon.

**A. Herminieri** Bory mss. ex FÉE, *Hist. des Acrostich.* (1844) 43 t. 11 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 216 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 402 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 579. ELAPHOGLOSSUM — Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) 357. — Cuba, Guyane angl. et franç., au Brésil.

**A. peltatum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 11 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 12 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 252 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 416 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 587. RHIPIDOPTERIS — Fée, *Hist. des Acrostich.* (1844) 78 (excl. syn.). OLFERSIA — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 587. — Antilles ; du Mexique au Pérou et au Brésil.

**A. quercifolium** Retzius, *Obs. Bot.* VI (1791) 39 ; Hooker, *Icon. Pl.* X t. 905 ; *Fil. Exot.* t. 80 et *Sp. Fil.* V 279 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 47. GYMNOPTERIS — Bernhardt in Scharder, *Neues Journ. f. d. Bot.* (1800) II 21 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 433 fig. 262. — Indes Orient., Ceylan, Chine austr., Cochinchine.

**A. viscosum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 10 et 193 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 61 ; Blume, *Fl. Javæ (Filices)* 27 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 220 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 406 ; Baker in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 576 t. 37. ELAPHOGLOSSUM — Schott, *Gen. Fil.* (1834) t. 15 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 196. — Région trop. de l'Ancien et du Nouveau Monde (l'Australie exceptée).

36. PLATYCERIUM Desvaux, Prodr. Fam. Foug. (1827) 213.

— Genre de 5 espèces habitant l'Archipel Malais, l'Afrique, l'Amérique et l'Australie trop.

**P. alcorné** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 213 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 2 ; *Bot. Reg.* III t. 262 et 263 ; Hooker, *Sp. Fil.* V 282 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 425 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 780. ACROSTICHUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 17. — Australie temp., îles Mascareignes et Seychelles, Pérou.

**Platycerium biforme** Blume, *Fl. Javæ (Filices)* (1828) 44 t. 18; Hooker, *Gen. Fil.* t. 86 et *Sp. Fil.* V 285; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 425; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 109 et 224 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 447 fig. 273. ACROSTICHUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 12. — Philippines, péninsule et îles Malaises.

**P. grande** J. Smith in Hooker, *Journ. of Bot.* III (1841) 402; Hooker, *Sp. Fil.* V 294; *Fil. Exot.* t. 86 et *Sp. Fil.* V 284; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 425; Bentham, *Fl. Austral.* VII 781; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 326 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 445. — Singapore, Philippines, Australie bor.

**P. Hillii** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1878) II 429 fig. 74 et 75; Regel in *Gartenflora* (1879) 89. — Queensland.

**P. Stemmaria** Desvaux, *Prodr. Fam. Foug.* (1827) 213; Hooker, *Gard. Ferns* t. 9. ACROSTICHUM — Palisot de Beauvois, *Fl. d'Oware* I (1804) 2 t. 2. P. ÆTHIOPICUM Hooker, *Sp. Fil.* V 283; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 425. — Guinée, Angola.

**P. Willinckii** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1875) I 302 fig. 56; Regel in *Gartenflora* (1878) 27 et 28 et (1879) 19 et 20. — Madagascar.

## OSMUNDACEE

37. OSMUNDA Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 778. — Genre de 6 espèces habitant surtout les régions temp., bor. et austr.; rare dans la zone trop.

**O. cinnamomea** Linné, *Sp. Pl. ed. II* (1763) 1521; Schkuhr, *Farnkr.* t. 146; Sturm in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 163; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 426; Beddome, *Ferns of Brit. Ind.* t. 187 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 449 fig. 275. — Himalaya, Canada, États-Unis (? Guatemala, Brésil).

**O. regalis** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 1065; *Fl. Danica* (1763) t. 217; Hooker, *Brit. Ferns* t. 45; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 427; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 76 et *Handb. Ferns Brit. Ind.* 450; Boissier, *Fl. Or.* V 720. — Europe, Açores, Afrique bor.-trop. et austr., Asie bor., or. et trop., Amérique bor. et trop.

— — subsp. **palustris** STURM in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1839) 195. O. PALUSTRIS Schrader in *Geett. Gelehr. Anzeig.* (1824) 866; Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* 20. O. SPECTABILIS Willdenow var. — Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 53. — Brésil.

38. *TODEA* Willdenow in Schrift. Acad. zu Erfurth (1802) 14.

— Genre de 4 espèces confiné dans la zone temp. austr. de l'Ancien monde.

**T. barbara** Th. Moore, *Ind. Fil.* (1857) p. CXIX ; *Bot. Mag.* (1872) t. 5954 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 427 ; Ed. Morren in *Belg. Hort.* (1872) 257 t. 21 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 699. *ACROSTICHUM* — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1529. *OSMUNDA* — Thunberg, *Prodr. Pl. Capens.* (1800) 171. *T. AFRICANA* Willdenow in *Schrift. Acad. zu Erfurth* (1802) 14 t. 3 fig. 1 ; Hooker f., *Fl. Tasm.* II 153 t. 168 ; Lowe, *Ferns* VIII t. 17. — Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, Natal, colonie du Cap.  $\frac{1}{2}$

## SCHIZÆACEÆ

39. *ANEMIA* Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 155. — Genre d'une trentaine d'espèces confiné dans l'Amérique trop.

**A. Phyllitidis** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 155 ; Martius, *Icon. Pl. Crypt. Brasil.* 114 n. 1 (excl. syn.) ; Sturm in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 190 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 435. *OSMUNDA* — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1520. *ANEMIDICTYON* — Presl, *Suppl. Tent. Pterid.* (1845) 93 et *Gefässbündel Stipes Farrn.* 21 t. 4 fig. 6. — Cuba et du Mexique au Pérou et au Brésil austr.

**A. tomentosa** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 157 ; Willdenow, *Sp. Pl.* V 93 ; Sturm in Martius, *Fl. Brasil.* I 2, 203 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 433 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 453 fig. 280. *OSMUNDA* — Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* IV (1797) 652. *A. CHEILANTHOIDES* Kaulfuss, *Enum. Fil.* (1824) 53. — Brésil, Uruguay, Argentine ; Indes Orient.

40. *LYGODIUM* Swartz in Schrader, *Journ. für d. Bot.* (1801)

II 7 et 106 t. 2 fig. 2. — Genre de 16 espèces environ de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique trop. et subtrop.

**L. dichotomum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 154 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 55 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 62 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 437. *L. CIRCINATUM* Swartz, *loc. cit.* (1806) 153 ; Bentham, *Fl. Honkong.* 441 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 455 fig. 281. — Ceylan, péninsule et îles Malaises, Hong-Kong, Chusan, Philippines.

**L. Japonicum** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 154 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 64 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 439 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 962 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 457. — Japon, Chine or., Indes Orient., Archipel Malais, Australie.

**L. scandens** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 152 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 437 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 961 ; Beddome, *Ferns of S. Ind.* t. 61. *L. MICROPHYLLUM* Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 162 ; Beddome, *Handb. Ferns Brit. Ind.* 455. — Asie, Afrique et Australie trop.



## OPHIOGLOSSACEÆ

41. **BOTRYCHIUM** Swartz in Schrader, *Journ. für d. Bot.* (1800) II 110. — Genre de 6 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie.

**B. ternatum** Swartz in SCHRADER, *Journ. für d. Bot.* (1800) II 111 et *Syn. Fil.* 172 ; Kunze in Schkuhr, *Farnkr.* Suppl. II 52 t. 121 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 448 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII 690. **OSMUNDA** — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 329 t. 32. **B. AUSTRALE** Rob. Brown, *Prodr. Fl. N.-Holl.* (1810) 164. — Japon, Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.

**B. Virginicum** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 64. **OSMUNDA** — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1579. **B. VIRGINIANUM** Swartz in Schrader, *Journ. für d. Bot.* (1800) II 111 et *Syn. Fil.* 171 ; Schkuhr, *Farnkr.* 157 t. 156 ; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 29 ; Hooker et Baker, *Syn. Fil.* 448. — Des États-Unis à l'Équateur et au Brésil ; de la Norvège à l'Autriche ; Himalaya, Tsou Sema.

## CLVIII. SELAGINELLACÉES

1. **SELAGINELLA** Palisot de Beauvois, *Prodr. Æthéogamie* (1805) 101. — Genre d'environ 350 espèces existant dans les cinq parties du monde, mais surtout bien représenté dans l'Amérique trop. (deux espèces en Europe).

**S. apus** Spring in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 119 et *Monog. Lycopod.* II (1850) 75 pr. p. ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 112 et *Fern Allies* 71. **LYCOPODIUM APODUM** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1568 ; Swartz, *Syn. Fil.* 184. — Canada, États-Unis, ? Mexique.

**S. Braunii** Baker in *Gard. Chron.* (1867) 1120 ; in *Journ. of Bot.* (1885) 25 et *Fern Allies* 96. — China occ.

**S. caulescens** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 158 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 24 et *Fern Allies* 94. **LYCOPODIUM** — Wallich, *Catal.* (1829) n. 137. **S. AMÆNA** Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Asie trop. et subtrop. (de l'Inde au Japon et à la Nouvelle-Guinée).

— — var. **Japonica** BAKER in *Journ. of Bot.* (1885) 24 et *Fern Allies* (1887) 95. **S. JAPONICA** Macnab in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* IX (1868) 8. — Japon.

**S. circinalis** Presl, *Bot. Bemerck.* III (1844) 583. **LYCOPODIUM** — Thunberg, *Fl. Japon.* (1784) 341. **L. INVOLVENS** Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 182. **SELAGINELLA** — Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 63 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 375 et *Fern Allies* 87. — Japon, Corée, Amour, Chine, Philippines, Himalaya or.

- Selaginella conferta** Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 113 et *Fern Allies* 72. — Cuba.
- S. convoluta** Spring in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 131 et *Monog. Lycopod.* II 69 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 376 et *Fern Allies* 88. LYCOPODIUM — Arnott in *Edinb. Mem. Werner. Soc.* V (1623-24) 199. — Du Mexique au Brésil austr.
- S. cordifolia** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 118 et *Monod. Lycopod.* II 103 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 179 et *Fern Allies* 112. LYCOPODIUM — Desvaux in Poiret, *Encycl. Méth. Bot.* XI (1813) 548. S. CORDATA Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 524. — Saint-Domingue, Porto-Rico.
- S. cuspidata** Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1841) 158 ; Kunze in *Linnaea* XIII (1839) 151 et XVIII (1844) 304 ; Spring, *Monog. Lycopod.* II 66 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 19 ; *Fern Allies* 89. LYCOPODIUM — Link, *Hort. Berol.* II (1833) 161. L. PALLESCENS Presl, *Reliq. Haenk.* I (1830) 97. SELAGINELLA — Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 520. S. RETICULATA Klotzsch. — Cuba, Mexique, Guatémala, Vénézuéla, Nouvelle-Grenade.
- S. Douglasii** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 92 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 142 et *Fern Allies* 47. LYCOPODIUM — Greville et Hooker, *Enum. Fil.* in Hooker, *Bot. Miscell.* II (1831) 396 ; Hooker, *Fl. Bor.-Amer.* II 268. L. OVATIFOLIUM Hooker et Greville (non Desvaux), *Icon. Fil.* II (1831) t. 177. — Colombie brit., Orégon, Territoire de Washington.
- S. erythropus** Spring in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 125 et *Monog. Lycopod.* II 149 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 118 et *Fern Allies* 103. LYCOPODIUM — Martius, *Icon. Pl. Crypt. Brasil.* (1828-34) 39 t. 20 fig. 3. S. SETOSA Hort. — Antilles ; du Guatemala au Chili et au Brésil centr.
- S. Galeottii** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 129 et *Monog. Lycopod.* II 220 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 297 et *Fern Allies* 81. LYCOPODIUM STOLONIFERUM Martens et Galeotti (non Swartz), *Mém. Foug. Mexique* (1842) 12. — Mexique, Guatemala.
- S. grandis** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1882) II 40 t. 8 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 46 et *Fern Allies* 98 ; Regel in *Gartenflora* XXXIII (1884) 188 cum icone. — Bornéo.
- S. Griffithii** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 80 et *Monog. Lycopod.* II 151 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 25 et *Fern Allies* 96. — Indo-Chine (Mergui).
- S. haematodes** Spring in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 126 et *Monog. Lycopod.* II 156 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 119 et *Fern Allies* 103. LYCOPODIUM — Kunze in *Linnaea* IX (1834) 9 et in Schkuhr, *Farnkr.* suppl. I 61 t. 30. S. DICHROA Hort. — Vénézuéla, Équateur, Pérou.
- S. Helvetica** Link, *Fil. Sp. Hort. Berol.* (1841) 159 ; Spring, *Monog. Lycopod.* II 83 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 46 et *Fern Allies* 37. LYCOPODIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1568 ; Jacquin, *Fl. Austr. Icon.* III t. 196 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 165. — Europe centr. ; de la Sibérie à la Perse, Chine bor., Japon.

- Selaginella inæqualifolia** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 148 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 20 et *Fern Allies* 91. LYCOPODIUM — Greville et Hooker, *Enum. Fil.* in Hooker, *Bot. Miscell.* II (1831) 391. — Himalaya, Assam, Birma.
- — var. **perelegans** BAKER in *Journ. of Bot.* (1885) 21 et *Fern Allies* (1887) 91. S. PERELEGANS Th. MOORE ex Baker, *loc. cit.* (1885) 21. S. BELLULA Th. MOORE (non Cesati) in *Gard. Chron.* (1879) I 173 fig. 25. — Ceylan.
- S. Karsteniana** AL. BRAUN, *Prodr. Nov.-Granat.* in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5 III (1865) 288 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 295 et *Fern Allies* 122. — Colombie.
- S. Kraussiana** AL. BRAUN in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1859) 22 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 87 et *Fern Allies* 65. LYCOPODIUM — Kunze in *Linnaea* XVIII (1844) 144. S. MNIODES Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 114 (excl. syn. Desv.) et *Monog. Lycopod.* II 223 pr. p. S. BROWNII Hort. ex Baker, *loc. cit.* (1887) 65. — Afrique austr., Maurice, Afrique trop. occ., Açores, Madère, Java, Japon.
- S. lepidophylla** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 72 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 376 et *Fern Allies* II 88. LYCOPODIUM — Hooker et Greville in Hooker, *Bot. Miscell.* III (1833) 106 et *Icon. Pl.* II t. 162-63 ; Meissner in *Linnaea* XII (1838) 150 t. 5. — Californie, Mexique, Pérou.
- S. Lobbii** Th. MOORE in *Journ. of Bot.* (1885) 20 ; Baker, *Fern Allies* 90. S. COGNATA Hort. ex Baker, *loc. cit.* (1887) 90. — Bornéo, Sumatra.
- S. Ludoviciana** AL. BRAUN in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XIII (1860) 58 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 112 et *Fern Allies* 70. S. APUS Spring var. DENTICULATA Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 77. — Alabama, Louisiane.
- S. Martensii** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 129 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 296 et *Fern Allies* 80. LYCOPODIUM FLABELLATUM Martens et Galeotti (non Linné), *Foug. Mexique* (1842) 11 et 12. S. PÖPPIGIANA Hooker (non Spring), *Fil. Exot.* (1859) t. 36. — Mexique.
- — var. **variegata** HORT. MAKOV ex ED. MORREN in *Belg. Hort.* (1866) 129 t. 9.
- — var. **divaricata** AL. BRAUN in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, XIII (1860) 67 ; Baker, *loc. cit.* 80. S. DIVARICATA Hort.
- S. microphylla** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 158 et *Monog. Lycopod.* II 88 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 83 et *Fern Allies* 41. LYCOPODIUM — Kunth in Humboldt et Bonpland, *Nov. Gen. et Sp. Pl.* I (1815) 39 et *Syn. Fil.* I 96. S. THULEFOLIA Spring in Martius, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 120. — Guatemala, Amérique trop.-austr., Argentine, Uruguay.
- S. Parkeri** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 85 et *Monog. Lycopod.* II (1850) 226 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 120 et *Fern Allies* 104. LYCOPODIUM — Greville et Hooker, *Enum. Fil.* in Hooker, *Bot. Miscell.* II (1831) 388. S. PEDATA Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 521. S. LUCIDINERVIA Spring, *loc. cit.* (1841) n. 154. — Guyanes franç. et angl., vallée de l'Amazone.

- Selaginella patula** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 96 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 141 et *Fern Allies* 46. LYCOPODIUM — Swartz, *Syn. Fil.* (1806) 184 et 411. S. SARMENTOSA Al. Braun in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) app. 14. — Jamaïque.
- S. plumosa** Baker (non Presl) in *Journ. of Bot.* (1883) 144 et *Fern Allies* 50. LYCOPODIUM — Linné (non alior.), *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1568. S. RADICATA Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 114. — Asie trop. (de l'Inde et de la Chine austr. aux îles Fidji).
- S. Poulteri** Hort. Veitch ex BAKER in *Journ. of Bot.* (1884) 299 et *Fern Allies* (1887) 84. — Açores.
- S. rubella** Th. Moore in *Gard. Chron.* (1871) 902 fig. 190 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1884) 297 et *Fern Allies* 81. — Patrie inconnue.
- S. rupestris** Spring in MARTIUS, *Fl. Brasil.* I 2 (1840) 118 ; Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 520 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 43 et *Fern Allies* 35. LYCOPODIUM — Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1564 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 165 ; Raddi, *Fil. Brasil.* 80 t. 4 bis fig. 2. — Zones temp., bor. et austr. de l'Ancien et du Nouveau Monde, Andes, Brésil, Himalaya, Ceylan.
- S. serpens** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 102 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 99 et *Fern Allies* 46. LYCOPODIUM — Desvaux in Poirét, *Encycl. Méth. Bot.* XI (1813) 553 (excl. syn. Swartzii) ; Sprengel, *Syst. Veget.* IV 17 ; Chamisso et Schlechtendal in *Linnaea* V (1830) 622. S. MUTABILIS et VARIABILIS Hort. ex Baker, *loc. cit.* — Cuba, Jamaïque.
- S. stolonifera** Spring in *Bot. Zeit.* (1838) I 193 et *Monog. Phan.* II 209 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1883) 336 et *Fern Allies* 61. LYCOPODIUM — Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1576 (excl. syn.) et *Syn. Fil.* 182 ; Kunze in *Linnaea* IX (1834) 11. — Antilles.
- S. Victoriae** Th. Moore in *Bull's Catal.* (1878) ; *Flor. and Pomol.* (1878) 90 cum xylogr. et in *Gard. Chron.* (1879) I 74 fig. 8 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 20 et *Fern Allies* 91. — Bornéo, Gillolo, San Gristoval, Fidji.
- S. viticulosa** Klotzsch in *Linnaea* XVIII (1844) 524 ; Spring, *Monog. Lycopod.* 186 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 118 et *Fern Allies* 102. S. VARIEGATA Hort. ex Spring, *loc. cit.* — Vénézuéla, Panama.
- S. Vogelii** Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 170 ; Hooker, *Second Cent. of Ferns* t. 86 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 48 et *Fern Allies* 100. S. PERVILLEI Spring, *loc. cit.* II (1850) 169. S. AFRICANA Al. Braun in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1857) app. 19. — Guinée, Kaméroun, Zanzibar, Madagascar.
- S. Wallichii** Spring, *Enum. Lycopod.* (1841) n. 73 et *Monog. Lycopod.* II 143 ; Baker in *Journ. of Bot.* (1885) 19 et *Fern Allies* 90. LYCOPODIUM — Greville et Hooker, *Enum. Fil.* in Hooker, *Bot. Miscell.* II (1831) L. 384. ELEGANS Wallich (non Desvaux), *Catal.* (1829) n. 128. — Indes Orient., Indo-Chine, Java, Moluques, Philippines, Nouvelle-Guinée.

**Selaginella Willdenowii Baker** in *Gard. Chron.* (1867) 950; in *Journ. of Bot.* (1885) 22 et *Fern Allies* 93. *LYCOPodium lævigatum* Willdenow (non Lamarck), *Sp. Pl.* V (1810) 45. *SELAGINELLA* — Spring, *Monog. Lycopod.* II (1850) 137. *LYCOPodium* — Desvaux in Poirer, *Encycl. Méth. Bot.* III (1789) 652; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 57. — Himalaya or., Philippines, Cochinchine, péninsule et îles Malaises.

## CLIX. LYCOPODIACÉES

1. *LYCOPodium* Linné, *Gen. Pl.* ed. I (1737) n. 792 pr. p.  
— Genre d'une centaine d'espèces, répandu dans le monde entier.

**L. dichotomum** Jacquin, *Hort. Vindob.* III (1776) 26 t. 45; Spring, *Monog. Lycopod.* I 41 et II 18; Grisebach, *Fl. Brit. West Ind.* 647; Baker, *Fern Allies* 16. — Antilles; du Mexique au Pérou et au Brésil austr.

**L. Phlegmaria** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1564; Blume, *Enum. Fil. Javæ* 261; Spring, *Monog. Lycopod.* I 63; Bentham, *Fl. Austral.* VII 674; Baker, *Fern Allies* 22. *LEPIDOTIS* — Palisot de Beauvois, *Prodr. Æthéogamie* (1805) 110. — Rég. trop. de l'Ancien Monde (de l'Inde au Queensland et à la Nouvelle-Zélande).

**L. Selago** Linné, *Sp. Pl.* ed. II (1763) 1568; *Fl. Dan.* (1763) t. 104; *Engl. Bot.* (1795) t. 233; Schkuhr, *Farnkr.* t. 159; Spring, *Monog. Lycopod.* 19; Bentham, *Fl. Austral.* VII 674; Baker, *Fern Allies* 9. — Europe, Asie, Amérique et Australie; Açores, Madère, Ascension.

**L. taxifolium** Swartz, *Fl. Ind. Occid.* III (1806) 1573; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 131; Spring, *Monog. Lycopod.* I 31 et II 13; Baker, *Fern Allies* 16. *PLANANTHUS* — Palisot de Beauvois, *Prodr. Æthéogamie* (1805) 112. — Antilles et du Mexique au Brésil austr.

**L. volubile** Forster, *Prodr. Fl. Insul. Austr.* (1786) 86; Spring, *Monog. Lycopod.* I 105; Hooker et Greville, *Icon. Fil.* t. 170; Hooker f., *Handb. New Zeal. Fl.* 391; Bentham, *Fl. Austral.* VII 677. *L. SPECTABILE* Blume, *Enum. Fil. Javæ* (1850) 264; Baker, *Fern Allies* 29. — Penang, Java, Bornéo, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie.

## CLX. RHIZOCARPÉES

1. **AZOLLA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.* I (1783) 343. — Genre de 5 espèces des régions chaudes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Australie.

**A. Caroliniana** Willdenow, *Sp. Pl.* V (1810) 541 ; Kuhn in Martius, *Fl. Brasil.* I 659 t. 82 ; Baker, *Fern Allies* 138. — Des États-Unis mérid. à la république Argentine.

2. **MARSILEA** Linné, *Gen. Pl. ed. I* (1737) n. 799. — Genre de 40 espèces des régions tempérées chaudes, subtrop. et trop. du monde entier.

**M. quadrifolia** Linné, *Sp. Pl. ed. I* (1753) 1099 ; Schkuhr, *Farnkr.* t. 173 ; Mettenius, *Rhizocarp.* t. 2 et 3 ; Baker, *Fern Allies* 139. — Europe centr., Asie, Amérique bor.

**M. Drummondii** A. Braun in *Linnaea* XXV (1852) 721 ; Bentham, *Fl. Austral.* VII (1878) 684. **M. MULLERI** A. Braun in *Linnaea* XXV (1852) 721. **M. MACROPUS** Hooker, *Icon. Plant.* X (1854) t. 909 ; *Garden Ferns* t. 63. — Australie.

---

# TABLE DES FAMILLES ET DES GENRES

(Noms admis et synonymes.)

Dans cette table, les familles sont indiquées en petites capitales, les genres admis en caractères ordinaires, les synonymes en caractères italiques. Pour ces derniers il est fait mention de toutes les pages où il en est question dans ce volume.

---

Abelia 160.  
Abies 498.  
*Abies* 492, 493, 493-99, 500.  
Abutilon 51.  
Acacia 74.  
*Acacia* 74.  
Acæna 86.  
*Acæna* 87.  
Acampe 345.  
ACANTHACÉES 244.  
Acantholimon 196.  
Acanthophippium 294.  
Acanthophyllum 42.  
Acanthostachys 370.  
Acanthus 245.  
Acer 63.  
*Acer* 63.  
ACERACÉES 63.  
Aceranthus 20.  
*Aceras* 354.  
Achillea 171.  
*Achillea* 171, 172.  
Achimenes 237.  
*Achimenes* 237.  
Achlys 21.  
Achyranthes 256.  
Acineta 321.

*Acineta* 321.  
Aciphylla 156.  
Acokanthera 212.  
Aconitum 14.  
*Aconitum* 14.  
Acorus 474.  
*Acorus* 474.  
Acosmia 42.  
*Acropera* 318, 319.  
*Acropteris* 528.  
*Acrostichum* 509, 528.  
*Actinospora* 15.  
Ada 337.  
*Adamsia* 438.  
Adenocarpus 66.  
*Adenocarpus* 66.  
Adiantum 513.  
*Adiantum* 511, 513-18.  
Adlumia 24.  
Adonis 6.  
*Æchmea* 372.  
*Æchmea* 372-74.  
*Æonium* 115.  
*Aeranthus* 348, 349.  
Aerides 341.  
*Aerides* 344-47.  
*Æschynanthus* 240.

- Æschynanthus* 240-241.  
*Æsculus* 63.  
*Æthionema* 33.  
*Æthionema* 33.  
*Agallostachys* 368.  
*Agalmyla* 241.  
*Agapanthus* 427.  
*Agapanthus* 247.  
*Agave* 406.  
*Agave* 406-08.  
*Aglaomorpha* 538.  
*Agraphis* 440.  
*Agropyrum* 490.  
*Agrostemma* 45.  
*Akebia* 18.  
*Albizzia* 75.  
*Albica* 435.  
*Alcea* 50, 51.  
*Alchemilla* 86.  
*Alchemilla* 86, 87.  
*Aletris* 435.  
 ALISMACÉES 482.  
*Allamanda* 212.  
*Allium* 430.  
*Allium* 429-35.  
*Alloplectus* 239.  
*Allosurus* 519-20.  
*Alnaster* 273.  
*Alnus* 273.  
*Alocasia* 477.  
*Aloe* 415.  
*Aloe* 413-21.  
*Alopecurus* 487.  
*Alpinia* 366.  
*Alsine* 46, 47.  
*Alsophila* 508.  
*Alsophila* 508.  
*Alstræmeria* 405.  
*Althæa* 50, 51.  
*Alyssum* 29.  
*Alyssum* 29.  
 AMARANTACÉES 256.  
 AMARYLLIDÉES 395.  
*Amaryllis* 400.  
*Amaryllis* 398-401, 405.  
*Amblirion* 451.  
*Ambrosinia* 481.  
*Amelanchier* 92.  
*Amelanchier* 92.  
*Amiantanthus* 466.  
*Amianthium* 466.  
*Amomophyllum* 475.  
*Amorpha* 69.  
*Amorpha* 69.  
*Amorphophallus* 476.  
 AMPELIDÉES 62.  
*Amphoricarpus* 178.  
*Amsonia* 212.  
*Amygdalus* 77.  
*Anacampseros* 48.  
 ANACARDIACÉES 65.  
*Anagallis* 208.  
*Anarrhinum* 231.  
*Anchonium* 35.  
*Anchasa* 225.  
*Ancistrum* 86.  
*Androsace* 203.  
*Andromeda* 193.  
*Anemia* 544.  
*Anemia* 544.  
*Anemone* 4.  
*Anemone* 4, 5.  
*Anemonopsis* 13.  
*Anemonopsis* 13.  
*Angelica* 155.  
*Angræcum* 347.  
*Angræcum* 346-49.  
*Anguloa* 318.  
*Anguloa* 319.  
*Anhalonium* 135.  
*Anisopetalum* 292.  
*Anæctochilus* 351.  
 ANONACÉES 17.  
*Anoplophytum* 378.  
*Anopterus* 105.  
*Anthemis* 172.  
*Anthemis* 171.  
*Anthericum* 425.  
*Anthericum* 425-27, 456, 462.  
*Antholyza* 394.  
*Antholyza* 394.  
*Anthriscus* 155.  
*Anthurium* 473.  
*Anthurium* 473, 475.



- Anthyllis* 67.  
*Anticlea* 466.  
*Antirrhinum* 230-31.  
*Aphelandra* 246.  
*Apicra* 417.  
*Apicra* 417-20.  
*Apios* 73.  
*Aplectrum* 286.  
 APOCYNACÉES 212.  
*Aponogeton* 483.  
*Aponogeton* 483.  
*Aquilegia* 11.  
*Aquilegia* 11-13.  
*Arabis* 26.  
*Arabis* 26-27.  
*Aralia* 157.  
*Aralia* 157.  
 ARALIACÉES 157.  
*Araucaria* 492.  
*Araucaria* 492.  
*Araujia* 214.  
*Areca* 470.  
*Arenaria* 46.  
*Arenaria* 46, 47.  
*Arethusa* 353.  
*Argemone* 23.  
*Argyrolobium* 66.  
*Arisæma* 478.  
*Arisæma* 478.  
*Arisarum* 479.  
*Arisarum* 479.  
*Aristolochia* 259.  
*Aristolochia* 259-60.  
*Armeria* 197.  
*Arnebia* 225.  
 AROIDÉES 473.  
*Aronia* 92.  
*Arpophyllum* 283.  
*Arpophyllum* 284.  
*Arrhoxystylis* 244.  
*Artemisia* 173.  
*Artemisia* 174.  
*Arthropodium* 427.  
*Arum* 480.  
*Arum* 477-78, 481.  
*Arthrostemma* 120.  
*Arundinaria* 490.  
*Asarum* 259.  
*Asarum* 259.  
 ASCLEPIADÉES 214.  
*Asclepias* 214.  
*Asclepias* 214.  
*Asparagus* 440.  
*Asparagus* 410, 423.  
*Aspasia* 325.  
*Asperula* 164.  
*Asperula* 164, 165.  
*Asphodeline* 424.  
*Asphodeline* 424.  
*Asphodelus* 424.  
*Asphodelus* 424.  
*Aspidistra* 412.  
*Aspidistra* 412.  
*Aspidium* 530-31.  
*Aspidium* 510, 513, 526.  
*Asplenium* 524.  
*Asplenium* 525-28.  
*Astelia* 424.  
*Aster* 168.  
*Aster* 169.  
*Astilbe* 93.  
*Astragalus* 70.  
*Astragalus* 70-71.  
*Astrantia* 153.  
*Astrantia* 153.  
*Astrophytum* 434.  
*Ataccia* 408.  
*Athamanta* 155.  
*Athyrium* 526-28.  
*Atractylis* 178.  
*Atrogene* 1.  
*Atropa* 227.  
*Aubrietia* 29.  
*Aucuba* 158.  
*Avena* 488.  
*Avena* 488.  
*Azara* 39.  
*Azolla* 550.  
  
*Balantium* 510.  
*Baldingera* 487.  
*Ballota* 254.  
*Balsamorhiza* 171.  
*Bambusa* 491.

*Bambusa* 490-91.  
*Banffia* 43.  
*Baptisia* 65.  
*Barleria* 245.  
*Barlia* 354.  
*Basilea* 439.  
*Batemannia* 314.  
*Batschia* 225.  
*Beaucarnea* 423.  
*Begonia* 124.  
*Begonia* 124-25.  
 BEGONIACÉES 124.  
*Belis* 500.  
*Bellevalia* 436, 438.  
*Bellium* 168.  
*Bellium* 168.  
*Beloperone* 246.  
*Berardia* 180.  
 BERBERIDÉES 18.  
*Berberidopsis* 18.  
*Berberis* 18.  
*Berberis* 18.  
*Bertolonia* 120.  
*Bertolonia* 121.  
*Beschorneria* 406.  
*Betonica* 254.  
*Betula* 273.  
*Betula* 273.  
*Biarum* 479.  
*Biarum* 484.  
*Biebersteinia* 53.  
*Bifrenaria* 316.  
*Biglandularia* 238.  
*Bignonia* 243.  
 BIGNONIACÉES 243.  
*Billbergia* 371.  
*Billbergia* 368-74.  
*Biota* 502.  
*Biota* 502.  
*Biscutella* 33.  
 BIXINÉES 39.  
*Blechnum* 523.  
*Blechnum* 522-24.  
*Bletia* 295.  
*Bletia* 299, 306-09.  
*Bloomeria* 429.  
*Bocconia* 23.

*Bomarea* 405.  
*Bomarea* 405.  
*Bongardia* 19.  
 BORAGINÉES 223.  
*Borderea* 408.  
*Botryanthus* 436-37.  
*Botrychium* 545.  
*Botrychium* 545.  
*Boucerosia* 216.  
*Bougainvillæa* 256.  
*Bowiea* 425.  
*Brasenia* 21.  
*Brassavola* 300.  
*Brassavola* 307-08.  
*Brassia* 337.  
*Brassica* 32.  
*Bravoa* 406.  
*Braya* 32.  
*Brevoortia* 428.  
*Brevoortia* 428.  
*Brodiaea* 428.  
*Brodiaea* 428.  
*Bromelia* 368.  
*Bromelia* 368-74.  
 BROMELIACÉES 368.  
*Bromus* 490.  
*Browallia* 228.  
*Brunfelsia* 229.  
*Brunsvigia* 400.  
*Bryanthus* 194.  
*Buddleia* 217.  
*Buddleia* 217.  
*Bulbine* 425.  
*Bulbine* 425.  
*Bulbocodium* 460.  
*Bulbocodium* 460-61.  
*Bulbophyllum* 291.  
*Bulbophyllum* 292.  
*Buphthalmum* 171.  
*Bupleurum* 154.  
*Bupleurum* 154.  
*Burchardia* 461.  
*Burlingtonia* 323.  
*Butomus* 482.  
*Buxus* 268.  
*Buxus* 268.

- Cacalia 175.  
 Caccinia 223.  
 CACTÉES 126.  
 Cactus 128.  
*Cactus* 130, 134-37.  
 Cænopteris 518, 527-28.  
 CÆSALPINIÉES 74.  
 Caladium 477.  
 Calamintha 251.  
*Calamintha* 250.  
 Calanthe 298.  
*Calanthe* 299.  
 Calathea 266.  
 Calceolaria 230.  
 Calendula 177.  
 Calimeris 168.  
 Calla 476.  
*Calla* 476.  
*Calliprora* 429.  
*Callistachys* 486.  
 Callistemon 118.  
*Callixene* 411.  
 Calochortus 456.  
*Calochortus* 456-60.  
 Calopogon 353.  
 Calostemma 405.  
 Caltha 8.  
 CALYCANTHACÉES 15.  
 Calycanthus 15.  
*Calycanthus* 15.  
 Calypso 286.  
*Calysphyrum* 162.  
 Camassia 442.  
*Camassia* 442.  
 Camellia 50.  
 Campanula 186.  
*Compyloneuron* 536, 538.  
 Canarina 185.  
 CAPRIFOLIACÉES 159.  
*Caprifolium* 161.  
 Caragana 70.  
*Caragana* 69, 70.  
 Caraguata 376.  
 Cardamine 28.  
*Cardamine* 28.  
 Cardiandra 105.  
 Carduus 178.  
 Carex 485.  
*Carex* 485-86.  
 Carlina 178.  
 Carpenteria 105.  
 Carya 272.  
 CARYOPHYLLÉES 40.  
*Caryotaxus* 506-07.  
 Cassandra 192.  
*Cassebeera* 521.  
 Cassiope 192.  
 Catalpa 243.  
*Catalpa* 243.  
 Cattleya 303.  
*Cattleya* 303-10.  
 Ceanothus 61.  
 Cedrela 61.  
 Cedronella 252.  
*Cedronella* 252.  
 Cedrus 495.  
*Cedrus* 495.  
 Celsia 229.  
 Celtis 269.  
*Celtis* 269.  
 Cenchrus 488.  
 Centaurea 180.  
 Centradenia 119, 120.  
*Centradenia* 120.  
 Centranthus 166.  
*Centrosolenia* 239.  
*Cephalanthera* 353.  
 Cerastium 46.  
*Cerastium* 46.  
 Cerasus 76, 77.  
*Ceratochilus* 319, 320.  
 Cercis 74.  
 Cereus 136.  
*Cereus* 132, 134, 136-45.  
 Ceropegia 215.  
 Cestrum 228.  
 Chænomeles 89.  
 Chænostoma 232.  
 Chærophyllum 154.  
*Chærophyllum* 154.  
*Chaixia* 242.  
 Chamæcyparis 503.  
*Chamæcyparis* 502-04.  
*Chamæcirion* 461.

Chamærops 471.  
*Chamærops* 470, 471.  
 Cheilanthes 517.  
*Cheilanthes* 509, 518-20.  
 Cheiranthus 26.  
*Cheiranthus* 32.  
*Chelidonium* 23.  
*Chelonanthera* 298.  
*Chelone* 232.  
*Chevalieria* 374.  
 Chilidanthus 398.  
 Chimaphila 195.  
 Chimonanthes 16.  
 Chiogenes 191.  
 Chionodoxa 139.  
 Chirita 241.  
*Chironia* 218.  
 Chlorogalum 425.  
*Chlorogalum* 442.  
 Choisyia 60.  
 Chondrosea 95, 98-100.  
 Chorizema 65.  
 Chrysanthemum 173.  
*Chrysanthemum* 172-73.  
*Chrysocoptis* 11.  
 Chysis 295.  
 Cicer 72.  
*Cienkowskyia* 365.  
 Cimicifuga 15.  
*Cineraria* 176.  
 Circæa 123.  
 Cirrhopetalum 293.  
 Cissus 62.  
 CISTINÉES 36.  
 Cistus 36.  
*Cistus* 36.  
 Citrus 60.  
 Claytonia 48.  
 Cleisostoma 347.  
*Cleisostoma* 347.  
 Cleistes 353.  
 Clematis 1.  
*Clematis* 1-3.  
 Clerodendron 248.  
*Clerodendron* 248.  
 Clethra 195.  
 Cleyera 50.

Clintonia 464.  
*Clintonia* 464.  
 Clivia 401.  
 Cnicus 179.  
 Cochlioda 325.  
 Cochliostema 467.  
*Cochliostema* 467.  
 Cocos 472.  
*Cocos* 472.  
 Codonopsis 185.  
 Cœlia 293.  
 Cœlogyne 296.  
*Cœlogyne* 296-98.  
*Cœtocapnia* 406.  
 Coffea 163.  
*Coffea* 163.  
 Colax 317.  
 Colchicum 459.  
*Colchicum* 459-60.  
 Columnnea 239.  
 Coluria 82.  
*Comaropsis* 81.  
 COMMELINACÉES 467.  
 CONIFÈRES 492.  
*Convallaria* 411.  
 CONVULVULACÉES 226.  
 Convolvulus 226.  
*Convolvulus* 226.  
 Coptis 10.  
*Corbularia* 395.  
*Corchorus* 79.  
 Cordyline 423.  
*Coresanthe* 380.  
 CORNACÉES 158.  
 Cornus 158.  
 Coronilla 72.  
 Correa 60.  
*Correa* 60.  
 Cortusa 205.  
 Corydalis 24.  
*Corydalis* 25.  
 Corylopsis 118.  
*Corypha* 471.  
 Cotoneaster 92.  
*Cotoneaster* 92.  
 Cotula 173.  
*Cotyledon* 106-13.

- Craspedia* 170.  
*Craspedia* 170.  
*Crassocephalum* 173.  
*Crassula* 106.  
*Crassula* 106-08.  
 CRASSULACÉES 106.  
*Cratægus* 91.  
*Cratægus* 91.  
*Crinum* 399.  
*Crinum* 399-401, 403.  
*Crocanthus* 393.  
*Crococoma* 393.  
*Crocus* 388.  
*Crocus* 388-92.  
*Croton* 268.  
*Crucianella* 165.  
 CRUCIFÈRES 26.  
*Cryptanthus* 369.  
*Cryptanthus* 369.  
*Cryptochilus* 296.  
*Cryptogramma* 520.  
*Cryptomeria* 500.  
*Cryptotania* 154.  
*Ctenanthe* 366.  
*Cucubalus* 43, 45.  
 CUCURBITACÉES 123.  
*Cunninghamia* 500.  
*Cunninghamia* 500.  
*Cupressus* 503.  
*Cupressus* 501-04.  
 CUPULIFÈRES 273.  
*Curmeria* 476.  
*Curtogyne* 107.  
*Cyanophyllum* 121.  
*Cyanotis* 468.  
*Cyclamen* 206.  
*Cyclobothra* 456-58.  
*Cydonia* 89.  
*Cydonia* 89.  
*Cyllenium* 479.  
*Cymbidium* 311.  
*Cymbidium* 295-98, 300, 311-13, 345, 353.  
*Cynanchum* 214.  
*Cynoglossum* 224.  
*Cynoglossum* 224.  
*Cynosurus* 489.
- CYPERACÉES 483.  
*Cyperorchis* 312.  
*Cyperus* 483.  
*Cyperus* 483.  
*Cyphia* 184.  
*Cypripedium* 359.  
*Cypripedium* 286, 359-65.  
*Cyrtanthera* 246.  
*Cyrtanthus* 401.  
*Cyrtochilum* 326, 328, 333, 335.  
*Cyrtodeira* 237, 239.  
*Cyrtopodium* 313.  
*Cystopteris* 513.  
*Cystopteris* 513.  
*Cytisus* 67.  
*Cytisus* 66, 67.  
*Czackia* 425.
- Dactylanthus* 266.  
*Dactylis* 489.  
*Dactylis* 489.  
*Dalechampia* 269.  
*Dalibarda* 80.  
*Dalibarda* 80, 81.  
*Danaë* 410.  
*Daphne* 263.  
*Daphne* 264.  
*Darea* 525, 528.  
*Darlingtonia* 22.  
*Dasyllirion* 423.  
*Dasyllirion* 423.  
*Datura* 228.  
*Davallia* 511.  
*Davallia* 511-12.  
*Delphinium* 13.  
*Delphinium* 13.  
*Dendrobium* 286.  
*Dendrobium* 286-92, 345.  
*Dendrochilum* 292.  
*Dendrochilum* 285-86.  
*Dendrophylax* 349.  
*Dentaria* 28.  
*Desfontainca* 217.  
*Desfontainea* 217.  
*Dethawia* 155.  
*Deutzia* 104.  
*Deutzia* 104.

*Dianthus* 40.  
*Dianthus* 40-42.  
*Diastema* 237.  
*Dicentra* 24.  
*Dicentra* 24.  
*Dichelostemma* 428.  
*Dichorisandra* 467.  
*Dichorisandra* 467.  
*Dicksonia* 510.  
*Dicliptera* 247.  
*Diclytra* 24.  
*Dictamnus* 59.  
*Dictamnus* 59.  
*Dicyrta* 237.  
*Didymocarpus* 242.  
*Dielytra* 24.  
*Dienia* 284.  
*Diervilla* 162.  
*Digitalis* 233.  
*Dioscorea* 409.  
*Dioscorea* 408, 409.  
 DIOSCORÉACÉES 408.  
*Diospyros* 209.  
*Diospyros* 209.  
*Diplachne* 489.  
*Diplazium* 528.  
*Diplechthrum* 356.  
*Diplopappus* 168.  
*Dipodium* 313.  
*Disa* 357.  
*Disa* 357, 358.  
*Disisocactus* 142.  
*Disperis* 358.  
*Disporum* 463.  
*Disteganthus* 370.  
*Dodartia* 233.  
*Dodecatheon* 206.  
*Dœllingeria* 168.  
*Dolichodeira* 238.  
*Dondia* 153.  
*Doodia* 524.  
*Doodia* 524.  
*Doritis* 341.  
*Doronicum* 175.  
*Doronicum* 175.  
*Dorstenia* 270.  
*Dorstenia* 270.

*Doryopteris* 521.  
*Dossinia* 351.  
*Draba* 30.  
*Draba* 27, 30, 31.  
*Dracæna* 422.  
*Dracæna* 410, 464.  
*Dracocephalum* 252.  
*Dracocephalum* 252.  
*Dracontium* 475, 476.  
*Dracunculus* 481.  
*Dracunculus* 481.  
*Drimys* 16.  
*Dryas* 80.  
*Dryas* 81.  
*Dupinia* 50.  
*Dyckia* 376.  
*Dyckia* 376.  
  
*Earina* 296.  
 EBÉNACÉES 209.  
*Ebenus* 72.  
*Echeveria* 108, 109.  
*Echinaria* 488.  
*Echinocactus* 132.  
*Echinocactus* 132-141.  
*Echinocereus* 136-141.  
*Echinonoyctanthus* 137-42.  
*Echinops* 178.  
*Echinopsis* 135, 137-38, 141-42.  
*Echinostachys* 372, 374.  
*Echioglossum* 347.  
*Echium* 225.  
 ELÆAGNÉES 264.  
*Elæagnus* 264.  
*Elæagnus* 264-65.  
*Elaphoglossum* 542.  
*Elatostema* 271.  
*Elyna* 484.  
*Eminium* 481.  
 EMPETRACÉES 276.  
*Empetrum* 276.  
*Encyclia* 302.  
*Endressia* 155.  
*Enemion* 11.  
*Ephedra* 492.  
*Ephedra* 492.  
*Epidendrum* 300.

- Epidendrum* 297, 300-05, 312, 319, 330, 349-50.  
*Epigæa* 193.  
*Epilobium* 122.  
*Epilobium* 122.  
*Epimedium* 19.  
*Epimedium* 19, 20.  
*Epipactis* 353.  
*Epipactis* 350.  
*Epiphora* 313.  
*Epiphyllum* 142.  
*Epipremnum* 475.  
*Epipremnum* 475.  
*Episcia* 239.  
*Eranthis* 10.  
*Eremophila* 247.  
*Eremostachys* 253.  
*Eremurus* 426.  
*Eremurus* 426.  
*Eria* 293.  
*Eria* 296.  
*Erica* 193.  
*Erigenia* 153.  
*Erigeron* 169.  
*Erigeron* 169.  
*Erinacea* 67.  
*Erinus* 234.  
*Erinus* 234.  
*Eriocnema* 120.  
*Eriogonum* 257.  
*Eriogonum* 257.  
*Eriopsis* 316.  
*Erodium* 53.  
*Erodium* 53.  
*Eryngium* 152.  
*Erysimum* 32.  
*Erythræa* 218.  
*Erythrina* 73.  
*Erythronium* 453.  
*Eucharis* 402.  
*Eucharis* 402.  
*Eucodonia* 237.  
*Eucomis* 439.  
*Eucomis* 439.  
*Eugenia* 119.  
*Eulophia* 310.  
*Eulophia* 310.  
*Eunonia* 33.  
*Eunonia* 33.  
*Eupatorium* 167.  
*Euphorbia* 265.  
*Euphorbia* 265-67.  
*EUPHORBIACÉES* 265.  
*Eurycles* 404.  
*Eurycles* 404.  
*Eustephia* 402.  
*Exolobus* 216.  
*Ewaldia* 124.  
  
*Falkia* 226.  
*Farsetia* 28.  
*Fatsia* 157.  
*Fernandezia* 338.  
*Ferraria* 388.  
*Ferraria* 387.  
*Ferula* 156.  
*Ferulago* 156.  
*Festuca* 490.  
*Festuca* 489-90.  
*Ficinia* 484.  
*FICOIDÉES* 147.  
*Ficus* 270.  
*Ficus* 270.  
*Fiedleria* 42.  
*Filago* 169.  
*Filipendula* 78.  
*Fitzroya* 501.  
*Fontanesia* 211.  
*Forsythia* 210.  
*Forsythia* 210.  
*FOUGÈRES* 507.  
*Fragaria* 82.  
*Franciscea* 229.  
*Francoa* 101.  
*Fraxinus* 211.  
*Fraxinus* 211.  
*Freesia* 393.  
*Freesia* 393.  
*Fremontia* 52.  
*Fritillaria* 448.  
*Fritillaria* 448-51, 453.  
*Fuchsia* 122.  
*Fumaria* 24, 25.  
*FUMARIACÉES* 24.

*Funkia* 412.  
*Funkia* 412.  
  
*Gagea* 455.  
*Gagea* 454, 456.  
*Galanthus* 397.  
*Galax* 196.  
*Galeandra* 311.  
*Galium* 164.  
*Gardenia* 162.  
*Gardenia* 163.  
*Garrielia* 376.  
*Garrya* 159.  
*Gasteria* 413.  
*Gasteria* 413-14.  
*Gaultheria* 192.  
*Geiseleria* 268.  
*Geissois* 106.  
*Geissomeria* 246.  
*Genista* 66.  
*Gentiana* 218.  
 GENTIANÉES 218.  
 GERANIACÉES 53.  
*Geranium* 54.  
*Geranium* 54-58.  
*Gesneria* 238.  
*Gesneria* 238-39.  
 GESNERIACÉES 237.  
*Geum* 81.  
*Geum* 82.  
*Ghiesbreghtia* 229.  
*Gillenia* 79.  
*Ginkgo* 506.  
*Gireoudia* 124-25.  
*Gladiolus* 394.  
*Gladiolus* 393-94.  
*Glaziová* 472.  
*Gleichenia* 507.  
*Gleichenia* 507-08.  
*Globba* 365.  
*Globularia* 248.  
 GLOBULARIÉES 248.  
*Globulea* 106, 108.  
*Gloxinia* 237.  
*Gloxinia* 237-38.  
*Glycine* 73.  
*Glyptostrobus* 501.

*Gnaphalium* 170.  
*Gnaphalium* 169-70.  
 GNÉTACÉES 492.  
*Gomesa* 337.  
*Gonatopus* 474.  
*Gongora* 318.  
*Gongora* 319.  
*Goniophlebium* 537, 539.  
*Goodyera* 352.  
*Goodyera* 351.  
*Gossypium* 52.  
*Govenia* 313.  
 GRAMINÉES 486.  
*Grammangis* 312.  
*Grammatophyllum* 312.  
*Grammatophyllum* 312.  
*Grevillea* 263.  
*Griffinia* 399.  
*Grindelia* 167.  
*Grisebachia* 470.  
*Griselinia* 159.  
*Guillonea* 156.  
*Guzmannia* 377.  
*Guzmannia* 368.  
*Gyas* 295.  
*Gymnadenia* 355.  
*Gymnocalycium* 133.  
*Gymnocladus* 74.  
*Gymnogramme* 540-41.  
*Gymnogramme* 540-41.  
*Gymnomesium* 480.  
*Gypsophila* 42.  
*Gypsophila* 42.  
*Gyromia* 464.  
  
*Habenaria* 355.  
*Habenaria* 354-56.  
*Haberlea* 242.  
*Habrothamnus* 227-28.  
*Hacquetia* 153.  
*Hæmanthus* 401.  
*Hemanthus* 402.  
*Hakea* 263.  
*Hakea* 263.  
*Halimodendron* 69.  
 HAMAMELIDÉES 117.  
*Hamamelis* 118.



*Hamamelis* 117.  
*Hamelinia* 424.  
*Hariota* 143.  
*Haworthia* 418.  
*Haworthia* 418-21.  
*Hebenstreitia* 247.  
*Hechtia* 376.  
*Hechtia* 376.  
*Hedera* 558.  
*Hedera* 154.  
*Hedychium* 365.  
*Hedysarum* 72.  
*Helcia* 325.  
*Heleastrum* 168.  
*Helianthemum* 36.  
*Helichrysum* 170.  
*Helichrysum* 170.  
*Helicia* 262.  
*Helicodea* 371.  
*Helocodicros* 481.  
*Helicodicros* 481.  
*Heliconia* 367.  
*Helicophyllum* 480.  
*Helicophyllum* 480-81.  
*Helleborus* 9.  
*Helleborus* 9-11.  
*Helonias* 461, 466-67.  
*Hemerocallis* 412.  
*Hemerocallis* 412, 425.  
*Henningia* 426.  
*Hepatica* 4.  
*Heracleum* 156.  
*Heracleum* 156.  
*Herminium* 355.  
*Herminium* 355.  
*Hermodactylus* 387.  
*Hesperis* 26.  
*Hesperaloe* 421.  
*Hesperochiron* 223.  
*Hesperoscordium* 429.  
*Heterochaeta* 168.  
*Heuchera* 102-03.  
*Hexacentris* 244.  
*Hexisea* 299.  
*Hibiscus* 51.  
*Hibiscus* 51.  
*Hieracium* 182.

*Himantophyllum* 401.  
*Higginsia* 162.  
 HIPPOCASTANÉES 63.  
*Hohenbergia* 370-74.  
*Hoitzia* 222.  
*Hollboellia* 486.  
*Homalomena* 476.  
*Homalomena* 476.  
*Homogyne* 174.  
*Honckenya* 47.  
*Hookera* 428.  
*Hoplophytum* 372-74.  
*Hosta* 412.  
*Houlletia* 321.  
*Houlletia* 321.  
*Howea* 470.  
*Hoya* 215.  
*Hugueninia* 31.  
*Hulthemia* 87.  
*Humata* 512.  
*Huntleya* 314.  
*Hyacinthus* 436-38, 440.  
*Hydrangea* 104.  
*Hydrangea* 104, 105.  
*Hydrastis* 9.  
 HYDROCHARIDÉES 276.  
*Hydrocleis* 482.  
*Hydrocotyle* 152.  
*Hydrocotyle* 152.  
*Hydropeltis* 21.  
 HYDROPHYLLACÉES 222.  
*Hydrophyllum* 222.  
*Hymenanthera* 39.  
*Hymenocallis* 404.  
*Hymenocallis* 404.  
*Hymenophyllum* 510.  
*Hymenophyllum* 511.  
*Hyoscyamus* 228.  
 HYPERICINÉES 49.  
*Hypericum* 49.  
*Hypericum* 44, 50.  
*Hypæstes* 247.  
*Hyssopus* 250.  
  
*Iberis* 34.  
*Iberis* 33, 34.  
*Ibidium* 351.

*Ictodes* 476.  
*Ilex* 61.  
*Ilex* 60.  
 ILICINÉES 61.  
*Illicium* 16.  
*Illicium* 16.  
*Illus* 396.  
*Imantophyllum* 401.  
*Impatiens* 59.  
*Impatiens* 59.  
*Incarvillea* 243.  
*Indigofera* 69.  
*Iochroma* 227.  
*Iochroma* 227.  
*Ionopsis* 333.  
*Ipomæa* 226.  
*Ipomæa* 226.  
 IRIDÉES 379.  
*Iris* 379.  
*Iris* 380-87.  
*Iridorchis* 311.  
*Isatis* 35.  
*Ischarum* 479.  
*Isochilus* 300.  
*Isolepis* 484.  
*Isoloma* 238.  
*Isopyrum* 11.  
*Itea* 405.  
*Ixia* 392.  
*Ixia* 392-94.  
*Ixiolirion* 405.  
*Ixiolirion* 405.  
*Ixora* 163.  
*Ixora* 163.

*Jaborosa* 227.  
*Jacobeæa* 176.  
*Jacobinia* 246.  
*Jambosa* 119.  
*Janthe* 229.  
*Jasione* 185.  
*Jasminum* 209.  
*Jasminum* 210.  
*Jeffersonia* 20.  
*Joniris* 384, 386.  
*Jubæa* 472.  
 JUGLANDÉES 272.

*Juglans* 272.  
*Juglans* 272.  
 JUNCACÉES 468.  
*Juncus* 468.  
*Juncus* 468-69.  
*Juniperus* 504.  
*Juniperus* 504-06.  
*Jurinea* 179.  
*Justicia* 246.  
*Justicia* 246.  
  
*Kadsura* 17.  
*Kæmpferia* 365.  
*Kalanchoe* 108.  
*Kalanchoe* 109.  
*Kalmia* 194.  
*Karatas* 368-69.  
*Kaufmannia* 203.  
*Kefersteinia* 314-15.  
*Kentia* 470.  
*Kerria* 79.  
*Knesebeckia* 124-25.  
*Kobresia* 484.  
*Kœllikeria* 237.  
*Koelreuteria* 62.

LABIÉES 249.  
*Laburnum* 66.  
*Lachenalia* 435.  
*Lachenalia* 435.  
*Lælia* 307.  
*Lælia* 307-09.  
*Lamium* 254.  
*Lampsana* 373-74.  
*Lantana* 248.  
*Lapageria* 410.  
*Lapiedra* 398.  
*Laricio* 493.  
*Larix* 493.  
*Larix* 495-96.  
*Laserpitium* 156.  
*Laserpitium* 155.  
*Lasiandra* 120.  
*Latania* 471.  
*Latania* 471.  
*Lathyrus* 73.  
 LAURINÉES 262.  
*Laurus* 262, 240.

Lavandula 249.  
 Ledum 194.  
 LÉGUMINOSÉES 65.  
 Leontice 19.  
*Leontice* 19, 21.  
 Leontodon 183.  
 Leontopodium 169.  
 Lepanthes 277.  
*Lepanthes* 277.  
 Leopoldia 436.  
 Lepidium 33.  
*Lepismium* 143.  
*Leptinella* 173.  
*Leptochloa* 489.  
*Leptotes* 306.  
 Lespedeza 72.  
*Leucanthemum* 173.  
*Leuchtenbergia* 132.  
 Leucoium 397.  
*Leucoium* 397.  
*Leucostegia* 512.  
 Leuzea 180.  
 Lewisia 48.  
 Liatris 167.  
 Libocedrus 501.  
*Lievena* 372.  
*Ligularia* 175.  
 Ligusticum 155.  
*Ligusticum* 155.  
 Ligustrum 211.  
*Ligustrum* 211.  
 LILIACÉES 409.  
*Liliorhiza* 449-50.  
 Lilium 444.  
*Lilium* 444-51.  
 Limnocharis 482.  
*Limnocharis* 482.  
*Limodorum* 295, 299, 310, 348.  
 Linaria 230.  
*Linaria* 230.  
 Linderia 262.  
 LINÉES 53.  
 Linnæa 160.  
 Linum 53.  
*Linum* 53.  
 Liparis 284.  
*Liparis* 285.

Lippia 248.  
 Liquidambar 118.  
*Liquidambar* 118.  
 Liriodendron 17.  
 Lissochilus 310.  
 Listera 350.  
 Listrostachys 349.  
 Lithospermum 225.  
*Lithospermum* 225.  
*Litobrochia* 520-21.  
 Littonia 463.  
 Livistona 471.  
 Lloydia 456.  
*Lloydia* 456.  
 Lobelia 184.  
 Lockhartia 338.  
 Loddigesia 68.  
 Læselia 222.  
 LOGANIACÉES 217.  
 Loiseleuria 193.  
 Lomaria 522.  
*Lomaria* 522-23.  
 Lonchitis 517.  
 Lonicera 161.  
*Lonicera* 161, 217.  
 Lopezia 123.  
 Lopholepis 486.  
 Luisia 339.  
*Luisia* 344.  
 Luzula 469.  
*Luzula* 469.  
 Luzuriaga 411.  
 Lycaste 317.  
*Lycaste* 316-18.  
 Lychnis 45.  
 Lycomormium 316.  
 LYCOPODIACÉES 549.  
 Lycopodium 549.  
*Lycopodium* 545-49.  
*Lycopsis* 225.  
 Lycoris 400.  
 Lysimachia 207.  
 Lysionotus 240.  
  
 Macadamia 262.  
 Macleania 191.  
 Maclura 269.

- Macradenia* 302.  
*Macrochordion* 372, 374.  
*Macroplectrum* 348.  
*Macropodium* 27.  
*Macrotomia* 225.  
*Magnolia* 16.  
*Magnolia* 17.  
 MAGNOLIACÉES 16.  
*Malacocarpus* 132, 133, 135, 139.  
*Malaxis* 284, 285.  
*Malcolmia* 31.  
*Malcolmia* 31.  
*Malus* 90.  
*Malva* 51.  
 MALVACÉES 50.  
*Malvastrum* 51.  
*Mamillaria* 126.  
*Mamillaria* 126-31.  
*Mandirola* 237.  
*Mandragora* 227.  
*Mantisia* 365.  
*Manulea* 232.  
*Maranta* 366.  
*Maranta* 366-69.  
*Marrubium* 253.  
*Marrubium* 253.  
*Marshallia* 171.  
*Marsilea* 550.  
*Marsilea* 550.  
*Masdevallia* 278.  
*Masdevallia* 278-83.  
*Massangea* 377-78.  
*Matthiola* 26.  
*Maxillaria* 322.  
*Maxillaria* 315-19, 322-23.  
*Maximowiczia* 17.  
*Mazus* 233.  
*Meconopsis* 23.  
*Medeola* 464.  
*Medeola* 440.  
*Medicago* 68.  
*Medinilla* 121.  
*Medinilla* 121.  
*Megaclinium* 292.  
*Megasea* 95.  
*Melaleuca* 118.  
*Melaleuca* 119.
- MELASTOMACÉES 119.  
*Melia* 61.  
 MÉLIACÉES 61.  
*Melissa* 251.  
*Melocactus* 126.  
*Melothria* 123.  
*Menyanthes* 221.  
*Menyanthes* 221.  
*Merendera* 460.  
*Merendera* 460-61.  
*Mertensia* 224.  
*Mertensia* 507-08.  
*Mesembryanthemum* 147.  
*Mesembryanthemum* 150-52.  
*Mesoclastes* 331.  
*Mesospinidium* 325, 337.  
*Mespilus* 91, 92.  
*Metrosideros* 119.  
*Metrosideros* 118.  
*Miconia* 121.  
*Micranthes* 97.  
*Micromeria* 250.  
*Micromeria* 250.  
*Microstylis* 284.  
*Milla* 428.  
*Milla* 428-29.  
*Miltonia* 336.  
*Miltonia* 328, 336, 337.  
*Mimosa* 74, 75.  
*Mimulus* 233.  
*Mitchella* 163.  
*Mitraria* 242.  
*Moltkia* 225.  
*Monadenia* 358.  
*Monanthes* 117.  
*Moneses* 195.  
*Monnina* 40.  
*Monocaryum* 459.  
*Monochaetum* 120.  
*Monochaetum* 120.  
*Monolena* 121.  
*Monstera* 475.  
*Monstera* 475.  
*Montbretia* 393.  
*Moraea* 385.  
*Moussonia* 238.  
*Muehlenbeckia* 258.

Musa 367.  
 MUSACÉES 367.  
 Muscari 436.  
*Muscari* 436-38.  
 Musschia 186.  
*Myconia* 242.  
*Myogalum* 443.  
 MYOPORINÉES 247.  
 Myosotis 224.  
*Myosotis* 224.  
 Myrica 272.  
 MYRICACÉES 272.  
 Myricaria 49.  
*Myriopteris* 518.  
 MYRTACÉES 118.  
 Myrtus 119.  
 Mystacidium 349.

*Nanolirion* 450.  
 Narcissus 395.  
*Narcissus* 395-96, 404.  
 NAIADÉES 483.  
*Nectaroscilla* 440.  
 Nemaconia 300.  
 Nemastylis 392.  
*Nemastylis* 392.  
 NEPENTHACÉES 258.  
 Nepenthes 258.  
*Nepenthes* 258-59.  
 Nepeta 252.  
 Nephrodium 532-34.  
*Nephrodium* 540.  
 Nephrolepis 534-35.  
*Nephrolepis* 534-35.  
 Nerine 400.  
*Nerine* 400.  
 Nerium 213.  
*Nerium* 213.  
*Neottia* 531.  
 Nertera 163.  
*Neubeckia* 382-83.  
 Neviusia 79.  
 Nidularium 368-69.  
*Nidularium* 368-70.  
 Nierembergia 228.  
*Nipholobolus* 537-39.  
 Nolina 423.

Nothoscordum 429.  
 Notylia 349.  
 Nuphar 21.  
 NYCTAGINÉES 256.  
 Nymphæa 21.  
*Nymphæa* 21.  
 NYMPHÆACÉES 21.  
  
*Oakesia* 462.  
 Ochna 60.  
 OCHNACÉES 60.  
 Ochropteris 517.  
 Octomeria 284.  
*Octomeria* 284, 294.  
 Odontoglossum 326.  
*Odontoglossum* 325-30, 335-37.  
 Oeceoclades 348.  
 OLÉACÉES 209.  
 Olearia 169.  
 OMBELLIFÈRES 152.  
 Omphalodes 223.  
 ONAGRARIÉES 122.  
 Oncidium 330.  
*Oncidium* 330-37.  
 Onoclea 508.  
*Onoclea* 522.  
 Ononis 68.  
*Ononis* 68.  
 Onychium 518.  
*Onychium* 523.  
*Ophianthe* 239.  
 Ophrys 355.  
*Ophrys* 284-85 ; 350-51, 353, 355.  
*Oplismenus* 487.  
 Opuntia 144.  
*Opuntia* 144-47.  
 ORCHIDÉES 276.  
 Orchis 354.  
*Orchis* 342, 348, 354-58.  
 Origanum 249.  
*Orithya* 451, 454.  
 Ornithidium 323.  
 Ornithocephalus 338.  
 Ornithogalum 442.  
*Ornithogalum* 426, 439-44, 455, 456.  
 Orobus 73.  
 Ortgiesia 374.

- Ortgiesia* 374.  
*Osmunda* 545.  
*Osmunda* 508, 520, 522, 553.  
*Othonna* 177.  
*Othonnopsis* 177.  
*Ourisia* 223.  
*Oxalis* 58.  
*Oxalis* 59.  
*Oxycoccus* 191.  
*Oxytropis* 71.  
  
*Pachidendron* 415.  
*Pachysandra* 268.  
*Pachystoma* 294.  
*Pæderota* 235.  
*Pæderota* 234-35.  
*Pæonia* 15.  
*Pæonia* 15.  
*Palisota* 467.  
 PALMACÉES 470.  
*Panax* 157.  
*Pancratium* 403.  
*Pancratium* 403-04.  
 PANDANACÉES 472.  
*Pandanus* 472.  
*Panicum* 487.  
*Panisea* 298.  
*Papaver* 22.  
 PAPAVERACÉES 22.  
*Paphinia* 317.  
*Paphiopedilum* 360-64.  
 PAPILIONACÉES 65.  
*Papyrus* 454.  
*Paradisía* 425.  
*Parathesis* 208.  
*Parietaria* 271.  
*Parnassia* 103.  
*Parrotia* 117.  
*Passerina* 264.  
 PASSIFLORÉES 123.  
*Passiflora* 123.  
*Pavia* 63.  
*Pectis* 168.  
*Pedicularis* 236.  
*Pelargonium* 56.  
*Pelargonium* 56.  
*Pelecyphora* 131.  
  
*Pellæa* 519.  
*Pellæa* 519.  
*Pellionia* 271.  
*Peltandra* 477.  
*Peltaria* 35.  
*Pentarhaphia* 239.  
*Pentstemon* 232.  
*Pentstemon* 231.  
*Pentlandia* 403.  
*Peperomia* 261.  
*Peperomia* 262.  
*Peristeria* 321.  
*Peristeria* 316, 321.  
*Pernettya* 192.  
*Persica* 77.  
*Pescatorea* 314.  
*Petilium* 449.  
*Petitia* 155.  
*Petrocallis* 31.  
*Petrocoptis* 45.  
*Phaca* 70, 71.  
*Phædranassa* 402, 403.  
*Phaius* 294.  
*Phaius* 294-95.  
*Phalænosis* 339.  
*Phalænopsis* 425-26, 442, 456.  
*Phalangium* 339-41.  
*Phalaris* 487.  
*Philadelphus* 105.  
*Philadelphus* 105.  
*Philesia* 411.  
*Philesia* 410-11.  
*Philodendron* 477.  
*Philodendron* 475.  
*Philogyne* 395.  
*Phlebodium* 536.  
*Phlomis* 254.  
*Phlomis* 254.  
*Phlox* 221.  
*Phlox* 221-22.  
*Phœnix* 470.  
*Pholidophyllum* 370.  
*Pholidota* 298.  
*Phormium* 412.  
*Photinia* 92.  
*Phrynium* 366-67.  
*Phycella* 403.

- Phygeliu 231.  
 Phylca 62.  
 Phyllanthu 266.  
 Phyllocactu 142.  
*Phyllocactu* 142.  
 Phyllocladu 491.  
 Phyllostachy 491.  
*Phyllotenu* 478.  
*Physematium* 509.  
 Physosiphon 277.  
*Phytarrhiza* 378.  
 Phyteuma 186.  
 PHYTOLACACÉES 256.  
 Picea 496.  
*Picea* 493, 496-500.  
 Pilea 271.  
*Pilocereu* 136-41.  
*Pilogyne* 123.  
 Pilumna 324.  
 Pimelea 263.  
*Pimelea* 263.  
 Pimpinella 154.  
 Pinu 492.  
*Pinu* 492-500.  
 Piper 251.  
*Piper* 261-62.  
 PIPÉRACÉES 260.  
*Pironneava* 373.  
 Pitcairnia 375.  
*Pitcairnia* 375, 377.  
*Pityrophyllum* 378.  
*Planera* 269.  
 PLANTAGINÉES 255.  
 Plantago 255.  
*Platanthera* 355-56.  
 PLATANÉES 271.  
 Platanu 271.  
*Platycladu* 501.  
*Platystachy* 378-79.  
 Platyclinis 285.  
 Platycodon 185.  
*Plectopoma* 237.  
*Pleione* 297-98.  
*Pleopeltis* 536, 538.  
 Pleurothallis 276.  
*Pleurothallis* 276-78.  
 Plumbago 198.  
 Poa 489.  
 Podocarpu 506.  
*Podocarpu* 506-07.  
 Podophyllum 20.  
*Podophyllum* 20.  
 Pogonia 353.  
 Pogostemon 249.  
*Pogostemon* 249.  
 POLÉMONIACÉES 224.  
 Polemonium 222.  
 Polyachyru 181.  
 Polygala 39.  
 POLYGALÉES 39.  
 Polygonatu 411.  
*Polygonatu* 411.  
 POLYGONÉES 257.  
 Polygonu 257.  
*Polygonu* 258.  
 Polypodium 509.  
*Polypodium* 513, 518, 523, 526.  
*Polyschemone* 45.  
 Polystachya 313.  
*Polystichum* 530-32, 535.  
 Ponera 300.  
 Populu 275.  
*Populu* 275-76.  
 Portulaca 48.  
*Portulaca* 48.  
 PORTULACÉES 48.  
 Potentilla 82.  
*Potentilla* 82-85.  
 Potho 473-76.  
 Pratia 184.  
*Preptanthe* 299.  
 Primula 199.  
 Pritzelia 124.  
 Prosartes 463.  
 PROTÉACÉES 262.  
*Prumnopity* 506.  
 Prunu 76.  
*Prunu* 76.  
*Pseudepidendrum* 302.  
 Pseudolarix 496.  
 Pseudotsuga 498.  
*Ptarmica* 171-72.  
 Pteris 520.  
*Pteris* 519-22.

*Pterocarya* 272.  
*Pterocarya* 272.  
*Pterocephalus* 166.  
*Pterostylis* 352.  
*Ptilotrichum* 29.  
*Pukateria* 159.  
*Pulmonaria* 224.  
*Pulmonaria* 224.  
*Pulsatilla* 5, 6.  
*Puschkinia* 430.  
*Puschkinia* 438.  
*Puya* 375, 377.  
*Pyrethrum* 173.  
*Pyrus* 89.  
*Pyrus* 89-92.  
  
*Queltia* 395.  
*Quercus* 273.  
*Quercus* 273.  
*Quesnelia* 372.  
*Quesnelia* 372.  
  
*Ramondia* 242.  
*Ranunculus* 6.  
*Ranunculus* 7, 8.  
*Reinwardtia* 53.  
*Renanthera* 344.  
 RENONCULACÉES 1.  
*Reseda* 35.  
 RÉSÉDACÉES 35.  
*Restrepia* 275.  
*Restrepia* 278.  
*Retinispora* 502-04.  
 RHAMNÉES 61.  
*Rhamnus* 269.  
*Rhaphidophora* 474.  
*Rhaphidophora* 474-75.  
*Rhazia* 212.  
*Rheum* 257.  
*Rhexia* 120.  
*Rhipsalis* 143.  
*Rhipsalis* 143.  
 RHIZOCARPÉES 550.  
*Rhodocistus* 36.  
*Rhododendron* 194.  
*Rhodostachys* 370.  
*Rhodotypus* 79.

*Rhœo* 468.  
*Rhopalostylis* 470.  
*Rhodorrhiza* 226.  
*Rhus* 65.  
*Rhynchostylis* 346.  
*Rhytidophyllum* 238.  
*Ribes* 106.  
*Ribes* 106.  
*Richardia* 477.  
*Richardia* 477.  
*Rigidella* 387.  
*Rigidella* 387.  
*Rivina* 256.  
*Robinia* 69, 70.  
*Rochea* 108.  
*Rochea* 107.  
*Rodriguezia* 323.  
*Rodriguezia* 337.  
*Rœzlia* 120.  
*Rogiera* 162.  
*Romanzowia* 223.  
*Romneya* 22.  
*Romulea* 392.  
*Romulea* 392.  
*Rondeletia* 162.  
*Rosa* 87.  
*Rosa* 87-89.  
 ROSACÉES 76.  
*Rubus* 80.  
*Rubus* 80.  
*Ruellia* 244.  
*Ruscus* 409.  
*Ruscus* 409.  
*Russelia* 232.  
 RUTACÉES 59.  
  
*Sabbatia* 218.  
*Sabina* 504-06.  
*Saccolabium* 346.  
*Saccolabium* 343, 347.  
*Sagittaria* 482.  
*Sagittaria* 482.  
 SALICINÉES 274.  
*Salix* 274.  
*Salix* 274-75.  
*Salpinga* 121.  
*Salvadora* 212.



## SALVADORACÉES 212.

Salvia 251.

*Salvia* 251.

Sameraria 35.

Sandersonia 462.

Sanguinaria 23.

Santolina 172.

SAPINDACÉES 62.

Saponaria 43.

*Saponaria* 43.

Sarcanthus 346.

Sarcocapnos 25.

*Sarcocapnos* 25.

Sarcochilus 341.

*Sarcoglottis* 351.*Sarcopodium* 292.

SARRACENIACÉES 22.

Satureja 250.

*Satureja* 250.

Satyrium 356.

*Satyrium* 356-58.

Sauromatum 479.

*Sauromatum* 479.

Saururus 260.

Saussurea 179.

Saxegothea 506.

Saxifraga 93.

*Saxifraga* 92-102.

SAXIFRAGÉES 93.

Scabiosa 166.

*Scabiosa* 166.*Scaphyglottis* 300.*Schivereckia* 30.

Schizandra 17.

Schizostylis 392.

*Schlumbergeria* 377.*Schœnolirion* 426.

Schomburgkia 309.

*Sciadocalyx* 238.

Scilla 439.

*Scilla* 425, 437-42.*Scindapsus* 474.

Scirpus 484.

*Scirpus* 484.

Scoliopus 464.

*Scoliopus* 464.

Scolopendrium 523.

*Scolopendrium* 529-30.

Scorzonera 184.

Scrophularia 231.

*Scrophularia* 231-32.

SCROPHULARINÉES 219.

Scutellaria 253.

Sedum 112.

*Sedum* 112-14.

SELAGINÉES 247.

Selaginella 545.

*Selaginella* 545-49.

SELAGINELLACÉES 549.

Selenipedium 363.

*Selenipedium* 363-64.

Selinum 155.

Sempervivum 115.

*Sempervivum* 115-17.

Senecio 175-77.

*Senecio* 175-76.*Septas* 108.

Sequoia 500.

Serapias 354.

Serratula 180.

Seseli 155.

Sesleria 489.

*Seubertia* 429.

Shepherdia 265.

Sherardia 164.

*Sibbaldia* 84.

Sida 51.

Sidalcea 51.

*Sideritis* 254.

Silene 43.

*Silene* 44-45.

Sinningia 238.

*Siphisa* 260.

Sison 153-54.

Sisymbrium 31.

*Sisymbrium* 26, 32.

Skimmia 60.

*Smegmathamnina* 43.*Smilacina* 464.*Smilax* 440.

Sobralia 350.

*Sobralia* 303.

SOLANÉES 227.

Solanum 227.

- Soldanella* 205.  
*Solidago* 167.  
*Solidago* 176.  
*Sophranitis* 310.  
*Sorbaria* 78.  
*Sorbus* 90.  
*Sparmannia* 52.  
*Spartium* 66, 67.  
*Spathalanthus* 392.  
*Spathiphyllum* 475.  
*Spathiphyllum* 475.  
*Spathoglottis* 294.  
*Spathoglottis* 294.  
*Sphæralcea* 51.  
*Sphæralcea* 51.  
*Sphacrocionium* 510.  
*Sphacrothele* 403.  
*Sphondylium* 156.  
*Spigelia* 217.  
*Spiræa* 77.  
*Spiræa* 77-79.  
*Spiranthes* 351.  
*Spiranthes* 351-52.  
*Sprekelia* 399.  
*Sprekelia* 399.  
*Stachys* 253.  
*Stanhopea* 319.  
*Stanhopea* 319-20.  
*Stanleya* 32.  
*Stapelia* 216.  
*Statice* 197.  
*Stauritis* 340.  
*Stauropsis* 339.  
*Stegania* 522-23.  
*Steironema* 208.  
*Stelis* 277.  
*Stellaris* 340.  
*Stenactis* 169.  
*Stenogastra* 238.  
*Stenoloma* 511.  
*Stenomesson* 403.  
*Stenomesson* 403.  
*Stenorrhynchus* 351.  
*Stephanotis* 215.  
 STERCULIACÉES 52.  
*Sterigma* 35.  
*Sternbergia* 398.  
*Stiffia* 181.  
*Stipa* 437.  
*Strangweja* 438.  
*Stratiotes* 482.  
*Strelitzia* 367.  
*Strelitzia* 367.  
*Streptocalyx* 374.  
*Streptocarpus* 241.  
*Streptocarpus* 241  
*Streptosolen* 228.  
*Strobilanthes* 245.  
*Stromanthe* 366.  
*Stromanthe* 366.  
*Struthiopteris* 508.  
*Stylophorum* 23.  
 STYRACÉES 209.  
*Swertia* 220.  
*Swertia* 221.  
*Symphyandra* 191.  
*Symplocarpus* 476.  
*Symplocarpus* 476.  
*Symplocos* 209.  
*Synnotia* 394.  
*Synthyris* 234.  
*Syringa* 210.  
*Syringa* 210.  
  
*Tabernæmontana* 213.  
*Tacca* 408.  
 TACCACÉES 408.  
*Tainia* 293.  
*Talinum* 48.  
 TAMARISCINÉES 49.  
*Tamarix* 49.  
*Tanacetum* 173.  
*Tapeinotes* 238.  
*Taraxacum* 188.  
*Tasmania* 16.  
*Taxodium* 501.  
*Taxodium* 501.  
*Taxus* 501.  
*Tecoma* 243.  
*Telekia* 171.  
*Telekia* 171.  
*Ternstroemia* 50.  
 TERNSTREMIACÉES 50.  
*Testudinaria* 409.

*Testudinaria* 409.  
 Tetramicra 306.  
 Teucrium 255.  
 Thalia 366.  
 Thalictrum 3.  
*Thalictrum* 3.  
*Thea* 50.  
 Thelymitra 352.  
*Thelymitra* 352.  
*Theresia* 451.  
 Thlaspi 34.  
*Thlaspi* 33, 34.  
*Thrixspermum* 341.  
 Thunbergia 244.  
*Thunia* 294.  
 Thuya 502.  
*Thuya* 501-04.  
 Thuyopsis 501.  
*Thuyopsis* 501.  
 Thymelæa 264.  
*Thymelæa* 264.  
 THYMELÆACÉES 263.  
 Thymus 249.  
*Thymus* 249, 251.  
 Thysananthus 247.  
 Tiarella 93.  
 Tibouchina 120.  
*Tigridia* 387.  
 Tilia 52.  
*Tilia* 52, 53.  
 TILIACÉES 52.  
 Tillandsia 377.  
*Tillandsia* 369-72, 377-79.  
*Timæosia* 42.  
 Tipularia 286.  
*Tithymalus* 266.  
 Todea 544.  
*Todea* 544.  
 Toffieldia 462.  
*Toffieldia* 462.  
 Tolmiea 103.  
 Torenia 233.  
*Torenia* 233.  
*Tornelia* 475.  
 Torreya 506.  
*Torreya* 506-07.  
 Toxicophlæa 212.

Tozzia 236.  
 Trachelospermum 213.  
 Trachyandra 426.  
 Trachycarpus 471.  
 Tradescantia 468.  
*Tradescantia* 468.  
 Trautvetteria 6.  
 Triadenia 49.  
 Trichocentrum 323.  
 Trichoglottis 341.  
*Trichoglottis* 339.  
 Trichomanes 510.  
*Trichomanes* 511, 512, 518.  
 Trichopilia 323.  
*Trichopilia* 324-25.  
 Trichosma 296.  
*Trichosporum* 240.  
 Tricyrtis 463.  
 Trientalis 208.  
 Trifolium 68.  
*Trifolium* 68.  
 Trigonidium 338.  
*Trigonidium* 308.  
 Triguera 229.  
 Trillium 464.  
*Trillium* 365.  
 Triosteum 160.  
 Trisetum 488.  
*Trisetum* 488.  
 Tristagma 428.  
 Triticum 490.  
 Tritonia 393.  
*Tritonia* 393.  
 Trollius 9.  
*Trollius* 9.  
 Tromotriche 216.  
 Tsuga 497.  
*Tsuga* 498.  
 Tulbaghia 427.  
 Tulipa 452.  
*Tulipa* 452-54.  
 Tuna 145.  
 Tunica 42.  
 Turritis 26, 27.  
*Tussilago* 174.  
 Typhonium 481.

Umbilicus 108-11, 113.  
 Urceolina 403.  
*Urceolina* 403.  
 URTICACÉES 269.  
 Uvaria 17.  
*Uvaria* 17.  
 Uvularia 462.  
*Uvularia* 451, 462-63.  
  
 Valeriana 165.  
 Vallisneria 276.  
 Vallota 401.  
 Vancouperia 19.  
 Vanda 344.  
*Vanda* 346-47.  
 Vanilla 350.  
 Vella 32.  
 Veltheimia 435.  
 Veratrum 466.  
*Veratrum* 461, 466.  
 Verbascum 229.  
*Verbascum* 229, 242.  
*Verbena* 248.  
 VERBÉNACÉES 248.  
 Veronica 235.  
*Veronica* 235-36.  
 Vesicaria 29.  
 Viburnum 159.  
*Viburnum* 104, 159-60.  
 Vicia 72.  
*Vicia* 72.  
*Vigna* 485.  
 Villarsia 221.  
*Villarsia* 223.  
 Vinca 213.  
*Vinca* 213.  
 Viola 37.  
*Viola* 37, 38.  
 VIOLARIÉES 37.  
*Vriesea* 377-79.

*Wallrothia* 155.  
 Waldsteinia 81.  
 Warrea 314, 315.  
*Warszewiczella* 314-15.  
*Washingtonia* 500.  
*Weigelia* 162.  
 Wellingtonia 500.  
 Wistaria 69.  
 Woodsia 509.  
*Woodsia* 509.  
 Woodwardia 524.  
*Woodwardia* 524.  
 Wulfenia 234.  
*Wulfenia* 234.  
  
 Xanthoceras 62.  
 Xanthosoma 478.  
*Xanthosoma* 478.  
 Xatardia 155.  
 Xerophyllum 461.  
*Xerophyllum* 461.  
 Xeranthemum 170.  
*Xiphion* 380-86.  
 Xylophylla 268.  
 Xyridion 381-83.  
  
 Yucca 421-22.  
*Yucca* 422-23.  
  
 Zamioculcas 474.  
*Zantedeschia* 477.  
 Zebrina 468.  
 Zerkova 269.  
 Zephyranthes 399.  
 ZINGIBÉRACÉES 365.  
 Zygadenus 466.  
*Zygadenus* 466-67.  
*Zygocactus* 142.  
 Zygopetalum 314.  
*Zygopetalum* 314-15, 326.  
*Zygosepulum* 315.

---




# GEORG & C<sup>ie</sup>, LIBRAIRES-ÉDITEURS

GENÈVE — BALE — LYON


- BOISSIER, EDM. *Flora orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Græcia et Ægypto ad Indiæ fines hucusque observatarum.* — 5 vol. et Supplément, in-8°, 1867-1888 . . . . . 140 fr.
- *Voyage botanique dans le midi de l'Espagne pendant l'année 1837.* — 2 vol. grand in-4°. — Tome I. *Narration et Géographie botanique*, x et 248 pages de texte. — Tome II. *Énumération des plantes du royaume de Grenade.* — *Additions*, 757 pages. Accompagnés d'un Atlas de 206 planches dessinées et gravées par Heyland et coloriées à la main, ainsi que d'un *Tableau synoptique* donnant la hauteur des montagnes et les régions botaniques, 1839-1845.  
 Prix réduit, colorié, au lieu de 400 fr. . . . . 230 fr.  
 — en noir . . . . . 150 fr.  
 — sur papier vélin, colorié, au lieu de 660 fr. . . . . 330 fr.
- *Icones Euphorbiarum* ou figures de 122 espèces du genre Euphorbia, dessinées et gravées par Heyland, avec des considérations sur la classification et la distribution des plantes de ce genre. — 1 vol. grand in-folio, 24 pages de texte et 121 planches. Genève, 1866 . . . . . 70 fr.
- *Diagnoses plantarum orientalium.* 1<sup>re</sup> série, 13 fascicules; 2<sup>me</sup> série, 6 fascicules. — In-8°. Genève, 1842-1859, le fascicule . . . . . 3 fr.  
*Les fascicules 1, 3, 6 et 7 sont épuisés.*
- *Plantæ Aucherianæ.* Fascicules I et II. — In-8°, le fascicule . . . . . 3 fr.
- *Description de deux nouvelles Crucifères des Alpes et du Piémont.* — In-4°, avec 2 planches . . . . . 5 fr.
- *Centuria Euphorbiarum.* Genève, 1860 . . . . . 1 fr.
- *Pugillus plantarum novarum Africæ borealis Hispaniæque australis.* — In-8°. Genève, 1852 . . . . . 3 fr.
- BOISSIER, EDM. ET BUHSE. *Aufzählung der in einer Reise durch Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen.* — In-4° avec 10 planches et 1 carte. Moskau, 1860 . . . . . 40 fr.
- BOISSIER, EDM. ET REUTER, G. F. *Diagnoses plantarum Hispaniæ.* — In-8°. Genève, 1842 . . . . . 42 fr.
- BARBEY, C. ET W. *Herborisations au Levant: Égypte, Syrie et Méditerranée.* Février-Mai 1880. Avec 11 planches et 1 carte. — 1880 . . . . . 20 fr.
- BARBEY, W. *Floræ Sardiæ compendium.* Catalogue raisonné des végétaux observés dans l'île de Sardaigne. Avec suppl. par MM. P. ASCHERSON et E. LEVIER. Avec 7 planches. — 1885 . . . . . 25 fr.
- *Epilobium genus*, a cl. CH. CUISIN, ill. Avec 24 planches. — Lausanne, 1885, 25 fr.
- *Lydie, Lycie, Carie*, 1842, 1883, 1887. Études botaniques. Avec 5 pl. — 1890, 6 fr.
- BARBEY, W., C. DE STEFANI ET C. J. FORSYTH-MAJOR. *Samos.* Étude géologique, paléontologique et botanique. Avec 13 pl., par CH. CUISIN. 1894 . . . . . 20 fr.
- — *Karpathos.* Étude géologique, paléontologique et botanique. Avec 13 pl., par CH. CUISIN. 1895 . . . . . 20 fr.
- Bulletin de l'Herbier Boissier*, sous la direction de EUG. AUTRAN, conservateur de l'Herbier. 12 numéros par an. — Prix: pour la Suisse, 15 fr. Union postale, 20 fr.











New York Botanical Garden Library

QK 73 .B66 A87 1896 gen

Autran, Eugene/Hortus Boissierianus : en



3 5185 00054 2629

